

Звіт

про виконання завдання з самостійної роботи

з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика»

тема «Функція і густина розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини»

студентом Попов А. А. (група КС-231)

в 2024-2025 навчальному році

за індивідуальним варіантом даних №17

Завдання 1. Неперервна випадкова величина задана густиною розподілу $f(x)$. Зобразити диференціальну $f(x)$ та інтегральну $F(x)$ функції розподілу випадкової величини. Обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

$$17. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ 2x + \frac{8}{3}, & 0 < x \leq \frac{1}{3}; \\ 0, & x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Розв'язання:

Обчислимо інтеграли для визначення $F(x)$.

Використовуємо формулу:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

Якщо $x \leq 0$, то $f(x) = 0$, отже

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dx = 0;$$

якщо $0 < x \leq \frac{1}{3}$, то

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \frac{8}{3} + 2t dx = \frac{8}{3}x + x * x$$


якщо $x > \frac{1}{3}$, то

$$F(x) = F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1$$


Отже, шукана функція розподілу:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{8}{3}x + 2x, & 0 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1, & x > \frac{1}{3} \end{cases}$$

Функція $f(x)$ має вигляд:



Функція $F(x)$ має вигляд:



Тепер обчислюємо $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

Математичне сподівання неперервної випадкової величини X , можливі значення якої належать всій осі Ox , визначається рівністю:

$$M(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx.$$

$$M(X) = \int_0^{\frac{1}{3}} x \cdot \left(2x + \frac{8}{3}\right) dx = \int_0^{\frac{1}{3}} \left(2x^2 + \frac{8}{3}x\right) dx = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{81} + \frac{4}{27} = 0,173.$$

Дисперсія неперервної випадкової величини X , можливі значення якої належать всій осі Ox , визначається рівністю:

$$D(X) = \int_a^b x^2 \cdot f(x) dx - [M(X)]^2.$$

$$D(X) = \int_0^{\frac{1}{3}} x^2 \cdot \left(2x + \frac{8}{3}\right) dx - [M(X)]^2 = 0,0092.$$

Середнє квадратичне відхилення неперервної випадкової величини визначається так же, як і для дискретної величини:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \approx 0,096.$$

Висновок: щоб знайти густину розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини потрібно взяти першу похідну від інтегральної функції розподілу ймовірностей.