

# Mathematics for Data Science

## Lecture 2: Continuous Random Variables, Sampling and Limit Theorems

---

Mohamad GHASSANY

EFREI PARIS

Variables Aléatoires Continues

Fonction de répartition d'une v.a.c

Fonction d'une variable aléatoire continue

Moments des variables aléatoires continues

Lois Usuelles de Variables Aléatoires Continues

Loi exponentielle  $\mathcal{E}(\lambda)$

Loi Normale ou de Laplace-Gauss  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Loi Normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$

Relation entre loi normale et loi normale centrée réduite

Approximation normale d'une répartition binomiale

Lois déduites de la loi normale

## **Variables Aléatoires Continues**

---

- ▶ Précédemment nous avons traité des variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire de variables dont l'univers est fini ou infini dénombrable.
- ▶ Il existe cependant des variables dont l'univers est **infini non dénombrable**.
- ▶ **Exemples:**
  - L'heure d'arrivée d'un train à une gare donnée.
  - La durée de vie d'un transistor.

### Definition

$X$  est une **variable aléatoire continue** s'il existe une fonction  $f$  non négative définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et vérifiant pour tout ensemble  $B$  de nombres réels la propriété

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

La fonction  $f$  est appelée **densité de probabilité** de la variable aléatoire  $X$ .

- ▶ Tous les problèmes de probabilité relatifs à  $X$  peuvent être traités grâce à  $f$ .
- ▶ Par exemple pour  $B = [a, b]$ , on obtient:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Graphiquement,  $P(a \leq X \leq b)$  est l'aire de la surface entre l'axe de  $x$ , la courbe correspondante à  $f(x)$  et les droites  $x = a$  et  $x = b$ .




Figure 1:  $P(a \leq X \leq b) = \text{surface grisée}$







Figure 2: L'aire hachurée correspond à des probabilités.  $f(x)$  étant une fonction densité de probabilité.



## Propriétés

Pour toute variable aléatoire continue  $X$  de densité  $f$ :

- ▶  $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- ▶  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- ▶ Comme  $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ , si l'on pose  $a = b$  il résulte  $P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$
- ▶ Ceci signifie que la probabilité qu'une variable aléatoire continue prenne une valeur isolée fixe est toujours nulle.



**Exemple**

Soit  $X$  la variable aléatoire réelle de densité de probabilité

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer  $k$ .
2. Calculer:  $P(1 \leq X \leq 3)$ ,  $P(2 \leq X \leq 4)$  et  $P(X < 3)$ .

**Exemple**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle continue ayant pour densité de probabilité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x + k & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer  $k$ .
2. Calculer  $P(1 \leq X \leq 2)$

## Fonction de répartition d'une v.a.c

---

## Definition

*Si comme pour les variables aléatoires discrètes, on définit la fonction de répartition de  $X$  par:*

$$\begin{aligned} F_X: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto F_X(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

*alors la relation entre la fonction de répartition  $F_X$  et la fonction densité de probabilité  $f(x)$  est la suivante:*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$


## Properties

Pour une variable aléatoire continue  $X$ :

- ▶  $F'_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = f(x)$ .
- ▶ Pour tous réels  $a \leq b$ ,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) \\ &= P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

La fonction de répartition correspond aux probabilités cumulées associées à la variable aléatoire continue sur l'intervalle d'étude.



*Figure 3: L'aire hachurée en vert sous la courbe de la fonction densité de probabilité correspond à la probabilité  $P(X < \alpha) = F_X(\alpha)$  et vaut 0,5 car ceci correspond exactement à la moitié de l'aire totale sous la courbe.*

## Propriétés

Les propriétés associées à la fonction de répartition sont les suivantes:

1.  $F_X$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , dérivable en tout point où  $f$  est continue.
2.  $F_X$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .
3.  $F_X$  est à valeurs dans  $[0, 1]$ .
4.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$ .

## Exemple

Soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires réelles de densités de probabilité

$$f_X(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}y + k & \text{si } 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer  $F_X(a)$  et  $F_Y(a)$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ .

## Fonction d'une variable aléatoire continue

---

- ▶ Soit  $X$  une variable aléatoire continue de densité  $f_X$  et de fonction de répartition  $F_X$ .
- ▶ Soit  $h$  une fonction continue définie sur  $X(\Omega)$ , alors  $Y = h(X)$  est une variable aléatoire.
- ▶ Pour déterminer la densité de  $Y$ , notée  $f_Y$ , on commence par calculer la fonction de répartition de  $Y$ , notée  $F_Y$ , ensuite nous dérivons pour déterminer  $f_Y$ .

### Calcul de densités

Soit  $X$  une variable aléatoire continue de densité  $f_X$  et de fonction de répartition  $F_X$ . Calculer la densité des variables aléatoires suivantes:

- ▶  $Y = aX + b$
- ▶  $Z = X^2$
- ▶  $T = e^X$

### Exemple

Soit la v.a.c  $X$  ayant la fonction de densité

$$f_X(x) = 2x \times \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$$

Déterminer la densité de:  $Y = 3X + 1$ ,  $Z = X^2$  et  $T = e^X$ .

## **Moments des variables aléatoires continues**

---



**Definition**

Si  $X$  est une variable aléatoire absolument continue de densité  $f$ , on appelle espérance de  $X$ , le réel  $E(X)$ , défini par:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

si cette intégrale est convergente.

Les propriétés de l'espérance d'une variable aléatoire continue sont les mêmes que pour une variable aléatoire discrète.

**Properties**

Soit  $X$  une variable aléatoire continue,

- ▶  $E(aX + b) = aE(X) + b$       $a \geq 0$  et  $b \in \mathbb{R}$ .
- ▶ Si  $X \geq 0$  alors  $E(X) \geq 0$ .
- ▶ Si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires définies sur un même univers  $\Omega$  alors

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

## Theorem

Si  $X$  est une variable aléatoire de densité  $f(x)$ , alors pour toute fonction réelle  $g$  on aura

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

## Example

Soit la v.a.c  $X$  ayant la fonction de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer l'espérance des variables aléatoires  $Y = 3X + 1$ ,  $Z = X^2$  et  $T = e^X$ .

La variance d'une variable aléatoire  $V(X)$  est l'espérance mathématique du carré de l'écart à l'espérance mathématique. C'est un paramètre de dispersion qui correspond au moment centré d'ordre 2 de la variable aléatoire  $X$ .

### Definition

*Si  $X$  est une variable aléatoire ayant une espérance  $E(X)$ , on appelle variance de  $X$  le réel*

$$V(X) = E([X - E(X)]^2) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

*Si  $X$  est une variable aléatoire continue, on calcule  $E(X^2)$  en utilisant le théorème de transfert,*

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

### Example

Calculer la variance de la variable aléatoire  $X$  définie dans l'exemple précédent.

### Properties

Si  $X$  est une variable aléatoire admettant une variance alors:

- ▶  $V(X) \geq 0$ , si elle existe.
- ▶  $\forall a \in \mathbb{R}, V(aX) = a^2 V(X)$
- ▶  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}, V(aX + b) = a^2 V(X)$
- ▶ Si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires indépendantes,  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

### Definition

Si  $X$  est une variable aléatoire ayant une variance  $V(X)$ , on appelle écart-type de  $X$ , le réel:

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

## Lois Usuelles de Variables Aléatoires Continues

---

## Définition

La variable aléatoire  $X$  suit une loi uniforme sur le segment  $[a, b]$  avec  $a < b$  si sa densité de probabilité est donnée par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{si } x \notin [a, b] \end{cases} = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$$




Figure 4: Fonction de densité de  $\mathcal{U}([a, b])$

- La *fonction de répartition* associée à la loi uniforme continue est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{b+a}{2}$
- $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

## Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

---



**Définition**

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  est **exponentielle** (ou suit la loi exponentielle) de paramètre  $\lambda$  si sa densité est donnée par


$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

On dit  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$


- La fonction de répartition  $F$  d'une variable aléatoire exponentielle est donnée par

$$\text{Si } x \geq 0 \quad F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$  et  $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$



(a) Représentation graphique de la densité d'une loi exponentielle



(b) Représentation graphique de la fonction de répartition d'une loi exponentielle

## Cas d'utilisations de la loi exponentielle:

- ▶ Représenter le temps d'attente avant l'arrivée d'un événement spécifié.
- ▶ Modéliser la durée de vie d'un phénomène **sans mémoire**, ou sans vieillissement, ou sans usure.
- ▶ On dit qu'une variable aléatoire non négative  $X$  est *sans mémoire* lorsque

$$P(X > t + h | X > t) = P(X > h) \quad \forall \quad t, h \geq 0$$

- ▶ Par exemple, la durée de vie de la radioactivité ou d'un composant électronique.

## Loi Normale ou de Laplace-Gauss

$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

---

**Définition**

Une variable aléatoire  $X$  est dite **normale** avec paramètres  $\mu$  et  $\sigma^2$  si la densité de  $X$  est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$


Avec  $\mu \in \mathbb{R}$  et  $\sigma \in \mathbb{R}^+$ . On dit que  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ .

**Moments de la loi Normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$** 

- ▶  $E(X) = \mu$
- ▶  $V(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- La fonction  $f$  est paire autour d'un axe de symétrie  $x = \mu$  car  $f(x + \mu) = f(\mu - x)$ .
- $f'(x) = 0$  pour  $x = \mu$ ,  $f'(x) < 0$  pour  $x < \mu$  et  $f'(x) > 0$  pour  $x > \mu$



**Figure 6: Remarque:** Le paramètre  $\mu$  représente l'axe de symétrie et  $\sigma$  le degré d'aplatissement de la courbe de la loi normale dont la forme est celle d'une courbe en cloche.

## Théorème

- ▶  $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
- ▶  $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$
- ▶  $X_1$  et  $X_2$  sont indépendantes.

Alors  $X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

**Loi Normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$**

---



**Définition**

Une variable aléatoire continue  $X$  suit une **loi normale centrée réduite** si sa densité de probabilité est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

On dit  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

**Moments de la loi Normale  $\mathcal{N}(0, 1)$** 

- ▶  $E(X) = 0$
- ▶  $V(X) = 1$




Figure 7: Densité d'une loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .




Figure 8: Fonction de répartition de  $\mathcal{N}(0, 1)$

## Relation entre loi normale et loi normale centrée réduite

---

### Théorème





Si  $X$  suit une loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , alors  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$  est une variable centrée réduite qui suit la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

La fonction de répartition de la loi normale centrée réduite permet d'obtenir les probabilités associées à toutes variables aléatoires normales  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  après transformation en variable centrée réduite.

### Définition

On appelle fonction  $\Phi$ , la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ , telle que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x f(t) dt$$



### Propriétés de $\Phi$

Les propriétés associées à la fonction de répartition  $\Phi$  sont:


1.  $\Phi$  est croissante, continue et dérivable sur  $\mathbb{R}$  et vérifie:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \Phi(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} \Phi(x) = 1$$

2.  $\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi(x) + \Phi(-x) = 1$


3.  $\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi(x) - \Phi(-x) = 2\Phi(x) - 1$

# Table de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$



| $a$ | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| .   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| .   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |

# Table de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$



| $\alpha$ | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0      | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1      | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2      | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3      | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| 0.8      | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9      | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0      | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1      | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2      | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3      | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4      | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      |
| 2.9      | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0      | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |

Par exemple, pour  $x = 1.23$  (intersection de la ligne 1.2 et de la colonne 0.03), on obtient :

$$\Phi(1.23) \approx 0.8907$$



**Exemple 1**

Soit  $X$  une variable aléatoire normale centrée réduite. Calculer:

1.  $P(X > 2)$
2.  $P(2 < X < 5)$

**Exemple 2**

Soit  $X$  une variable aléatoire normale de paramètres  $\mu = 3$  et  $\sigma^2 = 4$ . Calculer:

1.  $P(X > 0)$
2.  $P(2 < X < 5)$
3.  $P(|X - 3| > 4)$

## **Approximation normale d'une répartition binomiale**





---

### Théorème de Moivre Laplace

On suppose que pour tout  $n$ ,  $X_n$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  avec  $p \in ]0, 1[$ .

Alors la variable  $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$  converge en loi vers une loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

- ▶ Ce résultat a été progressivement généralisé par Laplace, Gauss et d'autres pour devenir le théorème actuellement connu comme théorème centrale limite qui est un des deux résultats les plus importants de la théorie de probabilités.
- ▶ En pratique de très nombreux phénomènes aléatoires suivent approximativement une distribution normale.



*Figure 9: La loi de probabilité d'une variable aléatoire  $\mathcal{B}(n, p)$  devient de plus en plus "normale" à mesure que  $n$  augmente.*

## Lois déduites de la loi normale

---

**Définition**

Soit  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ,  $n$  variables **normales centrées réduites**, et  $Y$  la variable aléatoire définie par

$$Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_i^2 + \dots + X_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

On dit que  $Y$  suit la loi de  $\chi^2$  (ou loi de Pearson) à  $n$  degrés de liberté,  $Y \sim \chi^2(n)$

- ▶ La loi de  $\chi^2$  trouve de nombreuses applications dans le cadre de la comparaison de proportions, des tests de conformité d'une distribution observée à une distribution théorique et le test d'indépendance de deux caractères qualitatifs. Ce sont les *tests du khi-deux*.
- ▶ **Remarque:** Si  $n = 1$ , la variable du  $\chi^2$  correspond au carré d'une variable normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

**Définition**

Soit  $U$  une variable aléatoire suivant une loi **normale centrée réduite**  $\mathcal{N}(0, 1)$  et  $V$  une variable aléatoire suivant une loi de  $\chi^2(n)$ ,  $U$  et  $V$  étant indépendantes, on dit alors que  $T_n = \frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n}}}$  suit une **loi de Student** à  $n$  degrés de liberté.  $T_n \sim St(n)$

- La loi de Student est utilisée lors des tests de comparaison de paramètres comme la moyenne et dans l'estimation de paramètres de la population à partir de données sur un échantillon (**Test de Student**).

**Définition**

Soit  $U$  et  $V$  deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi de  $\chi^2$  respectivement à  $n$  et  $m$  degrés de liberté.

On dit que  $F = \frac{U/n}{V/m}$  suit une loi de Fisher-Snedecor à  $(n, m)$  degrés de liberté.  $F \sim \mathcal{F}(n, m)$

- La loi de Fisher-Snedecor est utilisée pour comparer deux variances observées et sert surtout dans les très nombreux [tests d'analyse de variance](#) et de covariance.



- ▶ A visual introduction to probability and statistics:  
<http://students.brown.edu/seeing-theory/>
- ▶ Distribution Calculator:  
[https://gallery.shinyapps.io/dist\\_calc/](https://gallery.shinyapps.io/dist_calc/)