


¿POR QUÉ DUELE EL HOMBRO DE MI PACIENTE?



READAPTACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR


Vicente Giles - Fisioterapeuta




SOBRECARGA DEL TEJIDO Y CARGA ALOSTÁTICA




MODELO CARGA-TOLERANCIA




SOBRECARGA DEL TEJIDO




SOBRECARGA DEL TEJIDO




LA CONTRIBUCIÓN NOCICEPTIVA NO LO ES TODO



CARGA ALOSTÁTICA



CARGA ALOSTÁTICA




An anatomical illustration of a human torso in blue, with the shoulder joint highlighted in a glowing orange and red circle, indicating pain or inflammation. The spine and ribcage are visible in the background.

CONTRIBUYENTES AL DOLOR DE HOMBRO

Más allá de la fuente nociceptiva

02

BANDERAS AMARILLAS



Un peor perfil psicológico (DASS, PCS, PSEQ, TKS-11) se asoció a peores resultados post-cirugía

At 6 weeks and 6 months

SPADI and QuickDASH

Higher baseline pain and disability measured by corresponding outcome measure.
Patient expectation of 'slight improvement' rather than 'complete recovery' as 'a result of physiotherapy treatment'.
Lower pain self-efficacy.
Not being in employment due to redundancy, unemployment or disability compared with being in employment or education (exception: SPADI at 6 weeks).
Higher pain severity at rest.

Unas buenas expectativas de tratamiento y una buena autoeficacia se asociaron a mejores resultados de tratamiento a medio y largo plazo

1. Chester, R., Jerosch-Herold, C., Lewis, J., & Shepstone, L. (2018). Psychological factors are associated with the outcome of physiotherapy for people with shoulder pain: a multicentre longitudinal cohort study. *British journal of sports medicine*, 52(4), 269–275. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096084>
2. Thorpe AM, O'Sullivan PB, Mitchell T, Hurworth M, Spencer J, Booth G, Goebel S, Khoo P, Tay A, Smith A. Are Psychologic Factors Associated With Shoulder Scores After Rotator Cuff Surgery? *Clin Orthop Relat Res*. 2018 Oct;476(10):2062-2073. doi: 10.1097/CORR.000000000000389. PMID: 30179945; PMCID: PMC6259849.

KINESIOFOBIA Y DOLOR DE HOMBRO

	1 Totalmente en desacuerdo	2	3	4 Totalmente de acuerdo
1. Tengo miedo de lesionarme si hago ejercicio físico.	1	2	3	4
2. Si me dejara vencer por el dolor, el dolor aumentaría.	1	2	3	4
3. Mi cuerpo me está diciendo que tengo algo serio.	1	2	3	4
4. Tener dolor siempre quiere decir que en el cuerpo hay una lesión.	1	2	3	4
5. Tengo miedo a lesionarme sin querer.	1	2	3	4
6. Lo más seguro para evitar que aumente el dolor es tener cuidado y no hacer movimientos innecesarios.	1	2	3	4
7. No me dolería tanto si no tuviese algo serio en mi cuerpo.	1	2	3	4
8. El dolor me dice cuándo debo parar la actividad para no lesionarme.	1	2	3	4
9. No es seguro para una persona con mi enfermedad hacer actividades físicas.	1	2	3	4
10. No puedo hacer todo lo que la gente normal hace porque me podría lesionar con facilidad.	1	2	3	4
11. Nadie debería hacer actividades físicas cuando tiene dolor.	1	2	3	4

La Kinesiofobia se asocia a mayor intensidad del dolor y discapacidad en dolor de hombro

KINESIOFOBIA Y DOLOR DE HOMBRO



VALORACIÓN DISCAPACIDAD: SPADI

- **Puntuación: 0-130**
- **Mínimo cambio detectable: 13-17 puntos**
- **Cambio clínicamente significativo: 20 puntos**

INDICE DE DOLOR Y DISCAPACIDAD DEL HOMBRO (SPADI)

Nombre: _____ Fecha: _____ Visit: _____ EPS: _____
Sólo para uso de oficina Sólo para uso de oficina

Escala de dolor:

Por favor, ponga una cruz en el número que mejor represente su experiencia **durante la última semana** como consecuencia de su problema de hombro.

¿Cuanto de grave es el dolor?

① = ausencia de dolor y ⑩ = el peor dolor imaginable.

¿En su peor momento?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¿Cuándo se acuesta sobre ese lado?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¿Al alcanzar algo en un estante alto?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¿Al tocarse la parte posterior de su cuello?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¿Al empujar con el brazo afecto?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Escala de discapacidad:

Ponga una cruz en el número que **mejor describe su experiencia**, donde:

¿Cuánta dificultad tiene usted?

① = ausencia de dolor y ⑩ = el peor dolor imaginable.

Lavandose el pelo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lavandose la espalda	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poniéndose una camiseta o un jersey	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poniéndose una camisa con los botones delante	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poniéndose los pantalones	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colocando un objeto en un estante alto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cargando un objeto pesado de 10 libras (4.5 kilograms)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cogiendo algo de su bolsillo trasero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Gómez-Valero, S., García-Pérez, F., Flórez-García, M. T., & Miangolarra-Page, J. C. (2017). Assessment of cross-cultural adaptations of patient-reported shoulder outcome measures in Spanish: a systematic review. *Shoulder & elbow*, 9(4), 233–246. <https://doi.org/10.1177/1758573217694340>
2. Thoomes-de Graaf, M., Scholten-Peeters, G. G., Schellingerhout, J. M., Bourne, A. M., Buchbinder, R., Koehorst, M., Terwee, C. B., & Verhagen, A. P. (2016). Evaluation of measurement properties of self-administered PROMs aimed at patients with non-specific shoulder pain and "activity limitations": a systematic review. *Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation*, 25(9), 2141–2160. <https://doi.org/10.1007/s11136-016-1277-7>

VALORACIÓN DISCAPACIDAD: DASH

- **Puntuación: 0-190**
- **Mínimo cambio detectable: 9 puntos**
- **Cambio clínicamente significativo: 12-14 puntos.**
- **Existe la versión QuickDASH**

Cuestionario DASH

Por favor puntúe su habilidad o capacidad para realizar las siguientes actividades durante la última semana. Para ello marque con un círculo el número apropiado para cada respuesta.

		Ninguna dificultad	Dificultad leve	Dificultad moderada	Mucha dificultad	Imposible de realizar
1	Abrir un bote de cristal nuevo	1	2	3	4	5
2	Escribir	1	2	3	4	5
3	Girar una llave	1	2	3	4	5
4	Preparar la comida	1	2	3	4	5
5	Empujar y abrir una puerta pesada	1	2	3	4	5
6	Colocar un objeto en una estantería situada por encima de su cabeza.	1	2	3	4	5
7	Realizar tareas duras de la casa (p. ej. fregar el piso, limpiar paredes, etc.	1	2	3	4	5
8	Arreglar el jardín	1	2	3	4	5
9	Hacer la cama	1	2	3	4	5
10	Cargar una bolsa del supermercado o un maletín.	1	2	3	4	5
11	Cargar con un objeto pesado (más de 5 Kilos)	1	2	3	4	5
12	Cambiar una bombilla del techo o situada más alta que su cabeza	1	2	3	4	5
13	Lavarse o secarse el pelo	1	2	3	4	5
14	Lavarse la espalda	1	2	3	4	5
15	Ponerse un jersey o un suéter	1	2	3	4	5
16	Usar un cuchillo para cortar la comida	1	2	3	4	5
17	Actividades de entretenimiento que requieren poco esfuerzo (p. ej. jugar a las cartas, hacer punto, etc.)	1	2	3	4	5
18	Actividades de entretenimiento que requieren algo de esfuerzo o impacto para su brazo, hombro o mano (p. ej. golf, martillar, tenis o a la petanca)	1	2	3	4	5
19	Actividades de entretenimiento en las que se mueva libremente su brazo (p. ej. jugar al platillo "frisbee", badminton, nadar, etc.)	1	2	3	4	5
20	Conducir o manejar sus necesidades de transporte (ir de un lugar a otro)	1	2	3	4	5
21	Actividad sexual	1	2	3	4	5

IRRITABILIDAD DEL TEJIDO

Una nueva clasificación

02

IRRITABILIDAD

Table 3.

Operational Definitions for 3 Stages of Tissue Irritability Derived by Consensus^a

	Stage of Irritability		
	High	Moderate	Low
History and examination findings	High pain ($\geq 7/10$) Consistent night or rest pain Pain before end of ROM AROM < PROM High disability	Moderate pain (4–6/10) Intermittent night or rest pain Pain at end of ROM AROM ~ PROM Moderate disability	Low pain ($\leq 3/10$) Absent night or rest pain Minimal pain with overpressure AROM = PROM Low disability
Intervention focus	Minimize Physical Stress Activity modification Monitor impairments	Mild–Moderate Physical Stress Address impairments Basic-level functional activity restoration	Moderate–High Physical Stress Address impairments High-demand functional activity restoration

La irritabilidad hace referencia a la capacidad (o incapacidad) de un tejido de manejar estrés físico.

- Esto podría correlacionar con el estado del tejido y el nivel de inflamación

