

Panduan Penatalaksanaan Perilaku, Perawatan, dan Pencegahan Gigi pada Pasien Anak ASD



Mulai perlahan.

Periksa mulut pasien dengan jari dulu, baru lanjut ke instrumen jika pasien tenang



Jauhkan instrumen dari pandangan pasien.

Hindari cahaya ke mata, suara bising, atau bau yang mengganggu.



Gunakan bahasa yang mudah dipahami pasien.

Jelaskan prosedur dengan jelas, konkret, dan langsung menggunakan metode **tell-show-do**.



Minimalkan gangguan.

Kurangi jumlah staf di ruangan.



Teknik Imobilisasi hanya dengan izin orang tua.

Untuk mencegah cedera.



Berikan pujian.

Apresiasi setiap perilaku kooperatif.



Waspada gerakan tiba-tiba.

Pastikan area sekitar aman.



Konsisten.

Jika memungkinkan Gunakan staf, ruangan, dan waktu yang sama di tiap kunjungan.

Penanganan Kejang saat Perawatan:

- Segera keluarkan semua instrumen dari mulut anak.
- Kosongkan area sekitar kursi perawatan.
- Tetap bersama anak dan posisikan tubuhnya ke salah satu sisi.
- Awasi jalan napas untuk mengurangi risiko aspirasi.
- Catat waktu saat kejang mulai; bila berlangsung lebih dari 3 menit, segera hubungi EMS karena berisiko status epilepticus (potensi mengancam nyawa).