

Panduan Penatalaksanaan Perilaku, Perawatan, dan Pencegahan Gigi pada Pasien Anak Cerebral Palsy



Jelaskan instruksi prosedur sesuai tingkat pemahaman.

Jelaskan satu per satu secara singkat & perlahan.



Gunakan Tell-Show-Do.

Saat memperkenalkan prosedur baru.



Masukkan instrumen pemeriksaan gigi secara perlahan.

posisikan dagu pasien ke bawah untuk mengurangi refleks muntah yang berlebihan.



Jangan paksa tubuh pasien.

Tenangkan dengan tekanan lembut bila ada gerakan tak terkendali.



Perhatikan komunikasi pasien.

Amati ucapan, gerakan, atau isyarat. Tanya pengasuh jika perlu.



Bangun kepercayaan.

Gunakan staf, ruangan, dan waktu yang sama di tiap kunjungan.



Minimalkan rangsangan.

Kurangi cahaya, suara, gerakan mendadak, dan beri tahu anak sebelum ada rangsangan.



Perawatan gigi dan pencegahan:

- Anak dengan kursi roda dapat dirawat tetap di kursi roda; pastikan roda terkunci, gunakan papan luncur (sliding board) untuk menopang punggung, kepala, dan leher, serta posisikan kursi roda miring ke belakang bila memungkinkan.

Panduan Penatalaksanaan Perilaku, Perawatan, dan Pencegahan Gigi pada Pasien Anak Cerebral Palsy

Perawatan gigi dan pencegahan:

- Pertimbangkan mouth guard pada kasus bruxism berat, bila tidak ada disfagia/gagging yang menghalangi pemakaian.
- Anestesi umum sering diperlukan untuk tindakan restoratif atau bedah.
- Berikan edukasi kepada pengasuh tentang perawatan gigi di rumah. Posisi terlentang dengan mouth prop dapat membantu saat menyikat gigi.

Pertimbangan Tambahan:

- Pada pasien dengan feeding tube (gastrik atau nasogastrik) biasanya risiko karies rendah tetapi akumulasi kalkulus cepat, sering dengan GERD, hipersensitivitas oral, dan risiko aspirasi tinggi di kursi perawatan. Tidak perlu antibiotik profilaksis untuk pasien dengan feeding tube.
- Posisikan pasien setegak mungkin, gunakan air semiminal mungkin, dan hisap dengan suction berdaya besar untuk mengurangi risiko aspirasi.

Penanganan Kejang Saat Perawatan:

- Segera keluarkan semua instrumen dari mulut.
- Kosongkan area sekitar kursi perawatan.
- Tetap dampingi anak dan posisikan ke salah satu sisi.
- Awasi jalan napas untuk mencegah aspirasi.
- Catat waktu mulai kejang; bila berlangsung >3 menit, segera hubungi EMS karena berisiko status epilepticus (potensi mengancam nyawa).
- Gunakan suction sesering mungkin bila anak bisa mentoleransinya.

Keamanan di Klinik:

- Tinjau ulang area kerja untuk mencegah kecelakaan, seperti lantai licin, karpet terlipat, atau hambatan lain yang dapat menyebabkan jatuh.