

Logik und Komplexität ÜBUNG 4

Notizen zur dritten Übung
HU Berlin

Aufgabe 1)

a)

$$\begin{aligned} \exists x X(x) \quad \wedge \exists y \neg X(y) \quad \wedge \forall u \forall v ((X(u) \wedge \neg X(v)) \rightarrow (\neg E(u, v) \wedge \neg E(v, u))) \\ \bigvee_{a \in A} v_a \quad \wedge \bigvee_{a \in A} \neg v_a \quad \wedge \bigwedge_{a \in A} \bigwedge_{b \in A} (v_a \wedge \neg v_b \rightarrow (\neg \begin{cases} 1 & (a, b) \in E \\ 0 & (a, b) \notin E \end{cases} \wedge \neg \begin{cases} 1 & (b, a) \in E \\ 0 & (b, a) \notin E \end{cases})) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (v_1 \vee v_2 \vee v_3) \\ & \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \\ & \wedge (v_1 \wedge \neg v_1 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_1 \wedge \neg v_2 \rightarrow \neg 1 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_1 \wedge \neg v_3 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_2 \wedge \neg v_1 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_2 \wedge \neg v_2 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_2 \wedge \neg v_3 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_3 \wedge \neg v_1 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_3 \wedge \neg v_2 \rightarrow \neg 0 \wedge \neg 0) \\ & \wedge (v_3 \wedge \neg v_3 \rightarrow \neg 1 \wedge \neg 1) \end{aligned}$$

b) Erfüllende Belegung ist $v_1, \neg v_3$ d.h.: Erfüllt für $X = \{1\}, X = \{1, 2\}$

Aufgabe 2)

Zeige: $Eval_{Fin_{<}}(\Phi)$ für jeden ESO-HORN-Satz Φ liegt in P.

D.h. es ex. ein det. Algorithmus der bei eingabe einer Endlichen Struktur \mathfrak{A} in Polinomialzeit entscheidet, ob $\mathfrak{A} \models \Phi$

Ein ESO-Horn Satz Φ besitzt die form:

$$\exists X_1 \dots \exists X_d \forall y_1 \dots \forall y_{d'} \phi$$

Wobei ϕ eine Konjunktion von ESO-Horn formeln ist:

$$\phi := \bigwedge_{k \in \Gamma} \bigvee_{j \in K} \beta_{k,j}$$

mit

$$\beta_{k,j} := \begin{cases} \psi(y_1, \dots, y_{d'}) & \psi \in FO[\sigma] \\ X_i(\bar{y}) & \bar{y} \in (\{y_1, \dots, y_d\} \cup \{c : c \text{ ist eine Konstante in } \sigma\})^{ar(X_i)} \\ \neg X_i(\bar{y}) & \bar{y} \in (\{y_1, \dots, y_d\} \cup \{c : c \text{ ist eine Konstante in } \sigma\})^{ar(X_i)} \end{cases}$$

Aus dem Beweis von Theorem 2.24 konstruieren wir in **Polinomialzeit** bei eingabe von \mathfrak{A} die Aussagenlogische Formel $\alpha_{\Phi, \mathfrak{A}}$. Diese hat die Form:

$$\bigwedge_{a_1 \in A} \dots \bigwedge_{a'_d \in A} \bigwedge_{k \in \Gamma} \bigvee_{j \in K} \beta'_{k,j}$$

mit

$$\beta'_{k,j} := \begin{cases} \psi(a_1, \dots, a_{d'}) & \psi \in FO[\sigma] \\ v_{X_i,(\bar{y})} & \bar{y} \in A^{ar(X_i)} \\ \neg v_{X_i,(\bar{y})} & \bar{y} \in A^{ar(X_i)} \end{cases}$$

$\psi(a_1, \dots, a_{d'})$ besitzt keine variablen und kann rekursiv in Polinomialzeit ausgewertet werden. Somit ist Φ ein Aussagenlogischer Horn Satz ist, welcher mit dem Streichungsalgorithmus in Polinomialzeit gelöst werden kann. \square

Aufgabe 3)

Aufgabe 4)