

Sinais e Sistemas - Trabalho 3 - Avaliação 5

Grupo 2

Leonardo Soares da Costa Tanaka
Matheus Henrique Sant Anna Cardoso
Theo Rudra Macedo e Silva

1.) Um SLIT é modelado por $\tau \dot{y}(t) + y(t) = u(t)$ com $y(0^-) = \alpha$. **G2:** $\tau = 3, \alpha = -2$

(a) Calcular a resposta ao degrau unitário e esboçar o seu gráfico;

Para calcular a resposta, trataremos já com os dados, sendo a EDO:

$$3\dot{y}(t) + y(t) = 1(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Pela propriedade da derivação, sabemos que

$$\dot{y}(t) = sY(s) - y(0^-)$$

Então

$$\mathcal{L}\{3\dot{y}(t) + y(t)\} = \mathcal{L}\{u(t)\}$$

$$3(sY(s) - y(0^-)) + Y(s) = U(s)$$

$$Y(s)(3s + 1) + 6 = U(s)$$

Como $u(t) = 1(t)$, sabemos que $U(s) = \frac{1}{s}$, assim

$$\begin{aligned} Y(s)(3s + 1) + 6 &= \frac{1}{s} \\ Y(s) &= \frac{1}{3s + 1} \cdot \frac{1}{s} - \frac{6}{3s + 1} \end{aligned}$$

Separando em frações parciais, temos:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{s} - \frac{3}{3s + 1} - \frac{6}{3s + 1} \\ Y(s) &= \frac{1}{s} - \frac{9}{3s + 1} \\ Y(s) &= \frac{1}{s} - \frac{3}{s + 1/3} \end{aligned}$$

Agora, podemos descobrir $y(t)$.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1(t) \qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s + 1/3}\right\} = 3e^{-\frac{1}{3}t}1(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1(t) - 3e^{-\frac{1}{3}t}1(t)$$

Finalmente

$$y(t) = 1(t) - 3e^{-\frac{1}{3}t}1(t)$$




Figura 1: Esboço do gráfico - Questão 1) a)

(b) calcular a resposta à rampa unitária e esboçar o seu gráfico;

Para calcular a resposta à rampa, tomemos a seguinte EDO:

$$3\dot{y}(t) + y(t) = t1(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Da mesma forma como no item (a), podemos utilizar a propriedade da derivação e fazer em ambos os lados, a transformada de Laplace.

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = (sY(s) - y(0^-)) \qquad \mathcal{L}\{t1(t)\} = U(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$3(Y(s) - y(0^-)) + Y(s) = U(s)$$

$$Y(s)(3s + 1) + 6 = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{3s + 1} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{6}{3s + 1}$$

Separando em frações parciais, teremos

$$Y(s) = \frac{9}{3s + 1} - \frac{3s - 1}{s^2} - \frac{6}{3s + 1}$$

$$Y(s) = \frac{3}{3s + 1} - \frac{3s - 1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s + 1/3} - \frac{3}{s} + \frac{1}{s^2}$$

Agora, podemos calcular a inversa da transformada de Laplace.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 1/3}\right\} = e^{-\frac{t}{3}}1(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s}\right\} = 3 \cdot 1(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t1(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = e^{-\frac{t}{3}}1(t) - 3 \cdot 1(t) + t1(t)$$

Finalmente

$$y(t) = e^{-\frac{t}{3}} 1(t) - 3 \cdot 1(t) + t 1(t)$$




Figura 2: Esboço do gráfico - Questão 1) b)

(c) calcular a resposta ao seno $u(t) = \sin(\omega t)$ para $\alpha = 0$, $\omega = 1/(4\tau)$ e esboçar o seu gráfico;
Agora, temos para resolver a seguinte EDO:

$$3\dot{y}(t) + y(t) = \sin\left(\frac{t}{12}\right) 1(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

Utilizaremos Laplace, para resolver, a saber

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) \qquad \mathcal{L}\left\{\sin\left(\frac{t}{12}\right) 1(t)\right\} = \frac{1/12}{s^2 + 1/144} = \frac{12}{144s^2 + 1}$$

Utilizando, novamente, as técnicas empregadas nos itens anteriores, teremos

$$\begin{aligned} 3(sY(s)) + Y(s) &= \frac{12}{144s^2 + 1} \\ Y(s)(3s + 1) &= \frac{12}{144s^2 + 1} \\ Y(s) &= \frac{1}{3s + 1} \cdot \frac{12}{144s^2 + 1} \\ Y(s) &= \frac{r_1}{3s + 1} + \frac{r_2}{144s^2 + 1} \end{aligned}$$

Vamos, por tentativa e erro, calcular as constantes r_1 e r_2 .

Perceba que, fazendo $r_1 \cdot (144s^2 + 1)$ teremos um termo com s^2 mais uma constante. O mesmo deve ser para $r_2 \cdot (3s + 1)$. Para isso, podemos fazer com que o segundo seja o produto da soma pela diferença, obtendo um termo ao quadrado e uma constante.

Fazemos, então $r_2 = (3s - 1)$, obtendo, naquele segundo produto, o seguinte: $r_2 \cdot (3s + 1) = (3s - 1)(3s + 1) = 9s^2 - 1$. No primeiro produto ($r_1 \cdot (144s^2 + 1)$), já temos um fator grande suficiente para o termo quadrático, podemos corrigir com o segundo produto, multiplicando por 16.

No final, ficamos com a expressão

$$\frac{1}{3s + 1} - \frac{16(3s - 1)}{144s^2 + 1}$$

Ficamos, porém, com uma constante no numerador igual a $(144s^2 + 1 - 16(9s^2 - 1) = 1 + 16 = 17)$ diferente da expressão original (12). Sendo assim, podemos multiplicar a expressão toda por $\frac{12}{17}$ para termos a expressão inicial na forma de somas parciais.

Então

$$Y(s) = \left(\frac{1}{3s+1} - \frac{16(3s-1)}{144s^2+1} \right) \cdot \frac{12}{17}$$

Assim

$$Y(s) \cdot \frac{17}{12} = \frac{1}{3s+1} - \frac{48s-16}{144s^2+1}$$

Fazendo mais alterações, teremos

$$\begin{aligned} Y(s) \cdot \frac{17}{12} &= \frac{1}{3s+1} - \frac{48s}{144s^2+1} + \frac{16}{144s^2+1} \\ Y(s) \cdot \frac{17}{12} &= \frac{1/3}{s+1/3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{s}{s^2+1/144} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1/12}{s^2+1/144} \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1/3} \right\} = e^{-\frac{t}{3}} 1(t) \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1/144} \right\} = \cos \left(\frac{t}{12} \right) 1(t) \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1/12}{s^2+1/144} \right\} = \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right) 1(t)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ Y(s) \cdot \frac{17}{12} \right\} &= \frac{e^{-\frac{t}{3}} 1(t)}{3} - \frac{\cos \left(\frac{t}{12} \right) 1(t)}{3} + \frac{4}{3} \cdot \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right) 1(t) \\ y(t) \cdot \frac{17}{4} &= e^{-\frac{t}{3}} 1(t) - \cos \left(\frac{t}{12} \right) 1(t) + 4 \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right) 1(t) \end{aligned}$$

Finalmente

$$y(t) = 1(t) \cdot \frac{4e^{-\frac{t}{3}} - 4 \cos \left(\frac{t}{12} \right) + 16 \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right)}{17}$$




Figura 3: Esboço do gráfico - Questão 1) c)

(d) calcular a resposta ao seno $u(t) = \text{sen}(\omega t)$ para $\alpha = 0$, $\omega = 4/\tau$ e esboçar o seu gráfico;

Agora, temos para resolver a seguinte EDO:

$$3\dot{y}(t) + y(t) = \operatorname{sen}\left(\frac{4t}{3}\right)1(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

Utilizaremos Laplace, para resolver, a saber

$$\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) \qquad \mathcal{L}\left\{\operatorname{sen}\left(\frac{4t}{3}\right)1(t)\right\} = \frac{4/3}{s^2 + 16/9} = \frac{12}{9s^2 + 16}$$

Utilizando, novamente, as técnicas empregadas nos itens anteriores, teremos

$$\begin{aligned} 3(sY(s)) + Y(s) &= \frac{12}{9s^2 + 16} \\ Y(s)(3s + 1) &= \frac{12}{9s^2 + 16} \\ Y(s) &= \frac{1}{3s + 1} \cdot \frac{12}{9s^2 + 16} \\ Y(s) &= \frac{r_1}{3s + 1} + \frac{r_2}{9s^2 + 16} \end{aligned}$$

Vamos, por tentativa e erro, calcular as constantes r_1 e r_2 .

Perceba que, fazendo $r_1 \cdot (9s^2 + 16)$ teremos um termo com s^2 mais uma constante. O mesmo deve ser para $r_2 \cdot (3s + 1)$. Para isso, podemos fazer com que o segundo seja o produto da soma pela diferença, obtendo um termo ao quadrado e uma constante.

Fazemos, então $r_2 = (3s - 1)$, obtendo, naquele segundo produto, o seguinte: $r_2 \cdot (3s + 1) = (3s - 1)(3s + 1) = 9s^2 - 1$. No primeiro produto ($r_1 \cdot (9s^2 + 16)$), já temos um fator multiplicado pelo termo quadrático, igual ao outro. Não tendo a necessidade de multiplicarmos por nada. Assim, ficamos com $r_1 = 1$.

No final, ficamos com a expressão

$$\frac{1}{3s + 1} - \frac{(3s - 1)}{9s^2 + 16}$$

Ficamos, porém, com uma constante no numerador igual a $(9s^2 + 16 - (9s^2 - 1)) = 16 + 1 = 17$ diferente da expressão original (12). Sendo assim, podemos multiplicar a expressão toda por $\frac{12}{17}$ para termos a expressão inicial na forma de somas parciais.

Então

$$Y(s) = \left(\frac{1}{3s + 1} - \frac{3s - 1}{9s^2 + 16} \right) \cdot \frac{12}{17}$$

Assim

$$Y(s) \cdot \frac{17}{12} = \frac{1}{3s + 1} - \frac{3s - 1}{9s^2 + 16}$$

Fazendo mais alterações, teremos

$$Y(s) \cdot \frac{17}{12} = \frac{1}{3s+1} - \frac{3s}{9s^2+16} + \frac{1}{9s^2+16}$$

$$Y(s) \cdot \frac{17}{12} = \frac{1/3}{s+1/3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{s}{s^2+16/9} + \frac{1}{12} \cdot \frac{4/3}{s^2+16/9}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1/3} \right\} = e^{-\frac{t}{3}} 1(t) \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1/144} \right\} = \cos \left(\frac{t}{12} \right) 1(t) \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1/12}{s^2+1/144} \right\} = \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right) 1(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ Y(s) \cdot \frac{17}{12} \right\} = \frac{e^{-\frac{t}{3}} 1(t)}{3} - \frac{\cos \left(\frac{4t}{3} \right) 1(t)}{3} + \frac{1}{12} \cdot \text{sen} \left(\frac{4t}{3} \right) 1(t)$$

$$y(t) \cdot 17 = 4e^{-\frac{t}{3}} 1(t) - 4 \cos \left(\frac{4t}{3} \right) 1(t) + \text{sen} \left(\frac{t}{12} \right) 1(t)$$

Finalmente

$$y(t) = 1(t) \cdot \frac{4e^{-\frac{t}{3}} - 4 \cos \left(\frac{4t}{3} \right) + \text{sen} \left(\frac{4t}{3} \right)}{17}$$




Figura 4: Esboço do gráfico - Questão 1) d)

(e) encontrar a entrada $u(t)$ para que $y(t) = \alpha \forall t \geq 0$;

Trabalhando com a seguinte EDO, teremos:

$$3\dot{y}(t) + y(t) = u(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Porém, temos que $y(t) = -2 \forall t \geq 0$. Assim, podemos definir a função $y(t) = -2$, pois respeitará o fato de $y(0^-) = -2$. Dessa forma, $\dot{y}(t) = 0$. Na equação, teremos:

$$3 \cdot 0 + (-2) = u(t)$$

Finalmente

$$u(t) = -2$$

(f) encontrar a entrada $u(t)$ para que $y(t) = 0 \forall t > 0$.

Aqui, devemos tomar o cuidado para manter a condição de que $y(0^-) = -2$. Para isso, podemos definir que

$$y(t) = -2 \cdot 1(-t)$$

Tendo, por consequência que

$$\dot{y}(t) = -2\delta(-t) = -2\delta(t)$$

Acima, utilizamos a inversão na escala de tempo para chegar que $\dot{y}(t) = -2\delta(t)$.

Agora, podemos resolver a equação, que é dada por

$$3\dot{y}(t) + y(t) = u(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

$$3(-2\delta(t)) + (-2 \cdot 1(-t)) = u(t)$$

Finalmente

$$u(t) = -6\delta(t) - 2 \cdot 1(-t)$$

2.) Um SLIT relaxado é descrito por $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{u}(t) + u(t)$. **G2:** $a_1 = 30, a_0 = 3$

(a) Para $b_1 = 0$ calcular a resposta ao degrau unitário e esboçar o seu gráfico;

$$\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) = u(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t)\} = \mathcal{L}\{1(t)\}$$

$$s^2Y(s) + 30sY(s) + 3Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s \cdot (s^2 + 30s + 3)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} =$$

$$= \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} \right)$$

$$y(t) = \int \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left[\frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right] \right\} =$$

$$= \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \int (e^{(-15+\sqrt{222})t} - e^{(-15-\sqrt{222})t}) dt = \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left\{ \frac{e^{(-15+\sqrt{222})t}}{-15 + \sqrt{222}} - \frac{e^{(-15-\sqrt{222})t}}{-15 - \sqrt{222}} \right\}$$

(b) para $b_1 = 0$ calcular a resposta à rampa unitária e esboçar o seu gráfico;

$$\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) = u(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t)\} = \mathcal{L}\{t1(t)\}$$




Figura 5: Esboço do gráfico - Questão 2) a)

$$s^2 Y(s) + 30s Y(s) + 3Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 \cdot (s^2 + 30s + 3)} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} =$$

$$= \frac{1}{s^2} \cdot \left(\frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} \right)$$

$$y(t) = \int \int \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left[\frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right] \right\} =$$

$$= \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \int \left\{ \frac{e^{(-15+\sqrt{222})t}}{-15+\sqrt{222}} - \frac{e^{(-15-\sqrt{222})t}}{-15-\sqrt{222}} \right\} dt = \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left\{ \frac{e^{(-15+\sqrt{222})t}}{(-15+\sqrt{222})^2} - \frac{e^{(-15-\sqrt{222})t}}{(-15-\sqrt{222})^2} \right\}$$




Figura 6: Esboço do gráfico - Questão 2) b)

(c) para $b_1 = 1$ calcular a resposta ao degrau unitário e esboçar o seu gráfico;

$$\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) = \dot{u}(t) + u(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

$$\mathcal{L} \{ \ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) \} = \mathcal{L} \{ 1(t) + t1(t) \}$$

$$s^2Y(s) + 30sY(s) + 3Y(s) = 1 + \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 30s + 3} + \frac{1}{s \cdot (s^2 + 30s + 3)}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} + \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} + \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} \right) \\ &= \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left\{ e^{(-15 + \sqrt{222})t} - e^{(-15 - \sqrt{222})t} + \frac{e^{(-15 + \sqrt{222})t}}{-15 + \sqrt{222}} - \frac{e^{(-15 - \sqrt{222})t}}{-15 - \sqrt{222}} \right\} \end{aligned}$$




Figura 7: Esboço do gráfico - Questão 2) c)

(d) para $b_1 = -1$ calcular a resposta ao degrau unitário e esboçar o seu gráfico;

$$\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) = -\dot{u}(t) + u(t) \quad , \quad y(0^-) = 0$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t)\} = \mathcal{L}\{-1(t) + t1(t)\}$$

$$s^2Y(s) + 30sY(s) + 3Y(s) = -1 + \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = -\frac{1}{s^2 + 30s + 3} + \frac{1}{s \cdot (s^2 + 30s + 3)}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= -\frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} + \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(s + 15 - \sqrt{222}) \cdot (s + 15 + \sqrt{222})} \\ &= -\frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} + \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} + \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{\frac{\sqrt{222}}{444}}{s + 15 + \sqrt{222}} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{222}}{444} \cdot \left\{ -e^{(-15+\sqrt{222})t} + e^{(-15-\sqrt{222})t} + \frac{e^{(-15+\sqrt{222})t}}{-15+\sqrt{222}} - \frac{e^{(-15-\sqrt{222})t}}{-15-\sqrt{222}} \right\}$$




Figura 8: Esboço do gráfico - Questão 2) d)

(e) traçar com precisão um único gráfico com as 3 respostas ao degrau;




Figura 9: Gráficos da questão 2) e)

(f) calcular a resposta a seno $u(t) = \text{sen}(\omega t)$ para $b_1 = 0, \omega = 4a_0$ e esboçar o seu gráfico.

Aqui, teremos a seguinte EDO:

$$\ddot{y}(t) + 30\dot{y}(t) + 3y(t) = \text{sen}(12t)$$

Como $y(0^-) = 0$, pois o sistema é relaxado, fazendo a transformada de Laplace em ambos os lados, teremos:

$$s^2 Y(s) + 30s Y(s) + 3Y(s) = \frac{12}{s^2 + 144}$$

$$Y(s) [s^2 + 30s + 3] = \frac{12}{s^2 + 144}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 30s + 3} \cdot \frac{12}{s^2 + 144}$$

Podemos fazer, primeiramente, a separação entre os dois produtos principais, de forma que fique como abaixo:

$$\frac{1}{s^2 + 30s + 3} - \frac{1}{s^2 + 144}$$

Corrigindo a equação acima, multiplicamos por um fator, tendo:

$$Y(s) = \frac{12}{141 - 30s} \cdot \left[\frac{1}{s^2 + 30s + 3} - \frac{1}{s^2 + 144} \right]$$

Fazendo por partes, podemos começar a separar a primeira parcela $\frac{1}{s^2 + 30s + 3}$.

$$\frac{1}{s^2 + 30s + 3} = \frac{1}{2\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right]$$

E agora, a segunda parcela $\frac{1}{s^2 + 144}$.

$$\frac{1}{s^2 + 144} = \frac{1}{24j} \cdot \left[\frac{1}{s - 12j} - \frac{1}{s + 12j} \right]$$

Por partes, novamente, multiplicamos os resultados por $\frac{12}{141 - 30s}$. Começando da primeira parcela, já separada.

$$\begin{aligned} & \frac{12}{141 - 30s} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right] \right) \\ & \frac{6}{\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{1}{141 - 30s} \cdot \frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{141 - 30s} \cdot \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right] \\ & \frac{2}{\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{1}{197 - 10\sqrt{222}} \cdot \left(\frac{30}{141 - 30s} + \frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} \right) - \frac{1}{197 + 10\sqrt{222}} \cdot \left(\frac{30}{141 - 30s} + \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right) \right] \\ & \frac{2}{\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{1}{197 - 10\sqrt{222}} \cdot \left(-\frac{1}{s - 141/30} + \frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} \right) - \frac{1}{197 + 10\sqrt{222}} \cdot \left(-\frac{1}{s - 141/30} + \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right) \right] \\ & \frac{2}{\sqrt{222}} \cdot \left[\frac{-1}{s - 141/30} \cdot \frac{20\sqrt{222}}{16609} + \frac{1}{197 - 10\sqrt{222}} \cdot \frac{1}{s + 15 - \sqrt{222}} - \frac{1}{197 + 10\sqrt{222}} \cdot \frac{1}{s + 15 + \sqrt{222}} \right] \end{aligned}$$

Chamando de p_1 a primeira parcela na qual faremos a inversa de Laplace, teremos:

$$p_1(t) = -\frac{40}{16609} \cdot e^{\frac{141}{30}t} + \frac{2}{197\sqrt{222} - 2220} \cdot e^{(-15 + \sqrt{222})t} - \frac{2}{197\sqrt{222} + 2220} \cdot e^{(-15 - \sqrt{222})t}$$

Podemos, agora, tratar da segunda parcela, também já separada. Ao final ficamos com:

$$\begin{aligned} -\frac{12}{141 - 30s} \cdot \frac{1}{s^2 + 144} &= -\frac{1}{2j} \cdot \left[\frac{30}{141 - 30s} \cdot \frac{80j}{16609} + \frac{1}{141 - 360j} \cdot \frac{1}{s - 12j} - \frac{1}{141 + 360j} \cdot \frac{1}{s + 12j} \right] \\ & \left[\frac{1}{s - 141/30} \cdot \frac{40}{16609} - \frac{1}{282j + 720} \cdot \frac{1}{s - 12j} + \frac{1}{282j - 720} \cdot \frac{1}{s + 12j} \right] \end{aligned}$$

Chamando de p_2 a inversa de Laplace desta segunda parcela, teremos:

$$p_2(t) = \frac{40}{16609} \cdot e^{\frac{141}{30}t} - \frac{1}{282j + 720} \cdot e^{j12t} + \frac{1}{282j - 720} \cdot e^{-j12t}$$

Somando $p_1(t) + p_2(t) = y(t)$, temos:

$$y(t) = \frac{2}{197\sqrt{222} - 2220} \cdot e^{(-15+\sqrt{222})t} - \frac{2}{197\sqrt{222} + 2220} \cdot e^{(-15-\sqrt{222})t} - \frac{1}{282j + 720} \cdot e^{j12t} + \frac{1}{282j - 720} \cdot e^{-j12t}$$

Fazendo mais alterações, chegamos em:

$$y(t) = \frac{2}{197\sqrt{222} - 2220} \cdot e^{(-15+\sqrt{222})t} - \frac{2}{197\sqrt{222} + 2220} \cdot e^{(-15-\sqrt{222})t} - \frac{40}{16609} \cos(12t) - \frac{47}{49827} \sin(12t)$$

Esboçando o gráfico:




Figura 10: Esboço do gráfico - Questão 2) f)

3.) Um SLIT relaxado é descrito por uma função de transferência com numerador e denominador dados por $n(s) = K$ e $d(s) = (s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)$. **G2:** $p_1 = 1, p_2 = 3, p_3 = 4$

(a) Esboçar a resposta ao degrau unitário (escolha o valor de K);

A partir da equação dada no enunciado, temos:

$$Y(s) = \frac{K}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)} \cdot U(s) + G_i(s)$$

Como o SLIT é relaxado, o termo $G_i(s)$ é nulo. Já o termo $U(s)$ será $\frac{1}{s}$, pois representa a resposta ao degrau unitário. Além disso, vamos escolher $K = 6$.

Substituindo os valores na equação abaixo:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{6}{(s+1)(s+3)(s+4)}$$

Devemos separar a equação acima em uma soma de frações parciais:

$$Y(s) = \frac{r_1}{s} + \frac{r_2}{s+1} + \frac{r_3}{s+3} + \frac{r_4}{s+4}$$

O cálculo dos resíduos é simples, portanto será omitido. Os leitores interessados facilmente verificarão a validade dos resultados ao lado. $r_1 = \frac{1}{2}$; $r_2 = -1$; $r_3 = 1$; $r_4 = -\frac{1}{2}$;

Substituindo novamente:

$$Y(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} - \frac{1}{2(s+4)}$$

Para encontrar a expressão final no domínio do tempo, deve-se aplicar a transformada inversa de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} - \frac{1}{2(s+4)}\right\}$$

Ao aplicar simples propriedades de derivação, chegamos ao resultado final:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{1}{2} - e^{-t} + e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-4t}\right]$$

(b) esboçar a resposta ao degrau unitário quando os p_i são divididos por 5;

Mantendo o mesmo valor de K, será necessário recalculer os resíduos para esse caso.

$$Y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{6}{(s+\frac{1}{5})(s+\frac{3}{5})(s+\frac{4}{5})}$$

$$Y(s) = \frac{r_1}{s} + \frac{r_2}{s+\frac{1}{5}} + \frac{r_3}{s+\frac{3}{5}} + \frac{r_4}{s+\frac{4}{5}}$$

Resíduos encontrados: $r_1 = \frac{125}{2}$; $r_2 = -125$; $r_3 = 125$; $r_4 = -\frac{125}{2}$;

$$Y(s) = \frac{125}{2s} - \frac{125}{s+\frac{1}{5}} + \frac{125}{s+\frac{3}{5}} - \frac{125}{2(s+\frac{4}{5})}$$

Resolvendo pela transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{125}{2} - 125e^{-t/5} + 125e^{-3t/5} - \frac{125}{2}e^{-4t/5}\right]$$

(c) esboçar a resposta ao degrau unitário quando os p_i são multiplicados por 5;

$$Y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{6}{(s+5)(s+15)(s+20)}$$

$$Y(s) = \frac{r_1}{s} + \frac{r_2}{s+5} + \frac{r_3}{s+15} + \frac{r_4}{s+20}$$

Os resíduos são: $r_1 = \frac{1}{250}$; $r_2 = -\frac{1}{125}$; $r_3 = \frac{1}{125}$; $r_4 = -\frac{1}{250}$;

$$Y(s) = \frac{1}{250s} - \frac{1}{125(s+5)} + \frac{1}{125(s+15)} - \frac{1}{250(s+20)}$$

Finalmente:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{1}{250} - \frac{1}{125}e^{-5t} + \frac{1}{125}e^{-15t} - \frac{1}{250}e^{-20t} \right]$$

(d) comentar os resultados acima;

É interessante observar que os resíduos aparecem como os coeficientes das exponenciais em cada equação, e as exponenciais estão associadas aos termos p_i do enunciado.

Vamos analisar a equação final da letra a) por exemplo:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{1}{2} - e^{-t} + e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \right]$$

Observe que o termo $\frac{1}{2}$ parece não ter uma exponencial associada, mas na verdade, podemos reescrever como:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{1}{2}e^{0t} - e^{-t} + e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \right]$$

Através da análise acima, concluímos que o termo isolado $\frac{1}{s}$ é na verdade: $\frac{1}{(s+0)}$. Assim, torna-se explícito um possível termo p_i , tal que $p_0 = 0$

Isso prova que os termos p_i e os resíduos encontrados em cada caso podem ser escritos da seguinte forma:

$$y(t) = 1(t) \cdot [r_1e^{-p_0t} + r_2e^{-p_1t} + r_3e^{-p_2t} + r_4e^{-p_3t}]$$

(e) esboçar a resposta ao degrau unitário quando dois p_i são multiplicados por 5 e o outro é dividido por 5;

Vamos então definir a equação da seguinte forma:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{6}{(s+5)(s+15)(s+\frac{4}{5})}$$

Separando em frações parciais:

$$Y(s) = \frac{r_1}{s} + \frac{r_2}{s+5} + \frac{r_3}{s+15} + \frac{r_4}{s+\frac{4}{5}}$$

Resíduos: $r_1 = \frac{1}{10}$; $r_2 = \frac{1}{35}$; $r_3 = -\frac{1}{355}$; $r_4 = -\frac{125}{994}$;

$$Y(s) = \frac{1}{10s} + \frac{1}{35(s+5)} - \frac{1}{355(s+15)} - \frac{125}{994(s+\frac{4}{5})}$$

Por fim:

$$y(t) = 1(t) \cdot \left[\frac{1}{10} + \frac{1}{35}e^{-5t} - \frac{1}{355}e^{-15t} - \frac{125}{994}e^{-4t/5} \right]$$

(f) comentar os resultados acima.

O mesmo padrão, visto nas questões anteriores, se repete aqui. Para cada resíduo calculado e cada termo p_i , podemos expressar o resultado final no mesmo formato visto na questão d)

$$y(t) = 1(t) \cdot [r_1 e^{-p_0 t} + r_2 e^{-p_1 t} + r_3 e^{-p_2 t} + r_4 e^{-p_3 t}]$$