Fallblatt 06: Dupixent (Zahl)

Spezialitätenliste (SL), Prüfung der Sprachfassungen DE/FR/IT, Lauf vom 06.10.2026 (Phase 1, Pilot).

Feld	Inhalt
Präparat(e)	Dupixent
Limitierung(en), Kennung in der Publikation	`DUPIXENT.02`, `DUPIXENT.02P`
Art der Prüfung	Zahl (Wert mit Einheit)
Betroffene Sprachfassung(en)	FR
Abweichung	Zahl, FR: DE 15 30 · FR —
Weicht von den beiden anderen ab	FR
Erstmals festgestellt	bereits im frühesten geprüften Stand 2026 vorhanden (19.02.2026); vorhanden in 9 von 9 geprüften Ständen ab diesem Datum
Blinde Einstufung	real: Bedeutung weicht ab (N20: real; N21: real)
Herkunft der Einstufung	zwei blinde Claude-Annotatoren, ein dritter bei Uneinigkeit (Mehrheit); keine Einstufung durch das BAG
Hinweis	Fall war vor Entwicklung der Prüfregel bekannt (kein unabhängiger Treffer)
Nachschlagen	https://sl.bag.admin.ch/sl, Präparat «Dupixent» suchen, Limitierung in DE, FR und IT vergleichen; Rohdaten: https://epl.bag.admin.ch/static/sl/publication/fhir/foph-sl-publication-20261006-de.ndjson (ebenso `-fr`, `-it`)

Auszüge

Wörtlich aus der Publikation vom 06.10.2026; die abweichenden Werte sind **fett**. «…» kürzt den Text.

Befund N20

- **DE:** … alle zwei Wochen, bei Patienten mit einem Körpergewicht ab **30 kg** bis unter 60 kg in einer Anfangsdosis von 400 mg als sub…
- **FR:** …injection sous-cutanée toutes les deux semaines, et pour les patients pesant moins de 60 kg à une dose initiale de 400 mg en injection sous-…
- **IT:** …iniezione sottocutanea ogni due settimane, in pazienti con un peso corporeo da **30 kg** a meno di 60 kg a una dose iniziale di 400 mg sotto forma di iniezione…

Einstufung: von beiden blinden Claude-Annotatoren als real bestätigt: die Bedeutung weicht ab.

Befund N21

- **DE:** … alle zwei Wochen, bei Patienten mit einem Körpergewicht ab **30 kg** bis unter 60 kg in einer Anfangsdosis von 400 mg als sub…
- **FR:** …injection sous-cutanée toutes les deux semaines, et pour les patients pesant moins de 60 kg à une dose initiale de 400 mg en injection sous-…
- **IT:** …iniezione sottocutanea ogni due settimane, in pazienti con un peso corporeo da **30 kg** a meno di 60 kg a una dose iniziale di 400 mg sotto forma di iniezione…

Einstufung: von beiden blinden Claude-Annotatoren als real bestätigt: die Bedeutung weicht ab.

Bearbeitung (durch BAG auszufüllen)

Feld	Eintrag
Geschäftsnummer (GEVER)	durch BAG zu ergänzen
Sprache der Verfügung	aus dem Dossier: _____
Welcher Text ist falsch?	□ DE □ FR □ IT (mehrere möglich; gemessen am Entscheid des BAG)
Was ist zu tun?	□ Von Amtes wegen berichtigen □ Mit der Zulassungsinhaberin in der dreijährlichen Überprüfung aufnehmen □ An den Sprachdienst □ Keine Massnahme (gleichwertige Formulierung) □ Noch unklar – Entscheiddossier prüfen

Feld	Eintrag
Bemerkung	
Visum (Name, Datum)	

Quelle: `data/audit/audit_20261006.json`, Befunde N20, N21; erzeugt mit `python3 tools/pilot_sheets.py` (ohne Modellaufruf).