CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD · SALA DE SITUACIÓN BOLIVIA

BOLETÍN DE SITUACIÓN · SALA DE SITUACIÓN · BOLIVIA

Último mes · corte 10/11/2026 06:11 (hora Bolivia) · fuentes abiertas, información preliminar

Amenazas climatológicas

Sequía, incendios forestales y variabilidad climática. Focos de calor por satélite (NASA FIRMS) y sequía con el índice SPI (método OMM).

NASA FIRMS · INPE (GOES, 10 min) · SPI / ERA5 · SENAMHI (propensión) · NASA EONET · Prensa

Focos de calor (último día)
307
NASA FIRMS · 2026-11-09

Potencia radiativa (último día)
3.823 MW
suma de focos


Complejos de incendio
6
grupos de focos vecinos

Departamentos con sequía (SPI-3 ≤ −1)
0
Sin déficit relevante

Mapa y situación vigente

Focos de calor, complejos y sequía

Mapa de calor (3 días, NASA) · círculos rojos = complejos · puntos celestes = focos GOES (INPE, cada 10 min). Use el panel «Capas» para ver focos por municipio, imagen NASA con fecha y sequía.



Complejos de incendio mayores y sequía

Santa Rosa, Santa Cruz
43 detecciones · 739.7 MW

El Puente, Santa Cruz
29 detecciones · 494.4 MW

San Joaquín, Beni
16 detecciones · 324.1 MW


San Joaquín, Beni
23 detecciones · 264.8 MW

Santa Rosa, Santa Cruz
10 detecciones · 111.2 MW

Villa Tunari, Cochabamba
8 detecciones · 77.6 MW

Subtipos y nivel de importancia


Cada fenómeno dentro de este tipo, desglosado por nivel (últimos 30 días). El nivel viene de la fuente oficial cuando existe; en prensa es «sin nivel» hasta que se confirme.



Indicadores y gráficos de análisis


Focos de calor por día

Barras = número de focos; línea = potencia radiativa (MW).




Focos por departamento (3 días)

Detecciones de los últimos tres días.




Municipios con más focos (3 días)

Los diez con más detecciones.




Sequía por departamento (SPI-3)

Rojo/naranja = déficit de lluvia; azul = húmedo (método OMM).




Historia del SPI-3 del departamento



Departamento × día (focos)

Mapa de calor de detecciones.



Registro de eventos (62)