CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD · SALA DE SITUACIÓN BOLIVIA

BOLETÍN DE SITUACIÓN · SALA DE SITUACIÓN · BOLIVIA

Último mes · corte 09/11/2026 19:02 (hora Bolivia) · fuentes abiertas, información preliminar

Amenazas climatológicas

Sequía, incendios forestales y variabilidad climática. Focos de calor por satélite (NASA FIRMS) y sequía con el índice SPI (método OMM).

NASA FIRMS · INPE (GOES, 10 min) · SPI / ERA5 · SENAMHI (propensión) · NASA EONET · Prensa

Focos de calor (último día)
26
NASA FIRMS · 2026-11-08

Potencia radiativa (último día)
420 MW
suma de focos


Complejos de incendio
25
grupos de focos vecinos

Departamentos con sequía (SPI-3 ≤ −1)
0
Sin déficit relevante

Mapa y situación vigente

Focos de calor, complejos y sequía

Mapa de calor (3 días, NASA) · círculos rojos = complejos · puntos celestes = focos GOES (INPE, cada 10 min). Use el panel «Capas» para ver focos por municipio, imagen NASA con fecha y sequía.



Complejos de incendio mayores y sequía

San Joaquín, Beni
111 detecciones · 4025.6 MW

Ixiamas, La Paz
71 detecciones · 907 MW

Yapacaní, Santa Cruz
54 detecciones · 854.4 MW

Reyes, Beni
50 detecciones · 784.8 MW


San Ignacio, Santa Cruz
31 detecciones · 622.9 MW

Concepción, Santa Cruz
81 detecciones · 616.7 MW

San Andrés, Santa Cruz
66 detecciones · 587.9 MW

Subtipos y nivel de importancia


Cada fenómeno dentro de este tipo, desglosado por nivel (últimos 30 días). El nivel viene de la fuente oficial cuando existe; en prensa es «sin nivel» hasta que se confirme.



Indicadores y gráficos de análisis


Focos de calor por día

Barras = número de focos; línea = potencia radiativa (MW).




Focos por departamento (3 días)

Detecciones de los últimos tres días.




Municipios con más focos (3 días)

Los diez con más detecciones.




Sequía por departamento (SPI-3)

Rojo/naranja = déficit de lluvia; azul = húmedo (método OMM).




Historia del SPI-3 del departamento



Departamento × día (focos)

Mapa de calor de detecciones.



Registro de eventos (61)