

red

Verifica di Fisica Esempio di verifica

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} |f(x+\varepsilon) - f(x)| < \mathscr{S}$$


$$A\widehat{B}C = 120^{\circ} - \int_{x=0}^{\infty} \frac{1}{x^2} + {5 \choose 2} - \sum_{i=1}^{N} \frac{i(i+1)}{2} - \overline{x}$$

 $^{\circ}\mathrm{C}^{\circ}\mathrm{C}e$

€



Figura 1: Logo della scuola 1



Logo della scuola 2

A1 A2 AB3
B12 AB3
Prova in verde

$$2x^{2} - 6 = 0$$
$$2(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0$$

prova prova prova prova

ab // c \perp defghijklmnopqstuvwxyz i // j $\hat{i} \perp \hat{j}$ \hat{i} // \vec{i}

abc defghijklm nop qr stuv w xyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1

$$\operatorname{Nm} \cdot \operatorname{s}^{-2}\Omega \overset{\operatorname{1cc}}{\Longrightarrow} \overset{\operatorname{1cc}}{\Longrightarrow} \qquad 2,3 \cdot 10^{3} \, \frac{\operatorname{m}}{\operatorname{s}^{2}} \quad \Longrightarrow \quad \overrightarrow{v} \neq \overrightarrow{v}_{1} \binom{5+2}{2} = 10 \qquad \binom{1}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad A\widehat{B}C$$

$$\left(\frac{\operatorname{m}}{\operatorname{s}^{2}}\right) \qquad \left[\frac{\operatorname{N}}{\operatorname{kg}^{2}}\right] \qquad \left\{\frac{n!}{k!}\right\} \qquad \left|\int_{0}^{\infty} x \, \mathrm{d}x\right| \qquad \left\lfloor \binom{5}{3} \right\rfloor \qquad \left\lceil\sum_{i=0}^{N} \frac{i(i+1)}{2}\right\rceil$$

Verifica di Fisica

COGNOME: Miceli	CLASSE: 2 D	4. ASTI
NOME:	Liceo Scientifico F. Vercelli	E
Asti,	a.s. 2024-2025	Scientifico Sue

Lemma 1 (delle mediane). Potrebbe essere utile per la dimostrazione dell'esistenza del baricentro.

Teorema 2 (esistenza del baricentro). Ogni triangolo ha un baricentro. Questo vuol dire che le sue mediane concorrono in un punto.

Corollario 3. Potrebbe esserci qualche conseguenza Emberessante

Dimostrazione 1. Potrebbe essere Emberessante dimostrare sto fatto.

Esercizio 1. Poi possiamo provare a dare un esercizio

Soluzione 1. Potrebbe essere utile proporre una soluzione al problema

Vale poi la pena di provare a scrivere qualcosa

Definizione. Una forza si dice conservativa se la sua circuitazione è nulla su qualunque percorso chiuso.

- a. Questa è la prima domanda del problema
- **b**. Questa è la seconda domande

C'è poi ancora un po' di testo

- c. continuiamo con una terza domanda
- d. e poi con una quarta
- e. e al limite una quinta

Pt.base	$\mathrm{Es.}1$		Es. 2		Es. 3		Es. 4	Tot.
	a.	b.	a.	b.	a.	b.		
10	10	10	15	10	15	10	20	100
10								

Voto: