

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники  
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

### **Отчёт по лабораторной работе №1**

По дисциплине «Математическая статистика» (четвёртый семестр)

Исследование распределения случайной величины

**Студент:**

Билошицкий Михаил Владимирович

Беяев Михаил Сергеевич

Сиразетдинов Азат Ниязович

**Преподаватель:**

Милованович Екатерина Воиславовна

Санкт-Петербург  
2024 г.

## Цель работы:

На основании анализа опытных данных

1. Построить интервальный ряд; полигон частот; выборочную функцию распределения; гистограмму для изучения признака
2. Вычислить точечные оценки математического ожидания и дисперсии
3. Построить доверительные интервалы для мат ожидания и дисперсии с доверительной вероятностью 0,95

## 1 Интервальный ряд

По условию нам дано  $n = 100$ . Получим  $k$  - число интервалов:

$$k = \sqrt{n} \quad (1)$$

$$k = \sqrt{100} = 10$$

Таблица для оценивания исследования распределения случайной величины:

0.866	-0.005	0.403	1.908	0.448	0.169	-0.731	0.66
1.409	0.191	-0.165	0.889	0.804	-2.131	-0.754	
-0.693	-0.732	1.073	-1.724	-1.810	0.947	-1.118	
-0.990	-0.104	0.174	-0.052	-0.182	1.813	0.346 height0.970	
1.547	-0.484	-0.086	-0.066	0.150	-0.264 height0.350	0.033	
-0.319	0.570	-0.837	-0.413	-1.640 height-0.795	-0.015	1.774	
-0.917	-0.091	1.118	0.277 height-0.622	-0.554	-0.470	0.700	
0.630	-0.700	-0.674 height	1.429	-1.163	-0.925	0.973	
0.384	-0.350	0.203 height-2.084	0.100	0.001	-0.070	0.773	
1.816	1.307 height						

Таблица 1: Данные

Для выборки  $\min = -2.977$ ,  $\max = 2.247$ . Для удобства расчётов пусть  $\min = -3.0$ ,  $\max = 2.5$ .

$$a_{\min} = -3.0; \quad b_{\max} = 2.5$$

По формуле найдём шаг разбиения:

$$h = \frac{b - a}{k} \quad (2)$$

$$h = \frac{5.5}{10} = 0.55$$

Введём отрезок  $[a, b]$ , длина которого  $10h$ . Разбиваем его на 10 равных частичных интервалов, определяем частоты и относительные частоты. Представителя каждого интервала будем считать по формуле:

$$x_i^* = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \quad (3)$$

$$h_i = \frac{p_i^*}{h}$$

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интервалы	[ -3.0 ; -2.45 )	[ -2.45 ; -1.9 )	[ -1.9 ; -1.35 )	[ -1.35 ; -0.8 )	[ -0.8 ; -0.25 )	[ -0.25 ; 0.3 )	[ 0.3 ; 0.85 )	[ 0.85 ; 1.4 )	[ 1.4 ; 1.95 )	[ 1.95 ; 2.5 ]
$x_i^*$	-2.725	-2.175	-1.625	-1.075	-0.525	0.025	0.575	1.125	1.675	2.225
$m_i$	3	1	4	9	21	27	14	8	11	2
$p_i^*$	0.03	0.01	0.04	0.09	0.21	0.27	0.14	0.08	0.11	0.02
$h_i$	0.05	0.02	0.07	0.16	0.38	0.49	0.25	0.15	0.2	0.04

Таблица 2: Интервальный ряд с характеристиками




Рис.2 Полигон частот

2 Вычисление точечных оценок мат ожидания и дисперсии

Найдем точечные оценки математического ожидания и дисперсии. В качестве таких оценок выбирают среднее выборочное значение:

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{10} x_i^* p_i^*$$




Рис. 1: Эмпирическая функция




Рис. 3 Гистограмма распределения

и выборочную дисперсию:

$$S^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i^* - \bar{X})^2 p_i^* = \sum_{i=1}^{10} x_i^{*2} p_i^* - \bar{X}^2 = m_2 - \bar{X}^2$$

где

$$m_2 = \sum_{i=1}^{10} x_i^{*2} p_i^*$$

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	некоторые рез-ты
$x_i^*$	-2.725	-2.175	-1.625	-1.075	-0.525	0.025	0.575	1.125	1.675	2.225	-
$p_i^*$	0.03	0.01	0.04	0.09	0.21	0.27	0.14	0.08	0.11	0.02	-
$x_i^* p_i^*$	-0.082	-0.022	-0.065	-0.097	-0.11	0.007	0.081	0.09	0.184	0.045	0.031
$x_i^{*2} p_i^*$	0.223	0.047	0.106	0.104	0.058	0.0	0.046	0.101	0.309	0.099	1.093

Таблица 3: Данные для подсчёта мат ожидания и дисперсии

Оценка математического ожидания: 0.031

Оценка дисперсии: 1.092

### 3 Построить доверительные интервалы для мат ожидания и дисперсии

Для рассматриваемого примера будем иметь:

$$\gamma = 0,95;$$

тогда находим по таблице распределения Стьюдента для 0.05 квантиль  $t = 2.262$ , поэтому в нашем примере имеем:

$$\bar{X} - t \frac{S}{\sqrt{n}} = 0.031 - 2.262 \cdot \frac{\sqrt{1.092}}{\sqrt{10}} = -0.716$$

$$\bar{X} + t \frac{S}{\sqrt{n}} = 0.031 + 2.262 \cdot \frac{\sqrt{1.092}}{\sqrt{10}} = 0.778$$

таким образом:

$$-0.716 < m < 0.778$$

Для дисперсии определим квантили распределения хи-квадрат с 9 степенями свободы:

$$\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 = \chi_{1-\frac{0.05}{2}, 9}^2 = \chi_{0.975, 9}^2 = 2.7$$

$$\chi_{\alpha/2, n-1}^2 = \chi_{0.025, 9}^2 = 19.02$$

По формуле подставим:

$$\left( \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right) \\ \left( \frac{9 \cdot 1.093}{19.02}, \frac{9 \cdot 1.093}{2.7} \right)$$

Доверительный интервал для дисперсии:

$$0.517 < s^2 < 3.643$$

## Вывод

На основании анализа опытных данных: построили интервальный ряд; полигон частот; выборочную функцию распределения; гистограмму для изучения признака. Вычислили точечные оценки мат ожидания и дисперсии. Построили доверительные интервалы для мат ожидания и дисперсии с доверительной вероятностью 0,95.