

a
Hallmark
p53
E2F
ρ = 0.71; 49 sets
NES, Yq loss vs Yq-intact cells
NES, 3p loss vs remaining cells
b
GO:BP
Type I interferon
ρ = 0.50; 3,178 sets
NES, Yq loss vs Yq-intact cells
NES, 3p loss vs remaining cells
FDR <0.05:
Both, same direction
Both, opposite
3p only
Yq only
Neither
c
RPTEC: early Yq
RPTEC: early 3p
1q | A2058 [1]
1q | A2780 vs WT [2]
1q | A2780 vs TK [2]
1q | AGS vs TK
1q | MCF10A
1q | MCF10A-HRAS
3p | RPTEC day 18 [3]
3p | RPTEC day 90 [3]
7p | A2058 [1]
8q | A2058 [1]
8q | HCT116
10+18 | RPE1 p53 KO [4]
13 | RPE1 p53 KO [4]
19p | RPE1 p53 KD
p53
E2F
G2/M
MYC V1
OXPHOS
Ribosomal
IFN-α
IFN-γ
TNFα–NF-κB
Inflammatory
EMT
NES
4
0
−4
d
NES; * FDR <0.05
Day 5 (scRNA) +2.11* +2.07* -2.96* -2.83* -1.68* +2.04*
Day 10 (scRNA) +2.07* +1.64* -2.78* -2.68* -2.53* +1.96*
Day 18 (bulk) +2.08* +1.50* -2.72* -2.19* -2.58* -1.77*
Day 90 (bulk) -1.94* -1.77* +2.02* +1.46* +2.26* +1.22
IFN-α
IFN-γ
E2F
G2/M
MYC V1
p53