



c ATP-binding cleft

RK-33-associated region

	200–207							224–231							
X	Y	T	R	P	T	P	V	Q	A	Q	T	G	S	G	K	T
Y	Y	T	R	P	T	P	V	Q	A	Q	T	G	S	G	K	T
	198–205							222–229							

ATP segments: 16/16 identical

2I4I AMP neighbors (≤4 Å): 14/14 identical

RNA-binding surface

FH-1321 / 16d and BA103 (modeled contacts)

	274	276	302	323	326	357	503
X	P	R	G	T	R	F	R
Y	P	R	G	T	R	F	R
	272	274	300	321	324	355	501

16d: 6/6 identical | BA103: 4/4 identical

d N-terminal IDR

X 9–28 / Y 9–28

X	A	L	G	L	D	Q	Q	F	A	G	L	D	L	N	S	S	D	N	Q	S
Y	D	P	E	L	D	Q	Q	L	A	N	L	D	L	N	S	E	K	Q	S	G

10/20 identical (50%) | 50% similar

Disordered; binding untested

RecA2 variable segment

X 421–440 / Y 419–438

X	W	V	E	E	S	D	K	R	S	F	L	L	D	L	L	N	A	T	G	K
Y	W	V	E	D	L	D	K	R	S	F	L	L	D	I	L	G	A	T	G	S

15/20 identical (75%) | 85% similar

Resolved in 2I4I; binding untested