




b Leading P4 candidates

Gene	P3 rank	P4 rank	P3 ΔD0	P4 ΔD0
L3MBTL2	1	1	−1.15	−1.50
UBR5	5	2	−1.15	−1.42
TM7SF2	3	3	−0.85	−1.11
CLYBL	4	4	−0.72	−1.01
CELSR2	12	5	−0.97	−1.31
ICK	294	6	−0.44	−1.57
MFGE8	2	7	−1.00	−0.79
EIF1AX	15	8	−0.04	−0.29
NUP155	169	11	−0.87	−1.47
TTC3	21	10	−0.22	−0.52

ΔD0: mean baseline-adjusted $\log_2$ ratio; pseudocount 0.5.
Ranks use endpoint drugZ scores and all retained target guides.



NTC scaling; 342-guide exclusion; pseudocount 0.5. Grey: guides; colour: gene mean.
P3: 1 CTRL + 3 LOY; P4: 1 CTRL + 2 LOY. Cross: CTRL_P3_R1 reassigned to LOY and included in the P3 mean.
Passage samples overlap; the additional P3 sample's independence is unresolved.



Matched guide sets and total-count scaling; 342-guide exclusion and ≥50 reads in every original D0 library.
P3: three LOY / one CTRL; P4: two LOY / one CTRL. Shared population baselines; FDRs exploratory.