Matched CPM + 1 contrasts at D0 and endpoint

Guide $\log_2$ fold change (LOY / sgCTRL)

Chr 1 (n = 7,915) | Chr 2 (n = 4,799) | Chr 3 (n = 4,150) | Chr 4 (n = 2,918)

Chr 5 (n = 3,362) | Chr 6 (n = 4,002) | Chr 7 (n = 3,511) | Chr 8 (n = 2,578)

Chr 9 (n = 3,007) | Chr 10 (n = 2,845) | Chr 11 (n = 4,999) | Chr 12 (n = 3,962)

Chr 13 (n = 1,234) | Chr 14 (n = 2,328) | Chr 15 (n = 2,238) | Chr 16 (n = 3,183)

Chr 17 (n = 4,526) | Chr 18 (n = 1,051) | Chr 19 (n = 5,447) | Chr 20 (n = 2,094)

Chr 21 (n = 847) | Chr 22 (n = 1,682) | Chr X (n = 3,224) | Chr Y (n = 186)



Grey: all observed guide pairs (2.5% opacity). Black: stage-wise medians. Density reflects guide count; no downsampling.

Both stages: $\log_2[(\text{LOY CPM} + 1)/(\text{sgCTRL CPM} + 1)]$. Endpoint CPM is the within-genotype mean of R1/R2.

All panels share limits and retain all finite values. Guides absent from both genotypes at either stage are omitted.