

a
Mapped reads (%)
100
50
0
21.2
21.5
85.3
85.6
84.8
85.0
Guides detected (%)
100.0
99.4
98.8
99.53
99.53
99.09
99.18
99.12
99.08
D0 CTRL
D0 LOY
CTRL R1
CTRL R2
LOY R1
LOY R2
b
Zero-count guides
363
365
703
634
684
713
77,441 guides / sample
Guide abundance, log2(CPM + 1)
16
12
8
4
0
c
MAGeCK Gini index (log counts)
0.12
0.08
0.04
0.00
0.11450
0.11440
0.08652
0.08355
0.08015
0.08480
D0 guides / hexagon
Endpoint guides / hexagon
d
D0: CTRL vs LOY
Pearson r = 0.957
n = 77,441 guides
Identity
Linear fit
173 removed; r = 0.927
LOY
CTRL
D0 LOY, log2(CPM + 1)
D0 CTRL, log2(CPM + 1)
e
CTRL
Pearson r = 0.956
n = 77,441 guides
Identity
Linear fit
R2, log2(CPM + 1)
R1, log2(CPM + 1)
f
LOY
Pearson r = 0.946
n = 77,441 guides
Identity
Linear fit
R2, log2(CPM + 1)
R1, log2(CPM + 1)
g
True-positive rate
False-positive rate
Essential / non-essential genes
CTRL: 989 / 740
LOY: 994 / 736
CTRL AUC 0.947
LOY AUC 0.907
h
sgCTRL
Y-depleted
Yp (AMELY)
Yq (KDM5D/DDX3Y)
Estimated Y-target copies per cell
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
D0
P1
P2
P3
P4
Screening passage