No R, a função principal para arredondar valores decimais é `round()`. YouTube · Mercel Santos +2

Funções mais comuns de arredondamento

- `round(x, digits = n)`: Arredonda o valor `x` para o número de casas decimais especificado em `digits`.

```
R

round(3.14159, digits = 2) # Retorna 3.14
```

Use o código com cuidado.

- `floor(x)`: Arredonda sempre para baixo (menor inteiro próximo).

```
R

floor(3.8) # Retorna 3
```

Use o código com cuidado.

- `ceiling(x)`: Arredonda sempre para cima (maior inteiro próximo).

```
R

ceiling(3.2) # Retorna 4
```

Use o código com cuidado.

- `signif(x, digits = n)`: Arredonda o número para um total de `n` dígitos significativos. Steven P. Sanderson II,... +1

```
R

signif(123.456, digits = 4) # Retorna 123.5
```

Use o código com cuidado.

Exemplos práticos

1. Arredondar um vetor ou coluna

Você pode aplicar a função diretamente a um vetor ou a uma coluna de um `data.frame`:

```
R

vetor <- c(1.234, 5.678, 9.1011)
round(vetor, digits = 1)
# Resultado: [1] 1.2 5.7 9.1
```

Use o código com cuidado.

2. Usando com pipes (`%>%`) do `dplyr`

Se você estiver manipulando bases de dados e quiser arredondar uma coluna específica com o operador `%>%`: Stack Overflow em Port… +1

R

```
library(dplyr)

# Exemplo: arredondando a coluna 'IQA' para 2 casas decimais
dados %>%
  mutate(IQA = round(IQA, 2))
```

Use o código com cuidado.

Você gostaria de ver como formatar os números para exibição com vírgula e zeros à direita (como em tabelas e relatórios), ou precisa de ajuda com uma estrutura de dados específica?