
## Matematika I

15. januára 09:00

Meno a priezvisko: Podpis: Podpis:
Ročník: študijný program:
1. (7b) Daná je všeobecná rovnica kužeľosečky $4x^2 + y^2 + 8x + 4y - 8 = 0$ .
Doplňte:
a) (2b) Kanonická rovnica (rovnica v štandardnom tvare) kužeľosečky je
b) (1b) Typ kužeľosečky je
c) (3b) Napšíte, ak existujú
$c_1$ ) súradnice stredu kužeľosečky:
d) (1b) Znázornite kužeľosečku a v náčrte popíte jej charakteristické prvky

2. (2b) Vyberte funkciu, ktorej definičný obor je znázornený na obrázku.



a) 
$$f(x,y) = \arcsin x + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

b) 
$$f(x,y) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$$

c) 
$$f(x,y) = \frac{\ln(1-x^2)}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

$$f(x,y) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \sqrt{4-x^2-y^2}$$

3. (6b) Vypočítajte

$$\iint\limits_{M} xy \, \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

kde množina M je mnohouholník s vrcholmi  $A=[1,0],\,B=[2,0],\,C=[2,2],\,D=[1,3].$ 

- **4.** (4b) Bod M má v pravouhlej súradnicovej sústave súradnice:  $M = [3, \sqrt{3}, 3]$ .
  - a) (2b) Vyberte správnu odpoveď: Súradnice bodu M v cylindrickej súradnicovej sústave sú:

a) 
$$M = \left[2\sqrt{3}, \frac{11\pi}{6}, 3\right]$$

c) 
$$M = \left[2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, 3\right]$$

b) 
$$M = \left[2\sqrt{3}, \frac{5\pi}{3}, 3\right]$$

d) 
$$M = \left[2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}, 3\right]$$

b) (2b) Znázornite tento bod M v cylindrickej súradnicovej sústave.

Náčrt:

<b>5.</b> (8b) Dana je linearna obycajna diferencialna rovnica (LODR) $y^*(x) + 3y(x) - 4y(x) = \cos x$
a) (2b) Napíšte charakteristickú rovnicu k danej diferenciálnej rovnici.
Charakteristická rovnica je:
b) (2b) Nájdite fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice s nulovou pravou stra nou.
Fundamentálny systém riešení je
c) (2b) Nájdite partikulárne riešenie uvedenej nehomogénnej rovnice.
Partikulárne riešene je
d) (2b) Napíšte všeobecné riešenie danej lineárnej diferenciálnej rovnice.
Všeobecné riešenie danej LODR je
6. (4b) Vypočítajte
$\lim_{[x,y]\to[0,0]} \frac{xy}{3-\sqrt{xy+9}}.$
Výsledok:
7. (6b) Nájdite rovnicu dotykovej roviny $\tau$ ku grafu funkcie $f(x,y)=\frac{1}{x^2-2y}$ v bode $T=[1,y_0,3].$
(2b) Nájdite $y_0$ a <b>uvedte súradnice dotykového bodu</b> :
(4b) Rovnica dotykovej roviny $\tau$ je:
8. (6b) Daná je funkcia $f(x,y) = \ln(x+y)$ , bod $A = [1, 2]$ a vektor $\vec{l} = (1, -2)$ .
a) (3b) Nájdite gradient funkcie $f(x,y)$ v bode $A$ .
<b>Gradient</b> funkcie $f(x,y)$ v bode $A$ je
b) (3b) Vypočítajte deriváciu funkcie $f(x,y)$ v bode $A$ v smere vektora $\vec{l}$ .
<b>Derivácia</b> funkcie $f(x,y)$ v bode $A$ v smere vektora $\vec{l}$ je

9. (27b) Daná je funkcia $f(x,y)=xy+8y-2x^2-3y^2-9x-66$ a oblasť $M$ . Oblasť $M$ je mnohouholník $ABCD$ s vrcholmi $A=[-3,0],\ B=[-1,0],\ C=[-1,2]$ a $D=[-3,2].$	2]
a) Načrtnite oblasť $M$ :	
Náčrt:	
Pomocou matematických vzťahov popíšte hranice oblasti $M$ :	
(a) (2b) $AB$	
(b) $(2b) BC$	
(c) (2b) $CD$	
(d) (2b) $AD$	•
b) (5b) Nájdite lokálne extrémy danej funkcie $f(x,y)$ v oblasti $M$ . Ak hľadané lokálne extrémy nie sú, napíšte "nie sú".	
<b>Doplňte odpoveď:</b> Funkcia $f(x,y)$ má v bode lokálne	
c) Nájdite viazané lokálne extrémy danej funkcie $f(x,y)$ na hraniciach oblasti $M$ . Ak hľadan lokálny extrém nejestvuje, napíšte "nie je".	ý
(a) (3b) Na hranici $AB$ má funkcia $f(x,y)$ v bode viazané lokálne	
(b) (3b) Na hranici $BC$ má funkcia $f(x,y)$ v bode viazané lokálne	
(c) (3b) Na hranici $CD$ má funkcia $f(x,y)$ v bode viazané lokálne	
(d) (3b) Na hranici $AD$ má funkcia $f(x,y)$ v bode $\ldots\ldots$ viazané lokálne $\ldots\ldots$	
d) (2b) Nájdite najväčšiu a najmenšiu hodnotu funkcie $f(x,y)$ na oblasti $M.$	
$\mathbf{Najv\ddot{a}\check{c}\check{s}ia}$ hodnota funkcie $f(x,y)$ je:	
Najmenšia hodnota funkcie $f(x,y)$ je:	