

★

Exercice 1

Voir correction

Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes, ainsi que leurs limites aux bornes de leurs ensembles de définition.

- 1) $f(x) = \cos x - x$ définie sur \mathbb{R}
- 2) $g(x) = -3 \sin(x/2)$ définie sur $[0, 2\pi]$
- 3) $h(x) = \cos^2(2x)$ définie sur $[0, \pi]$
- 4) $k(x) = \ln(\sin x)$ définie sur $]0, \pi[$.
- 5) $m(x) = x - \frac{x^3}{6} - \sin x$ définie sur \mathbb{R}_+

★

Exercice 2

Voir correction

Dans chaque cas, résoudre dans I l'équation ou l'inéquation :

- 1) $\cos x = -\frac{1}{2}, I = [0, 2\pi]$
- 2) $\tan x = -1, I =]-\pi/2, \pi/2[$
- 3) $\tan x = 0, I =]5\pi/2, 7\pi/2[$
- 4) $\sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}, I = [-\pi, \pi]$
- 5) $\sin(2x) > \frac{\sqrt{2}}{2}, I = [-\pi, 3\pi]$
- 6) $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}, I = [-3\pi, \frac{\pi}{6}]$

★

Exercice 3

Voir correction

- 1) Montrer que $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$
- 2) En déduire les solutions de $\cos 2x + \sin 2x \geq -1$ sur \mathbb{R}

★ ★

Exercice 4

Voir correction

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

- 1) $\cos(2x) = \cos x$
- 2) $\cos(2x) = \sin x$
- 3) $\sin(2x) = \cos x$
- 4) $\cos(3x) = \cos x$

★ ★

Exercice 5

Voir correction

Résoudre l'équation $\cos x + \sin x = -\frac{\sqrt{6}}{2}$ dans \mathbb{R} .

★ ★ ★

Exercice 6

Voir correction

- 1) Montrer que pour tout entier naturel n et tout réel x on a :

$$\sin(2^{n+2}x) = 2 \sin(2^{n+1}x) - 4 \sin(2^{n+1}x) \sin(2^n x)^2$$

- 2) Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_{n+1} \times (u_n)^2 \quad ; \quad u_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ; \quad u_1 = 1$$

Montrer que (u_n) est une suite stationnaire (i.e. à partir d'un certain rang N , on a $u_{n+1} = u_n$). Quelle est alors la valeur limite de la suite (u_n) ?

Correction des exercices

Correction de l'exercice 1 :

1) On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = -\sin x - 1$$

Or, on sait que $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin x \leq 1$, donc $-2 \leq -\sin x - 1 \leq 0$.

On en déduit que f est décroissante sur \mathbb{R} .

De plus, $f(x) = -x \left(1 - \frac{\cos x}{x}\right)$, et $-1 \leq \cos x \leq 1$ donc $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$, on en déduit d'après le théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$. De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$.

Par somme et par produit de limites, on en conclut que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) On a $\forall x \in [0, 2\pi], g'(x) = -\frac{3}{2} \cos(x/2)$.

$$x \in [0, 2\pi] \iff \frac{x}{2} \in [0, \pi].$$

Pour $X \in [0, \pi]$, on a $\cos X \geq 0 \iff X \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Ainsi, $\cos(x/2) \geq 0 \iff \frac{x}{2} \in [0, \pi/2] \iff x \in [0, \pi]$.

On en déduit le tableau de variation suivant :

x	0	π	2π
$g'(x)$		0	
$g(x)$	0	-3	0

3) On a $\forall x \in [0, \pi], h'(x) = -4 \sin(2x) \cos(2x) = -2 \sin(4x)$ d'après la formule de duplication du sinus.

Or, $0 \leq x \leq \pi \iff 0 \leq 4x \leq 4\pi$.

Sur l'intervalle $[0, 4\pi]$, $\sin X \geq 0 \iff X \in [0, \pi] \cup [2\pi, 3\pi]$ d'après la courbe représentative de la fonction sinus.

On en déduit que $\sin(4x) \geq 0 \iff 4x \in [0, \pi] \cup [2\pi, 3\pi] \iff x \in [0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi]$.

Finalement, on a le tableau de variations suivant

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$h'(x)$		0	0	0	
$g(x)$	1	0	1	0	1

4) $k = \ln u$ avec $u(x) = \sin x$ donc $k' = \frac{u'}{u}$.

$$k'(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Or, $\forall x \in]0, \pi[, \sin x > 0$, et $\cos x \geq 0 \iff x \in [0, \pi/2]$

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ et $\lim_{X \rightarrow 0} \ln X = -\infty$, donc par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\sin x) = -\infty$.

De même, $\lim_{x \rightarrow \pi} \ln(\sin x) = -\infty$. On en déduit le tableau de variations suivant :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$k'(x)$	+	0	-
$k(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

5) On a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, m'(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - \cos x$$

puis

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, m''(x) = -x + \sin x$$

et enfin

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, m'''(x) = -1 + \cos x$$

Comme, $\forall x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \cos x \leq 1$, on a $-2 \leq -1 + \cos x \leq 0$, donc m'' est décroissante sur \mathbb{R}_+ . Comme $m''(0) = 0$, on en conclut que $m''(x) \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.

Ainsi, m' est décroissante sur \mathbb{R}_+ , et on a aussi $m'(0) = 0$, ce qui permet d'en déduire que $m'(x) \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. Finalement, m est décroissante sur \mathbb{R}_+ .

Lorsque x tend vers $+\infty$, on peut majorer $m(x)$ par $m(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + 1$ qui tend vers $-\infty$, donc par théorème de comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} m(x) = -\infty$. On en déduit le tableau suivant :

x	0	$+\infty$
$m'(x)$	-	
$m(x)$	0	$-\infty$

Correction de l'exercice 2 :

1) Dans $[0; 2\pi]$, $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$. $S = \left\{ -\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}$

2) $\tan x = -1 \iff \frac{\sin x}{\cos x} = -1 \iff \cos x \neq 0$ et $\sin x = -\cos x$. Il n'y a que sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}$ que \sin et \cos ont un signe opposé. De plus, \sin est strictement croissante sur cet intervalle et \cos est strictement décroissante. On pose $f(x) = \sin x + \cos x$, dérivable sur $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ avec $f'(x) = \cos x - \sin x$ pour tout x dans cet intervalle. Or $\cos x \geq 0$ et $-\sin x \geq 0$ sur cet intervalle et elles ne s'annulent jamais simultanément, donc $f'(x) > 0$ sur cet intervalle. f est donc strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $f(-\frac{\pi}{2}) = -1$ et $f(0) = 1$ donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires f s'annule une et une seule fois sur cet intervalle. De plus on sait que $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ donc

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ est l'unique solution.}$$

3) $\tan x = 0 \iff \sin x = 0 \iff x = \frac{6\pi}{2} = 3\pi$. Donc $S = \{3\pi\}$

4) Commençons par résoudre sur \mathbb{R} :

$$\begin{aligned} \sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2} &\iff 3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \\ &\iff x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

On ne retient que les solutions qui sont dans $[-\pi; \pi]$, on trouve :

$$x \in [-\pi, \pi] \quad \text{et} \quad \sin(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff x \in \left\{ -\frac{5\pi}{9}; -\frac{4\pi}{9}; \frac{\pi}{9}; \frac{2\pi}{9}; \frac{7\pi}{9}; \frac{8\pi}{9} \right\}$$

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{9}; -\frac{4\pi}{9}; \frac{\pi}{9}; \frac{2\pi}{9}; \frac{7\pi}{9}; \frac{8\pi}{9} \right\}$$

5) Dans \mathbb{R} on a

$$\begin{aligned} \sin(2x) > \frac{\sqrt{2}}{2} &\iff \frac{\pi}{4} + 2k\pi < 2x < \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \\ &\iff \frac{\pi}{8} + k\pi < x < \frac{3\pi}{8} + k\pi \end{aligned}$$

On ne retient que les solutions qui sont dans $[-\pi; 3\pi]$ et on trouve

$$S = \left] \frac{-7\pi}{8}; \frac{-5\pi}{8} \right[\cup \left] \frac{\pi}{8}; \frac{3\pi}{8} \right[\cup \left] \frac{9\pi}{8}; \frac{11\pi}{8} \right[\cup \left] \frac{17\pi}{8}; \frac{19\pi}{8} \right[$$

6) Dans $[-\pi; \pi]$, $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x \in [-\pi; -\frac{\pi}{4}] \cup [\frac{\pi}{4}; \pi]$.

Par périodicité, on en déduit que sur $[-3\pi; \frac{\pi}{6}]$, $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x \in [-3\pi; -\frac{9\pi}{4}] \cup [-\frac{7\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}] \cup [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}]$

Correction de l'exercice 3 :

1) Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) &= \cos x \cos(\pi/4) + \sin x \sin(\pi/4) \\ &= \cos x \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin x \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos x + \sin x$.

2) D'après la question 1 on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos 2x + \sin 2x \geq -1 \iff \sqrt{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq -1$$

$$\iff \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\iff \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

D'après les variations et les valeurs remarquables de la fonction cosinus, on sait que :

$$\cos X \geq -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq X \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

donc

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x \leq \pi + 2k\pi$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Longleftrightarrow x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right]$$

Finalement l'ensemble des solutions est donc :

$$S = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right]$$

Correction de l'exercice 4 :

- 1) On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$
On a donc

$$\cos(2x) = \cos x \Longleftrightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$$

En posant $X = \cos x$, l'équation devient $2X^2 - X - 1 = 0$.

L'équation $2X^2 - X - 1 = 0$ a deux solutions dans \mathbb{R} : $X = 1$ et $X = -\frac{1}{2}$

Ainsi, $\cos x = 1$ ou $\cos x = -\frac{1}{2}$, donc $x \in \{0 + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

$$S = \left\{ 0 + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- 2) $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$ donc

$$\begin{aligned} \cos 2x = \sin x &\Longleftrightarrow 1 - 2\sin^2 x = \sin x \\ &\Longleftrightarrow 0 = 2\sin^2 x + \sin x - 1 \end{aligned}$$

On pose $X = \sin x$ et on résout $2X^2 + X - 1 = 0$. On trouve $X = -1$ ou $X = \frac{1}{2}$, donc $\sin x = -1$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$. Ainsi

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- 3) $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$, donc

$$\begin{aligned} \sin(2x) = \cos x &\Longleftrightarrow 2\sin x \cos x = \cos x \\ &\Longleftrightarrow \cos x(2\sin x - 1) = 0 \\ &\Longleftrightarrow \cos x = 0 \quad \text{ou} \quad \sin x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On en conclut que les solutions sont

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- 4) Commençons par exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$:

$$\begin{aligned} \cos(3x) &= \cos(2x + x) \\ &= \cos(2x)\cos x - \sin(2x)\sin x \\ &= (\cos^2 x - \sin^2 x)\cos x - 2\sin^2 x \cos x \\ &= \cos^3 x - (1 - \cos^2 x)\cos x - 2(1 - \cos^2 x)\cos x \\ &= \cos^3 x - \cos x + \cos^3 x - 2\cos x + 2\cos^3 x \\ &= 4\cos^3 x - 3\cos x \end{aligned}$$

Ainsi, on a

$$\begin{aligned}
\cos(3x) = \cos x &\iff 4\cos^3 x - 3\cos x = \cos x \\
&\iff 4\cos^3 x - 4\cos x = 0 \\
&\iff 4\cos x(\cos^2 x - 1) = 0 \\
&\iff 4\cos x(\cos x - 1)(\cos x + 1) = 0 \\
&\iff \cos x = 0 \quad \text{ou} \quad \cos x = 1 \quad \text{ou} \quad \cos x = -1
\end{aligned}$$

On trouve donc

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi, 0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, 0 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Correction de l'exercice 5 : Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(x - \theta) = \cos x \cos \theta + \sin x \sin \theta$. En posant $\theta = \frac{\pi}{4}$, comme on a $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}/2$ on obtient

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x + \sin x)$$

$$\text{On a donc } \cos x + \sin x = 1 \iff \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x + \sin x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Or, dans $[-\pi, \pi]$ on a $\cos X = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff X \in \{\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}\}$ donc dans \mathbb{R} on a

$$\cos X = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff X \in \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Finalement, dans \mathbb{R} on a

$$\begin{aligned}
\cos x + \sin x = 1 &\iff x - \frac{\pi}{4} \in \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \\
&\iff x \in \left\{ 0 + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 6 :

1) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}
\sin(2^{n+2}x) &= \sin(2 \times 2^{n+1}x) \\
&= 2\sin(2^{n+1}x)\cos(2^{n+1}x) \\
&= 2\sin(2^{n+1}x)\cos(2 \times 2^n x) \\
&= 2\sin(2^{n+1}x)(\cos^2(2^n x) - \sin^2(2^n x)) \\
&= 2\sin(2^{n+1}x)(1 - 2\sin^2(2^n x)) \\
&= 2\sin(2^{n+1}x) - 4\sin(2^{n+1}x)\sin^2(2^n x)
\end{aligned}$$

2) La suite (u_n) vérifie la même relation de récurrence double que la suite (v_n) définie par $v_n(x) = \sin(2^n x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Si $u_0 = \sin(2^0 x)$ et $u_1 = \sin(2^1 x)$, alors on aura $u_n = \sin(2^n x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Il suffit de prendre $x = \frac{\pi}{4}$ pour avoir $\sin(2^0 x) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = u_0$, et $\sin(2^1 x) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 = u_1$.

On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sin\left(2^n \frac{\pi}{4}\right)$.

Or, pour $n \geq 2$, 2^n est un multiple de 4 donc $2^n \frac{\pi}{4}$ est un multiple de π . On a $\sin(k\pi) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$ donc $u_n = \sin(2^n \frac{\pi}{4}) = 0$ pour tout $n \geq 2$.

Ainsi, (u_n) est stationnaire égale à 0 à partir du rang $n = 2$, sa limite est donc 0.