
Programme de khôlle de maths n° 4

Semaine du 6 Octobre

Cours

Chapitre 2 : Logique

- Logique : propositions, connecteurs, quantificateurs, implications et équivalences.
- Lois de De Morgan
- $(A \Rightarrow B) \iff (\neg A \vee B)$, négation de $A \Rightarrow B : A \wedge \neg B$
- Raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas (par ex : (in)équations avec valeur absolue), par analyse-synthèse (résolution d'(in)équations).

Chapitre 3 : Ensembles et applications

- Egalité, inclusion d'ensembles
- Ensemble vide, ensemble $\mathcal{P}(E)$ des sous-ensembles d'un ensemble E , ensemble $F \setminus E = \{x \in F, x \notin E\}$.
- Union et intersection de deux ensembles, complémentaire dans un ensemble.
- Union et intersection d'une famille quelconque d'ensembles.
- Produit cartésien, n -uplet (définitions)
- Application $f : E \rightarrow F$, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, image directe $f(A)$ de $A \in \mathcal{P}(E)$, image réciproque $f^{-1}(B)$ de $B \in \mathcal{P}(F)$.
- Restriction d'une application, prolongement d'une application

Questions de cours et exercices vus en classe

1. Soient A et B deux ensembles, montrer que : $A \cap B = B \iff B \subset A$
2. Soient A et B deux ensembles, montrer que : $A \cup B = B \iff A \subset B$
3. Soient A , B et C trois ensembles, montrer que : $(A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \iff B = C$
4. Soient A et B deux parties d'un ensemble E . En notant \overline{A} et \overline{B} leurs complémentaires respectifs dans E , montrer que : $\overline{A} \subset B \iff \overline{B} \subset A$
5. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ et que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Donner un exemple pour lequel on n'a pas l'inclusion réciproque.

Exercices

1. Démontrer que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. Montrer que $f(B) \setminus f(A) \subset f(B \setminus A)$.
3. Montrer que si $A \cap B = A \cup B$ alors $A = B$.
4. Montrer que $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$
5. Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$, montrer que $(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B))$ pour tout $B \subset G$.