

Dans tout ce chapitre et sauf mention contraire, I est un intervalle réel et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction définie sur I .

I. Fonction dérivée et propriétés

1. Nombre dérivé

Définition 1

Soit $a \in I$. Pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, on appelle **taux d'accroissement de f entre a et x** le réel $t(x)$ défini par :

$$t_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

On dit que f est **dérivable en a** si $t_a(x)$ admet une limite lorsque x tend vers a .

On appelle cette limite le **nombre dérivé de f en a** , et on note ce nombre $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Remarque

$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite lorsque x tend vers a avec $x \neq a$.



$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite lorsque h tend vers 0 avec $h \neq 0$

Remarque

Le taux d'accroissement de f entre a et x est le coefficient directeur de la droite qui relie les points de la courbe de f d'abscisses a et x .

Remarque

Le nombre dérivée de f en a peut aussi se noter $\frac{df}{dx}(a)$. Cette notation vient du fait que la dérivée de f en a exprime le rapport entre une "petite variation" de $f(x)$, notée df , et une "petite variation" de x , notée dx .

Remarque

Le taux d'accroissement de f entre deux réels représente la vitesse moyenne globale de variation de f entre ces réels, tandis que le nombre dérivé de f représente en quelque sorte la vitesse "instantanée" en un réel. En physique, la vitesse d'un objet est la dérivée de sa position.

2. Fonction dérivée

Définition 2

On dit que f est **dérivable sur I** si f est dérivable en a pour tout $a \in I$.

On note alors f' la fonction qui à tout réel x associe $f'(x)$, le nombre dérivé de f en a .

$$\begin{array}{ccc} f : & I & \rightarrow \mathbb{R} \\ & x & \mapsto f'(x) \end{array}$$

→ Exercice de cours n° 1

Définition 3

Soit $a \in I$. On dit que f est dérivable à droite en a (resp. à gauche) si $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite à

droite en a (resp. une limite à gauche. On note alors $f'_d(a)$ (resp. $f'_g(a)$) cette limite.

Propriété 2

f est dérivable en $a \in I$ si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_d(a) = f'_g(a)$ et on a dans ce cas : $f'(a) = f'_d(a) = f'_g(a)$.

→ Exercices de cours n° 2 à 4

Proposition 3

Si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .

Remarque

La réciproque est fautive en général : exemple de la fonction $x \mapsto |x|$ continue sur $\mathbb{R}$ mais pas dérivable en 0.

3. Opérations

Propriété 4

Soient u et v deux fonctions. Si u et v sont dérivables sur I , alors :

- $u + v$ est dérivable sur I et sa dérivée est $u' + v'$
- uv est dérivable sur I et sa dérivée est $u'v + uv'$
- Pour tout $k \in \mathbb{R}$, ku est dérivable sur I et sa dérivée est ku' .
- Si v ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et sa dérivée est $-\frac{v'}{v^2}$
- Si v ne s'annule pas sur I , alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et sa dérivée est $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Remarque

L'opération de dérivation est **linéaire**.

En effet d'après la propriété précédente, pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et pour toutes fonctions f et g dérivables sur I , on a $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ sur I .

Propriété 5

Si $n \in \mathbb{Z}$, alors $f : x \mapsto x^n$ est dérivable et sa dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$

Propriété 6

Soit v une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.

Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times (v' \circ u)(x)$

On en déduit la propriété suivante :

Propriété 7

Soit f une fonction définie et dérivable sur I , strictement monotone sur I , et telle que f' ne s'annule pas sur I

D'après le théorème de la bijection, $J = f(I)$ est un intervalle et f admet une fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$.

Alors f^{-1} est dérivable et

$$\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

4. Quelques dérivées de fonctions usuelles

Proposition 8

Soit n un entier naturel fixé. La fonction $f : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = nx^{n-1}$.

Proposition 9

Soit n un entier relatif strictement négatif fixé. La fonction $f : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = nx^{n-1}$.

Proposition 10

Soit α un réel fixé. La fonction $f : x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$ et $\forall x \in \mathbb{R}^{*+}, f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Proposition 11

La fonction $f : x \mapsto \ln(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$ et $\forall x \in \mathbb{R}^{*+}, f'(x) = \frac{1}{x}$.

5. Développement limités

Définition 4

Soit $x_0 \in I$. On dit que f admet un développement limité d'ordre 1 au voisinage de x_0 s'il existe deux réels a_0 et a_1 tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + o(x - x_0)$$

c'est à dire s'il existe une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et telle que

$$\forall x \in I, f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

Proposition 12

Si f admet un développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0, alors ce développement limité est unique.

Propriété 13

Soit $x_0 \in I$. f admet un développement limité d'ordre 1 au voisinage de x_0 si et seulement si f est dérivable en x_0 , et on a dans ce cas :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

c'est à dire

$$\forall x \in I, f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

avec $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$.

Une autre façon de formuler cette propriété est la suivante :

Propriété 14

Soit $x_0 \in I$ tel que f est dérivable en x_0 , alors :

$$f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(x_0) + f'(x_0) \times h + o(h)$$

c'est à dire

$$\forall x \in I, \quad f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0) \times h + h\varepsilon(h)$$

avec $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Propriété 15

Développement limités usuels à connaître par coeur.

Lorsque x tend vers 0, on a

- $e^x = 1 + x + o(x)$
- $\cos(x) = 1 + o(x)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + o(x)$
- $\ln(1+x) = x + o(x)$
- $\tan(x) = x + o(x)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$
lorsque $\alpha \in \mathbb{R}$ est fixé.
- $\sin(x) = x + o(x)$
- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + o(x)$

→ Exercices de cours n° 5 et 6

Remarque

Si f et g admettent un développement limité au voisinage de x_0 :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon_1(x) \quad \text{et} \quad g(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon_2(x)$$

avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon_2(x) = 0$ et $(a_0, a_1, b_0, b_1) \in \mathbb{R}^4$.

Alors

$$(f+g)(x) = a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)(x - x_0) + (x - x_0)(\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x))$$

avec $\lim_{x \rightarrow x_0} (\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x)) = 0$ donc $f+g$ admet un développement limité au voisinage de x_0 donné par l'expression ci-dessus.

De même,

$$(fg)(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)(x - x_0) + (x - x_0) \underbrace{[a_1b_1(x - x_0) + (x - x_0)(b_1\varepsilon_1(x) + a_1\varepsilon_2(x) + (x - x_0)\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x))]}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0}$$

donc fg admet un développement limité au voisinage de 0 donné par l'expression ci-dessus.

Définition 5

Soit $x_0 \in I$. On dit que f admet un développement limité d'ordre n (un $DL(n)$) au voisinage de x_0 s'il existe une fonction polynôme $P : x \mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$ telle que

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

c'est à dire s'il existe $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et telle que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x)$$

Remarque

Les DL d'ordre n seront vus en Khâgne.

6. Tangente

Définition 6

Soit C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé et soit $x_0 \in I$. Si f est dérivable en x_0 , alors on appelle **tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0** la droite d'équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Remarque

Parmi les droites passant par le point $(x_0, f(x_0))$, la tangente est celle qui approxime le mieux la courbe représentative de f dans le sens suivant :

On sait qu'il existe $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

Soit $h : x \mapsto f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ la fonction représentée graphiquement par la tangente

Soit $g : x \mapsto a(x - x_0) + f(x_0)$ une fonction affine quelconque qui coïncide avec f en x_0 et avec $a \neq f'(x_0)$.

Pour tout $x \in I$, posons $\Delta_1(x) = f(x) - h(x)$ et $\Delta_2(x) = f(x) - g(x)$ les différences respectives entre f et h et entre f et g . On a :

$$\forall x \in I, \quad \Delta_1(x) = (x - x_0)\varepsilon(x)$$

$$\Delta_2(x) = (x - x_0)(f'(x_0) - a + \varepsilon(x))$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta_1(x)}{\Delta_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varepsilon(x)}{f'(x_0) - a + \varepsilon(x)} = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0) - a + \varepsilon(x) = f'(x_0) - a \neq 0, \text{ ainsi } \Delta_1(x) = o(\Delta_2(x)).$$

7. Dérivée d'ordre supérieur

Définition 7

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et on note $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ l'ensemble de ces fonctions, si f est dérivable sur I et que sa dérivée f' est continue sur I .

Remarque

Toutes les fonctions de référence citées plus haut sont $\mathcal{C}^1$ sur tout intervalle où elles sont dérivables.

→ Exercice de cours n° 7

Définition 8

Si f est dérivable sur I et que f' est à nouveau une fonction dérivable, on note f'' la dérivée de f' . On définit de même par récurrence la dérivée n -ième de f , notée $f^{(n)}$, comme étant la dérivée de $f^{(n-1)}$ quand elle existe, avec comme convention $f^{(0)} = f$.

Définition 9

Soit $k \in \mathbb{N}$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si f est dérivable k fois et que $f^{(k)}$ est continue sur I . On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ définies sur I .

- $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}) \iff f$ est continue sur I .
- $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \iff f$ est dérivable sur I et f' est continue sur I
- $f \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}) \iff f$ est dérivable 2 fois sur I et f'' est continue sur I

On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions qui sont $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Remarque

Puisque f dérivable implique f continue, toute fonction de classe $\mathcal{C}^k$ est de classe $\mathcal{C}^{k'}$ pour tout $k' \leq k$.

Remarque

Si on note $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables k fois sur I , alors

$$\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^{k-1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{D}^{k-1}(I, \mathbb{R}) \subset \cdots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \underbrace{\mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})}_{\text{fonctions dérivables}} \underbrace{\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})}_{\text{fonctions continues}}$$

Remarque

Toutes les fonctions de références citées plus haut sont $\mathcal{C}^\infty$ sur tout intervalle où elles sont dérivables.

→ **Exercice de cours n° 8**

Proposition 16

La somme, la différence, le produit, le quotient, et la composée de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur tout intervalle où elle est définie.

II. Applications

1. Extremums

Définition 10

Soit $x_0 \in I$, alors

- $f(x_0)$ est un **minimum global** de f sur I si $\forall x \in I, f(x) \geq f(x_0)$.
- $f(x_0)$ est un **maximum global** de f sur I si $\forall x \in I, f(x) \leq f(x_0)$.

Définition 11

Soit $x_0 \in I$, alors

- $f(x_0)$ est un **minimum local** de f s'il existe un réel $\delta > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) \geq f(x_0)$.
- $f(x_0)$ est un **maximum local** de f s'il existe un réel $\delta > 0$ $\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) \leq f(x_0)$.

Remarque

Tout extremum global est aussi un extremum local de même nature.

Propriété 17

Soit f une fonction dérivable sur I et soit $x_0 \in I$. Si f atteint un extremum local en x_0 alors $f'(x_0) = 0$

Remarque

La réciproque est fausse, exemple avec $f(x) = x^3, f'(0) = 0$ mais $f(0)$ n'est pas un extremum local car pour tout réel $t > 0, f(t) > 0$ et $f(-t) < 0$.

2. Théorème de Rolle

Théorème 18 : (de Rolle)

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

3. Théorème des accroissements finis

Théorème 19 : (des accroissements finis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Théorème 20 : (Inégalité des accroissements finis)

- Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Supposons qu'il existe deux réel M et m tels que $\forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

- Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Supposons qu'il existe un réel k tel que $\forall x \in]a, b[, \quad |f'(x)| \leq k$. Alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k \times |b - a|$$

→ Exercice de cours n° 9

4. Variations

Propriété 21

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.
- f est constante sur I si et seulement si $\forall x \in I, f'(x) = 0$.

Propriété 22

Supposons que f est dérivable sur I .

- Si $\forall x \in I, f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I
- Si $\forall x \in I, f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .

Les réciproques sont fausses en général.

Remarque

Il est possible d'avoir f strictement croissante avec $f'(x) = 0$ pour certaines valeurs de x .
Par exemple $f(x) = x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ mais $f'(0) = 0$.

Propriété 23

Supposons que f est dérivables sur I .

- Si $f'(x) > 0$ sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs, alors f est strictement croissante.
- Si $f'(x) < 0$ sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs, alors f est strictement décroissante.

5. Régression linéaire

On considère un échantillon de données de taille n se présentant comme des couples de variables (x_i, y_i) , $1 \leq i \leq n$ (exemple : on sélectionne un groupe de personne et on note pour chaque personne sa taille x et son poids y , on peut représenter l'ensemble de données par un nuage de points avec x en abscisse et y en ordonnée)

On note $\bar{x}$ et $\bar{y}$ les moyennes respectives des familles $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$.

On cherche un coefficient a tel que $\bar{y} + a(x - \bar{x})$ soit une bonne approximation de la famille y .

Pour cela, on décide de minimiser les carrés des écarts de y à la valeur moyenne $\bar{y}$ (écarts quadratiques). Autrement dit, on cherche la valeur de a qui minimise la valeur de $\sum_{i=1}^n (y_i + a(x_i - \bar{x}) - \bar{y})^2$.

Posons $\varphi(a) = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} - a(x_i - \bar{x}))^2$.

Alors φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme, et pour tout $a \in \mathbb{R}$ on a $\varphi'(a) = \sum_{i=1}^n -2(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y} - a(x_i - \bar{x}))$

Si a est une valeur qui minimise $\varphi(a)$, alors $\varphi'(a) = 0$. On cherche donc une solution à l'équation $\sum_{i=1}^n -2(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y} - a(x_i - \bar{x})) = 0$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n -2(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y} - a(x_i - \bar{x})) = 0 &\iff a \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) \\ &\iff a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \end{aligned}$$

Exercices de cours

Exercice 1

Montre à l'aide de la définition que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est dérivable en tout réel a et que $\forall a \in \mathbb{R}, f'(a) = 2a$.

Exercice 2

Montrer que la fonction f définie par

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-1/x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Montrer que la fonction $f: x \mapsto |x|$ définie sur $\mathbb{R}$ n'est pas dérivable en 0.

Exercice 4

Montrer que $f: x \mapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0, +\infty[$, n'est pas dérivable en 0 :

Exercice 5

Déterminer la limite de $\frac{e^x - \cos(x)}{x}$ lorsque x tend vers 0.

Exercice 6

Étudier la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 8

On considère la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ mais pas $\mathcal{C}^2$.

Exercice 9

On considère la suite u_n définie par $u_0 = 0, u_{n+1} = \frac{1}{2} \cos(u_n)$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$
2. Montrer qu'il existe un unique réel $\ell \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\ell = \frac{1}{2} \cos(\ell)$
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{2} |u_n - \ell|$
4. En déduire qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq M \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
5. En déduire que u_n converge vers ℓ .