



PROTOCOLE DE SOIN

Maladie caséuse



Diagnostic

Présence d'un ou plusieurs abcès localisés souvent à l'emplacement d'un ganglion: sous l'oreille, sous la mâchoire, devant l'épaule, etc.

Provoqué principalement par *Corynebacterium pseudotuberculosis* mais aussi par d'autres bactéries ("maladie des abcès").

Transmission principalement par des objets vulnérants (clous, échardes, ...) qui blessent la peau et inocule le germe



Traitement

Soit attendre que l'abcès perce de lui-même (mais cela entraîne une contamination du bâtiment), soit percer l'abcès quand il est mûr.

Nettoyer et désinfecter l'abcès vidé.

Appliquer du baume aromatique sur et dans l'abcès vidé.



Prévention

Éliminer tous les objets vulnérants.

Contrôler les parasites externes (poux) pour éviter le grattage.

Désinfecter le matériel d'intervention, utiliser des aiguilles à usage unique

Désinfecter périodiquement les cornadis et les barres

Traiter et désinfecter rapidement toutes les plaies, désinfecter le cordon ombilical

Renforcer l'immunité du troupeau (Magnésium, vitamines, Sélénium, etc.)



Appel

Persistance de nombreux abcès sur beaucoup de chèvres