



## Maladie caséuse



### Diagnostic

Présence d'un ou plusieurs abcès localisés souvent à l'emplacement d'un ganglion: sous l'oreille, sous la mâchoire, devant l'épaule, etc.  
Provoqué principalement par *Corynebacterium pseudotuberculosis* mais aussi par d'autres bactéries ("maladie des abcès").  
Transmission principalement par des objets vulnérants (clous, échardes, ...) qui blessent la peau et inocule le germe



### Traitement

Soit attendre que l'abcès perce de lui-même (mais cela entraîne une contamination du bâtiment), soit percer l'abcès quand il est mûr.  
Nettoyer et désinfecter l'abcès vidé.  
Appliquer du baume aromatique sur et dans l'abcès vidé.



### Prévention

Éliminer tous les objets vulnérants.  
Contrôler les parasites externes (poux) pour éviter le grattage.  
Désinfecter le matériel d'intervention, utiliser des aiguilles à usage unique  
Désinfecter périodiquement les cornadis et les barres  
Traiter et désinfecter rapidement toutes les plaies, désinfecter le cordon ombilical  
Renforcer l'immunité du troupeau (Magnésium, vitamines, Sélénium, etc.)



### Appel

Persistance de nombreux abcès sur beaucoup de chèvres