

## PROTOCOLE DE SOIN

### Omphalite du veau nouveau né



#### Diagnostic

Veau naissant à 2 semaines d'âge :

**Symptômes locaux** : palpation du vestige du cordon ombilical :

Douleur à la palpation, cordon « gros », chaud

Suppuration, odeur nauséabonde

**Symptômes généraux** : perte d'appétit, veau « mous »

*Pour en savoir plus : voir la fiche Votre attitude face à ...*

#### Traitement

**Traitement par voie générale** : Injection intramusculaire d'antibiotique (pénicilline streptomycine, amoxicilline, lincomycine, spectinomycine) avec ajout d'anti-inflammatoires pendant 7 jours.

**Traitement local** : Lavage matin et soir du cordon ombilical à l'eau tiède javellisée

#### Prévention

Faire vèler les vaches dans un local propre et sec

**Désinfecter le cordon** dès la naissance du veau à l'aide d'une solution iodée ou d'une teinture-mère (Calendula, Lavande, etc.). Renouveler cette désinfection une fois par jour tant que le cordon n'est pas sec (ou si la mère l'a léché)

Logement des veaux naissants : local sec, propre, paille abondante et renouvelée

#### Appel

Symptômes généraux « graves » : veau couché avec fièvre.

Avant de renouveler le traitement sur un même veau