



PROTOCOLE DE SOIN

Diarrhées néonatales des agneaux (« agneaux baveurs »)



Diagnostic

De nombreux agents pathogènes sont en cause dans les diarrhées des agneaux (bactéries, virus, parasites). Ce sont des microbes qui survivent bien dans les bergeries et qui sont portés par les adultes. Les agneaux se contaminent en général très tôt sur les mamelles ou la laine des brebis souillées par la litière.

Exemples d'agent pathogène

E.Coli K99 ,Salmonelle, Rotavirus et Coronavirus, Cryptosporidium (diarrhée des 2 premières semaines souvent résistantes au traitement antidiarrhéique classique), Coccidiose (agneaux de plus de 3 semaines, baisse de croissance, agneau léopard, diarrhée de couleur foncée)



Traitement

Agneaux de mois de 3 semaines :

Antibiotiques voie parentérale en cas de symptômes généraux (« agneaux baveurs ») et par voie orale.

Argile en libre service

Agneaux de 3 semaines et plus (coccidiose) :

Traitement anticoccidien



Prévention

Diarrhées bactériennes et virales: avoir des brebis en bon état, hygiène de la bergerie, équilibre de la ration des brebis, déparasitage, apport d'oligo-éléments et de vitamines.

Hygiène de la mise bas : Désinfection du cordon, têtée du colostrum, bonne hygiène lors d'intervention.

Elevage des agneaux : allotement, espace réservé aux agneaux, argile en libre service

Coccidiose: argile en libre service, acidifier l'eau de boisson au vinaigre de cidre, bassines à lécher à effet coccidiostatique



Appel

Fréquence importante et/ou mortalité >10%