



PROTOCOLE DE SOIN

Mammites cliniques de la chèvre



Diagnostic

Toujours des symptômes locaux à la mamelle :

Modification du lait : présence de caillots, ou liquide séreux

Quartier chaud, rouge, congestionné, douloureux...ou froid, violacé...

Parfois des symptômes généraux : Température, perte d'appétit, chèvre abattue

Si tache bleue ou noire et froide => mammite gangréneuse



Traitement

Toujours un traitement par voie locale : des seringues d'antibiotiques par voie intra mammaire deux fois par jour après la traite pendant 3 à 6 traites selon les médicaments prescrits.

Voie générale :

Injection d'ocytocine avant la traite pour aider l'éjection du lait

Anti inflammatoire non stéroïdien



Prévention

Hygiène de la traite

Logement confortable des chèvres : propre, sec, spacieux, à l'abri des courants d'air.

Règlage et entretien régulier de la machine à traire

Equilibre de la ration

Réforme des chèvres infectées chroniques

Traitement antibiotique au tarissement en fonction de l'importance des mammites



Appel

Au niveau de l'animal

-> Symptômes généraux « graves » : chèvre couchée, déshydratée, en souffrance...

Au niveau du troupeau

-> Nombre important de mammites cliniques.