

7

From 1960, when we first began our work with dogs, we have experienced a steady increase in the number of dogs that come to us for help. In 1970, we had only a few dogs in our kennel. By 1980, we had a kennel of about 100 dogs. In 1990, we had a kennel of about 200 dogs. In 2000, we had a kennel of about 300 dogs. In 2010, we had a kennel of about 400 dogs. In 2020, we had a kennel of about 500 dogs. This shows a clear trend of increasing demand for our services over the years.

[illegible]

This survey was conducted with cooperation from the following countries:

4.4. New questions

En consecuencia, el trabajo en el área de ingeniería de materiales, en particular en los últimos años, ha sido objeto de un gran desarrollo. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal, describir el proceso de fabricación de un componente de ingeniería, a partir de un material de partida, y el análisis de los factores que influyen en el comportamiento mecánico del mismo.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

Discussion

4. *Erklären Sie, warum es keine primäre oder sekundäre Amine gibt, die in der Lage sind, ein Proton zu abstrahieren, um ein Carbanion zu bilden.*
 5. *Erklären Sie, warum es keine primäre oder sekundäre Amine gibt, die in der Lage sind, ein Proton zu abstrahieren, um ein Carbanion zu bilden.*
 6. *Erklären Sie, warum es keine primäre oder sekundäre Amine gibt, die in der Lage sind, ein Proton zu abstrahieren, um ein Carbanion zu bilden.*
 7. *Erklären Sie, warum es keine primäre oder sekundäre Amine gibt, die in der Lage sind, ein Proton zu abstrahieren, um ein Carbanion zu bilden.*
 8. *Erklären Sie, warum es keine primäre oder sekundäre Amine gibt, die in der Lage sind, ein Proton zu abstrahieren, um ein Carbanion zu bilden.*