

4.2.4. Identifikation by comparison of frequencies

Ein Objekt x ist als x_i zu identifizieren, wenn es sich als x_i identifizieren lässt und nicht als x_j für ein $j \neq i$. Das heißt, es muss eine eindeutige Zuordnung von x zu x_i geben, die die Identifikation von x ermöglicht. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

Man kann die Identifikation by comparison of frequencies auch als x_i mit x_j identifizieren, wenn x_i und x_j die Identifikation by comparison of frequencies ermöglichen. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

$$x_i \text{ ist als } x_j \text{ identifizierbar} \iff x_i \text{ ist als } x_j \text{ identifizierbar} \iff x_i = x_j$$

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

4.2.5. Identifikation by comparison of frequencies

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

$$x_i \text{ ist als } x_j \text{ identifizierbar} \iff x_i \text{ ist als } x_j \text{ identifizierbar} \iff x_i = x_j$$

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

Die Identifikation by comparison of frequencies ist eine Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies. Dies ist die Identifikation by comparison of frequencies.

Lemma 1.1.1 (Satz von Weierstraß)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \implies f \text{ ist auf } [a, b] \text{ beschränkt und} \quad (1.1.1)$$

Lemma 1.1.2 (Satz von Weierstraß)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \implies f \text{ nimmt auf } [a, b] \text{ alle Werte zwischen } f(a) \text{ und } f(b) \text{ an.} \quad (1.1.2)$$

Wenn man davon ausgeht, dass es sich um eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ handelt, die auf $[a, b]$ stetig ist, dann ist es klar, dass f auf $[a, b]$ beschränkt ist. Dies ist die Aussage des Satzes von Weierstraß. Der Satz besagt, dass eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $[a, b]$ stetig ist, auf $[a, b]$ beschränkt ist und alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Satz von Weierstraß nur für Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen gilt. Wenn man ein offenes Intervall (a, b) betrachtet, dann kann es sein, dass die Funktion f auf (a, b) stetig ist, aber nicht auf $[a, b]$ beschränkt ist.

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

Wenn man eine Funktion $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ betrachtet, die auf (a, b) stetig ist, dann ist es nicht sicher, dass f auf (a, b) beschränkt ist. Dies ist die Aussage des Satzes von Weierstraß. Der Satz besagt, dass eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $[a, b]$ stetig ist, auf $[a, b]$ beschränkt ist und alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Satz von Weierstraß nur für Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen gilt. Wenn man ein offenes Intervall (a, b) betrachtet, dann kann es sein, dass die Funktion f auf (a, b) stetig ist, aber nicht auf $[a, b]$ beschränkt ist. ■

Lemma 1.1.3 (Satz von Weierstraß)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \implies f \text{ ist auf } [a, b] \text{ beschränkt und} \quad (1.1.3)$$

Wenn man davon ausgeht, dass es sich um eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ handelt, die auf $[a, b]$ stetig ist, dann ist es klar, dass f auf $[a, b]$ beschränkt ist. Dies ist die Aussage des Satzes von Weierstraß. Der Satz besagt, dass eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $[a, b]$ stetig ist, auf $[a, b]$ beschränkt ist und alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Satz von Weierstraß nur für Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen gilt. Wenn man ein offenes Intervall (a, b) betrachtet, dann kann es sein, dass die Funktion f auf (a, b) stetig ist, aber nicht auf $[a, b]$ beschränkt ist.

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

Wenn man eine Funktion $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ betrachtet, die auf (a, b) stetig ist, dann ist es nicht sicher, dass f auf (a, b) beschränkt ist. Dies ist die Aussage des Satzes von Weierstraß. Der Satz besagt, dass eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die auf $[a, b]$ stetig ist, auf $[a, b]$ beschränkt ist und alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Satz von Weierstraß nur für Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen gilt. Wenn man ein offenes Intervall (a, b) betrachtet, dann kann es sein, dass die Funktion f auf (a, b) stetig ist, aber nicht auf $[a, b]$ beschränkt ist.