

gewonnen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

$$P(W > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0)$$

Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

1. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.
2. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.
4. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

2.2.2. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

$$P(W > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0) = \sum_{i=1}^n P(W_i > 0)$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W positiv ist, größer als die Wahrscheinlichkeit für die Gewinnfunktion W negativ ist.

Beispiel: Die Menge der reellen Zahlen ist nicht abgeschlossen. Die Menge der reellen Zahlen ist nicht abgeschlossen, da es reelle Zahlen gibt, die nicht reell sind. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)

Es sei nun A eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann ist A abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

Die Menge A ist abgeschlossen, da sie alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält.

2.1. Beispiel: Abgeschlossenheit

Die Abgeschlossenheit einer Menge A in einem topologischen Raum X ist eine Eigenschaft, die die Menge A in Bezug auf die Topologie von X beschreibt.

Definition 2.1: Eine Teilmenge A eines topologischen Raumes X heißt abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)

Es sei nun A eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann ist A abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)

Es sei nun A eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann ist A abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)

Es sei nun A eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann ist A abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)

2.2. Beispiel: Abgeschlossenheit in einem topologischen Raum

Die Abgeschlossenheit einer Menge A in einem topologischen Raum X ist eine Eigenschaft, die die Menge A in Bezug auf die Topologie von X beschreibt.

Es sei nun A eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann ist A abgeschlossen, wenn A alle Grenzwerte ihrer Elemente enthält. (Dies ist eine sehr einfache Aussage, die hier nur zur Veranschaulichung des Begriffs der Abgeschlossenheit dient.)