Product specificatie

MFU: 42653 [9] - SFU: 49618 [17] - TPS: 61529 [13]

De informatie in deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt. Ter Beke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die voortkomen uit vroegere versies van deze specificatie.

Productidentificatie

Ref. Ter Beke	42653
Verkoopsbenaming	Leverkaas
	Leverkaas DC
Wettelijke Productbenaming	Vleesbereiding - Pâté
Merknaam	Daniel Coopman
Identificatiemerk	BE - B148 - EG
Gewicht	2,09 kg
Afmetingen	
Lengte	23,5 cm
Breedte	10,5 cm
Hoogte	10,0 cm
EAN13	2845592000001
EAN14	95413848447087
GTIN	95413848447094

Houdbaarheid en opslagvoorwaarden

Verpakkingsvoorwaarde	Vacuümverpakt
Houdbaarheidstemperatuur	Bewaren bij maximum 7°C
Houdbaarheidsaanduiding	Te gebruiken tot
Min. commerciële houdbaarheid	43 Dagen

Ingrediëntenlijst

Deze ingrediëntlijst werd opgesteld volgens onze kennis en begrip van de relevante etiketteringswetgeving. De allergie-informatie heeft enkel betrekking op de wettelijk verplicht te declareren allergenen.

Ingrediënten: varkenslever (40%), varkensvet, EI-eiwit, varkenszwoerd, zout, MELKeiwitten, TARWEzetmeel, suiker, glucosestroop, stabilisatoren: E451, E452, conserveermiddelen: E261, E250, antioxidant: E301, uienextract, LACTOSE.
Ommanteling: spekmantel.
Kan ook SELDERIJ bevatten.

Voedingswaarden

	Per 100g	**Per serv.eenh.**	
			g
Energie	344		kcal
Energie	1424		kJ

	Per 100g	**Per serv.eenh.**	
Vetten	31,5		g
waarvan			
verzadigde vetzuren	11.7		g
Koolhydraten	1,5		g
waarvan			
Suikers	1.5		g
Eiwitten	13.7		g
Equivalent in zout	2.00		g

Microbiologische eigenschappen

Begin houdbaarheid/Einde van het productieproces

	QCP	m (GMP)	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	100/g	1000/g	
Melkzuurbacteriën	Y	100/g	1000/g	
Enterobacteriën	Y	<10/g	100/g	
Escherichia coli	Y	<10/g	10/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100/g	1000/g	
Pseudomonas	N	10/g	100/g	
Sulfietreducerende clostridia	N	100/g	1000/g	
Salmonella	N	neg./25g	neg./25g	
Listeria monocytogenes	N	neg./25g	neg./25g	(13), (14), (15)
Staphylococcus aureus	N	10/g	100/g	
Clostridium perfringens	N	100/g	1000/g	
Bacillus cereus	N	100/g	1000/g	
Campylobacter jejuni	N	-	neg./25g	(17)

Einde houdbaarheid

	QCP	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	1 000 000/g	(2), (4), (5)
Melkzuurbacteriën	Y	1 000 000/g	(2), (7)
Enterobacteriën	Y	-	(16)
Escherichia coli	Y	100/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100 000/g	no visual growth
Pseudomonas	Y	10 000/g	
Sulfietreducerende	Y	10 000/g	

clostridia			
Salmonella	Y	neg./25g	
Listeria monocytogenes	Y	<100.g	(15)
Staphylococcus aureus	Y	1000/g	
Clostridium perfringens	N	1000/g	
Bacillus cereus	Y	10 000g	
Campylobacter jejuni	Y	neg./25g	(17)

Verklarende nota

(2) Totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal en (pyschrotrofe) melkzuurbacteriën moeten geïnterpreteerd worden bij gebruik van gefermenteerde ingrediënten (bijv. beschermende culturen, kaas, salami, ...) ==> cfr. microbiologische eigenschappen van gefermenteerde producten. Dit is van toepassing voor zowel micronormen "af productie" als "einde houdbaarheid". In dergelijken gevallen zouden de micronormen niet van toepassing kunnen zijn.
(4) Wanneer het totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal overschreden wordt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd als het andere kiemen betreft dan (homofermentatieve) melkzuurbacteriën.
(5) Indien melkzuurbacteriën verantwoordelijk zijn voor een hoog totaal aëroob kiemgetal mag het verschil niet meer bedragen dan 1 log eenheid.
(7) Wanneer het aantal melkzuurbacteriën de norm overschrijdt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd op voorwaarde dat er onaanvaardbare sensorische afwijkingen zijn.
(10) E.coli direct geanalyseerd of na detectie van Enterobacteriaceae.
(13) Deze waarde kan hoger zijn (afwezigheid in "x" g) indien de groeisnelheid van Listeria monocytogenes werd vastgesteld (door bijv challenge testen) en daarbij kan gegarandeerd worden dat het aantal steeds beneden <100 kve/g blijft gedurende de ganse houdbaarheid.
(14) Kan <100kve/g zijn indien kan aangetoond worden dat Listeria monocytogenes niet kan uitgroeien (zie pH en aw-waarden in Verordening 2073/2005).
(15) Listeria monocytogenes is eerst bepaald als "afwezig in 25g" en - indien positief - volgt een telling met de bovengrens van <100kve/g.
(16) Enterobacteriaceae spp or not a good hygiene indicator for chilled products during or at end of shelf life. For that purpose, E.coli is a better indicator.
(17) Only applicable for products containing poultry

Vreemde voorwerpen detectie

	Methode	Detectie limiet (mm sferisch)
IJzer	Metaal detectie in productielijn	1,5
Non-ferro	Metaal detectie in productielijn	2,0
Roestvrij staal	Metaal detectie in productielijn	2,5

GGO en bestraling

Het product, noch delen ervan, is onderworpen aan GGO etikettering en werd niet doorstraald.

Verpakking

Secundaire verpakking	Eps 13
Eenheden/doos	6
Pallet	EURO 80x120 HOUT PALLET
Lagen/pallet	10
Dozen/laag	4
Dozen/pallet	40