

Diet	Wtloss
A	3.709
A	7.087
A	6.754
A	8.994
A	9.077
A	6.413
A	5.877
A	2.572
A	7.520
A	6.881
A	7.265
A	3.477
A	3.755
A	8.760
A	7.032
A	9.052
A	10.062
A	4.840
A	6.449
A	9.019
A	-1.715
A	4.718
A	4.007
A	7.241
A	2.128
A	6.968
A	4.853
A	0.055
A	2.680
A	3.746
A	7.033

Diet A	n	50
	Mean	5.341
	SD	2.536
	Median	5.642
	Q1	3.748
	Q3	7.033
	IQR	3.285

Diet B	n	50
	Mean	3.710
	SD	2.769
	Median	3.745
	Q1	2.726
	Q3	6.568
	IQR	3.842

Interpretation

Q1 belongs in the bottom 50% according to the median of 3.745, and Q3 correctly reflects above the median of 3.745.

The IQR is slightly higher than both the mean and median weight loss which seems to indicate a sporadic use of Diet B, compared to Diet A whose IQR (compared is lower than Mena) indicates a consistent use of Diet A.

A	5.033
A	5.569
A	6.712
A	3.663
A	2.741
A	6.256
A	5.349
A	7.300
A	5.445
A	4.970
A	3.613
A	7.568
A	5.861
A	4.157

A	0.203
A	4.441
A	5.875
A	5.715
A	0.280
B	-1.087
B	1.819
B	0.074
B	1.755
B	1.889
B	3.089
B	4.008
B	4.551
B	1.372
B	3.413
B	-4.148
B	2.823
B	2.865
B	4.369
B	6.337
B	6.308
B	3.494
B	10.539
B	3.840
B	5.123
B	5.485
B	-1.894
B	8.016
B	2.310
B	3.882
B	7.030
B	7.727
B	0.105
B	3.650
B	4.547
B	4.985
B	5.159
B	4.760
B	4.934
B	3.106
B	5.598
B	2.162
B	6.520
B	7.046
B	1.757
B	1.848
B	1.096
B	2.145
B	8.435
B	6.099
B	3.972
B	2.409
B	0.569
B	7.013
B	2.594