
ANALISI INDICE NASDAQ MAGGIO 2012 - APRILE 2017

Table of Contents

1) Presentazione titolo azionario	1
2) Analisi preliminare grafici	1
3) Test DF per la verifica di stazionarietà	4
4) Analisi della distribuzione dei rendimenti	6
5) Analisi del correlogramma empirico	8
6) Stima del modello ARIMA	10

Michele Sordo: il caso della time serie dell'indice \wedge NDX100 del NYSE.

1) Presentazione titolo azionario

Il NASDAQ-100 è un indice di borsa delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate nel mercato borsistico NASDAQ. È un indice ponderato; il peso delle diverse società che lo compongono è basato sulla loro capitalizzazione di mercato, con alcune regole per tener conto delle influenze delle componenti maggiori. Non comprende società finanziarie, e include alcune società estere. Questi due fattori lo differenziano dall'indice S&P 500. (Fonte: <https://it.wikipedia.org/wiki/NASDAQ-100>) La serie analizzata contiene dati a frequenza giornaliera degli ultimi 5 anni: dal 1 Maggio 2012 al 28 Marzo 2017 è presente un totale di 1257 osservazioni. L'indice è quotato 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì.

2) Analisi preliminare grafici

Analisi preliminare della serie storica.

```
load('NDX.mat');           % caricamento dei dati nel workspace
y = NDX;                   % definizione della serie
T = length(y);             % definizione di T numero di osservazioni
t = (1:T);                 % definizione del vettore temporale


figure;                   % apertura nuova figura vuota
plot(y);                  % plot grafico della serie
h1 = gca;                  % definizione assi cartesiani
h1.XLim = [0,T];          % definizione asse delle ascisse
h1.XTick = [1 263 521 773 1024]; % definizione etichette asse
                               ascisse
h1.XTickLabel = {'Mag 2012','Mag 2013','Mag 2014','Mag 2015', 'Mag
2016'}; % definizione titolo grafico
title('Prezzo di chiusura NDX100, Maggio 2012- Aprile 2017, frequenza
giornaliera.');
```





```
ly = log(y);               % definizione serie trasformata
                               logaritmica
```

```
figure;  
plot(ly);  
h1 = gca;  
h1.XLim = [0,T];  
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];  
h1.XTickLabel = {'Mag 2012','Mag 2013','Mag 2014','Mag 2015', 'Mag  
2016'};  
title('Trasformazione logaritmica indice NDX100.');
```

```
ma = tsmovavg(ly,'s',30,1);      % calcolo media mobile a 30 giorni  
figure;  
plot(t,ly,t,ma);  
h1 = gca;  
h1.XLim = [0,T];  
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];  
h1.XTickLabel = {'Mag 2012','Mag 2013','Mag 2014','Mag 2015', 'Mag  
2016'};  
title('Media mobile a 30 giorni indice NDX100');
```





I primi due grafici illustrano rispettivamente l'andamento della serie storica dell'indice NDX100 e della sua rispettiva trasformata logaritmica. Il terzo grafico è utilizzato per indicare l'andamento della media mobile a trenta giorni della trasformata logaritmica, strumento utilizzato per l'analisi degli investimenti borsistici. La media mobile è calcolata sommando i rispettivi ritardi delle osservazioni, nel nostro caso 30, e dividendo la sommatoria per il numero delle osservazioni. In questo modo, di giorno in giorno i valori superiori a 30 vengono sostituiti dalle nuove misurazioni, indicando un andamento della serie.

L'indicatore di media mobile viene utilizzato nell'ambito dell'analisi tecnica per evidenziare le tendenze sottostanti l'andamento dei prezzi eliminando l'effetto di fluttuazioni minori (transitorie). Le medie mobili possono essere calcolate con diverse metodologie. Le principali metodologie di calcolo sono le seguenti: medie mobili aritmetiche, medie mobili esponenziali e medie mobili ponderate. Eventuali cambiamenti di direzione della media mobile, oppure un incrocio tra la media mobile e la serie dei prezzi possono rappresentare segnali di acquisto o vendita, mentre la media mobile in sé rappresenta spesso un supporto o una resistenza. Fonte (<http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Media%20Mobile>). Questa prima analisi grafica permette di rilevare la mancanza di stazionarietà in senso debole della serie, in quanto la media presenta picchi anche distanti tra loro e la varianza si presenta contenuta in determinati periodi e più alta in altri. Al fine di verificare questa ipotesi utilizziamo il test di Dickey-Fuller.

3) Test DF per la verifica di stazionarietà

Il test di Dickey-Fuller verifica l'ipotesi nulla di presenza di una radice unitaria all'interno del processo generatore della serie storica. Se l'ipotesi nulla non viene rifiutata è necessario trasformare la serie, al fine di eliminare l'effetto della radice unitaria. Se l'ipotesi nulla viene rifiutata la serie può essere considerata stazionaria, a meno di particolari fattori. Matlab include di default 20 ritardi della variabile dipendente nella regressione ausiliaria utilizzata dalla funzione.

```
[h,pValue,stat] = adftest(ly);           % calcolo della statistica DF
table(h,stat,pValue)                     % output del test
if h == 1
    fprintf('Rifiuto l'ipotesi nulla');
else
    fprintf('Non rifiuto l'ipotesi nulla');
end                                       % esito del test
```

ans =

<i>h</i>	<i>stat</i>	<i>pValue</i>
<i>false</i>	<i>2.1213</i>	<i>0.99194</i>

Non rifiuto l'ipotesi nulla

L'output della funzione mostra rispettivamente: del test mostra rispettivamente

- H: l'esito dell'ipotesi alternativa (true: rifiuto l'ipotesi nulla, false: non rifiuto l'ipotesi nulla);
- STAT: valore statistica test associata;
- P-VALUE: p-value associato.

Nel nostro caso l'esito è "h = False", quindi non posso rifiutare l'ipotesi nulla di presenza di radice unitaria nella serie storica. Di conseguenza calcolo la serie delle differenze prime e ripeto il test per verificarne la stazionarietà in senso debole.

```
dy = diff(ly); % calcolo delle differenze prime
figure;
plot(dy);
h2 = gca;
h2.XLim = [0,T];
h2.XTick = [1 263 521 773 1024];
h2.XTickLabel = {'Mag 2012','Mag 2013','Mag 2014','Mag 2015', 'Mag
2016'};
title('Differenze prime NDX100');
```


```
[h,pValue,stat] = adftest(dy);
table(h,stat,pValue)
if h == 1
    fprintf('Rifiuto l''ipotesi nulla');
else
    fprintf('Non rifiuto l''ipotesi nulla');
end
```

*Warning: Test statistic #1 below tabulated critical values:
minimum p-value = 0.001 reported.*

ans =

<i>h</i>	<i>stat</i>	<i>pValue</i>
<i>true</i>	<i>-34.491</i>	<i>0.001</i>

Rifiuto l'ipotesi nulla



L'esito del test Dickey-Fuller, in questo caso, è positivo quindi rifiuto l'ipotesi di presenza di una seconda radice unitaria e traggio la conclusione che la serie storica dell'indice NDX100 si possa considerare stazionaria in senso debole nelle differenze prime. Il grafico associato alla serie delle differenze prime conferma che la serie è almeno stazionaria in media e mostra che la varianza cambia nei diversi periodi, risultando più marcata in alcuni casi e più contenuta in altri. Al fine dell'analisi della variabilità verrà affrontata nella sezione 8. Consideriamo quindi la serie come "integrata di ordine 1", ossia $I(1)$.

4) Analisi della distribuzione dei rendimenti

La serie delle differenze prime corrisponde alla serie dei rendimenti dell'indice NDX100. Al fine di scegliere e stimare il modello migliore si utilizza l'approccio di Box-Jenkins, definendo il processo stocastico di generazione della serie storica.

```
Media = mean(dy);  
Varianza = var(dy);  
Curtosi = kurtosis(dy);  
Asimmetria = skewness(dy);  
table(Media, Varianza, Curtosi, Asimmetria)  
figure  
subplot(2,2,1)  
histogram(dy,60)  
title('Istogramma serie dei rendimenti')  
  
[f,dyi] = ksdensity(dy);  
subplot(2,2,2)  
plot(dyi,f)
```





```
title('Stima distribuzione di probabilità dei rendimenti')
```

```
subplot(2,2,3)  
hold on  
plot(dy,f)  
x = (-1:.1:1);  
norm = normpdf(x,0,1);  
plot(x,norm)  
hold off  
title('Confronto con una normale standard')
```

```
subplot(2,2,4)  
qqplot(dy)
```

ans =

<i>Media</i>	<i>Varianza</i>	<i>Curtosi</i>	<i>Asimmetria</i>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
0.00057058	8.9686e-05	5.2899	-0.32627



I momenti calcolati mostrano:

- una media prossima allo zero, pari a "0.00057058".

- una varianza prossima allo zero, pari a "8.9686e-05".

La distribuzione è leptocurtica e asimmetrica verso sinistra. Il confronto tra la stima della distribuzione di probabilità dei rendimenti ed il confronto con la normale standard mostra che, sebbene le osservazioni siano concentrate intorno alla media, la distribuzione presenta pesanti code da entrambe le parti, con una particolare accentuazione verso sinistra. L'analisi è confermata dal qq-plot, dove si nota la presenza di asimmetria e la conferma dell'ipotesi delle code più pesanti.

5) Analisi del correlogramma empirico

Al fine di identificare il processo generatore della serie tramite l'approccio di Box-Jenkins si calcolano e si rappresentano attraverso i rispettivi correlogrammi empirici:

- ACF: funzione di autocorrelazione
- PACF: funzione di autocorrelazione parziale.

I correlogrammi empirici presentando una prima analisi grafica della relazione tra la serie e le osservazioni.


```
K = (0:20)'; % definizione vettore ritardi
ACF = autocorr(dy); % calcolo ACF
PACF = parcorr(dy); % calcolo PACF
table(K,ACF,PACF)
figure
autocorr(dy) % plot correlogramma ACF
figure
parcorr(dy) % plot correlogramma PACF
```


ans =

<i>K</i>	<i>ACF</i>	<i>PACF</i>
0	1	1
1	0.022853	0.022853
2	-0.015352	-0.01589
3	-0.064379	-0.063775
4	-0.06288	-0.060681
5	-0.016464	-0.016268
6	-0.0028925	-0.0085681
7	-0.0064258	-0.015068
8	-0.0023477	-0.008392
9	-0.0155	-0.018985
10	0.026972	0.02482
11	0.0038611	-0.00017703
12	-0.021	-0.024464
13	-0.013686	-0.013015
14	-0.0046123	-0.0022273
15	-0.05162	-0.054756
16	0.024571	0.021842
17	0.025596	0.020668
18	0.0048912	-0.0036883

ANALISI INDICE NASDAQ
MAGGIO 2012 - APRILE 2017

19	0.021881	0.019745
20	0.037173	0.040337





I correlogrammi empirici non permettono di derivare direttamente il modello stocastico migliore per l'analisi della serie storica ma permettono di notare i potenziali effetti dei ritardi, osservando per quali K essi superino l'intervallo di confidenza. Nel nostro caso i ritardi che mostrano potenziali effetti sono il terzo e il quarto. Tramite questa informazioni si procede a stimare il modello ARIMA migliore e più parsimonioso.

6) Stima del modello ARIMA

```
Mdl = arima(1,1,0); % definizione del modello ARIMA(1,1,0)
EstMdl10 = estimate(Mdl,ly); % stima del modello definito sui dati
    della serie storica

Mdl = arima(0,1,1); % ripetizione del procedimento
EstMdl01 = estimate(Mdl,ly);

Mdl = arima(1,1,1);
EstMdl11 = estimate(Mdl,ly);
```

ARIMA(1,1,0) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

<i>Parameter</i>	<i>Value</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Statistic</i>
Constant	0.000555734	0.000271965	2.04341

ANALISI INDICE NASDAQ
MAGGIO 2012 - APRILE 2017

AR{1}	0.0228532	0.0206712	1.10556
Variance	8.97064e-05	2.48051e-06	36.1645

ARIMA(0,1,1) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.000567465	0.0002787	2.03611
MA{1}	0.0236948	0.0206558	1.14713
Variance	8.94659e-05	2.46873e-06	36.2396

ARIMA(1,1,1) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.000608959	0.000559077	1.08922
AR{1}	-0.0725011	0.970821	-0.0746802
MA{1}	0.0962038	0.970265	0.0991521
Variance	8.94876e-05	2.48987e-06	35.9406

```
Mdl = arima(2,1,1);
EstMdl = estimate(Mdl,ly);
res = infer(EstMdl,ly);

Mdl = arima('ArLags',[3 4],'D',1,'MaLags',[]);
EstMdl340 = estimate(Mdl,ly);

Mdl = arima('ArLags',[],'D',1,'MaLags',[3 4]);
EstMdl034 = estimate(Mdl,ly);

Mdl = arima('ArLags',[3 4],'D',1,'MaLags',[3 4]);
EstMdl3434 = estimate(Mdl,ly);
```

ARIMA(2,1,1) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.000158659	0.000115054	1.37899
AR{1}	0.793469	0.125466	6.32418
AR{2}	-0.0655226	0.0218715	-2.9958
MA{1}	-0.775071	0.125727	-6.1647
Variance	8.89974e-05	2.53921e-06	35.0493

ARIMA(4,1,0) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.0006686	0.000274536	2.43538
AR{3}	-0.0629839	0.0222096	-2.83589
AR{4}	-0.0614709	0.0223005	-2.75648
Variance	8.86253e-05	2.50313e-06	35.4058

ARIMA(0,1,4) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.000569214	0.000245826	2.31552
MA{3}	-0.0644678	0.0226558	-2.84553
MA{4}	-0.0635488	0.0231999	-2.73918
Variance	8.88093e-05	2.50972e-06	35.3862

ARIMA(4,1,4) Model:

Conditional Probability Distribution: Gaussian

Parameter	Value	Standard Error	t Statistic
Constant	0.000146416	4.48184e-05	3.26687
AR{3}	0.190689	0.119548	1.59508
AR{4}	0.579912	0.109864	5.27847
MA{3}	-0.2421	0.115203	-2.10151
MA{4}	-0.634331	0.105668	-6.00307
Variance	8.81666e-05	2.45867e-06	35.8594

%{

%% 7) Analisi dei residui

%Valutiamo la qualità del modello specificato analizzando la distribuzione dei residui della regressione.

```
sy = (dy-res(2:end));
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
hold on
plot(dy)
plot(sy,'r')
```

```
legend('Valori osservati','Valori stimati')
title('Differenza tra valori osservati e stimati')
hold off

figure
plot(res./sqrt(EstMdl.Variance))          % plot dei residui
    standardizzati
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
title('Residui standardizzati')

%%

figure
subplot(2,2,1)
histogram(res,60)                        % istogramma dei residui
title('Istogramma residui')
subplot(2,2,2)
qqplot(res)                             % qqplot dei residui
subplot(2,2,3)
autocorr(res)                            % correlogramma
subplot(2,2,4)
parcorr(res)

%%

[h,p,Qstat,crit] = lbqtest(res,'lags',[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20]);
names = {'K';'H';'pvalue';'Qstat';'Crit'};
table(K(2:end),h',p',Qstat',crit','VariableNames',names)      %
    creazione tabella ouput

%% 8) Test per la presenza di effetti ARCH

figure;
plot((res-mean(res)).^2);
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
figure;
subplot(2,1,1)
autocorr((res).^2);
subplot(2,1,2)
parcorr((res).^2);
[h,p,Qstat,crit] = lbqtest(res.^2,'lags',1);
table(h,Qstat,crit,p,'rownames',{'lbqtest'})
if h == 1
    fprintf('Rifiuto l''ipotesi nulla');
else
```

```
        fprintf('Non rifiuto l''ipotesi nulla');
    end
    [h,p] = archtest(res,'lags',1);      %Test di Engle
    table(h,p,'rownames',{'Archtest'})
    if h == 1
        fprintf('Rifiuto l''ipotesi nulla');
    else
        fprintf('Non rifiuto l''ipotesi nulla');
    end

%% 9) Selezione e stima modello GARCH

Mdl = egarch(0,1);
VarMdl = estimate(Mdl,res);

%%
%
%
%
%
%

cv = infer(VarMdl,res);      % generazione della varianza condizionata
stres = (res./sqrt(cv));    % standardizzazione dei residui
[h,p,Qstat,crit] = lbqtest(cv.^2,'lags',2);
table(h,Qstat,crit,p,'rownames',{'lbqtest'})
if h == 1
    fprintf('Rifiuto l''ipotesi nulla');
else
    fprintf('Non rifiuto l''ipotesi nulla');
end
[h,p] = archtest(cv,'lags',2);      %Test di Engle
table(h,p,'rownames',{'Archtest'})
if h == 1
    fprintf('Rifiuto l''ipotesi nulla');
else
    fprintf('Non rifiuto l''ipotesi nulla');
end

%%
%
%
%
%
%

figure;
subplot(2,1,1)

title('ACF residui standardizzati al quadrato');
subplot(2,1,2)
```

```
parcorr((stres).^2);
title('PACF residui standardizzati al quadrato');
figure
subplot(2,2,1)
plot(stres)
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
title('Residui standardizzati');
subplot(2,2,2)
qqplot(stres)
subplot(2,2,3)
autocorr(stres)
subplot(2,2,4)
parcorr(stres)
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
hold on
plot(res./sqrt(EstMdl.Variance))
plot(stres,'r');
hold off
title('Residui standardizzati con varianza EGARCH su residui
standardizzati con varianza costante');
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
scatter(stres,res);
ylabel('Residui originali');
xlabel('Residui standardizzati');
title('Scatter plot residui standardizzati e residui originali')
autocorr((stres).^2);

%% 10) Previsione

[yf, vf] = forecast(EstMdl,30,'Y0',ly(1:1247));           % valore
    atteso condizionato
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
h1.XTickLabel = {'Giu 2011','Giu 2012','Giu 2013','Giu 2014','Giu
    2015'};
hold on
h2 = plot(ly,'Color',[.7,.7,.7]);
h3 = plot(1248:1277,yf,'b','LineWidth',2);
h4 = plot(1248:1277,yf + 1.96*sqrt(vf),'r:','LineWidth',2);
plot(1248:1277,yf - 1.96*sqrt(vf),'r:','LineWidth',2);
legend([h2 h3 h4],'Valori osservati','Previsione','Intervallo di
    confidenza al 95%','Location','NorthWest');
```

```
title('Simulazione previsione per 30 periodi e intervalli di
confidenza al 95%')
hold off

%%
%
%
%
%
%

cvf = forecast(VarMdl,30,'Y0',res(1:1247));           % varianza
condizionata
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
h1.XTickLabel = {'Giu 2011','Giu 2012','Giu 2013','Giu 2014','Giu
2015'};
hold on
plot(1:1247,cv(1:1247),'b','Color',[.7,.7,.7]);
plot(1248:1277,cv2,'r');
legend('Varianza condizionata','Previsione','Location','NorthEast');
title('Simulazione previsione varianza condizionata EGARCH(0,1) per 30
periodi');

%%
%
%
%
%
%

Mdl = arima('ArLags',[1 5],'MaLags',[1 5 6]); % simulazione
rendimenti con varianza EGARCH
EstMdl2 = estimate(Mdl,dy);
yf2 = forecast(EstMdl2,100,'Y0',dy(1:1177));
cvf2 = forecast(VarMdl,100,'Y0',res(1:1177));
figure
h1 = gca;
h1.XLim = [0,T];
h1.XTick = [1 263 521 773 1024];
h1.XTickLabel = {'Giu 2011','Giu 2012','Giu 2013','Giu 2014','Giu
2015'};
hold on
h2 = plot(dy,'Color',[.7,.7,.7]);
h3 = plot(1178:1277,yf2,'b','LineWidth',2);
h4 = plot(1178:1277,yf2 + 1.96*sqrt(cvf2),'r:','LineWidth',2);
plot(1178:1277,yf2 - 1.96*sqrt(cvf2),'r:','LineWidth',2);
legend([h2 h3 h4],'Valori osservati','Previsione','Intervalli di
confidenza al 95%','Location','NorthWest');
title('Simulazione previsione RENDIMENTI per 100 periodi e intervalli
di confidenza al 95%')
hold off
```



```
%% 11) Previsioni
```

```
close all
```

```
%}
```

Published with MATLAB® R2016b