

## 해석 텍스트

동의수세보원 1권  
성명론(37조)

[1-1] 천기(天機)에 넷이 있는데 첫째는 지방(地方)이고 둘째는 인륜(人倫)이고 셋째는 세회(世會)이고 넷째는 천시(天時)이다.

[1-2] 인사(人事)에 넷이 있는데 첫째는 거처(居處)이고 둘째는 당여(黨與)이고 셋째는 교우(交遇)이고 넷째는 사무(事務)이다.

[1-3] 귀로 천시를 들으며 눈으로 세회를 보며 코로 인륜을 냄새 맡고 입으로 지방을 맛본다.

[1-4] 천시는 지극히 탕(蕩)한 것이고 세회는 극히 큰 것이고 인륜은 극히 넓은 것이고 지방은 극히 먼 것이다.

[1-5] 폐는 사무를 수행하며 비는 교우를 맺게 하며 간은 당여를 형성하며 신은 거처를 정한다.

[1-6] 사무는 잘 닦여져야 하고 교우는 잘 이루어져야 하고 당여는 잘 정돈되어야 하고, 거처는 잘 다스려져야 한다.

[1-7] 턱에는 주책(籌策)이 있고 가슴에는 경륜(經綸)이 있고 배꼽에는 행검(行檢)이 있고 배에는 도량(度量)이 있다.

[1-8] 주책은 교만하지 말아야 할 것이고 경륜은 빠가지 말아야 할 것이고 행검은 함부로 하지 말아야 할 것이고 도량은 과장하지 말아야 할 것이다.

[1-9] 머리에는 식견(識見)이 있고 어깨에는 위의(威儀)가 있고 허리에는 재간(材幹)이 있고 엉덩이에는 방략(方略)이 있다.

[1-10] 식견은 반드시 빠앗는 일이 없어야 할 것이고 위의는 반드시 사치함이 없어야 할 것이고 재간은 반드시 게으름이 없어야 할 것이고 방략은 반드시 도적질함이 없어야 할 것이다.

[1-11] 귀와 눈과 코와 입은 천기를 인식하는 것이고 폐와 비와 간과 신은 인사를 수행하는 것이고 턱과 가슴과 배꼽과 배는 지(知)를 주관하는 것이며 머리와 어깨와 허리와 엉덩이는 행(行)을 주관하는 것이다.

[1-12] 천시는 대동(大同)한 것이고 사무는 각립(各立)한 것이요 세회는 대동한 것이고 교우는 각립한 것이요 인륜은 대동한 것이고 당여는 각립한 것이요 지방은 대동한 것이고 거처는 각립한 것이다.

[1-13] 주책은 널리 통하는 것(博通)이고 식견은 홀로 행하는 것(獨行)이요 경륜은 널리 통하는 것이고 위의는 홀로 행하는 것이요 행검은 널리 통하는 것이고 재간은 홀로 행하는 것이요 도량은 널리 통하는 것이고 방략은 홀로 행하는 것이다.

[1-14] 대동한 것은 천(天)이고 각립한 것은 사람(人)이며 널리 통하는 것은 성(性)이고 홀로 행하는 것은 명(命)이다.

[1-15] 귀는 좋은 소리를 좋아하고 눈은 좋은 빛을 좋아하고 코는 좋은 냄새를 좋아하고 입은 좋은 맛을 좋아한다.

[1-16] 좋은 소리는 귀에 순하고 좋은 빛은 눈에 순하고 좋은 냄새는 코에 순하고 좋은 맛은 입에 순하다.

[1-17] 폐는 나쁜 소리를 싫어하고 비는 나쁜 빛을 싫어하고 간은 나쁜 냄새를 싫어하고 신은 나쁜 맛을 싫어한다.

[1-18] 나쁜 소리는 폐에 거슬리고 나쁜 빛은 비에 거슬리고 나쁜 냄새는 간에 거슬리고 나쁜 맛은 신에 거슬린다.

[1-19] 턱에는 교만한 마음[驕心]이 있고 가슴에는 빠기는 마음[矜心]이 있고 배꼽에는 함부로 하는 마음[伐心]이 있고 배에는 과장하는 마음[夸心]이 있다.

[1-20] 교만한 마음은 뜻을 교만하게 하는 것이고 뽐내는 마음은 사려를 스스로 빠기는 것이고 함부로 하는 마음은 생각을 함부로 하는 것이고 과장하는 마음은 지조를 과장하는 것이다.

[1-21] 머리에는 독단으로 행하는 마음[擅心]이 있고 어깨에는 사치한 마음[侈心]이 있고 허리에는 나태한 마음[懶心]이 있고 엉덩이에는 욕심[欲心]이 있다.

[1-22] 독단으로 행하는 마음은 이익을 빼앗는 것이고 사치한 마음은 자기를 스스로 높이는 것이고 게으른 마음은 자기를 스스로 낮추는 것이고 욕심은 물건을 도적질 하는 것이다.

[1-23] 사람의 이목비구는 선을 좋아하는 것이 비길 바 없고 사람의 폐비간신은 악한 것을 미워함이 비길 바 없고 사람의 턱과 가슴과 배꼽과 배는 부정한 마음이 비할바 없고 사람의 머리와 어깨와 허리와 엉덩이는 태만한 마음이 비할 바 없다.

[1-24] 요(堯)와 순(舜)이 인을 행한 것은 5000년 전의 일인데 오늘날까지도 세상 사람들이 선한 것을 말할 때에는 다 요순을 말하니 사람이 선을 좋아하는 것이 비할 바 없는 것이다. 걸(桀)과 주(紂)가 폭정을 행한 것이 4000년 전의 일인데 지금도 세상에서 악한 것을 말할 때에는 모두 다 걸주를 말하니 사람들이 악을 미워하는 것이 과연 비할 바가 없는 것이다. 공자 같은 성인에게 3000명의 제자가 가르침을 받았으나 그 중에서 오직 안자(顔子) 한 사람만이 석 달 동안 인(仁)에 어긋남이 없었을 뿐이고 그 나머지는 겨우 며칠이나 한 달 남짓 어기지 않았으며 인을 충심으로 기뻐하며 성심으로 따르는 사람은 다만 72명뿐이니 사람의 사특한 마음이 과연 비할 바가 없는 것이다. 문왕(文王)이 덕으로 100년을 다스리고 죽었으나 그의 은덕이 천하에 흠족하지 못하고 무왕(武王)과 주공(周公)이 그것을 계승한 후에 크게 다스려졌는데 관숙(管叔)과 채숙(蔡叔)은 지극히 가까운 친척이면서도 오히려 난을 일으켰으니 사람의 태만한 행동이 과연 비할 바가 없는 것이다.

[1-25] 귀와 눈과 코와 입은 사람마다 다 요순과 같이 될 수 있게 하는 것이고 턱과 가슴과 배꼽과 배는 사람마다 다 스스로 요순이 되지 못하게 하는 것이요 폐비간신은 사람마다 다 요순이 될 수 있게 하는 것이고 머리와 어깨와 허리와 엉덩이는 사람마다 다 스스로 요순이 되지 못하게 하는 것이다.

[1-26] 사람의 귀·눈·코·입이 선을 좋아하는 마음은 보통 사람의 귀·눈·코·입을 가지고 말하여도 요순이 조금도 더 나은 것이 없고, 사람의 폐비간신이 악을 미워하는 마음은 요순의 폐비간신을 가지고 말하여도 보통 사람이 조금도 못한 것은 없으니 사람마다 다 요순이 될 수 있다는 것은 이 때문이다. 사람의 턱과 가슴과 배꼽과 배 가운데 세상을 속이는 마음이 항상 숨어 있으니 그

본마음을 보존하고 천성을 길러야 사람마다 다 요순처럼 알게 될 것이고, 사람의 머리와 어깨와 허리와 엉덩이 아래에 백성을 속이는 마음이 종종 비밀히 간직되어 있으니 그 자신을 수양하고 자기의 사명을 바로 깨달은 연후에야 사람마다 다 요순처럼 행할 수 있으니 사람마다 다 요순이 되지 못하는 것은 이 때문이다.

[1-27] 귀·눈·코·입의 정(情)은 길 가는 사람도 의로운 것에 협력하는 것이 다 같으므로 선을 좋아하는 것이다. 선을 좋아하는 실정은 공정한 것이니 매우 공정하면 사사로운 마음이 전혀 없을 것이다. 폐·비·간·신의 정(情)은 한 집안 사람끼리라도 각기 자기의 이익을 온전히 지키려고 하므로 악한 것을 싫어하는 것이다. 악을 싫어하는 참된 마음은 극히 사사로움이 없는 것이니 극히 사사로움이 없으면 또 극히 공정한 것이다. 턱과 가슴과 배꼽과 배 가운데 자연히 쉬지 않는 지혜가 있어서 다듬고 갈 듯이 성실하게 수양을 하나, 교만하며 빠지고 함부로 하며 과장하는 사사로운 마음이 갑자기 이것을 이기면 자연히 아는 것을 버려서 널리 통하지 못하게 되는 것이다. 머리와 어깨와 허리와 엉덩이의 아래에 자연히 쉬지 않고 실행하게 하는 힘이 있어서 빛나고 훌륭하나, 빼앗고 사치하고 게으르고 도적질하는 욕심이 갑자기 그것을 억누르면 자연히 그 행실을 버림으로써 정당한 행동을 하지 못하게 된다.

[1-28] 귀·눈·코·입은 사람마다 다 지혜로운 것이고 턱·가슴·배꼽·배는 사람마다 다 어리석은 것이고 폐·비·간·신은 사람마다 다 어진 것이고 머리·어깨·허리·엉덩이는 사람마다 다 착하지 못한 것이다.

[1-29] 사람의 귀·눈·코·입은 하늘의 위치에 해당하니 하늘은 지혜로운 것이고 사람의 폐·비·간·신은 사람의 위치에 해당하니 사람은 어진 것이다. 나의 턱과 가슴과 배꼽과 배는 자기 마음만 위하는 것이므로 어리석음을 면치 못하는 것이니 내가 어리석음을 면하려는 것도 나에게 있는 것이고, 나의 머리와 어깨와 허리와 엉덩이는 자기 몸만 위하는 것이므로 착하지 못한 것을 면하려는 것도 나에게 있는 것이다.

[1-30] 하늘이 만민을 나게 할 때에 성(性)으로 혜각(慧覺)을 주니 만민이 사는데 혜각이 있으면 살고 혜각이 없으면 죽는다. 혜각이란 것은 덕(德)이 나오는 바탕이다.

[1-31] 하늘이 만민을 나게 할 때에 명(命)으로 자업(資業)을 주니 만민이 사는데 자업이 있으면 살고 자업이 없으면 죽는다. 자업이라는 것은 도(道)가 나오는 바탕이다.

[1-32] 인의예지 충효우제(忠孝友悌) 등 모든 선이 다 혜각에서 나오는 것이고 사농공상 전택방국(田宅邦國) 등 모든 활동과 활용이 다 자업에서 나오는 것이다.

[1-33] 혜각은 남의 갑절이 되게 해서 가르침이 있게 하려고 하고 자업은 자기의 욕심을 줄여서 공을 이루려고 하니, 혜각이 사사롭고 작은 사람은 비록 그에게 남보다 뛰어난 점이 있다고 하더라도 간교하기가 조조(曹操)와 같으면 가르침이 있을 수 없고, 자업이 지나치게 벌여놓기를 좋아하는 사람은 비록 그에게 남다른 점이 있다고 하더라도 사납기가 진시황[秦王] 같으면 공을 이루지 못한다.

[1-34] 남의 선을 좋아하고 나 역시 선하게 할 줄 아는 것은 지성(至性)의 덕이며 남의 악을 미워하고 내가 반드시 악을 행하지 않는 것은 정명(正命)의 도이다. 알고 행함이 쌓이면 도덕이며 도덕이 이루어지면 인성(仁聖)이니, 도덕이 다른 것이 아니라 알고 행하는 것이며 성명(性命)이 다른 것이 아니라 알고 행하는 것이다.

[1-35] 어떤 사람이 말하기를 아는 것을 가지고 성을 논하는 것은 가하나 행하는 것을 가지고 명을 논하는 것은 무슨 뜻인가? 대답하기를 명이라는 것은 수명이니 착한행동을 하면 수명이 스스로 좋아지는 것이고 악한 행동을 하면 명수가 스스로 나빠지는 것을 점을 치지 않아도 알 수가 있는 것

이다. 《시경(詩經)》에 말하기를 길이 명을 짚하는 것이 저절로 많은 복을 구한다고 말한 것은 바로 이것을 말한 것이다.

[1-36] 어떤 사람이 말하기를 당신이 귀로 천시를 들으며 눈으로 세회를 보며 코로 인륜을 냄새 맡으며 입으로 지방을 맛본다고 말하는데, 귀가 천시를 듣는다는 것과 눈이 세회를 본다는 것은 가능하나 코가 어떻게 인륜을 냄새 맡으며 입이 어떻게 지방을 맛보겠는가? 나는 말하기를 인륜에 처하여 사람이 밖에 나타난 것을 살펴서 말없이 사람 사람의 재능과 행실이 어질고 착함을 탐색하는 것이 냄새 맡는 것이 아니겠는가! 지방에 처하여 각처의 인민생활의 지역적 특색을 고루 경험하여 보는 것이 맛보는 것이 아니겠는가!

[1-37] 그 본마음을 보존한다는 것은 그 마음을 책(責)하는 것이다. 마음이 밝고 어두움이 비록 자연히 그런 것 같으나 책하는 자는 맑고 책하지 않는 자는 흐리니, 말의 마음 깨닫는 것이 소보다 빠른 것은 말의 마음을 책하는 것이 소보다 빠른 까닭이고, 매의 기세가 술개보다 사나운 것은 매의 기운을 책하는 것이 술개보다 사나운 까닭이다. 마음의 맑고 흐린 것과 기상의 강하고 약한 것이 소와 말·매와 술개에 있어서도 이치로 미루어 볼 때 오히려 그러하거늘 하물며 사람에게 있어서야 더 말할 것이 있겠는가! 또는 두 배·다섯 배로 다르고 또는 천 배 만 배로 다른 것이니 어찌 나면서 곧 얻은 것이며 막연히 생각하지도 않고 아무 노력도 없이 저절로 그렇게 된 것이겠는가!

#### 사단론(26조)

[2-1] 사람이 장리(臟理)를 타고나는데 네 가지 같지 않은 것이 있으니, 폐가 크고 간이 작은 사람을 태양인(太陽人)이라 하고, 간이 크고 폐가 작은 사람을 태음인(太陰人)이라 하며, 비가 크고 신이 작은 사람을 소양인(少陽人)이라 하고, 신이 크고 비가 작은 사람을 소음인(少陰人)이라 한다.

[2-2] 사람이 욕심을 따르는데 네 가지 같지 않은 것이 있으니, 예(禮)를 버리고 방종하는 사람을 비인(鄙人)이라 하고, 의(義)를 버리고 안일한 것만 꾀하는 사람을 나인(懦人)이라 하며, 지(智)를 버리고 사사로운 일을 꾸미는 사람을 박인(薄人)이라 하고, 인(仁)을 버리고 극도로 욕심만 좇는 사람을 탐인(貪人)이라 한다.

[2-3] 오장(五臟) 가운데 심은 중앙의 태극이요, 오장 가운데 폐비간신은 사유(四維)의 사상(四象)이다. 중앙의 태극은 성인(聖人)의 태극이 못사람들의 태극 위에 높이 솟아 있고, 사유의 사상은 성인의 사상이 못사람들의 사상과 살살이 통해 있다.

[2-4] 태소음양(太少陰陽)의 장국(臟局)이 짧고 길어 네 가지로 같지 않은 중에도 한 가지 대동하는 것이 있으니 천리(天理)의 변화라는 것이다. 이것은 성인이나 못사람들이 다 같은 것이다. 비박탐나(鄙薄貪懦)한 마음자리의 맑고 탁함이 네 가지로 같지 않은 중에도 만 가지로 다른 것이 있으니 인욕(人欲)의 넓고 좁은 것이다. 이것은 성인과 못사람들이 만가지로 다른 것이다.

[2-5] 태소음양의 짧고 긴 변화는 한 가지로 같은 가운데 네 가지로 치우친 것이 있으니, 이것은 성인(聖人)이 천(天)을 희망하는 까닭이다. 비박탐나한 마음의 맑고 흐림, 넓고 좁음이 만 가지로 다른 가운데 한 가지 같은 것이 있으니, 이것은 못 사람들이 성인을 희망하는 까닭이다.

[2-6] 성인의 장(臟)도 사단(四端)이고 못 사람들의 장도 또한 사단인데, 성인은 한가지 사단의 장으로 못 사람들의 만 가지 사단의 가운데 처하여 있으니 성인이라는 것은 못 사람들이 즐거워하는 바이다. 성인의 마음에는 욕심이 없고 못 사람들의 마음에는 욕심이 있으니, 성인의 한 가지 욕심이 없는 마음으로 못 사람들의 만 가지 욕심이 있는 가운데 처하여 있으니 못 사람들이란 성인이 근심하는 바이다.

[2-7] 그러므로 천하의 모든 사람의 장리(臟理)가 또한 성인의 장리와 같아서 재능도 또한 성인의 재능과 같다. 폐비간신에 다 성인의 재능을 가지고서 스스로 자기는 재능이 없다고 말한다면, 그것이 어찌 재능의 죄이겠는가? 그것은 마음의 죄인 것이다.

[2-8] 호연지기(浩然之氣)는 폐비간신에서 나오고 호연지리(浩然之理)는 마음에서 나온다. 인의예지 등의 사장(四臟)의 기를 넓히고 채우면 호연지기가 여기에서 나오고, 비박탐나 등의 한 마음의 욕심을 밝히고 구별하면 호연지리가 여기에서 나온다.

[2-9] 성인의 마음에 욕심이 없다는 것은 청정(淸淨) 적멸(寂滅)하여 노자(老子)나 석가(釋迦)의 욕심 없는 것과 같은 것이 아니다. 성인의 마음은 천하가 다스려지지 않는 것을 깊이 근심하기 때문에 다만 욕심이 없을 뿐만 아니라 자기 한 몸의 욕심을 생각할 겨를도 없는 것이니, 천하가 다스려지지 못하는 것을 깊이 근심하여 자기 한 몸의 욕심을 생각할 겨를이 없는 사람은 반드시 배우기를 싫어하지 않고 가르치기를 게을리하지 않는다. 배우기를 싫어하지 않고 가르치기를 게을리하지 않는 것이 곧 성인에게 욕심이 없다는 것이다. 추호라도 자기 한 몸에 대한 욕심이 있으면 요순의 마음이 아니요, 잠시라도 천하를 근심하는 마음이 없으면 공맹(孔孟)의 마음이 아니다.

[2-10] 태양인은 애성(哀性)이 멀리 흠어지고 노정(怒情)이 촉급하니, 애성이 멀리 흠어지면 기운이 폐에 몰려서 폐가 더욱 성하여지고, 노정이 촉급하면 기운이 간에 부닥쳐서 간이 더욱 짝이므로 태양의 장국이 폐가 크고 간이 작게 형성되는 것은 그 때문이다. 소양인은 노성(怒性)이 넓고 크며 애정(哀情)이 촉급하니, 노성이 넓고 크면 기운이비에 몰려 비가 더욱 성하여지고, 애정이 촉급하면 기운이 신에 부닥쳐서 신이 더욱 짝이므로 소양의 장국이 비가 크고 신이 작게 형성되는 것은 그 때문이다. 태음인은 희성(喜性)이 널리 퍼지고 낙정(樂情)이 촉급하니, 희성이 널리 퍼지면 기운이 간에 몰려서 간이 더욱 성하여지고, 낙정이 촉급하면 기운이 폐에 부닥쳐서 폐가 더욱 짝이므로 태음의 장국이 간이 크고 폐가 작게 형성되는 것은 그 때문이다. 소음인은 낙성(樂性)이 깊고 굳으며 희정(喜情)이 촉급하니, 낙성이 깊고 굳으면 기운이 신에 몰려 신이 더욱 성하여지고, 희정이 촉급하면 기운이 비에 부닥쳐서 비가 더욱 짝이므로 소음의 장국이 신이 크고 비가 작게 형성되는 것은 그 때문이다.

[2-11] 폐의 기운은 곧으면서 펴는 것이고, 비의 기운은 굳으면서 싸는 것이며, 간의 기운은 너그러우며 완만한 것이고, 신의 기운은 온화하면서 쌓이는 것이다.

[2-12] 폐로써 내쉬고 간으로써 들이쉬니 간과 폐라는 것은 기액(氣液)을 호흡하는 문이며, 비로써 받아들이고 신으로써 내보내니 신과 비라는 것은 수곡(水穀)을 출납하는 창고이다.

[2-13] 애기(哀氣)는 곧게 올라가고 노기(怒氣)는 옆으로 올라가며 희기(喜氣)는 퍼지면서 내려가고 낙기(樂氣)는 처지면서 내려간다.

[2-14] 애기와 노기는 상승하고 희기와 낙기는 하강하니, 상승하는 기운이 과다하면 하초(下焦)가 상하고 하강하는 기운이 과다하면 상초(上焦)가 상한다.

[2-15] 애노의 기운이 순조롭게 움직이면 왕성하게 위로 올라가고 희락의 기운이 순조롭게 움직이면 부드럽게 아래로 떨어진다. 애기와 노기는 양(陽)이니 순조롭게 움직이면 순하게 위로 올라가고 희기와 낙기는 음(陰)이니 순조롭게 움직이면 순하게 아래로 내려간다.

[2-16] 애노의 기운이 불순하게 움직이면 갑자기 일어나 위에서 합쳐지고, 희락의 기운이 불순하게 움직이면 멋대로 일어나 아래에서 합쳐진다. 상승하는 기운이 불순하게 움직여 위에서 합쳐지면 간과 신이 상하고, 하강하는 기운이 불순하게 움직여 아래에서 합쳐지면 비와 폐가 상한다.

[2-17] 자주 화내고 자주 화를 참으면 옆구리[腰脇]가 자주 압박되고 동요된다. 옆구리는 간이 붙어 있는 곳인데 압박되고 동요되어 안정되지 못하면 간이 상하지 않겠는가! 잠깐 기뻐하고 잠깐 기쁨을 거두어들이면 가슴[胸臑]이 넓어졌다 좁아졌다 한다. 가슴은 비가 붙어 있는 곳인데 넓어지고 좁아지고 하여 안정되지 못하면 비가 상하지 않겠는가! 갑자기 슬퍼했다가 갑자기 슬픔을 그치면 허리[脊曲]가 구부러졌다 펴졌다 한다. 허리는 신이 붙어 있는 곳인데 구부러졌다 펴졌다 해서 안정되지 못하면 신이 상하지 않겠는가! 여러 번 즐거워했다 여러 번 즐거움을 잃으면 등골[背頤]이 지나치게 올라갔다 내려갔다 한다. 등골은 폐가 붙어 있는 곳인데 올라갔다 내려갔다 하여 안정되지 못하면 폐가 상하지 않겠는가!

[2-18] 태양인은 몹시 성내고 깊이 슬퍼함이 있으니 경계하여야 하고, 소양인은 몹시 슬퍼하고 깊이 성냄이 있으니 경계하여야 하며, 태음인은 지나치게 즐거워하고 깊이 기뻐함이 있으니 경계하여야 하고, 소음인은 지나치게 기뻐하고 깊이 즐거워함이 있으니 경계하여야 한다.

[2-19] 고요(驢陶)가 말하기를 "아! 사람을 아는 데 있으며 백성을 편안케 하는 데 있습니다"라 하였다. 우(禹)가 말하기를, "아, 다 그렇거늘 요(堯)임금도 어렵게 여기셨도다. 사람을 알아보면 밝은 것이니 벼슬을 줄 수 있으며, 백성을 편안케 하면 은혜로운 것이니 백성들이 마음에 간직할 것이다. 능히 밝고 은혜로우면 어찌 환두(驩兜)를 걱정하며 유묘(有苗)를 귀양 보내고, 교묘한 말과 아첨하는 얼굴 빛을 하는 공임(孔壬)을 두려워할 까닭이 있겠는가?"라 하였다.

[2-20] 우(禹)의 말씀을 세 번 반복하고 우러러보며 말하건대 요임금의 희노애락이 항상 절도에 맞는 것은 사람을 안다는 것이 어렵기 때문이요, 우임금의 희노애락이 항상 절도에 맞는 것은 감히 사람을 앞에 쉽게 할 수 없기 때문이다. 천하에 희노애락이 몹시 일어나는 것은 모두 행실이 정성되지 못하고 사람을 얹어 밝지 못하기 때문이다. 사람을 안다는 것은 요임금도 어려워했고 우임금도 탄식한 바인데 그 누가 만족히 여겨 스스로 기뻐할 수 있으랴? 더욱 그 정성을 반성하면서 사람을 쓰고 버림에 가벼이 해서는 안 될 것이다.

[2-21] 비록 선(善)을 좋아하는 마음이라도 편급(偏急)하게 하면 선을 좋아함이 반드시 밝지 못할 것이요, 비록 악(惡)을 미워하는 마음이라도 편급하게 하면 악을 미워함이 반드시 두루 미치지 못할 것이다. 천하의 일은 마땅히 좋은 사람(好人)과 더불어 해야 할 것이니 해야 할 것(做), 좋은 사람과 더불어 하지 않으면 희락(喜樂)이 반드시 번거로울 것이요, 천하의 일은 마땅히 좋지 않은 사람과 더불어 하지 말 것이니, 좋지 않은 사람과 더불어 하면 애노(哀怒)가 더욱 번거로울 것이다.

[2-22] 애(哀)와 노(怒)는 서로 이루고 희(喜)와 낙(樂)은 서로 돕는다. 애성(哀性)이 극에 달하면 노정(怒情)이 일어나고 노성(怒性)이 극에 달하면 애정(哀情)이 일어난다. 희성(喜性)이 극에 달하면 낙정(樂情)이 일어나고 낙성(樂性)이 극에 달하면 희정(喜情)이 일어난다. 태양인의 슬픔이 극에 달하여 그치지 않으면 분노(忿怒)가 밖으로 격동하고, 소양인의 성냄이 극에 달하여 이기지 못하면 비애(悲哀)가 마음 가운데 일어나고, 소음인의 즐거움이 극에 달하여 이루지 못하면 희호(喜好)가 일정하지 못하고, 태음인의 기쁨이 극에 달하여 누리지 못하면 치락(侈樂)이 끝이 없다. 이렇게 동하는 것은 칼로 장을 베는 것과 다름이 없으니 한 번 크게 동하면 10년을 가도 회복하기 어렵다. 이것이 죽고 사는 것과 단명하고 장수하는 것의 관건이니 몰라서는 아니 된다.

[2-23] 태소음양(太少陰陽)의 장국(臟局)이 짧고 긴 것은 음양의 변화라서 천품(天稟)이 이미 정하여진 것은 논할 것이 없으나 천품이 이미 정하여진 외에 또 짧고 긴 것이 있으니, 그것은 인사(人事)의 닦고 못 닦음에 따라 수명이 달라진다는 것이다. 삼가지 알아서는 안 될 것이다.

[2-24] 태양인의 성냄은 한 사람의 성냄으로 천만인을 성내게 하나니 그 성냄이 천만인을 감당할 재간이 없으면 반드시 천만인을 건디기 어려울 것이다. 소음인의 기쁨은 한 사람의 기쁨으로써 천만인을 기쁘게 하니 그 기쁨이 천만인을 감당할 재간이 없으면 반드시 천만인을 건디기 어려울 것

이다. 소양인의 슬픔은 한 사람의 슬픔으로써 천만인을 슬프게 하니 그 슬픔이 천만인을 감당할 재간이 없으면 반드시 천만인을 견디기 어려울 것이다. 태음인의 즐거움은 한 사람의 즐거움으로 천만인을 즐겁게 하니 그 즐거움이 천만인을 감당할 재간이 없으면 반드시 천만인을 견디기 어려울 것이다.

[2-25] 태양인과 소양인은 다만 항상 슬픔과 성냄이 과도한 것을 경계해야지 억지로 기쁨과 즐거움을 헛되게 동하여 미치지 못하게 해서는 안 된다. 만일 억지로 기뻐하고 즐거워한다면 기쁨과 즐거움이 진정에서 나오지 못하고 도리어 슬픔과 성냄이 더욱 치우칠 것이다. 태음인과 소음인은 다만 항상 기쁨과 즐거움이 과도한 것을 경계해야지 억지로 슬픔과 성냄을 헛되게 동하여 미치지 못하게 해서는 안 된다. 만일 억지로 슬퍼하고 성낸다면 슬픔과 성냄이 진정에서 우러나오지 못하고 도리어 기쁨과 즐거움이 더욱 치우칠 것이다.

[2-26] 희노애락이 아직 발동하지 않은 것을 중(中)이라 하고, 이미 발동함에 다 절도에 맞는 것을 화(和)라 한다. 희노애락이 아직 발동하지 않음에 항상 경계하는 것이 중(中)에 점점 가까워지는 것이 아니겠는가! 희노애락이 이미 발동함에 스스로 돌이켜보는 것이 절(節)에 점점 가까워지는 것이 아니겠는가!

#### 확충론(17조)

[3-1] 태양인(太陽人)은 애성(哀性)은 원산(遠散)하지만 노정(怒情)은 촉급(促急)한 것이니, 애성이 원산한다는 것은 태양의 귀가 천시(天時)를 살필 때 못사람이 서로 속임을 애처롭게 여기는 것이니, 애성이란 다름 아니라 듣는 것이다. 노정이 촉급한 것은 태양의 비(脾)가 교우(交遇)를 맺을 때 남이 자기를 업신여기는 것을 노여워하는 것이니, 노정이란 다름 아니라 노하는 것이다. 소양인(少陽人)은 노성(怒性)은 광포(宏抱)하지만 애정(哀情)은 촉급한 것이니, 노성이 광포하다는 것은 소양인의 눈이 세회(世會)를 살필 때 못 사람들이 서로 업신여김을 노엽게 여기는 것이니, 노성이란 다름 아니라 보는 것이다. 애정이 촉급하다는 것은 소양의 폐(肺)가 사무(事務)를 처리할 때 남이 자기를 속이는 것을 슬퍼하는 것이니, 애정이란 다름 아니라 슬퍼하는 것이다. 태음인(太陰人)은 희성(喜性)은 광장(廣張)하지만 낙성(樂性)은 촉급한 것이니, 희성이 광장하다는 것은 태음인의 코가 인륜(人倫)을 살필 때 못 사람들이 서로 돕는 것을 기쁘게 여기는 것이니, 희성이란 다름 아니라 냄새를 맡는 것이다. 낙성이 촉급하다는 것은 태음의 신(腎)이 거처(居處)를 다스릴 때 남이 자기를 보호해 줌을 즐거워하는 것이니, 낙성이란 다름 아니라 즐거워하는 것이다. 소음인(少陰人)은 낙성(樂性)은 심확(深確)하지만 희성(喜性)은 촉급한 것이니, 낙성이 심확하다는 것은 소음인의 입이 지방(地方)을 살필 때 못 사람이 서로 보호해줌을 즐겁게 여기는 것이니, 낙성이란 다름 아니라 맛보는 것이다. 희정이 촉급하다는 것은 소음의 간(肝)이 당여(黨與)에 관여할 때 남이 자기를 돕는 것을 기뻐하는 것이니, 희정이란 다름 아니라 기뻐하는 것이다.

[3-2] 태양(太陽)의 귀는 천시(天時)에 대하여 넓게 통할 수 있지만 태양의 코는 인륜(人倫)에 대하여 넓게 통할 수 없다. 태음(太陰)의 코는 인륜에 대하여 넓게 통할 수 있지만 태음의 귀는 천시에 대하여 넓게 통할 수 없다. 소양(少陽)의 눈은 세회(世會)에 대하여 넓게 통할 수 있지만 소양의 입은 지방(地方)에 대하여 넓게 통할 수 없다. 소음(少陰)의 입은 지방에 대하여 넓게 통할 수 있지만 소양의 눈은 세회에 대하여 넓게 통할 수 없다.

[3-3] 태양의 비(脾)는 교우(交遇)에 대하여 용통(勇統)할 수 있지만 태양의 간(肝)은 당여(黨與)에 대하여 아립(雅立)할 수 없다. 소음의 간은 당여에 대하여 아립할 수 있지만 소음의 비(脾)는 교우(交遇)에 대하여 용통할 수 없다. 소양의 폐(肺)는 사무(事務)에 대하여 민달(敏達)할 수 있지만 소양의 신(腎)은 거처(居處)에 대하여 항상 안정될 수는 없다. 태음의 신은 거처에 대하여 항상 안정될 수 있지만 태음의 폐는 사무에 대하여 민달할 수 없다.

[3-4] 태양인은 듣되 천시에 대하여 넓게 통할 수 있으므로 태양의 신(神)은 두뇌(頭腦)에 충족하여 돌아가는 것이 많고, 태양인은 말되 인륜에 대하여 넓게 통할 수 없으므로 태양의 혈(血)은 요척(腰脊)에 충족하지 못하여 간(肝)으로 돌아가는 것이 적으니라. 태음인은 말되 인륜에 대하여 넓게 통할 수 있으므로 태음인의 혈은 요척에 충족하여 간으로 들어가는 것이 많고 태음인은 듣되 천시에 대하여 넓게 통할 수 없으므로 태음인의 신(神)은 두뇌에 충족하여 폐로 돌아가는 것이 적으니라. 소양인은 보되 세회에 대하여 넓게 통할 수 있으므로 소양의 기(氣)는 배려(背纏)에 충족하여 비(脾)로 돌아가는 것이 많고, 소양인은 맛보되 지방에 대하여 넓게 통할 수 없으므로 소양의 정(精)은 방광(膀胱)에 충족하지 못하여 신(腎)으로 돌아가는 것이 적으니라. 소음인은 맛보되 지방에 대하여 넓게 통할 수 있으므로 소음의 정은 방광에 충족하여 신으로 돌아가는 것이 많고, 소음인은 보되 세회에 대하여 넓게 통할 수 없으므로 소음의 기는 배려에 충족하지 못하여 비(脾)로 돌아가는 것이 적으니라.

[3-5] 태양인의 노(怒)는 교우에 대하여 용통할 수 있으므로 교우는 모기(侮己)하지 않고, 태양인의 희(喜)는 당여에 대하여 아립할 수 없으므로 당여는 모기하는 것이니, 그러므로 태양인의 폭노(暴怒)는 교우에 있지 않고 반드시 당여에 있는 것이다. 소음인의 희(喜)는 당여에 대하여 아립할 수 있으므로 당여는 조기(助己)하고, 소음인의 노는 교우에 대하여 용통할 수 없으므로 교우는 조기하지 않는 것이니, 그러므로 소음인의 낭희(浪喜)는 당여에 있지 않고 반드시 교우에 있는 것이다. 소양인의 애(哀)는 사무에 대하여 민달할 수 있으므로 사무는 기기(欺己)하지 않고, 소양인의 낙(樂)은 거처에 대하여 항상 안정하지 못하므로 거처는 기기하는 것이니, 그러므로 소양인의 폭애(暴哀)는 사무에 있지 않고 반드시 거처에 있는 것이다. 태음인의 낙(樂)은 거처에 대하여 항상 안정하므로 거처는 보기(保己)하고, 태음인의 애(哀)는 사무에 대하여 민달하지 못하므로 사무는 보기하지 않을 것이니, 그러므로 태음인의 낭락(浪樂)은 거처에 있지 않고 반드시 사무에 있는 것이다.

[3-6] 태양인의 교우는 노(怒)로 다스릴 수 있지만 당여를 노로 다스려서는 안 된다. 만일 노를 당여에 옮기면 당여에 보탬이 없을 뿐만 아니라 간(肝)을 상하게 된다. 소음인의 당여는 희(喜)로 다스릴 수 있지만 교우를 희로 다스려서는 안 된다. 만일 희를 교우에 옮기면 교우에 보탬이 없을 뿐만 아니라 비(脾)를 상하게 된다. 소양인의 사무는 애(哀)로 다스릴 수 있지만 거처를 애로 다스려서는 안 된다. 만일 애를 거처에 옮기면 거처에 보탬이 없을 뿐만 아니라 신(腎)이 상하게 된다. 태음인의 거처는 낙(樂)으로 다스릴 수 있지만 사무를 낙으로 다스려서는 안 된다. 만일 낙을 사무에 옮기면 사무에 보탬이 없을 뿐만 아니라 폐(肺)가 상하게 된다.

[3-7] 태양인의 성기(性氣)는 항상 전진하려고 하지만 후퇴하려고 하지는 않는다. 소양인의 성기는 항상 거동하려 하지만 그만두려고 하지는 않는다. 태음인의 성기는 항상 고요하려고 하지만 움직이려고 하지는 않는다. 소음인의 성기는 항상 들어앉으려고 하지만 밖으로 나가려고 하지는 않는다.

[3-8] 태양인의 전진함은 그 역량이 가히 전진함즉 하지만 스스로 자신의 재주를 돌이켜보되 장엄하지 않으면 전진할 수 없을 것이다. 소양인의 거동은 그 역량이 가히 거동함즉 하지만 스스로 자신의 실력을 돌이켜보되 확고하지 않으면 거동할 수 없을 것이다. 태음인의 고요함은 그 역량이 가히 고요함즉 하지만 스스로 자신의 지혜를 돌이켜보되 주밀(周密)하지 않으면 고요할 수 없을 것이다. 소음인의 들어앉음은 그 역량이 가히 들어앉음즉 하지만 스스로 자신의 모사(謀事)를 돌이켜보되 광대(廣大)하지 않으면 들어앉을 수 없을 것이다.

[3-9] 태양인의 정기(情氣)는 항상 수컷이 되고자 하지만 암컷이 되고자 하지는 않는다. 소음인의 정기는 항상 암컷이 되고자 하지만 수컷이 되고자 하지는 않는다. 소양인의 정기는 항상 밖에서 뛰어나고자 하지만 안에서 지키고자 하지는 않는다. 태음인의 정기는 항상 안에서 지키고자 하지만 밖으로 뛰어나고자 하지는 않는다.

[3-10] 태양인은 비록 수컷이 되기를 좋아하지만 암컷이 되는 것도 좋을 것이니, 만일 전적으로 수

컷이 되기만을 좋아한다면 방종(放縱)하는 마음이 반드시 지나칠 것이다. 소음인은 비록 암컷이 되기를 좋아하지만 더러는 수컷이 되는 것도 좋을 것이니, 만일 전적으로 암컷이 되기를 좋아한다면 안일(安逸)을 꾀하는 마음이 반드시 지나칠 것이다. 소양인은 비록 외승(外勝)하기를 좋아하지만 또한 내수(內守)하는 것도 좋을 것이니, 만일 전적으로 외승하기를 좋아한다면 사정(私情)에 치우치는 마음이 반드시 지나칠 것이다. 태음인은 비록 내수하기를 좋아하지만 또한 외승하는 것도 좋을 것이니 만일 전적으로 내수하기만을 좋아한다면 반드시 물욕(物慾)에 빠지는 마음이 지나칠 것이다.

[3-11] 태양인은 비록 지극히 어리석더라도 그의 본성은 말씨가 명확하여 사람을 맞 아들이는 듯하고, 비록 지극히 못났더라도 사람들의 선악(善惡)을 분별할 줄을 안다. 소양인은 비록 지극히 어리석더라도 그의 본성은 포용력이 넓고 커서 사람을 존경하는 법도가 있는 듯하고, 비록 지극히 못났더라도 사람들의 지우(知愚)를 분별할 줄을 안다. 태음인은 비록 지극히 어리석더라도 그의 본성이 사람 위에 우뚝 솟아 남을 가르치며 유도해 내는 듯하고, 비록 지극히 못났더라도 사람들의 근타(勤惰)를 또한 가려낼 줄 안다. 소음인은 비록 지극히 어리석더라도 그의 본성이 넓고 평탄하여 사람들을 달래며 따르도록 하는 듯하고, 비록 지극히 못났더라도 사람들의 능부(能否)를 또한 분별해 낼 줄 안다.

[3-12] 태양인은 교우는 삼가는 까닭에 항상 생소한 교우인(交遇人)을 여환(慮患)하는 노심(怒心)이 있으니, 이 마음은 떳떳하게 타고난 경심(敬心)에서 나왔는지라 지극히 선한 것이 아닌 바 아니지만, 당여에 대해서는 가볍게 여기는 까닭에 매양 친숙한 당여인 때문에 함정에 빠져 치우친 노정(怒情)으로 장부를 상하는 것이니, 그의 택교(擇交)하는 마음이 넓지 못하기 때문이다.

[3-13] 소음인은 당여는 삼가하는 까닭에 항상 친숙한 당여인과 택교(擇交)하는 희심(喜心)이 있으니, 이 마음은 떳떳하게 타고난 경심에서 나왔는지라 지극히 선한 것이 아닌 바 아니지만, 교우에 대해서는 가볍게 여기는 까닭에 항상 생소한 교우인 때문에 속임수에 빠져 치우친 희정(喜情)으로 장부를 상하는 것이니, 그의 여환(慮患)하는 마음이 두루 치밀하지 못하기 때문이다.

[3-14] 소양인은 사무는 중(重)하게 다루는 까닭에 항상 밖으로 나아가 사무를 일으키는 애심(哀心)이 있으니, 이 마음은 떳떳하게 타고난 경심에서 나왔는지라 지극히 선한 것이 아닌 바 아니지만, 거처에 대해서는 삼가지 않는 까닭에 항상 안을 주장 삼아 거처를 마련하는 사람의 함정에 빠져 치우친 애정(哀情)으로 장부를 상하는 것이니, 그가 밖을 중하게 여기고 안을 가볍게 여기기 때문이다.

[3-15] 태음인은 거처는 중하게 여기는 까닭에 항상 안을 주장삼아 거처를 마련하는 낙심(樂心)이 있으니, 이 마음은 떳떳하게 타고난 경심에서 나왔는지라 지극히 선한 것이 아닌 바 아니지만, 사무에 대해서는 삼가지 않는 까닭에 항상 밖으로 나아가 사무를 일으키는 사람의 속임수에 빠져 치우친 낙정(樂情)으로 장부를 상하는 것이니, 그가 안을 중하게 여기고 밖을 가볍게 여기기 때문이다.

[3-16] 태음인의 턱은 마땅히 교심(驕心)을 경계해야 할 것이니, 태음인의 턱은 만일 교심이 없다면 절세의 주책(籌策)이 반드시 거기에 있을 것이다. 소음인의 가슴은 마땅히 긍심(矜心)을 경계해야 할 것이니, 소음인의 가슴에 만일 긍심이 없다면 절세의 경륜(經綸)이 반드시 거기에 있을 것이다. 태양인의 배꼽은 마땅히 벌심(伐心)을 경계해야 할 것이니, 태양인의 배꼽에 만일 벌심이 없다면 절세의 행검(行檢)이 반드시 거기에 있을 것이다. 소양인의 아랫배는 마땅히 과심(夸心)을 경계해야 할 것이니, 소양인의 아랫배에 만일 과심이 없다면 절세의 도량(度量)이 반드시 거기에 있을 것이다.

[3-17] 소음인의 머리는 마땅히 탈심(奪心)을 경계해야 할 것이니, 소음인의 머리에 만일 탈심이 없다면 대인의 식견(識見)이 반드시 거기에 있을 것이다. 태음인의 어깨는 마땅히 치심(侈心)을 경계해야 할 것이니, 태음인의 어깨에 만일 치심이 없다면 대인의 위의(威儀)가 반드시 거기에 있을 것

이다. 소양인의 허리는 마땅히 나심(懶心)을 경계해야 할 것이니, 소양인의 허리에 만일 나심이 없다면 대인의 재간(材幹)이 반드시 거기에 있을 것이다. 태양인의 엉덩이는 마땅히 절심(竊心)을 경계해야 할 것이니, 태양인의 엉덩이에 만일 절심이 없다면, 대인의 방략(方畧)이 반드시 거기에 있을 것이다.

#### 장부론(17조)

[4-1] 폐(肺)부위는 추하배상(頤下背上)에 있고, 위완(胃脘)부위는 턱 아래부터 가슴 상단에 있으므로 배상흉상(背上膺上) 이상을 상초(上焦)라 한다. 비(脾)부위는 여(膂)에 있고, 위(胃)부위는 격(膈)에 있으므로 여격(膂膈)간을 중상초(中上焦)라 한다. 간(肝)부위는 허리에 있고, 소장(小腸)부위는 제(膈)에 있으므로 요제(腰膂)간을 중하초(中下焦)라 한다. 신(腎)부위는 요척하(腰脊下)에 있고, 대장(大腸)부위는 제하(膂下)에 있으므로 척하제하(脊下膂下) 이하를 하초(下焦)라 한다.

[4-2] 수곡(水穀)은 위완(胃脘)에서 위(胃)로, 위에서 소장(小腸)으로, 소장에서 대장(大腸)으로 들어가 항문(肛門)으로 나가는데, 수곡은 전부 위(胃)에서 정축(停畜)되면 훈증(薰蒸)하여 열기(熱氣)가 되고, 소장(小腸)에서 소도(消導)되어 평담(平淡)한 량기(涼氣)가 되고, 열기 중 경청(輕淸)한 것은 위완으로 상승하여 온기(溫氣)가 되고, 량기 중 질중(質重)한 것은 대장으로 하강하여 한기(寒氣)가 된다.

[4-3] 위완은 입과 코로 통하는 까닭에 수곡의 기가 상승하고, 대장은 항문으로 통하는 까닭에 수곡의 기는 하강한다. 위의 모습은 광대(廣大)하여 포용할 수 있는 까닭에 수곡의 기가 정축되고, 소장의 모습은 협착(狹窄)하여 굴곡져 있는 까닭에 수곡의 기가 소도되는 것이다.

[4-4] 수곡의 온기(溫氣)는 위완에서 진(津)으로 화(化)하여 혀 밑으로 들어가 진해(津海)가 되니 진해는 진이 모이는 곳이다. 진해의 청기(淸氣)는 귀로 나와서 신(神)이 되고 두뇌(頭腦)로 들어가 이해(藥海)가 된다. 이해란 신이 모이는 곳이다. 이해의 이즙(藥汁)이 청(淸)한 것은 안으로 폐(肺)로 들어가고 탁재(濁滓)는 밖으로 피모(皮毛)로 돌아가는 까닭에 위완·혀·두뇌·피모는 다 폐의 무리들이다.

[4-5] 수곡의 열기(熱氣)는 위에서 고(膏)로 화하여 젖가슴 사이로 들어가 고해(膏海)가 되니, 고해란 고가 모여 있는 곳이다. 고해의 청기는 눈으로 나와서 기(氣)가 되고 척추골[背纏]로 들어가 막해(膜海)가 될 것이니, 막해란 기가 모여 있는 곳이다. 막해의 막즙(膜汁)이 청한 것은 안으로 비(脾)로 돌아가고 탁재는 밖으로 근(筋)으로 돌아가는 까닭에 위·양유(兩乳)·배려·근은 모두 비의 무리들이다.

[4-6] 수곡의 량기(涼氣)는 소장에서 유(油)로 화하여 배꼽으로 들어가 유해(油海)가 되니, 유해란 유가 모여 있는 곳이다. 유해의 청기는 코로 나와서 혈(血)이 되고, 요척(腰脊)으로 들어가 혈해(血海)가 되니, 혈해란 혈이 모여 있는 곳이다. 혈해의 혈즙(血汁)이 청한 것은 안으로 간(肝)에 돌아가고 탁한 찌꺼기는 밖으로 육(肉)에 돌아가는 까닭에 소장·비·코·요척·육은 모두 간의 무리이다.

[4-7] 수곡의 한기(寒氣)는 대장에서 액(液)으로 화하여 전음부(前陰部) 모제(毛際) 안으로 들어가 액해(液海)가 되니, 액해란 액이 모여 있는 곳이다. 액해의 청기는 입으로 나와서 정(精)이 되고 방광(膀胱)으로 들어가 정해(精海)가 되니 정해란 정이 모여 있는 곳이다. 정해의 정즙(精汁)이 청한 것은 안으로 신(腎)으로 돌아가고 탁재는 밖으로 골(骨)로 돌아가는 까닭에 대장·전음·입·방광·골은 다 신의 무리이다.

[4-8] 귀는 광박천시(廣博天時)하는 청력(聽力)으로 진해의 청기를 끌어내어 상초에 충만하게 하여 신(神)이 되게 하고, 두뇌로 쏟아 넣어 이가 되게 하니, 거둬들여 쌓이면 이해가 된다. 눈은 광박세

회(廣博世會)하는 시력(視力)으로 고해의 청기를 끌어내어 중상초에 충만하여 기가 되게 하고, 배려로 쏟아 넣어 막이 되게 하니, 거듭거듭 쌓이면 막해가 된다. 코는 광박인륜(廣博人倫)하는 후력(嗅力)으로 유해의 청기를 끌어내어 중하초에 충만하게 하여 혈(血)이 되게 하고, 요척으로 쏟아 넣어 혈이 엉키게 하니, 거듭거듭 쌓이면 혈해가 된다. 입은 광박지방(廣博地方)하는 미력(味力)으로 액해의 청기를 끌어내어 하초에 충만하게 하여 정(精)이 되게 하고, 방광으로 쏟아 넣어 엉키게 하니, 거듭거듭 쌓이면 정해가 된다.

[4-9] 폐는 연달사무(鍊達事務)하는 애력(哀力)으로 이해의 청즙을 빨아내어 폐에 넣어 줌으로써 폐의 근원을 북돋아 주며, 안으로는 진해를 부축하여 그 기를 두들김으로써 그 진을 엉겨 모이게 한다. 비는 연달교우(鍊達交遇)하는 노력(怒力)으로 막해의 정즙을 빨아내어 비에 넣어 줌으로써 비의 근원을 북돋아 주며, 안으로는 막해를 부축하여 그 기를 두들김으로써 그 고를 엉겨 모이게 한다. 간은 연달당여(鍊達黨與)하는 희력(喜力)으로 혈해의 청즙을 빨아내어 간에 넣어 줌으로써 간의 근원을 북돋아 주며, 안으로는 유해를 부축하여 그 기를 두들김으로써 그 유를 엉겨 모이게 한다. 신은 연달거처(鍊達居處)하는 낙력(樂力)으로 정해의 정즙을 빨아내어 신에 넣어 줌으로써 신의 근원을 북돋아 주며, 안으로는 액해를 부축하여 그 기를 두들김으로써 그 액을 엉겨 모이게 한다.

[4-10] 진해의 탁재는 위완이 상승하는 힘으로 그의 탁재를 취하여 그것으로써 위완을 보익(補益)하고, 고해의 탁재는 위의 정축하는 힘으로 그의 탁재를 취하여 그것으로써 위를 보익하며, 유해의 탁재는 소장이 소도하는 힘으로 그의 탁재를 취하여 그것으로써 소장을 보익하고, 액해의 탁재는 대장이 하강하는 힘으로 그의 탁재를 취하여 그것으로써 대장을 보익한다.

[4-11] 이해의 탁재는 머리가 직신(直伸)하는 힘으로 이를 단련하여 피모를 생성케 하고, 막해의 탁재는 손이 능수(能收)하는 힘으로 이를 단련하여 근을 생성케 하며, 혈해의 탁재는 허리가 관방(寬放)하는 힘으로 이를 단련하여 육을 생성케 하고, 정해의 탁재는 발이 굴강(屈強)하는 힘으로 이를 단련하여 골을 생성케 한다.

[4-12] 그런 까닭에 귀는 반드시 멀리 들어야 하고, 눈은 반드시 크게 보아야 하며, 코는 반드시 넓게 말아야 하고, 입은 반드시 깊이 맛보아야 한다. 이목비구의 작용이 심원광대(深遠廣大)하면 정신기혈(精神氣血)이 생성하고, 천근협소(淺近狹小)하면 정신기혈이 소모될 것이다. 폐는 반드시 잘 배워야 하고, 비는 반드시 잘 물어야 하고, 간은 반드시 잘 생각해야 하고, 신은 반드시 잘 분별해야 한다. 폐비간신의 작용이 정직중화(正直中和)하면 진고유액(津膏油液)이 충만할 것이요, 편의과불급(偏倚過不及)하면 진고유액이 녹아버릴 것이다.

[4-13] 이해는 신(神)이 감추어져 있고, 막해에는 영(靈)이 감추어져 있고, 혈해에는 혼(魂)이 감추어져 있고, 정해에는 백(魄)이 감추어져 있다.

[4-14] 진해에는 의(意)가 감추어져 있고, 고해에는 여(慮)가 감추어져 있고, 유해에는 조(操)가 감추어져 있고, 액해에는 지(志)가 감추어져 있다.

[4-15] 두뇌의 이해는 폐의 근본이고, 배려의 막해는 비의 근본이고, 요척의 혈해는 간의 근본이고, 방광의 정해는 신의 근본이다.

[4-16] 혀 밑의 진해는 귀의 근본이고, 젖가슴의 고해는 눈의 근본이며, 배꼽의 유해는 코의 근본이고, 아랫배의 액해는 입의 근본이다.

[4-17] 심(心)은 일신의 주재자가 되어 네 귀통이와 마음을 등에 지고 앞가슴의 중앙을 올라로 향하며, 불빛처럼 맑게 빛나고, 이목비구는 살피지 못하는 것이 없으며, 폐비간신은 헤아리지 못하는 것이 없고, 함액제복(頤臍臍腹)은 정성을 다하지 않는 것이 없으며, 두수요족(頭手腰足)은 공경하지

않는 것이 없다.

동의수세보원 2권  
의원론(9조)

[5-1] 《서경(書經)》에 이르기를 "만일 약이 명현(瞑眩)하지 않으면 그 병이 낫지 않는다"고 하였다. 상(商)나라 고종 때 이미 명현(瞑眩)하게 하는 약이 있어서 고종이 감탄하였은즉 의약의 경험이 그 유래가 이미 신(神農)·황제(黃帝) 때만큼 오래된다고 하는 설(說)은 진실하다고 믿을 수 있다. 그러나 《본초(本草)》·《소문(素問)》이 신농·황제의 손에서 나왔다고 하는 것은 진실하다고 믿기가 어렵다. 왜냐하면 신농황제 때에는 응당 문자가 없었을 것이요, 후세에 이르면서 문자의 용례가 점차 발전했을 것이기 때문이다. 주(周)가 쇠하고 진한(秦漢)시대 이후부터는 편작(扁鵲)이 유명했고, 장중경(張仲景)이 이를 습득하여 비로소 훌륭한 학자가 되어서 저서를 내놓음으로써 의학이 비로소 발전되었다. 장중경 이후에는 남북조(南北朝)와 수(隋)·당(唐)시대의 의학자들이 이를 계승하였고, 송(宋)나라에 이르러 주광(朱肱)이 모든 의술을 갖추어 《활인서(活人書)》를 저술함으로써 의도가 중흥되었다. 주광 이후에는 원(元)나라의 의학자 이고(李杲)·왕호고(王好古)·주진형(朱震亨)·위역림(危亦林) 등이 이를 계승했고, 명(明)나라에 이르러 이천(李梴)·공신(龔信) 등이 모든 의술을 갖추었으며, 허준(許浚)이 이것을 자세히 전수하여 《동의보감(東醫寶鑑)》을 저술하여 의학이 다시 발전하게 되었다. 대체로 신농·황제 이후로 진한 이전까지의 병증약리(病證藥理)는 모두 장중경이 전하였고, 위(魏)·진(晉) 이후로 수·당 이전까지의 병증약리(病證藥理)는 주광이 전하였고, 송·원 이후부터 명 이전의 병증약리(病證藥理)는 이천·공신·허준이 전하였다. 만일 의가의 공로와 업적으로 말한다면 마땅히 장중경·주광·허준을 으뜸이라 해야 할 것이며, 이천과 공신이 그 다음이라고 해야 할 것이다.

[5-2] 본초(本草)는 신농·황제 이후로 수천 년 동안 내려오면서 경험한 것으로, 신농 때에 이미 《본초(本草)》가 있었고, 은(殷)나라 때에는 《탕액본초(湯液本草)》가 있었으며 당나라 때에는 맹선(孟詵)의 《식료본초(食療本草)》와 진장기(陳藏器)의 《본초습유(本草拾遺)》가 있었고, 송나라 때에는 방안상(龐安常)의 《본초보유(本草補遺)》와 《일화자본초(日華子本草)》가 있었고, 원나라 때에는 왕호고의 《탕액본초(湯液本草)》가 있었다.

[5-3] 소음인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 거의 상세하게 밝혔으나, 송·원·명의 모든 의학자들이 거의 완벽할 만큼 자세하게 밝혔다. 소양인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 절반 정도 상세하게 밝힌 것을 송·원·명의 모든 의학자들이 거의 상세하게 밝혔다. 태음인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 대략 그림자만 비친 것을 송·원·명의 모든 의학자들이 절반쯤 상세하게 밝혔다. 태양인의 병증약리(病證藥理)는 주진형이 약간 그림자만 얻었고 본초에도 약의 이치가 대략 적혀 있다.

[5-4] 나는 의약의 경험이 있는지 5000-6000년 후에 태어나서 옛 사람들의 저술을 통하여 우연히 사상인의 장부성리(臟腑性理)를 깨닫고 한 의서를 저술하니 이름을 《수세보원(壽世保元)》이라고 한다. 이 책 중에서 장중경이 논한 태양병(太陽病)·소양병(少陽病)·양명병(陽明病)·태음병(太陰病)·소음병(少陰病)·厥음병(厥陰病)이라 한 것은 병의 증세를 지목해서 논한 것이고, 내가 말한 태양인·소양인·태음인·소음인은 인물을 지목해서 논한 것이다. 그러므로 이 두 가지를 혼동해서 보지 말아야 하며 또한 번거로운 생각을 버린 연후에 그 뿌리를 찾아내고 그 가지와 잎을 채취할 수 있을 것이다. 대체로 맥을 본다는 것은 병의 증세를 판단하는 한 가지 방법이다. 그 이치는 맥의 부(浮)하고 침(沈)하고 지(遲)하고 삭(數)한 데 있는 것이니 이것을 가지고 그 기묘한 이치를 찾을 필요는 없다. 삼음삼양(三陰三陽)이란 변증(辨證)하는 데 같고 다름이며, 그 이치가 배[腹]와 등[背]과 안[裏]과 밖[表]에 있을 뿐이니, 이것으로 반드시 경락의 변동을 구하려 할 필요는 없는 것이다.

[5-5] 옛 사람들이 육경(六經)·음양(陰陽)으로 병을 논하였으므로 장중경이 《상한론(傷寒論)》을 저

술함에도 역시 육경·음양으로서 병의 증세를 구별했다. 두통이 있고 온몸이 아프고 신열이 있고 오한이 나고 맥이 부하면 이를 태양병의 증세라 했고, 입이 쓰고 목이 마르며 현기가 나고 귀가 안 들리며 가슴이 답답하고 한열(寒熱)이 오락가락하며 두통이 나고 열이 나며 맥이 현(弦)하고 세(細)한 것을 가리켜 소양병의 증세라 하고, 또 오한이 없이 도리어 오열이 나고 땀이 저절로 나고 변비가 있는 자를 양명병의 증세라 하였다. 배가 가득하고 때때로 배가 아프지만 입이 건조하지 않고 명치가 답답하지도 않으면서 저절로 설사를 하면 태음병의 증세라 하고, 맥이 미(微)하고 세(細)하면서 자고만 싶고 입이 마르고 심장이 답답하면서 저절로 설사를 하면 소음병의 증세라고 하였다. 처음에는 배가 아프거나 설사를 하는 증상이 없다가 상한이 된지 6, 7일만에 맥이 미완(微緩)하며 손과 발이 매우 차고 혀가 굳어지고 음낭이 수축되면 궤음병의 증세라고 하였다. 이상 여섯 가지 병의 증세 중에서 삼음병증(三陰病證)은 모두 소음인에게 있는 병이고, 소양병의 증세는 곧 소양인에게 있는 증상이며 태양병의 증세나 양명병의 증세는 소양인·소음인·태음인에게 고루 있는 병이나 이 중에서도 소음인 병증이 가장 많다. 예로부터 의약의 법(法)과 방(方)이 세상에 유행되고, 많은 경험이 축적된 것을 장중경이 수집하여 《상한론》을 저술하였다. 대개 옛 사람들은 사람의 마음에서 생기는 사랑하고 미워하고 탐욕하며 기뻐하고 성내며 슬퍼하고 즐거워하는 것을 지나치게 하는 것이 병이 됨을 알지 못하고, 다만 비위(脾胃)의 음식과 풍(風)·한(寒)·서(暑)·습(濕)이 침범된 것으로만 병이 되는 줄 알았다. 그러므로 그 병론과 약론이 모두 소음인의 비위 음식 중에서 나왔고 이밖에 간혹 소양인의 위열증(胃熱證)에 대한 약이 있으며, 태음인·태양인의 병의 증세에 대해서는 전혀 알지 못하였다.

[5-6] 기백(岐白)이 말하기를 상한병의 1일에는 거양(巨陽)이 병을 받기 때문에 머리와 목이 아프며 허리와 척주가 뻣뻣해진다. 2일에는 양명(陽明)이 병을 받으니 양명은 육(肉)을 주관하고 그 맥이 코의 옆을 지나서 눈으로 연락되므로 몸에 열이 나고 눈알이 아프며 콧속이 마르고 잠을 자지 못한다. 3일에는 소양(少陽)이 병을 받으니 소양은 담을 주관하며 그 맥이 옆구리를 끼고 귀로 연락되므로 가슴과 옆구리가 아프고 귀가 안 들린다. 이렇게 삼양경락이 모두 그 병을 받고서 아직 장부 속에는 들어가지 않았기 때문에 땀만 낼 것이다. 4일에는 태음(太陰)이 병을 받으니 태음맥은 위(胃)에 퍼져서 다시 목구멍으로 연락되므로 배가 가득 차고 목이 마른다. 5일에는 소음(少陰)이 병을 받으니 소음맥은 신장을 관통하여 폐장에 연락한 후에 혀의 뿌리에 연속되므로 입과 혀가 마르고 갈증이 난다. 6일에는 궤음(厥陰)이 병을 받으며 궤음맥은 음기(陰器)를 돌아서 간으로 연락되므로 가슴이 답답하고 음낭이 수축된다. 이와 같이 삼음삼양(三陰三陽), 오장육부(五藏六腑)가 모두 병을 받아서 기혈이 순행하지 못하고 오장이 서로 통하지 못하게 되면 곧 사망하는 것이다.

[5-7] 상한에 양감(兩感)이 되면 반드시 죽음을 면치 못한다. 상한에 양감된 자는 1일에는 거양과 소음이 모두 병이 들어 머리가 아프고 입이 마르며 가슴이 답답하다. 2일에는 양명과 태음이 함께 병들어 배가 부르고 몸에 열이 나며 음식을 먹지 못하며 헛소리를 한다. 3일에는 소양과 궤음이 같이 병든 것이니 귀가 먹고 음낭이 수축되면서 손발이 차고 물과 미음을 넘기지 못하고 의식도 없으니 6일 만에 사망하는 것이다. 죽는 것은 모두 6, 7일 사이지만, 낫는 것은 모두 10일 이상인 것이다.

[5-8] 나는 논하기를 《영추(靈樞)》와 《소문(素問)》을 황제가 지었다고 거짓 핑계하는 것은 실로 괴이하고 이상해서 사람들을 현혹시키는 것이니 이 같은 것은 말할 가치가 없다. 그러나 방술(方術)이나 별난 것을 좋아하는 자들의 말이 혹 이와 같을 수도 있는 것이니 반드시 깊이 책망할 필요도 없다. 그러나 이 글이 역시 옛 사람의 경험이고 오장육부·경락·침법·병증·수양 등에 대하여 많이 깨우쳐 준 바 있으므로 사실상 의학하는 사람들의 연구하는 종주(宗主)가 되는 것이요, 또 묘맥(苗脈)이 여기서 나온 것이다. 그러므로 그 전체를 헛되다고만 나무라서 그 깨우쳐 준 공로마저도 없애 버려서는 안 된다. 대개 이 글은 옛 사람들의 총명과 지혜와 사물을 넓게 아는 말들과 방사(方士)들의 수양의 연원을 기록한 것이니 그 이치는 고찰해 봄 직하지만, 그 학설을 그대로 다 믿을 바는 못된다.

[5-9] 기백이 말한 거양·소양·소음경병은 모두 소양인의 병이고 양명·태음경병은 모두 태음인

의 병이고 꺾음경병은 소음인의 병이다.

소음인 신수열표열병론(52조)

[6-1] 장중경(張仲景) 《상한론》에서 말하기를 열이 오르고 오한이 있으며 맥이 부(浮)하면 이는 표병(表病)에 속하였으니, 즉 태양증인 것이다.

[6-2] 태양병에 상풍(傷風)으로 된 맥은 양맥(陽脈)이 부(浮)하고 음맥(陰脈)이 약(弱)하다. 양맥이 부하면 열이 저절로 나고, 음맥이 약하면 땀이 저절로 난다. 오슬오슬 춥고 오싹오싹 바람이 싫으며 후끈후끈 열이 오르고 코에서 쉼쉼 소리가 나고 마른 구역이 나면 주로 계지탕(桂枝湯)을 쓴다.

[6-3] 위역림(危亦林)의 《득효방(得效方)》에서 말하기를 사시온역(四時溫疫)에는 향소산(香蘇散)을 써야 한다.

[6-4] 공신(龔信)의 《의감(醫鑑)》에서 말하기를 상한(傷寒)에 머리가 아프고 몸이 쭈시나 표증(表證)인지 이증(裏證)인지 분별하기 어려울 때에는 곽향정기산(藿香正氣散)을 쓰라 하였다.

[6-5] 나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 태양상풍증(太陽傷風證)에 열이 나고 오한이 있다고 한 것은 곧 소음인의 신(腎)에 열을 받아 밖에 열이 나는 병이니 이 증후에 발열하며 오한이 나고 땀이 없으면 계지탕(桂枝湯) · 천궁계지탕(川芎桂枝湯) · 향소산(香蘇散) · 궁귀향소산(芎歸香蘇散) · 곽향정기산(藿香正氣散) 같은 것을 써야하고, 오한발열이 있으면서 땀이 나면 망양증 초증(亡陽證 初證)이므로 절대로 가볍게 보아 넘겨서는 안 된다. 황기계지탕(黃芪桂枝湯) · 보중익기탕(補中益氣湯) · 승양익기탕(升陽益氣湯)을 3일간 계속 먹어도 땀이 그치지 않고 병이 풀리지 않으면 계지부자탕(桂枝付子湯) · 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯) · 승양익기부자탕(升陽益氣付子湯)을 써야 한다.

[6-6] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병에 맥이 부(浮)하고 긴(緊)하며 열이 나고 땀이 없이 코피가 나면 병이 저절로 낫는다고 하였다.

[6-7] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병이 6, 7일 되었는데도 표증이 남아 있고 맥이 미(微)하면서 침(沈)하되 도리어 결흉(結胸)이 되지 않고, 그 사람이 미친 것 같은 것은 열이 하초(下焦)에 있기 때문이다. 비록 아랫배가 가득할지라도 소변이 순조로운 자는 하혈(下血)을 시키면 곧 낫는 것이다. 여기에 주로 저당탕(抵當湯)을 쓴다.

[6-8] 태양증에 몸이 노랗고 발광하면서 아랫배가 단단히 붓고 소변이 잘 나오는 것은 혈증(血證)이니 마땅히 저당탕을 쓴다. 상한에 아랫배가 가득하면 응당 소변이 잘 나오지 않을 것인데 지금 도리어 소변이 순조로운 것은 혈이 있기 때문이다.

[6-9] 태양병이 풀리지 않고 열이 방광에 맺혀 있어 미친 사람 같으면서 스스로 하혈(下血)하는 증은 병이 저절로 낫는 것이나, 아랫배가 급히 맺히는 증에는 마땅히 공격해야 하니 도인승기탕(桃仁承氣湯)을 써야 한다.

[6-10] 태양병 외증(外證)이 아직 다 풀리지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설사가 그치지 아니하며 명치끝이 막히고 단단히 굳어진다. 이것은 표증과 이증이 다 풀리지 않은 것이니 주로 인삼계지탕(人蔘桂枝湯)을 쓴다.

[6-11] 나는 논하기를 이와 같은 증세에 환자가 미친 것 같은 것은 신양(腎陽)이 열을 받았기 때문에 곤궁에 빠진 상태이고 아랫배가 단단하면서 가득하다는 것은 대장(大腸)이 한기(寒氣)를 받고 벌벌 떠는 상태이다. 이렇게 두 가지 증세가 함께 나타날 때에는 마땅히 그 급한 증부터 먼저 치료하

는 법이다. 만일 신양이 곤열(困熱)한 것이 더 급하면 우선 천궁계지탕(川芎桂枝湯) · 황기계지탕(黃芪桂枝湯) · 팔물군자탕(八物君子湯)을 써서 승보(升補)를 하고, 만일 대장이 한기를 받고 벌벌 떠는 것이 급하면 마땅히 곽향정기산(藹香正氣散) · 향사양위탕(香砂養胃湯)을 써서 화해(和鮮)케 하고, 만일 외열(外熱)이 이랭(裏冷)을 에워싸고 있으면 내(內)에 독기(毒氣)가 거듭 맺혀서 혹 장차 호랑이를 길러 화를 당하는 폐단이 있는 것인즉 마땅히 파두단(巴豆丹)을 써서 설사를 1, 2차 시키고 곧 곽향정기산 · 팔물군자탕으로서 화해를 시키면서 한편 크게 보하는 약을 써 주어야 한다.

[6-12] 장중경(張仲景)이 말한 하초혈증(下焦血證)이란 것은, 즉 소음인이 비국(脾局)의 양기(陽氣)가 한사(寒邪)에 억눌린 바가 되어서 신국(腎局)의 양기가 그 한사의 저항을 받아 위로 곧장 올라가 비국과 연접(連接)하지 못하고 방광에 울축(鬱蓄)되는 증세이다. 또 그 사람이 미친 것 같다는 것은 그 사람이 횡설수설하는 것이요, 귀신을 보았다는 것은 헛것을 보고 중얼거리는 것이다. 태양병 표증(太陽病 表證)이 아직 있다는 것은 신열(身熱)로 몹시 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한(惡寒)이 간간이 있는 것이다. 그러나 태양병에 외증(外證)이 없는 자는 신열로 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한이 간간이 있는 증세는 전혀 없는 것이다. 이런 증후에 기운을 돋우며 양기를 끌어올리면 상책을 얻었다고 할 것이요, 파혈(破血)을 하면서 열을 푸는 것은 졸렬한 계책에서 나온 것이다. 태양병 외증이 아직 다 제거되지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설사가 그치지 않는다고 운운한 것은 역시 옛 사람들이 이런 증세에 승기탕(承氣湯)을 쓰면 설사(泄瀉)가 그치지 않았기 때문에 그 처방을 고쳐서 저당도인탕(抵當桃仁湯)을 썼을 따름이었던 것이다. 태양병에 외증이 모두 제거되지 않았을 때에는 양기(陽氣)의 힘이 비록 울체(鬱滯)되어 막히긴 하였으나 오히려 한(寒)을 떨치고 겉[表]에서 한사(寒邪)와 서로 싸울 수가 있지만 만일 외증이 다 없어졌다면 양기의 힘이 한을 떨치지 못하고 곤궁(困窮)에 빠져 위축되어 엎드려진 형세이다. 공하(攻下)하는 약이 얼마나 좋은 약이길래 반드시 양기가 곤궁에 빠져서 위축되어 엎드려질 때까지 기다려 약을 써야 하는 것인가? 그렇다면 인삼계지탕(人蔘桂枝湯)이 또한 늦지 않겠는가?

[6-13] 장중경(張仲景)이 말하기를 부인 상한에 발열하고 경수(經水)가 적래적단(適來適斷)하며 낮에는 정신이 맑았다가 밤이 되면 헛소리를 하기를 귀신 같은 것이 보인다고 하는 것은 열이 자궁에 들어 있기 때문이다. 그러나 위기(胃氣)와 상초(上焦) · 중초(中焦)를 범하지 않았으면 반드시 저절로 낫는 것이다.

[6-14] 양명병(陽明病)에 입이 말라서 양치질을 하고도 그 물을 넘기고자 하지 않는 것은 반드시 코피가 터지려는 징조이다. 설사를 시켜서는 안 된다.

[6-15] 양명병의 음식을 먹지 못하는 증에 열을 공격하면 반드시 딸꾹질을 하는 것이고 상한에 구역기(嘔逆氣)가 많은 증에는 비록 양명증이 있어도 공격하는 약을 써서는 안 된다. 양명병 위가실(胃家實)증으로 대변을 보지 못하는데 만일 표증이 풀리지 않았거나 표증이 반쯤 풀렸을 경우에는 먼저 계지(桂枝) · 시호(柴胡)를 써서 화해(和鮮)를 시킨 후에 설사를 시켜야 한다.

[6-16] 위의 모든 증세에는 곽향정기산(藹香正氣散) · 향사양위탕(香砂養胃湯) · 팔물군자탕(八物君子湯)을 써야 한다.

[6-17] 장중경(張仲景)이 말하기를 양명병이 되면 위가실(胃家實)로 되는 것이다. 묻기를 · 어떠한 까닭으로 양명병을 얻게 되는가? 대답하기를 태양병이 되었을 때 땀을 너무 많이 내었거나 설사를 많이 하였거나 이뇨(利尿)를 많이 시키면 진액이 없어져서 위중(胃中)이 건조하게 되어 양명병으로 전속(轉屬)하게 되면 내실(內實)하여 대변이 통하기 어려운 증을 양명증이라고 한다.

[6-18] 상한(傷寒)에 양명병(陽明病)으로 전속(轉屬)하면 그 사람은 땀이 축축하게 난다.

[6-19] 상한에 만일 토하고 하리(下利)를 한 후에도 병이 풀리지 않고 대변을 5, 6일내지 10여 일을

보지 못하면서 해 질 무렵에 발열하며 오한이 없으면서 미친 소리를 하고 귀신 같은 것이 보인다고 한다. 몹시 심한 자는 발열하면서 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬으며 불안해 하고 약간 숨이 가빠지면서 눈동자를 곧추세운다. 이렇게 된 증에는 맥(脈)이 현(弦)한 사람은 살고 맥이 삽(澁)한 사람은 죽는 것이다.

[6-20] 나는 논하기를 진나라 · 한나라 때에는 의방치법(醫方治法)에 대변이 비조(秘燥)한 자에게는 대황(大黃)으로 치료하는 방법은 있어도 파두(巴豆)로서 치료하는 방법은 없었기 때문에 장중경(張仲景)도 대황대승기탕(大黃大承氣湯)을 써서 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 병증을 치료하는 것이다. 그 환자의 병증은 끈끈하게 땀이 나와서 위중(胃中)이 조변실(燥煩實)하여 대변을 5, 6일 내지 10여 일을 보지 못하고 매일 해질 무렵이면 조열(潮熱)을 발하며 오한증은 없고 미친 소리를 하면서 귀신 같은 것이 보인다고 할 때 대승기탕(大承氣湯)을 쓰면 신효(神效)하다 하고, 병증이 몹시 심한 자는 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬고 두려워하면서 불안해 하고 약간 숨이 차고 눈동자를 곧추세우는 것이다. 이렇게 되어 있는 병증에는 대승기탕(大承氣湯)을 쓰는데 맥(脈)이 현(弦)한 자는 살고 맥이 삽(澁)한 자는 죽는다고 하였으니 대개 이 처방은 소음인의 태양병이 양명병으로 전속하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵이면 조열(潮熱)이 나는 경우에는 쓸 수 있으나 그 외에는 쓸 수 없는 것이다. 장중경(張仲景)이 이 처방을 쓰고 못 쓰는 때와 증후(證候)를 잘 알기 때문에 또한 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 증후도 잘 알 수 있었다. 대개 중경의 일심 정력(一心精力)이 대승기탕을 쓸 수 있는 시기와 증후를 찾아내는 데 있기 때문에 또한 써서는 안 되는 시기와 증후도 소상히 잘 알았던 것이다. 장중경(張仲景)의 《상한론》 태양양명병증(太陽陽明病證) 처방 중에 오직 계지탕 · 인삼계지탕이 그 효력이 근사한 처방이지만 대승기탕은 사람의 생사(生死)를 아득히 끝없는 바닷가에 내버려두고, 반드시 대승기탕을 쓸 때와 증후를 구하고자 하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵에 조열(潮熱)이 나타나고 헛소리 할 때를 기다리고 있다면 이것이 어찌 좋은 치료법이라고 하겠는가? 대체로 소음인의 병증에는 땀이 저절로 나지 않으면 비(脾)가 약(弱)하지 않은 것이고 대변이 비조(秘燥)하면 위가실증(胃家實證)이 된다. 소음인의 태양증이 양명병으로 전속되었어도 저절로 땀이 나지 않으면 비가 약한 것이 아니고 오히려 경병(輕病)이다. 대변이 비록 굳다고 하더라도 약을 쓰면 잘 낫기 때문이다. 그렇기 때문에 대황(大黃) · 지실(枳實) · 후박(厚朴) · 망초(芒硝) 같은 약도 또한 성공하는 것이 이때이지만 그러나 병이 극심하여 반생반사(半生半死)하게 되어 있는 때라도 팔물군자탕(八物君子湯) · 승양익기탕(升陽益氣湯)을 파두(巴豆)와 함께 쓰면 비록 극심한 자라도 또한 맥이 현한 사람은 살고 맥이 삽한 사람은 죽어야 할 이치가 없다. 또 태양병의 표증이 그대로 있을 때 어찌하여 일찍부터 온보승양(溫補升陽)하는 약과 파두를 함께 써서 미리 그 병을 다스리지 않고서 꼭 양명병으로 전속되어서 해질무렵이 되면 조열이 나고 헛소리 할 때를 기다려 대승기탕을 써서 사람으로 하여금 반생반사하게 하는가.

[6-21] 허숙미(許叔微)의 《본사방(本事方)》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데 대변이 나오지 않고 해질 무렵 조열이 나면서 손으로 옷깃을 어루만지고 꿇매는 형용을 하며 두 손으로 허공을 저어 잡고자 하고 눈동자가 곧추서고 몹시 숨이 차하는 증세에 의사들이 모두 달아나버리니 실로 나쁜 상태이다. 장중경(張仲景)의 방(方)에 비록 그 증세는 있어도 치법은 없고 단지 말하기를 맥현자(脈弦者)는 살고 맥색자(脈澁者)는 죽는다고 한 것뿐이다. 우선 치료해보고자 소승기탕(小承氣湯) 한 첩을 달여 먹이니 대변이 통하고 모든 증세가 점점 물러가고 맥도 또한 미현(微弦)해지더니 15일만에 나왔다.

[6-22] 왕호고(王好古)의 《해장서(海藏書)》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데 발광(發狂)을 하면서 밖으로 달아나고자 하며 맥은 허삭(虛數)하여 시호탕(柴胡湯)을 썼더니 병이 도리어 심해졌다. 곧 인삼(人蔘) · 황기(黃芪) · 당귀(當歸) · 백출(白朮) · 진피(陳皮) · 감초(甘草) 등속을 한 첩 달여서 먹이니 발광병(發狂病)이 멎고 또 한 첩을 먹이니 편안히 잠이 들면서 나왔다.

[6-23] 《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 이전에 손으로 옷깃을 어루만지거나 침상을 더듬는 환자 몇 사람을 치료한 경험이 있었다. 모두 기혈(氣血)을 대보(大補)하는 약을 썼더니 그 중 한 사람만이

눈꺼풀에 경련이 일어나고 대맥(代脈)이 나오는 증을 겸하는 것이다. 그리하여 보제(補劑) 중에 계지(桂枝)·관계(官桂)를 가하여 다스렸더니 또한 눈의 경련이 멎고 맥이 화(和)하여지고 대맥이 없어지면서 나왔다

[6-24] 성무기(成無己)의 《명리론(明理論)》에 말하기를 조열(潮熱)은 양명증에 속하는 것이니 반드시 해질 무렵 열이 나는 것을 조열이라 한다. 양명병이라고 하는 것은 위가(胃家)가 실(實)해지는 것이다. 위가가 실하게 되면 헛소리를 하고 손발에서 끈끈하게 땀이 흐르는 데 이것은 대변이 이미 굳어 있는 것이다. 조열이 있고 헛소리를 하면 승기탕(承氣湯)으로 하리를 시키고 조열이 없으면 승기탕을 써서는 안된다.

[6-25] 주진형(朱震亨)의 《단계심법(丹溪心法)》에 말하기를 상한괴증(傷寒壞證)에 정신이 혼미하여 거의 죽게 된 경우와 일체 위급한 병증에는 좋은 인삼 1냥을 물에 달여 단번에 먹게 하면 땀이 콧등에서 물방울 흐르듯 떨어진다.

[6-26] 나는 논하기를 위에서 말한 모든 사람의 논술한 바가 모두 장중경(張仲景)의 대승기탕(大承氣湯)을 대상으로 하였으나 이를 쓸 수 있는 시후(時候)와 쓰지 못하는 시후를 잘 알기 어려워 여러 가지로 의혹이 분분하다가 비로소 장중경의 이론을 믿을 수 없음을 깨닫게 된 것이다. 장중경의 대승기탕은 원래 소음인에게 살인하는 약이고 사람을 살리는 약이 아니므로 대승기탕을 말할 필요도 없는 것이다. 이렇게 위가실(胃家實)하여 대변을 보지 못하고 발광을 하는 증에는 마땅히 파두(巴豆)를 한 알 쓰거나 또는 독삼팔물탕(獨參八物湯)을 쓰는 것이고 또는 먼저 파두를 쓰고 후에 팔물군자탕(八物君子湯)을 써서 병을 눌러야 한다.

[6-27] 장중경(張仲景)이 말하기를 양명병 외증(陽明病 外證)은 신열(身熱)이 나고 땀이 저절로 나면서 오한증은 없고 도리어 열을 싫어한다.

[6-28] 상한 양명병에 땀이 저절로 나고 소변이 잦으면 진액이 안에서 마르기 때문에 대변을 보기가 어렵게 되는 것이다. 그것은 비(脾)가 약(約)해진 것이다. 주로 마인환(麻仁丸)을 쓴다.

[6-29] 양명병증에 땀이 저절로 나면서 소변이 잦은 것은 진액이 안에서 말랐기 때문이다. 비록 대변이 굳어 있을지라도 공격하는 약을 써서는 안 되고 마땅히 밀도법(蜜導法)을 써서 통변(通便)하게 해야 한다.

[6-30] 양명병에 발열(發熱)하면서 땀이 몹시 흐르면 급히 설사를 시켜야 한다. 마땅히 대승기탕을 쓴다.

[6-31] 이천(李延)의 《의학입문(醫學入門)》에 말하기를 땀이 많이 나고 그치지 않는 것을 망양증(亡陽證)이라고 하니 가슴이 답답하고 심하(心下)를 짝 틀어막는 것 같고 얼굴빛이 푸르고 살이 떨어지는 증은 치료하기 어려운 것이고, 면색(面色)이 누렇고 수족이 따뜻한 자는 치료할 수 있다. 무릇 땀이 몹시 흐르고 그치지 않으면 진양(眞陽)이 빠져 나가기 때문에 이것을 망양증이라고 한다. 그 몸이 반드시 차고 대개는 비한(痺寒)이 되어 사지가 굳고 까부라진다. 주로 계지부자탕(桂枝附子湯)을 써야 한다.

[6-32] 일찍이 소음인 11세 된 아이가 한다망양병(汗多亡陽病)을 앓는 것을 치료한 일이 있다. 이 아이는 평소에도 노심초사하는 편이며 때때로 설사하는 것이 걱정이었으며, 밥을 먹을 때마다 온 얼굴에 구슬 같은 땀을 흘린다. 그러다가 하루는 갑자기 두통·발열하면서 땀이 저절로 흐르고 대변도 굳어서 불통(不通)하게 되었다. 이 아이의 평소 설사증을 걱정했기 때문에 두통·신열·변비·한출(汗出) 등의 열증(熱證)은 한증(寒證)인 설사와 반대되므로 관심을 두지 않고 예사로 치료하여 황기(黃芪)·계지(桂枝)·백작약(白芍藥)으로 발표(發表)만 해 주었더니 4,5일이 되었어도 두통

• 발열이 낫지 않는 것이다. 6일이 되던 날 아침에야 그 병세를 자세히 살펴보니 대변이 굳어서 못 본지가 이미 4,5일이 되었고 또 소변 빛이 붉고 깔깔하여서 잘 나오지 않아 한 번에 두세 손갈 밖에 되지 않는데다가 소변을 보는 횟수도 하루 동안에 두세 번 밖에 되지 않았다. 오한증은 없으면서 발열을 하며 땀이 흘러나오는 횟수는 하루에 2,3,4차로서 불규칙하였다. 인중(人中)에는 혹 땀이 있는 때도 있고 또는 땀이 없는 때도 있었다. 그리고 땀이 얼굴과 온몸에 줄줄 흐르고 있으니 그 병이 과연 나쁜 것이라 비로소 한다망양병(汗多亡陽病)의 증후란 것을 깨닫고 보니 진실로 위급한 병증인 것이다. 급히 파두(巴豆) 한 알을 거각(去殼)하여 먹이고 거듭 황기계지부자탕(黃芪桂枝付子湯)을 쓰는데 부자(附子)를 1돈을 넣고 달여서 2첩을 연복(連服)케 하여 병을 눌러놓았더니 오후 1시부터 3시 사이에 대변이 통하고 소변도 약간 맑아지고 양도 조금 많아졌다. 그 다음날은 병을 얻은 지 7일이 되는 날이다. 그 동안에 소아에게 부자를 너무 과하게 쓰지 않았는가 걱정이 되므로 황기계지부자탕(黃芪桂枝付子湯) 1첩을 2일간 나누어 먹게 하였더니 이틀 후 그 아이의 망양증(亡陽證)이 다시 발작하여 오한증은 없이 발열하면서 땀을 몹시 흘리고, 소변은 빛이 붉고 깔깔하며 대변은 굳어서 전번과 같이 통하지 않고 온 얼굴에 푸른빛을 띠고 간간히 마른기침을 하였다. 병세가 전번에 비하여 극히 심하게 된 것이다. 그 날은 그 아이가 병을 얻은 지 9일이 되는 날이고 시간은 상오 11시경이었다. 그리하여 급히 파두 한 알을 거각하여 먹이고 이번에는 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)을 써야 되겠기에 인삼(人蔘) 5돈, 부자(附子) 2돈을 물에 넣어 달여서 2첩을 연복시켜서 병을 눌러놓았더니 해질 무렵 되어서 대변을 비로소 통하고 소변은 조금 많아졌으나 빛깔이 붉은 것은 전과 같았다. 또다시 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)에 인삼 5돈, 부자 2돈을 물에 달여서 1첩을 먹이니 그날밤 10시쯤 되어서 그 아이가 모로 눕기는 하나 머리를 들지는 못하고 저절로 가래를 한두 손갈쯤 토하더니 기침도 곧 멎었다. 그 다음날 또다시 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)을 인삼 5돈, 부자 2돈 하여 3첩을 썼더니 죽을 두세 손갈을 먹고 매번 약을 먹은 후에는 몸이 식고 땀이 없어졌다. 소변도 조금씩 많아지면서 대변도 잘 통하였다. 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 쓰니 죽을 반 사발이나 먹었다. 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 썼더니 죽을 반 사발도 더 먹었다. 몸이 식으면서 방 안에서 스스로 일어나 앉았다. 바로 이날은 병이 생긴지 12일이 되는 날이다. 이렇게 3일 동안에 몸이 맑고 개운해지면서 땀이 없어지고 대변이 잘 통하고 소변이 맑으면서 많아지게 된 것은 부자 2돈을 넣고 하루에 두세 첩씩 연 3일 동안에 계속 썼기 때문에 그와 같은 좋은 효과를 본 것이다. 13일이 되는 날에는 또 일어나서 문 밖에 나가 걷기도 하나 힘이 없어서 머리와 얼굴을 잘 들지 못한다. 이것은 소아에게 부자를 너무 과하게 쓴 때문으로 생각되어 황기계지부자탕(黃芪桂枝付子湯)에 부자를 1돈씩 넣고 매일 2첩을 복용케 하여 7, 8일이 되자 머리와 얼굴은 조금은 들기는 하지만 얼굴이 부었다. 또 매일 2첩씩 7,8일을 썼더니 얼굴을 더욱 잘 들고 얼굴에 부종(浮腫)도 내렸다. 그 후에도 이 처방대로 매일 2첩씩 썼다. 이 한다망양병이 생긴 날로부터 병이 다 낫기까지 1개월이 조금 지났는데 그 동안 부자를 쓴 분량이 모두 8냥이었다.

[6-33] 장중경(張仲景)이 말하기를 양명병에는 세 가지 병이 있으니 태양양명(太陽陽明)이라 함은 비약(脾約)이 이것이고 정양양명(正陽陽明)이라 함은 위가실(胃家實)이고 소양양명(少陽陽明)이라 함은 땀을 많이 내거나 리소변(利小便)을 많이 해서 위중(胃中)이 조변(躁煩)하고 내실(內實)이 되어 대변불통(大便不通)이 된 것이다.

[6-34] 나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 바 양명병의 세 가지 병에 첫째, 비약(脾約)이라 함은 땀이 저절로 나고 소변을 많이 보는 증이고, 둘째, 위가실(胃家實)이라 한 것은 대변을 보고자 하여도 굳어서 나오지 않는 증이고, 셋째, 발한(發汗)과 소변을 너무 많이 시켜서 위중(胃中)이 말라서 실(實)하게 된다는 것은 이것 또한 위가실이다. 그 실상인즉 양명병이 세 가지 증이 아니고 두 가지 증일 따름이다. 장중경(張仲景)이 비약(脾約)이라고 말한 뜻은 진액이 점점 말라 비장(脾臟)의 윤기(潤氣)마저 점점 약(約)해지는 것을 말하는 것이고, 위가실이라 말한 것은 진액이 이미 말라서 위의 전체가 조실(燥實)하게 된 것을 말하는 것이다. 옛날 중국 전국(戰國)·진한시대(秦漢時代)에는 의가(醫家)들의 단방(單方) 경험이 이미 오래 전부터 전해져 왔고 한토하(汗吐下)의 3법(法)이 성행하기 시작하였다. 태양병 표증이 그대로 있는 사람을 또는 마황탕(麻黃湯)으로 발표(發表)시키고 또는 저령탕(猪苓湯)을 써서 리소변(利小便)시키고 또는 승기탕(承氣湯)을 써서 설사를 시켰다. 승기탕을

써서 설사를 시키면 설사가 멎지 않는 증이 생기고 마황탕・저령탕을 써서 발한과 리소변시키면 위중(胃中)이 조변실(躁煩實)하고 대변이 불통하는 증이 생긴다. 중경이 이렇게 되는 것을 보았기 때문에 비약(脾約)으로 땀이 저절로 나오고 소변이 잘 나오는 것은 비장의 윤기가 점점 약(約)해져 또한 장차 위가 조실(燥實)하게 되는 근원이 된다고 하였으나 비약(脾約)은 본래가 비약이고 위가실(胃家實)은 본래가 위가실이다. 정녕 그 병이 먼저 비가 약해지고 후에 얼마 있다가 위가실이 될 이치가 있겠는가?

[6-35] 위가실과 비약의 두 가지 병은 음증의 태음병, 소음병과 같아서 허실 증상이 현저히 다르다. 태양병 표증이 있을 때부터 두 길의 이미 나뉘어져 있기 때문에 원래 서로 합할 도리가 없는 것이다. 태양병 표증이 아직 남아 있어서 그 사람이 미친 자와 같은 것은 울광증 초증(鬱狂證 初證)이요, 양명병(陽明病)에 위가(胃家)가 실(實)하게 되고 대변을 보고자 하여도 불통되는 자는 울광증 중증(鬱狂證 中證)이고, 양명병에 해질 무렵이 되면 고열이 나타나서 헛소리를 하고 약간 헛떡거리며 눈동자를 곧추세우는 자는 울광증 말증(鬱狂證 末證)이 된 것이다. 태양병에 발열하고 오한증을 일으키면서 땀이 저절로 흘러나오는 자는 망양증 초증(亡陽證 初證)인 것이고, 양명병에 오한은 없고 오히려 오열(惡熱)하며 땀이 저절로 흘러나오는 것은 망양증 중증(亡陽證 中證)인 것이고, 양명병에 발열하고 땀이 몹시 많이 흘러나오는 자는 망양증 말증(亡陽證 末證)이 된 것이다. 울광증(鬱狂證)은 모두 신열이 있고 땀이 나오지 않는 것이고 망양증은 모두 신열이 있고 땀이 저절로 많이 흘러나오는 것이다.

[6-36] 음증(陰證)에 입 안이 부드러우면서 복통・설사하는 것은 태음증(太陰證)이고 입 안이 부드럽지 못하고 복통・설사를 하는 것은 소음증(少陰證)이다. 양증(陽證)에 땀이 나오지 않고 두통・신열이 있는 것은 태양양명병 울광증(太陽陽明病 鬱狂證)이고 땀이 저절로 나면서 두통・신열이 있는 것은 태양양명병 망양증(太陽陽明病 亡陽證)이다. 음증의 태음증과 양증의 울광증은 경증(輕證)・중증(重證)이 있고, 음증의 소음증과 양증의 망양증은 험증(險證)・위증(危證)이 있다. 망양증과 소음증은 병이 시작되면서부터 험증이 되고 계속하여 위증이 되는 것이다.

[6-37] 망양병증은 비단 땀만을 볼 것이 아니라 반드시 소변이 많고 적은 것도 보아야 한다. 만일 소변이 맑고 많으면서 땀이 저절로 나오면 비약병(脾約病)이 되는 것이니 이는 험증이다. 소변이 붉고 갈갈하게 나오면서 저절로 땀이 나게 되면 양명병에 발열다한증(發熱多汗證)이니 이는 위증이다. 그러나 소양인 이열병증(裡熱病證)과 태음인 표열병(表熱病)에도 또한 땀이 많이 나오면서 오줌이 붉고 갈갈한 자가 있으니 판단하여 함부로 약을 잘못 써서는 안 된다.

[6-38] 위가실병은 처음 시작할 때에는 땀이 나지 않고 오한증도 없다. 다만 열이 심하다가 거의 죽게 되면 끈끈하게 땀이 약간 나고 열이 조수(潮水)처럼 올랐다 내렸다 하는 것이니 위와 같이 되는 것은 한사(寒邪)를 겉으로 떨쳐 내보내는 힘이 아주 고갈되었기 때문에 나타나는 것이므로 위기(胃氣)가 아주 말라버린 증후인 것이다. 비약병(脾約病)은 시초에 신열이 있고 땀이 저절로 나오나 오한증은 없다가 그 병으로 거의 죽게 되면 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것이다. 이렇게 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것은 리열(裡熱)을 지탱해 내는 세력이 이미 다하였기 때문에 비기(脾氣)가 끊어지는 증후인 것이다.

[6-39] 장중경(張仲景)이 말하기를 궤음증(厥陰證)은 수족(手足)이 냉(冷)해지고 아랫배가 아프며 가슴이 답답하고 음낭이 쪼그라 들어가고 맥이 가늘어서 끊어지려고 하는 것이니 마땅히 당귀사역탕(當歸四逆湯)을 써야 한다.

[6-40] 장중경(張仲景)이 말하기를 대개 궤(厥)이라 하는 것은 음기와 양기가 서로 순합하지 못하고 한편으로 기울어져 궤이 되는 것이니, 궤한다고 하는 것은 수족으로부터 거슬러 냉해지는 것이다.

[6-41] 상한병이 6,7일이 되어서 촌척맥(寸尺脈)이 미완(微緩)하면 궤음경(厥陰經)에 병이 든 것이

다. 그 증세는 소복(小腹)이 번만(煩滿)하면서 음낭이 쪼그라 들어가는 것이니 마땅히 승기탕(承氣湯)으로 설사를 시키는 것이다.

[6-42] 상한병이 6,7일이 되어 맥이 크게 뛰고 번민(煩悶)하면서 입이 굳어져서 말은 못 하는데 떠 들고 소란을 피우는 자는 병이 반드시 풀리고자 하는 것이다.

[6-43] 주광(朱肱)의 《활인서(活人書)》에 말하기를 궤(厥)은 수족이 역랭(逆冷)하는 것이다. 수족지두(手足指頭)가 약간 찬 것을 청(淸)이라 하는데 이 병은 경증(輕證)이고 음궤증(陰厥證)은 병을 처음 얻을 때부터 오로지 사지가 궤랭(厥冷)하고 맥은 침(沈)하고 미약(微弱)하며 또 빠르지 않다. 흔히 다리에 경련을 일으키는 예가 많다.

[6-44] 상한병이 6,7일에 번만낭축(煩滿囊縮)하고 촌척맥(寸尺脈)이 모두 미완(微緩)한 것은 족궤음경(足厥陰經)에 병을 받은 것이다. 그 맥이 약간 부(浮)하면 병이 낫고자 하는 것이고 부맥(浮脈)이 없으면 난치(難治)인 것이다. 맥이 부완(浮緩)하면 반드시 낭축(囊縮)하지 않고 외증(外證)에 오한·발열이 있으면 병이 낫고자 하는 것이다. 마땅히 계마각반탕(桂麻各半湯)을 쓴다. 만일 촌척맥이 모두 침단(沉短)하면 반드시 낭축(囊縮)하는 것이고 독기(毒氣)가 복중(腹中)으로 들어가는 것이니 마땅히 승기탕(承氣湯)을 써서 설사를 시켜야 한다. 승기탕을 빨리 서둘러서 쓰면 5명은 살고 1명 정도 죽는 것을 보장할 수 있는 것이다. 상한병이 6,7일에 맥이 약간이라도 부맥(浮脈)이 있는 자는 꼭 막혔다가 극에 이르면 태평해지는 것처럼 수기(水氣)는 상승하고 화기(火氣)는 하강하여 한열이 생기면서 땀을 흘린 후 병이 풀리는 것이다.

[6-45] 모든 수족역랭은 다 궤음경(厥陰經)에 속하는 것이니 땀을 내거나 설사를 시켜서는 안 된다. 그러나 잠깐 땀을 내거나 설사를 시켜야 할 자가 있으니 비록 수족이 역랭하다 할지라도 때로 따뜻한 때도 있어서 손바닥과 발바닥이 따뜻한 것이니 그것은 완전한 궤역(厥逆)이 아니다. 마땅히 짐작하여 볼 것이다.

[6-46] 이천(李梴)이 말하기를 혀가 말리고 사지가 궤역(厥逆)하여 한랭(寒冷)한 기가 팔꿈치와 무릎을 지나며 아랫배가 급하게 잡아 트는 것과 같이 아프면 삼미삼유탕(三味蓼莢湯)·사순탕(四順湯)을 주로 쓰고, 수족이 잠깐 차졌다 잠깐 더워졌다 하면서 속에는 번열(煩熱)이 짝 차서 번민(煩悶)하는 자에게는 대승기탕(大承氣湯)을 주로 쓴다.

[6-47] 나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 궤음병(厥陰病)은 처음에는 복통·설사 같은 증상이 없다가 6,7일이 되면 갑작스럽게 궤증(厥證)을 일으키고 손발이 궤랭(厥冷)해진다면 이는 음증(陰證)의 종류가 아니고 곧 소음인의 태양상풍증(太陽傷風證)에 오한·발열하며 땀이 저절로 나는 증이니 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 여러 날을 서로 대치함으로써 마땅히 풀릴 것이 풀리지 못하고 변하여 이와 같은 증이 된 것이다. 이 병증은 태양병궤음증(太陽病厥陰證)이라 말하는 것이 마땅하다. 이와 같은 증에는 당귀사역탕(當歸四逆湯)·계마각반탕(桂麻各半湯) 등의 약은 필요가 없는 것이고 마땅히 삼유탕(三莢湯)·인삼오수유탕(人蔘吳茱萸湯)·독삼팔물탕(獨蓼八物湯)의 처방을 써야 한다. 그리고 대승기탕(大承氣湯)을 써서는 안 되고 마땅히 파두(巴豆)를 써야 한다.

[6-48] 무릇 소음인의 외감병(外感病)에 6,7일이 되어 땀을 내지 못하고 죽는 것은 다 궤음에 가서 죽는 것이니 4,5일에 그 병세를 자세히 관찰하고 황기계지탕(黃芪桂枝湯)·팔물군자탕(八物君子湯)을 3,4,5첩을 써서 미리 예방하여 주면 되는 것이다.

[6-49] 주광(朱肱)이 말하기를 궤음병 소갈(消渴)은 기운이 위로 심장(心臟)까지 치받쳐서 심중(心中)이 뜨겁고 아프며 배가 고파도 먹지 않으며 만일 먹으면 회충을 토한다.

[6-50] 공신(龔信)이 말하기를 상한병에 회충을 토하는 증은 비록 대열(大熱)이 있어도 찬 약으로 설

사시켜서는 안 된다. 만일 이것을 어기면 반드시 죽는다. 대개 위중(胃中)에 냉한기(冷寒氣)가 있으면 회충이 있을 바를 찾지 못하여 흉격으로 올라가는 것이니 대단히 흉한 징조이다. 급히 이중탕(理中湯)을 써야 한다.

[6-51] 나는 논하기를 이러한 토회증(吐蛔證)에는 반드시 이중탕(理中湯)을 1일에 3,4첩을 써야 하고 매일 복용시켜야 한다. 또는 이중탕에 진피(陳皮) · 관계(官桂) · 백하수오(白何首烏)를 가하여 쓰면 더욱 좋다.

[6-52] 중병(重病)과 위증(危證)에는 약을 하루에 3,4첩씩 쓰지 않으면 약력(藥力)이 충분치 못하고, 또 약을 연일 복용하지 않으면 병이 조금 나았다가 더하기도 하고 또는 병이 나았어도 완쾌되지 못하는 것이다. 연일 복용이라 함은 혹은 1일에 2번 또는 1일에 1번 또는 1일에 3번씩, 또는 2,3일간 연복(連服)하고 또는 5,6일간 연복하고 또는 수십 일간 계속하여 복용하는 것이다. 그 병의 병세를 잘 헤아려서 다스려야 한다.

소음인 위수한리한병론(67조)

[7-1] 장중경(張仲景)이 말하기를 태음증(太陰證)은 배가 더부룩하면서 토하고 먹은 것이 소화가 되지 않고 설사가 더욱 심하며 복통이 때때로 일어난다.

[7-2] 복만(腹滿)하고 때때로 아프면서 토하고 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음증(太陰證)이 된 것이다. 사역탕(四逆湯) · 이중탕(理中湯)을 쓰고 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 덜하다고 할 수 없는 것은 대승기탕(大承氣湯)을 쓴다.

[7-3] 상한에 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음증에 속한다. 그것은 장(臟)에 한기(寒氣)가 있기 때문이니 마땅히 속을 따뜻하게 해 주어야 할 것이니 사역탕(四逆湯)을 써야 한다.

[7-4] 태음증은 복통 · 설사를 하면서도 갈증이 없는 것이다. 마땅히 이중탕(理中湯) · 이중환(理中丸)을 쓰고 사순이중탕(四順理中湯)과 환(丸)도 주로 쓴다.

[7-5] 나는 논하기를 이러한 증에 마땅히 이중탕 · 사순이중탕 · 사역탕을 써야 한다고 했지만, 고방(古方)이 초창기의 처방이기에 약력(藥力)이 갖추어지지 못하므로 이러한 증에는 마땅히 백하오이중탕(白何烏理中湯) · 백하오부자이중탕(白何烏付子理中湯)을 써야 한다. 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 뱃속이 답답하다고 말하는 자는 고랭적체(痼冷積滯)가 되어 있는 것이니 마땅히 파두(巴豆)를 써야 하며 대승기탕(大承氣湯)을 써서는 안 된다.

[7-6] 장중경(張仲景)이 말하기를 병이 음증(陰證)으로 발(發)한 것을 도리어 설사를 시키면 이로 인하여 비증(痞症)을 일으킨다. 상한에 발열하고 구역(嘔逆)하면서 가슴이 짹 막혀 답답해하면서도 통증이 없다면 이는 비증이 된 것이다. 주로 반하사심탕(半夏瀉心湯)을 쓰고 또 위(胃)가 허(虛)하여 기역(氣逆)하는 데도 또한 반하사심탕을 주로 쓴다.

[7-7] 설사를 시킨 후에 설사를 하루에 수십 번씩 하는데 곡물(穀物)이 소화되지 않은 그대로 배설되며 배에서는 천둥소리가 울리며 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 마른 구역질을 하면서 가슴이 답답한 것은 열이 맺힌 것이다. 곧 위중(胃中)이 허(虛)하여 객기(客氣)가 거슬러 올라오기 때문이다. 감초사심탕(甘草瀉心湯)을 주로 쓴다.

[7-8] 태음증(太陰證)에 음식물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 증에 만일 발한(發汗)을 시키면 반드시 배가 창만(脹滿)해진다. 발한 후에 배가 창만해진 데는 마땅히 후박반하탕(厚朴半夏湯)을 써야 한다.

[7-9] 땀을 내고 난 후에 위(胃)가 편안하지 못하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 옆구리에 수기(水氣)가 있고 배에서 천둥소리가 나며 설사를 하는 중에는 생강사심탕(生薑瀉心湯)을 주로 쓴다.

[7-10] 상한에 하리(下利)를 하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하게 뭉치는 병증에 사심탕(瀉心湯)을 복용시키고 후에 다른 약방(藥方)으로 설사시켰더니 설사가 그치지 않으므로 이내 이중탕(理中湯)을 썼으나 설사가 더욱 심하다. 이렇게 될 때에는 적석지우여량탕(赤石脂禹餘糧湯)을 주로 써야 한다.

[7-11] 나는 논하기를 병이 음증(陰證)에서 발생한 것을 도리어 하리(下利)시켰다고 말한 것은 곧 위가 약하여 병이 생긴 것이다. 마땅히 곽향정기산(藿香正氣散)을 써야 할 것인데 도리어 대황(大黃)으로 하리를 시켰다는 것을 말하는 것이다. 마황(麻黃)과 대황(大黃)은 본시 태음인의 약이고 소음인의 약이 아니다. 소음인의 병에는 표증·이증을 막론하고 마황·대황으로 땀을 내거나 하리를 시킨다는 것은 원래 말할 필요가 없는 것이다. 소음인 병에 곡물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 것은 적체(積滯)가 스스로 풀리는 것이다. 태음증(太陰證)에 음식이 삭지 않은 것을 사(瀉)하면 곽향정기산(藿香正氣散)·향사양위탕(香砂養胃湯) 또는 강출관중탕(薑朮寬中湯) 같은 것을 써서 위를 덥히고 음기를 내리게(溫胃降陰) 해야 하고 소음증(少陰證)에 음식이 삭지 않은 것을 사(瀉)하면 관계부자이중탕(官桂附子理中湯)으로 건비강음(健脾降陰)해야 할 것이다.

[7-12] 곽향정기산(藿香正氣散)·향사육군자탕(香砂六君子湯)·관중탕(寬中湯)·소합원(蘇合元)은 모두 장중경 사심탕(瀉心湯)의 변제(變劑)이니 이것이 이른바 청출어람이다. 청(靑)이 비록 푸르나 그 남초(藍草)가 아니었으면 어찌 푸른 것을 얻었겠는가?

[7-13] 장중경(張仲景)이 말하기를 상한 음독병(陰毒病)은 얼굴빛이 푸르고 온몸이 몽둥이로 얻어맞은 것처럼 무시며 아프다. 이러한 병증은 5일이 된 것은 치료할 수 있지만 7일이 된 것은 치료할 수 없다.

[7-14] 이천(李梴)이 말하기를 삼음병(三陰病)이 심해지면 반드시 음독(陰毒)으로 변하게 된다. 그 증상은 수족이 꺾랭(厥冷)하며 토하고 설사를 하여도 갈증이 나지 않고 몸을 구부리고 조용히 누워서 잠자기를 좋아하고 극히 심하면 인통(咽痛)이 있으며 헛소리를 하고 여기에 두통과 머리에서 땀이 흐르는 증을 일으키며 눈동자가 아파서 햇빛을 싫어하며 얼굴·입술·손톱이 푸르고 검으며 몸에는 몽둥이로 얻어맞은 것처럼 되어 있다. 또 이 증세에는 면색(面色)이 청백흑(靑白黑)하며 사지가 꺾랭하고 잠을 많이 자는 것이 특징이다.

[7-15] 위의 증세에는 마땅히 인삼계피탕(人蔘桂皮湯)·인삼부자이중탕(人蔘附子理中湯)을 써야 한다.

[7-16] 장중경(張仲景)이 말하기를 상한병에 음경(陰經)을 직중(直中)한 것은 처음부터 두통·신열·갈증과 같은 증세는 없고 추워하며 구부리고 누워서 침중(沈重)한 모양으로 거뜰 잠에 빠지고자 하며 입술이 파랗고 사지가 차가워지며 맥이 가늘어서 끊어지려고 하고 혹 맥이 숨어서 나타나지 않는다. 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 한다. 사역(四逆)이란 것은 사지가 차갑다는 것이다.

[7-17] 나는 논하기를 일찍이 소음인이 직중음경(直中陰經)하여 건괭란(乾機亂)과 관격병(關格病)이 된 것을 치험한 것인데 때는 중복절후(中伏節候)였다. 소음인 한 사람이 얼굴의 기색(氣色)이 흑청(或靑或白)한데 마치 탄환 크기의 반점이 4,5개씩 둥글게 이루어져 있고, 기거(起居)는 평시와 같으나 실내의 벽에 기대어 앉아 온몸에 힘이 없고 늘어지면서 잠만 자려고 하였다. 그 동안의 원인을 물어본즉 대답하기를 며칠 전에 하리청수(下利清水) 1,2회 하고 이내 변폐(便閉)가 되어서 지금까지 2주야(晝夜)가 되었고 그 밖에 다른 이상은 없었다고 한다. 또 음식은 무엇을 먹었는가 물으

니 보리밥을 먹었다고 한다. 급히 파두여의단(巴豆如意丹)을 썼더니 한 시간쯤 지나서 땀이 인중혈(人中穴)에서 나와 얼굴에 퍼졌고 설사를 한두 번 하였다. 때는 해가 저물 때였다. 그 설사한 것을 자세히 살펴보니 묽은 물에 찌꺼기가 섞여 나오더니 그날 밤 밤새도록 설사를 10여 번 하고 또 다음 날 새벽부터 해가 저물 때까지 설사를 10여 번 하는데 보리알이 마치 콩알만 하게 붙어 있었다. 그 병이 식체(食滯)로 된 것이기 때문에 계속하여 3일 동안 음식을 먹지 못하게 하고 매일 먹는 것이라고는 다만 좋은 송늬를 한두 사발 먹게 하였더니 3일째 되던 날 새벽에 이르러서는 환자의 얼굴빛이 밝게 되었으나 몸 전체가 얼음같이 차고 머리와 목을 땅에서 2,3촌까지밖에 들지 못하였다. 병증이 더욱 위중하게 되었으니 어찌할 바를 모르다가 병자의 온몸을 자세히 점검해 보니 수족과 방광부(膀胱部)와 요복(腰腹)이 모두 얼음같이 차고 배꼽 아래 전체가 돌같이 단단한데 흉부와 복부 상중완(上中脘)에는 열기가 찌는듯하여 손이 구워질 정도로 뜨거운 것이니 아주 가관이었다. 5일째 새벽에 이르러 한 번 토하더니 맑은 거품이 나왔다. 그 맑은 거품 가운데에 잡미곡(雜米穀)이 한웅큼이나 섞여 나오더니 이때부터 병세가 대감(大減)하여 미음을 몇 사발 연이어 먹고 그 이튿날에는 죽을 먹게 되었다. 이 병자는 빈궁한 촌에 살고 있었기 때문에 온위(溫胃)하는 약과 화해(和解)하는 약을 쓸 사이가 없었던 것이다. 그 후에 또 소음인 한 사람이 하루에 몇 차례 설사를 하는데 맑은 물만 설사하고 온 배에 부종(浮腫)이 생겼다. 처음에는 계부곽진이중탕(桂附藿陳理中湯)을 쓰되 거기에 더하여 인삼(人蔘)·관계(官桂) 각 2돈 하고 부자(附子) 2돈 혹 1돈 하여 1일 4복 하고 수일 후에는 1일 3복하여 10여 일에 이르러서 마침내 청곡설사(淸穀泄瀉)를 연이어 3일간을 하는데 3일에 30-40차쯤 하고서 부종이 크게 줄었다. 또 소음인 소아가 물 설사를 하고 면색이 검고 푸르며 기운이 빠져서 졸고 있는 것이다. 독삼탕(獨參湯)을 쓰되 생강(生薑) 2돈, 진피(陳皮)·사인(砂仁) 각 1돈을 가하여 1일에 3,4복 하였더니 수일 후에 설사를 10여 번하고 크게 땀을 흘리고 병이 풀린 것이다. 대체로 소음인은 객란(襪亂)·관격병(關格病)에 인중에서 땀이 나면 비로소 위험을 면하게 된 것이고, 식체(食滯)가 뭉려서 크게 설사를 하면 다음으로 위험을 면한 것이고, 저절로 토하는 것은 꽤히 위험을 면하게 되는 것이다. 소음인의 병증이 위와 같을 때에는 밥이나 죽을 가까이하는 것을 금하고 다만 좋은 송늬나 미음을 먹게 하는 것이 정기(正氣)를 붙들어 주고 사기(邪氣)를 억누르는 좋은 방법이 된다. 체증(滯症)이 오래되어서 병이 위중할 때에는 좋은 송늬를 따뜻하게 하여 마시게 하면 소화가 잘되고 영양이 되기 때문에 다른 음식을 먹는 것과 다르지 아니하니 비록 절식을 2,3,4일쯤 할지라도 걱정할 필요가 없는 것이다.

[7-18] 장중경(張仲景)이 말하기를 소음병(少陰病)은 맥이 미세(微細)하고 다만 잠만 자려고 하는 것이다.

[7-19] 상한에 토하고자 하여도 토하지 못하고 가슴이 답답하면서 잠만 자려 하다가 5,6일에 이르러 설사를 하면서 갈증이 있으면 소음에 속하니 소변 색이 흰 것은 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 한다.

[7-20] 소음병에 전신이 아프면서 수족(手足)이 한랭(寒冷)하고 골절(骨節)이 쑤시고 맥이 침(沈)하면 부자탕(附子湯)을 써야 한다.

[7-21] 설사를 하고 복창만(腹脹滿)하면서 신체가 쑤시고 아프다고 하면 그 속(裏)을 먼저 따뜻하게 하고서야 그 겉(表)을 다스려야 한다. 온리(溫裏)를 하려면 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 하고 겉을 다스리려면 마땅히 계지탕(桂枝湯)을 써야 한다.

[7-22] 나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다.

[7-23] 장중경(張仲景)이 말하기를 소음병이 처음 시작할 때 도리어 열이 나고 맥이 침(沈)한 것은 마황부자세신탕(麻黃附子細辛湯)을 주로 쓴다.

[7-24] 소음병 1,2일에 입안이 부드럽고 등이 오싹오싹하면 마땅히 부자탕(附子湯)을 써야 한다.

[7-25] 소음병이 2,3일이 될 때에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)을 써서 약간 땀을 내게 한다. 2,3일이 되었어도 증상이 없기 때문에 약간 발한(發汗)을 시키는 것이다. 증상이 없다 함은 토하거나 설사를 하거나 수족이 귤랭(厥冷)하는 증세가 없다는 것이다.

[7-26] 설사를 하고 맥이 침지(沈遲)하며 그 사람의 얼굴이 약간 붉으면서 몸에서 땀이 약간 나고 청곡(淸穀)을 설사하면 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 풀리나 환자가 반드시 약간 귤랭하였을 것이니 그 이유는 얼굴에 양(陽)이 떠 있고 하초(下焦)는 허(虛)해졌기 때문인 것이다.

[7-27] 소음병에 맥이 세침삭(細沉數)하면 병이 속(裏)에 있는 것이니 발한(發汗)을 시켜서는 안 된다. 소음병에 다만 귤랭(厥冷)만 있고 땀이 없는 증상을 강제로 발한을 시키면 그 피가 동(動)하여서 입·코 또는 눈에서 출혈한다. 이렇게 되는 것은 하초(下焦)는 귤랭(厥冷)해지고 상초(上焦)는 피가 고갈된 것이니 난치인 것이다.

[7-28] 나는 논하기를 장중경(張仲景)이 논한 바의 태음병과 소음병은 모두 소음인의 위기(胃氣)가 허약하여 설사하는 증세이다. 태음병의 설사는 중증(重證) 중에서도 평증(平證)이지만 소음병의 설사는 위증(危證) 중에서도 험증(險證)인 것이다. 사람들이 다만 설사만을 보고서 동일한 것으로 여겨 대수롭지 않게 취급한다. 소음병의 설사를 대수롭지 않게 취급한다면 반드시 죽음을 면치 못할 것이다. 태음병 설사는 대장(大腸)의 설사이고 소음병 설사는 위중(胃中)의 설사이다. 태음병 설사는 온기(溫氣)가 냉기(冷氣)를 쫓아내는 설사이고, 소음병 설사는 냉기가 온기를 핍박하는 설사인 것이다.

[7-29] 소음병이 저절로 낫고자 하면 얼굴빛이 조금 붉어지고 몸에는 약간 땀이 있고 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 병이 흠린다. 그러므로 옛 사람들이 이것을 보고 소음병에 다만 귤증(厥證)만 있고 땀이 나지 않는 경우에도 마황(麻黃)을 써서 억지로 발한을 시켜 병이 저절로 낫게 하려다 도리어 그 혈(血)을 동하게 하여 입과 코로부터 출혈을 하는 까닭에 이제서야 비로소 삼가고 두려워한 것이다. 모든 소음병에 마황을 감히 손쉽게 써서는 안 된다. 소음병이 시작된 지 1,2일이 되었거나 2,3일이 된 초증에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)으로 약간 땀을 내게 하였으나 그러나 마황은 본디 소음병에 해로운 약인즉 비록 2,3일이 되는 초증이라도 마황을 써서 발한을 시키면 안 되는 것이다. 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다. 혹 관계(官桂)·계지(桂枝)로 대신 바꾸기도 한다.

[7-30] 소음병은 초기 증상에 이어 험증(險證)이 되고 이어서 위증(危證)이 되는 것이니 이 병은 초증에 일찍 병증을 잘 관찰하여 조치하지 않으면 나중에 위험한 처지에 빠지는 것이다. 복통이 있으면서 하리를 하며 구갈(口渴)이 없고 구중(口中)이 부드러우면 태음병이고 복통·자리(自利)하면서 구갈이 있고 구중이 갈갈하면 소음병이다. 소음병에 신체와 골절이 아픈 표증(表證)이 있는 것은, 즉 표리(表裏)가 다 병이 된 것으로써 대장한기(大腸寒氣)가 반드시 위중(胃中)의 온기(溫氣)를 이기고 위로 올라가는 것이다. 태음병에는 신체통과 골절통과 같은 표증이 없는데 이것은 속이 병든 것이고 겉은 병든 것이 아니니 위중의 온기가 오히려 대장의 한기를 이기고서 내려가는 것이다.

[7-31] 장중경(張仲景)이 말하기를 소음병에 순전히 푸른빛 물설사를 하고 명치 밑이 아프며 입 안이 바짝 마르는 자에게는 마땅히 대승기탕(大承氣湯)을 쓴다

[7-32] 주공(朱肱)이 말하기를 소음병에 입과 목 안이 마르고 갈증이 있으면 급히 설사를 시켜야 하니 양명병에 천천히 설사시켜도 괜찮은 것과는 다르다.

[7-33] 이고(李杲)가 《동원서(東垣書)》에 말하기를 소음증은 구중(口中)을 보고서 판단해야 할 것이니 입 안이 부드러운 자는 마땅히 온약(溫藥)을 써야 하고 입 안이 말라서 물기가 없는 자는 마땅히

하리를 시켜야 한다. 또 소음증은 하리를 보고서 판단해야 하는 것이니 대변 색이 푸르지 않으면 마땅히 온(溫)한 약을 써야 하고, 대변이 청색(靑色)이면 마땅히 설사를 시켜야 한다.

[7-34] 이천(李梴)이 말하기를 혀가 마르고 입 안에 물기가 없으며 또는 맑은 물 설사를 하다가 변이 막히고 헛소리를 하거든 마땅히 소승기탕(小承氣湯)을 쓰고 입술이 푸르고 사지가 궤랭(厥冷)하면서 손톱이 청흑(靑黑)하면 마땅히 강부탕(薑附湯)을 써야 한다.

[7-35] 내가 논하기를 푸른 물 설사를 하는 것을 하리시키고자 한다면 마땅히 파두(巴豆)를 써야 하고 따뜻하게 하고자 한다면 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다. 또 맑은 물 설사를 하고 이내 대변이 막히면 먼저 파두를 쓰고 후에 강출관중탕(薑朮寬中湯)을 써야 한다.

[7-36] 내가 일찍이 소음인 10세 아이가 생각이 많아 기운이 소모되어 매번 하루 이틀 근심하는 일이 있으면 반드시 복통을 일으키고 설사를 하는 증을 보았다. 그리하여 하루 이틀쯤 백하오이중탕(白何烏理中湯)을 2,3,4첩을 쓰거나 심할 때에는 부자이중탕(付子理中湯)을 1,2첩을 쓰면 설사가 반드시 나았다. 그러다가 하루는 갑자기 이 아이가 근심 걱정으로 기가 고르지 못하게 된지가 며칠이 지났기 때문에 예방치료로 백하오이중탕(白何烏理中湯)을 몇 첩 썼더니 설사가 나오는데 곧 하리 청수(下利清水)를 하는 것이다. 계속하여 6첩을 더 써도 청수가 그치지 않는다. 그리하여 급히 부자이중탕(付子理中湯) 6첩을 쓰니 청수가 변하여 흑수(黑水)가 나오고 또 2첩을 쓰니 흑수설사(黑水泄瀉)가 치유되었다. 또 2,3첩을 써서 조리를 시켰다. 이로써 살펴보면 청수를 설사하는 것은 환자가 괄란·관격(襍亂·關格)된 후에 이런 증세가 일어나는 것이다. 이런 증세에는 마땅히 파두(巴豆)를 써서 고랭적체(固冷積滯)를 뚫어버리는 것이 스스로 옳은 법이기에 의심할 필요가 없다. 이 아이가 10세 12월에 청수하리병을 앓았고 또 11세 되던 해 2월에 망양병(陽病)을 얻었다.

[7-37] 주광(朱肱)이 말하기를 조증(躁證)으로 잠시도 가만히 있지 못하고 사지가 궤랭(厥冷)한 것은 장궤(藏厥)이 된 것이다.

[7-38] 이천(李梴)이 말하기를 장궤은 조증을 일으켜 잠시라도 멎는 때가 없는 것이니, 발열한지 7,8일에 맥이 미약(微弱)해지고 피부는 차면서 조증이 발작하며, 또는 토하고 또는 설사가 나서 잠시도 안정을 이룰 수가 없는 것은 곧 궤음(厥陰)의 진장(眞藏)의 기운이 끊어진 것이다. 그러므로 장궤(藏厥)이라 이름 한 것이다. 중경도 치법이 없어서 사역탕(四逆湯)을 차게 마심으로써 구해 보고자 하였다. 소음병에 사지궤랭(四肢厥冷)하고 토하고 설사를 하면서 조바심을 하는 증에도 또한 치법이 없으니 삼미삼유탕(三味蓼莢湯)으로 구해 보라고 하였다.

[7-39] 나는 논하기를 소음인이 기빠하고 좋아하는 것이 일정치 않아 계교와 힘이 다하게 되면 가슴이 번조하게 된다. 소음병 상한에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자는 이는 계교가 궁하고 힘에 부쳐서 생긴 병이 아니겠는가? 대개 희호(喜好)라 함은 욕심 내는 바이니 어찌하여 계교와 힘이 다한 후에 이르러 이런 소음병을 얻었는가? 어찌하여 일찍부터 군자의 너그럽고 평온한 마음씨를 쓰지 못하였는가? 그러나 상한 초증(初證)에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자에는 일찍부터 약을 쓰면 오히려 죽음을 면할 수 있지만, 그러나 그 병이 조증이 되어 잠시도 안정을 이루지 못하고 수족이 궤랭(厥冷)하기에 이르러선 병세가 극히 위험한 지경에 놓여 있으니 어찌 가련하지 않겠는가? 이 병증에는 마땅히 삼유탕(蓼莢湯)·사역탕(四逆湯)·관계부자이중탕(官桂付子理中湯)·오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 써야 한다.

[7-40] 주광(朱肱)이 말하기를 환자의 몸이 차고 맥이 침세(沉細)하고 빠르며 번조를 하면서도 물을 마시지 못하는 것은 음(陰)이 성(盛)하여 양(陽)을 막고 있는 증이다. 만일 물을 마시는 자는 이증이 아니다. 궤음병(厥陰病)에는 목이 말라서 물을 마시고자 하는 자에게는 조금씩 먹게 하면 병이 낫는다.

[7-41] 성무기(成無己)가 말하기를 번(煩)은 가슴 속이 답답하고 갑갑한 것을 말하는 것이고 조(躁)는 기운이 밖으로 나와 더워서 손발을 흔드는 것을 말하는 것이다. 번증만 있고 조증은 없는 것과 선번후조(先煩後躁)하는 증은 다 치료할 수 있지만 조증만 있고 번증은 없는 것과 선조후번(先躁後煩)하는 증은 다 치료할 수 없다. 이것은 마치 별걱 성을 낸 후 다시 답답하여 괴로워하는 심정과 같으니 이는 음성격양(陰盛隔陽)이 된 것이다. 비록 조증이 크게 심하여서 진흙탕 물에라도 들어가 눕고자 하면서도 물을 입으로 넘기지도 못하는 것이 바로 이것이다. 이는 진기가 끊어지려고 하여 투쟁하는 것이니 비유하면 등잔불이 거의 꺼지려고 할 때 별안간 반짝 밝아졌다가 꺼지는 것과 같은 것이다.

[7-42] 이천(李梴)이 말하기를 상한에 음성격양(陰盛隔陽)은 그 증세가 몸은 얼음같이 차가운데 도리어 번조가 심해서 우물에라도 뛰어들려고 하고 입술은 검푸르며 얼굴빛은 검으며 목이 몹시 말라서 물을 마시고는 도로 토하며 설사를 하되 빛이 검다. 육맥(六脈)이 침세(沉細)하면서 빠르며 또는 맥이 없어진다. 이것은 음성격양의 대허증(大虛證)이다. 마땅히 벽력산(霹靂散)을 써야 하고 또 말하기를 꺾어하면서 번조하면 불치하는 것이다.

[7-43] 나는 논하기를 위의 병증에 관계부자이중탕(官桂附子理中湯)·오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 마땅히 써야 하고 또는 벽력산(霹靂散)을 쓴다.

[7-44] 장궤와 음성격양은 병정(病情)이 대동소이하여 모두 지극히 위극한 증세이다. 진기가 마치 머리카락 한 올이 남아 있는 것이라 너무 급하여 손을 댈 틈이 없게 된 것이다. 만일에 이 병을 다스리는 데 제일 좋은 대책을 말한다면 이와 같이 막심한 병증이 생기기 전에 일찍부터 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)·오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 써야 한다.

[7-45] 무릇 소음인의 병에 설사를 처음 할 때에 마땅히 잘 살펴보아야 할 것은 심번증이 있나 없나를 꼭 살펴야 하는데 심번증이 있으면 입이 말라서 구중(口中)이 불화(不和)하고 심번증이 없으면 입이 마르지 않고 구중이 부드러운 것이다. 또 소음인병의 위증(危證)에 있어서는 마땅히 조증(躁證)이 안정한가 안정되지 못한가를 잘 살펴야 한다. 조증이 안정한가 안정되지 못한가를 살펴보면 반드시 마음의 범위가 안정되어 있나 안정하지 못한가를 알아보아야 한다. 마음의 범위가 침착하고 여유가 있는 자는 그 마음도 안정되고 조증도 안정되어 있는 것이고, 마음의 범위가 편안치 못한 자는 그 마음도 안정되지 못하고 조증도 안정되지 못한 것이다. 비록 마음이 편안하지 못하여 깜짝깜짝 놀랄지라도 오히려 그 마음을 잠시 동안 만이라도 침착하고 여유롭게 한다면 그 병을 치료할 수 있는 것이다. 치료 가능한 것은 건강(乾薑)·부자(附子)를 쓰면 효과를 보는 것이다.

[7-46] 무릇 소음인이 설사하는 데 1일에 3회 한다면 1,2회보다는 중하고 1일에 4,5회 한다면 2,3회보다 중하다. 설사를 1일 4회 한다면 매우 중한 것이다. 설사를 하루 하는 것은 2일 하는 것보다 경(輕)하고 2일간 하는 것은 3,4일간보다는 경하다. 설사를 3일간 계속하는 것은 태중(太重)한 것이다. 소음인으로서 보통 건강한 사람이 1개월간에 설사를 2,3차 한다면 경증 환자라 볼 수 없고 또 하루에 굳은 대변이라도 3,4회 본다면 경증 환자라 볼 수 없다. 청곡(淸穀) 설사를 하는 것은 비록 1일에 수십 번을 하더라도 반드시 구중이 건조하지 않고 냉기가 밖으로 풀리는 것이다. 청수(淸水) 설사하는 것은 복중에 반드시 청수가 있는 것이고, 황수(黃水) 설사를 한다면 이것은 청수가 아니고 반드시 찌꺼기가 섞여 있는 것이다.

[7-47] 장중경(張仲景)이 말하기를 상한 7,8일에 몸이 치자색 같이 노랗고 소변이 나오지 않으며 복부가 약간 부르면 태음증에 속하는 것이니 마땅히 인진호탕(茵陳蒿湯)을 써야 한다. 상한에 다만 머리에서 땀이 나고 다른 곳은 나지 않으며 목둘레에 까지만 땀이 나고 소변이 잘 나오지 않으면 반드시 몸에 황달이 발생하는 것이다.

[7-48] 이천(李梴)이 말하기를 유행하는 역려(疫癘)에서도 황달이 되는 경우가 있는데 이것을 온황(瘟黃)이라 한다. 사람을 죽게 하는 것이 가장 급하니 마땅히 장달환(瘴疸丸)을 써야 한다.

[7-49] 나는 논하기를 위와 같은 황달병에는 마땅히 인진굴피탕(茵陳橘皮湯) · 인진부자탕(茵陳附子湯) · 인진사역탕(茵陳四逆湯) · 장달환(瘴疸丸) · 파두단(巴豆丹)을 쓴다.

[7-50] 《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 다만 결흉증(結胸證)만 있고 대열(大熱)이 없는 것은 수기(水氣)가 맺힌 것이다. 머리에서만 땀이 흐르는 것을 이름하여 수결흉(水結胸)이라 한다. 소반하탕(小半夏湯)을 쓴다.

[7-51] 공신(龔信)이 말하기를 한기(寒氣)가 실(實)하여 결흉하고 열이 없는 증에는 마땅히 삼물백산(三物白散)을 쓴다.

[7-52] 나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 계지반하생강탕(桂枝半夏生薑湯) · 적백하오관중탕(赤白何烏寬中湯) · 삼물백산(三物白散) 또는 파두단(巴豆丹)을 쓴다.

[7-53] 소양인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 결흉(結胸)이라 하는데 그 병은 치료할 수가 있고, 소음인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 장결(藏結)이라고 하는데 그 병은 불치의 병이다. 《의학강목(醫學綱目)》과 《의감(醫鑑)》에서 논한 바의 수결흉(水結胸)과 한실결흉(寒實結胸)의 약물은 모두 소음인의 태음병에 쓰는 약물로서 장중경의 인진호탕과 서로 같은 류에 속하므로 이것은 반드시 명치 밑이 진짜로 단단한 것이 아니고 더부룩하면서 가득한 것이라고 생각된다. 장중경의 사심탕(瀉心湯)증에서 상한에 설사를 하고서 심하가 비경(痞硬)하거나 땀을 많이 내고서 심하가 비경한다고 운운한 것은 모두 심하가 비만(痞滿)하였거나, 또는 제상(臍上) 부근에 경결이 된 것이겠고 진짜로 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 장결병은 아니다. 만일 소음인의 병에 명치 밑이 오른쪽으로 단단하게 굳어 뭉친 장결병이라면 그것은 불치인 것이다.

[7-54] 장중경(張仲景)이 말하기를 병에 결흉(結胸)과 장결(藏結)이 있으니 그 증상이 어떻게 다른가? 대답하기를 누르면 아프고 촌맥(寸脈)이 부(浮)하고 관맥(關脈)이 침(沈)한 것을 결흉병이라 한다. 장결증은 어떠한가? 대답하기를 결흉병 증상과 비슷하고 음식은 여전하고 때때로 설사하며 촌맥이 부하고 관맥이 세소침긴(細小沈緊)한 것을 장결병이라고 한다. 위와 같을 때 설상(舌上)에 백태(白苔)가 끼고 뻘뻘뻘뻘하면 난치하고 환자가 평소에 가슴 속이 답답한 증상이 있고 이것이 배꼽 아래로 내려와서 아랫배로 들어가서 당기고 음근(陰根)에까지 들어가는 것을 장결병이라고 한다. 이것은 죽는 병이다.

[7-55] 주광(朱肱)이 말하기를 장결은 그 증상이 결흉과 거의 같고 음식은 보통 때와 같으면서 때때로 설사하고 설상에 백태가 낀다. 이를 노래로 하면 음식은 예나 다름없고 때로 설사를 하니 다시금 혀에 백태가 끼는구나. 배꼽 아래 아픈 것이 음근까지 당기니, 아! 이 병은 애당초 죽고 마는 병인가 보다.

[7-56] 나는 논하기를 일찍이 소음인 한 사람이 명치 밑 오른쪽에 단단하게 굳어 뭉친 것이 있어서 백약을 써도 효과가 없다. 그리하여 파두여의단(巴豆如意丹)을 주었더니 도리어 병이 심하여 머리를 흔들며 풍증을 일으키다가 잠깐 그치더니 몇 달 후에 죽은 것이다. 또 그 후에 소음인 한 사람이 이와 같은 병증이 있어 파두단(巴豆丹)을 썼더니 얼굴과 몸에서는 땀이 나고 있으나 유독히 뺨입술 인중혈(人中穴) 좌우 쪽에서는 땀이 나지 아니하더니 이 사람은 1년 후에 죽은 것이다. 무릇 소음인이 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉쳐 있는 환자 4-5명을 실제로 보았으나 혹 6개월간 혹 1년간 침구(針灸) 의약(醫藥)을 두루 써보지 않은 것이 없었으나 날날이 회생할 희망이 없었으니 이는 곧 장결병으로 소음인의 병인 것이다.

[7-57] 장중경(張仲景)이 말하기를 황달병은 마땅히 18일로서 기간을 잡는 것이니 10일 이상이면 차도가 있어야 하는데 도리어 병이 더욱 심한 것은 다스리기 어려운 것이다. 병이 음부(陰部)에서 발(發)하면 그 사람이 반드시 구역을 하고 병이 양부(陽部)에서 발생을 하면 그 사람이 추워서 떨며 발열을 하는 것이다.

[7-58] 각종 황달병에 소변색이 노랗고 붉으면 이는 습열(濕熱)로 된 것이니 마땅히 습열로 다스려야 하고, 소변이 맑아서 열을 제(除)해서는 안 될 것은 열이 없는 것이다. 만일 허한증(虛寒證)이 있으면 마땅히 허로증(虛勞證)으로 다스려야 한다.

[7-59] 배가 부르고 얼굴이 누렇고 여위면 조바심이 나서 잠을 이루지 못하는 것이다.

[7-60] 대개 황달병들은 오후 4시쯤 마땅히 발열하는 것인데 도리어 오한이 있는 것은 여로(女勞)를 얻은 것이다. 방광이 아프고 아랫배가 부르며 온몸이 다 누렇게 되어도 이마는 검은빛을 띠고 발바닥에서 발열하면 흑달(黑疸)이 되는 것이다. 배가 부른 것이 마치 물이 찬 것 같고 대변이 검고 흑 때로는 묽으면 이것은 여로(女勞)로 병이 된 것이고 물이 차서 있는 것은 아니다. 배가 부은 증은 치료하기 어렵다.

[7-61] 주광(朱肱)이 말하기를 음증(陰證)으로 된 황달증은 마음이 답답하여 조바심하며 숨이 차며 구역이 나서 입 안이 마르지 않는다. 마땅히 인진굴피탕(茵陳橘皮湯)을 써야 한다. 한 사람이 상한병에 황달이 발하여 맥(脈)이 미약(微弱)하고 몸이 냉한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진사역탕(茵陳四逆湯)을 쓰고 크게 효과를 보았다. 또 한 사람이 상한병에 황달이 되었는데 맥이 침세무력(沈細無力)한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진부자탕(茵陳附子湯)을 쓰고 대효를 본 것이다.

[7-62] 《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 습(濕)으로 된 황달은 색이 어둡고 밝지 못하여 온몸이 아프지 아니하고 열로 된 황달증은 피부가 굴뚝같이 노랗고 온몸이 수시고 아프다.

[7-63] 왕호고(王好古)가 말하기를 모든 병에 있어서 마땅히 땀을 내야 할 것을 땀을 못 내거나 소변을 잘 나가게 해야 할 것을 이뇨(利尿)시키지 못하면 또한 황달이 발생하게 되는 것이다.

[7-64] 주진형(朱震亨)이 말하기를 황달병이 식적(食積)으로 인한 것은 식적을 내려야 하고 그 밖의 황달병에는 다만 소변을 잘 나오게 하면 된다. 소변이 잘 나오고 색이 맑으면 그 황달이 스스로 물러가는 것이다.

[7-65] 이천(李梴)이 말하기를 황달이 10일을 넘어서 배로 들어가면 숨이 차고 번갈하며 얼굴빛이 검어지는 자는 죽는다.

[7-66] 왕숙화(王淑和)의 《맥경(脈經)》에 말하기를 황달병은 촌구맥(寸口脈)이 손바닥 쪽에서부터 없어지고 입과 코에서 냉기(冷氣)가 나오고 얼굴빛이 검어진 것은 모두 치료할 수 없다.

[7-67] 나는 논하기를 음황(陰黃)은 곧 소음인의 병이다. 주씨인진굴피탕(朱氏茵陳橘皮湯)·인진사역탕(茵陳四逆湯)을 써야 하고, 여로의 황달과 열가(熱家)의 황달과 이소변(利小便)을 시켜야 할 황달증은 혹 소음인 병이 아닌 것으로 생각된다. 내가 황달 치료를 한 번도 해본 경험이 없어서 그 내막은 자세히 말하지 못하나 비만(痞滿)·황달(黃疸)·부종(浮腫)은 같은 병인에서 생긴 증으로 다만 경증(輕證)·중증(重證)이 있을 따름이다. 건강(乾薑)·양강(良薑)·청피(靑皮)·진피(陳皮)·향부자(香附子)·익지인(益智仁)은 소음인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이고 형개(荊芥)·방풍(防風)·강활(羌活)·독활(獨活)·복령(茯苓)·택사(澤瀉)는 소양인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이다.

소음인 범론(24조)

[8-1] 나는 논하기를 발열(發熱)하며 오한(惡寒)하는 증은 태양병(太陽病)이고, 발열 하면서 오한이 없으면 양명병(陽明病)이다. 태양병과 양명병의 발열상태는 같으나 오한·불오한(不惡寒)하는 거리가 심히 멀기 때문에 양기(陽氣)의 진퇴(進退)가 태산(泰山)과 언덕에 비하는 것과 같다. 설사를 하면서 구갈(口渴)하지 않는 증은 태음병(太陰病)이고 자리(自利)하면서 구갈하는 병은 소음병(少陰病)이다. 태음병과 소음병은 설사하는 증상은 같고 구갈하고 구갈하지 않는 사이가 서로 심히 멀어서 냉기(冷氣)의 취산(聚散)·경중(輕重)은 큰 호수와 작은 못을 비교하는 것과 같다. 그렇기 때문에 곽향정기산(藿香正氣散)·향사양위탕(香砂養胃湯)을 쓰는 증세는 준마가 평지를 달리는 격이고, 독삼팔물탕(獨參八物湯)·계부이중탕(桂付理中湯)을 쓰는 병세는 짧은 지팡이를 짚고 크고 높고 험한 산을 넘어가는 형세와 같은 것이다. 만일 온 세상에 소음인으로 태어난 자로 하여금 양명병과 소음병이 마치 태행산(太行山)의 험한 산길을 가는 사람과 같아서 그 병을 얻으면 과연 두려운 것이고 참으로 구명하기가 쉽지 않은 것을 알게 한다면 몸을 섭양하고 병을 치료하는 일에 경계하고 삼가 조심함에 마치 넓은 길을 걷는 것같이 하여 미혹하지 않게 해야 하지 않겠는가.

[8-2] 태양병에 땀이 나는 것은 열기(熱氣)가 한사(寒邪)를 물리치는 땀이고 양명병에 땀이 나는 것은 한사가 열기에 침범하는 땀이다. 태음증 하리는 온기(溫氣)가 냉기(冷氣)를 몰아내는 하리이고 소음증 하리는 냉기가 온기를 핍박하는 하리인 것이다.

[8-3] 소음인 병에 두 길증(吉證)이 있다. 하나는 인중(人中)에서 땀이 나는 것이요, 또 하나는 물을 능히 마시는 것이다.

[8-4] 소음인 병에 두 급증(急證)이 있다. 하나는 발열하면서 땀이 너무 많이 흐르는 것이요, 또 하나는 맑은 물 설사를 하는 것이다.

[8-5] 소음인 병에 육대증(六大證)이 있으니 첫째로 소음병(少陰病), 둘째로 양명병(陽明病), 셋째로 태음병음독증(太陰病陰毒證), 넷째로 태양병궤음증(太陽病厥陰證), 다섯째로 태음병황달증(太陰病黃疸證), 여섯째로 태양병위가실증(太陽病胃家實證)이다.

[8-6] 발열하고 땀이 나면 병이 반드시 풀려야 하는데 발열하고 땀이 나고서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 양명병이고 체한 것이 뚫리면서 설사를 하면 병이 반드시 풀려야 하는데 체기(滯氣)가 뚫리고 설사를 하고서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 소음병인 것이다. 양명병과 소음병은 사기(邪氣)가 정기(正氣)를 범(犯)하는 병이기 때문에 급하게 약을 쓰지 않을 도리가 없다. 추워 떨고서 땀이 나면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 오한하고 땀이 나고서도 그 병이 반만 풀리고 반은 풀리지 않는 것은 점차 궤음병(厥陰病)으로 전변(轉變)하려는 증이다. 복통에 설사를 하면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 복통에 하리(下利)를 하고서도 그 병이 반만 풀리고 반은 풀리지 않는다면 점차 음독병(陰毒病)으로 전변하려는 증이다. 궤음병과 음독증은 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 힘을 기울이는 병이니 불가불 미리 약을 써서 정기를 도와주어야 한다. 발열하고 땀이 한 번 나고 병이 풀리는 것은 태양의 경병(輕病)이고 식체에 한 번 설사를 하고서 병이 풀리는 것은 태음의 경병이다. 태양과 태음의 경병(輕病)은 약을 쓰지 않고서도 저절로 낫는 것이다. 발열 3일에 땀이 나지 않아 병이 풀리지 않는 것은 태양의 심한 병증이고 식체 3일에 소화가 되지 않아 내려가지 않는 것은 태음의 심한 병증이다. 태양병과 태음병의 심한 병증을 이미 경증이라고 말할 수 없으므로 약을 2-3첩을 쓰면 또한 스스로 낫는다. 발열이 있는 지 6일이 되어서도 땀이 나지 않고 열이 풀리지 않는 증과 식체 6일에 소화가 안 되어 내리지 않는 증은 태양병·태음병의 위가실황달병이다. 위가실황달병은 정기와 사기가 꼭 막힌 병이기 때문에 약을 크게 쓰지 않을 도리가 없는 병증이다.

[8-7] 태양병과 태음병은 6-7일에는 혹 위증(危證)이 되거나 혹 중증(重證)을 일으켜 10일 내에는 반드시 험증(險證)이 되는 것이고 양명병과 소음병은 처음부터 중증이 되므로 2-3일 내에 또한 험증을 일으키는 것이다. 그렇기 때문에 양명병과 소음병은 불가불 병이 시발(始發)할 때부터 잘 살펴

야 하고 태양병과 태음증은 불가불 4-5일 내에 증세를 잘 살펴야 한다.

[8-8] 태양병과 태음증은 병세가 느리므로 능히 여러 날을 이끌어 갈 수 있기 때문에 변증(變證)이 많이 생기고 양명병·소음병은 병세가 급하므로 여러 날을 끌어갈 수 없기 때문에 변증이 적다. 대개 양명병과 소음병은 1일이 지나고 2일이 되면 불가불 약을 써야 하며 태양병과 태음병은 4일이 지나 5일이 되면 불가불 약을 써야 한다. 태양·태음에서 궤음(厥陰)과 음독(陰毒)이 된 것은 모두 6-7일이 되면 죽음에 이르게 되므로 더욱 삼가지 않을 수가 없는 것이다.

[8-9] 양명병과 태양병의 위급한 자에게는 독삼팔물탕(獨參八物湯)·보중익기탕(補中益氣湯)이라야 병을 풀 수가 있고 병세가 위급할 때에는 만일에 1일에 3-4첩을 탕복하지 않거나 또 연 일복(連日服)하지 않으면 난치하고, 소음병과 태음병의 위급한 자는 독삼부자이중탕(獨參附子理中湯)·계부곽진이중탕(桂附藿陳理中湯) 등이라야 가히 풀릴 수가 있고 병세가 위급할 때에는 매일 3-4첩을 탕복(湯服)하지 아니하거나 또는 연일 복용하지 아니하면 난치한다. 또 병세가 극히 위급할 때에는 1일에 4첩을 탕복해야 하고 또 병세가 반 정도로 위급할 때에는 1일에 3첩을 복용한다. 그리고 다음부터는 병세가 더 감(減)해지지 않더라도 1일에 2첩을 복용하고 또 병세가 조금 감해지면 2일간에 3첩을 쓰거나 1일에 1첩을 쓰기도 하고 1일에 2첩을 쓰기도 한다. 병세가 크게 덜하게 되면 1일에 1첩을 쓰고 또 병세가 더욱 크게 덜하게 되면 2일간에 1첩을 쓰든지 3일간에 1첩, 4일 간에 1첩, 5일간에 1첩을 쓰기도 한다. 그리고 병이 있는 사람은 약을 써야 하지만 병이 없는 사람이 약을 복용하는 것은 옳지 않다. 중병에는 중한 약을 써야 하고 경병자에게는 중한 약을 써서는 안 된다. 만일에 병이 가벼운데 중한 약 쓰기를 좋아하거나 또 병이 없는 자가 약을 먹기를 좋아하면 내장의 기가 연약하게 되며 더욱 병을 불러오게 한다.

[8-10] 고량진미(膏粱珍味)가 비록 입맛에는 좋으나 늘 먹으면 도리어 입맛을 잃는 것이니 양피나 양털 의복이 비록 추위를 잘 막지만 늘 입으면 추위를 타게 된다. 기름진 음식이나 양털 옷도 항상 먹고 입으면 오히려 좋지 않은데 하물며 약이야 이보다 더하지 않겠는가? 만일 늘상 약을 먹는 해로움을 논한다면 전혀 약을 먹지 않는 것보다 도리어 백배나 이롭지 못한 것이다. 대개 병이 있는 사람은 그 병증을 밝게 안다면 반드시 약을 먹어야 하고 병이 없는 사람은 비록 병세를 밝게 안다고 할지라도 반드시 약을 먹을 필요는 없다. 지나간 역사와 현세를 살펴보건대 아편을 피우거나 수은(水銀)·산삼(山蔘)·녹용(鹿茸) 같은 것을 자주 먹으면 목숨을 재촉하는 경우가 없지 않으니 이것을 가지고 미루어 보아도 가히 알 수 있을 것이다.

[8-11] 소음인 토혈(吐血)에 마땅히 독삼팔물탕(獨參八物湯)을 사용한다. 소음인 인후통(咽喉痛)에 마땅히 독삼관계이중탕(獨參官桂理中湯)을 사용한다.

[8-12] 일찍이 소음인이 입맛이 달아서 음식을 평상시보다 배를 더 먹더니 불과 1개월 내에 부종이 생겨서 죽는 것을 보았다. 소음인 식소(食消)는 부종에 속한 것으로써 매우 위험한 병세이다. 불가불 급히 치료를 해야 한다. 마땅히 궁귀총소이중탕(芩歸葱蘇理中湯)을 사용한다.

[8-13] 일찍이 소음인 부종병에 노루의 간 일부를 썰어서 회로 만들어 한 번에 다 먹고 계속하여 5번을 하니 그 병이 곧 나았고, 소음인 한 사람이 노루의 간 일부를 먹고 시력이 배로 좋아지고 원기가 솟구쳐 나왔다. 그러나 소양인이 허로병에 노루의 간 일부를 먹더니 피를 토하며 죽은 것을 보았다.

[8-14] 일찍이 소음인의 부종병에 어떤 의사가 소금에서 흘러내린 즙을 1일에 반 손갈씩 먹어보라고 가르쳐 주기에 4,5일 먹었더니 부종이 크게 줄어 1개월간을 먹고 오래도록 완건하여 병이 재발하지 않는 것을 보았다.

[8-15] 일찍이 소음인이 인후통(咽喉痛)이 1년이 지나도록 낫지 않는 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기

를 금사주(金蛇酒)를 먹여보라고 하여 먹었더니 낫는 것이다. 금사주는 금색 같은 누런 점들이 있는 뱀으로 술을 빚은 것이다.

[8-16] 일찍이 소음인의 이질병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 목이 붉은 뱀을 달여서 먹으라고 하여 달여서 먹고 낫는 것을 보았다. 항적사의 머리와 꼬리는 잘라버리고 명주 베 두 겹 주머니에 넣어서 약 항아리 안에 나무를 가로 걸쳐놓고 거기에 매달아 놓은 뒤에 물을 다섯 사발 붓고 달여서 한 사발이 되면 이를 복용한다. 두 겹 명주 주머니에 넣고 허공에 달아 달이는 것은 뱀의 뼈가 범할까 두렵기 때문이다. 뱀의 뼈는 독이 있다.

[8-17] 내가 본 바에 의하면 소음인 이질에 어떤 의사가 큰 마늘 3통과 꿀 반 손가락을 함께 달여서 3일간 먹이라고 가르쳐 주었는데 곧 효과를 보았다.

[8-18] 내가 본 바에 의하면 일찍이 소음인의 유방 근처 늑골 밑에 누창(漏瘡)이 나서 7, 8개월이 되도록 창구가 아물지 않으며 악즙(惡汁)이 늘 흘러내리는 것이다. 어떤 의사가 가르쳐 주기를 산삼말(山蔘末)·웅담말(熊膽末) 각 1분(分)을 불이라고 하여 불였더니 곧 효과를 보았다. 소음인 한 사람이 전신에 창(瘡)이 생긴 것을 인삼말(人蔘末)을 바르고 즉시 효과를 보았다.

[8-19] 내가 본 바에 의하면 소음인의 유방 근처에 내옹(內癰)이 발생한 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기를 화침(火針)으로 고름을 뽑아내도록 하였는데 또 말하기를 내옹의 외증(外證)이 오한·발열하는 것이 마치 상한병과 비슷하지만 일정한 곳에 압통점이 있는 것이니 그 아픈 곳을 잘 살펴서 고름이 들어 있는 것을 밝게 안다면 불가불 화침을 써야 하는 것이다.

[8-20] 내가 본 바에 의하면 소음인의 등창에 어떤 의사가 화도(火刀)로 그 종창을 절개하라고 가르쳐 주었다. 의사가 말하기를 화도로 등창을 째는 것은 가급적 빨리해야 하며, 만일 의심스럽게 여겨서 때를 놓치면 등 전체가 단단하게 굳어질 것이니 후회해도 소용이 없는 것이다.

[8-21] 내가 본 바에 의하면 소음인의 반신불수병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 담금질한 물을 먹으라고 하여 매일 먹고 효험이 있는 것을 보았다.

[8-22] 내가 본 바에 의하면 소음인 아이의 복학병(腹瘡病)에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 학질(瘡病)이 발(發)하는 이른 아침에 화하(火燬)한 금정비(金頂砒)를 쓰되 극히 세말(細末)하여 6리(厘)를 생감초 달인 물에 같이 복용하라 하니 곧 효과가 있었다. 의사가 말하기를 비약(砒藥)은 반드시 금정비(金頂砒)를 만들어서 써야 하고 또 화하(火燬)해야만 쓸 수가 있다고 한다. 그리고 먹는 분량은 1회에 6리(厘)가 넘어서도 안 되고 6리가 못 되어도 안 된다. 그것은 6리가 넘으면 약독이 두렵기 때문이고 모자라면 학질이 낫지 않는 것이다. 이 약은 여러 번 시험하고 자주 치험한 바가 있는 것으로 한 번 복용한 후 잠깐 학질이 나았다가 또 재발하는 자가 있으니 이러한 자에게 또 한 번 쓰면 그 병이 더욱 심하고 위태롭게 된다. 대개 이 약은 한 번만 쓸 것이고 다시 한 번 복용할 수 없다고 말하는 의사의 말을 듣고 그 이치를 궁리하여 본즉 한 번 복용한 후 병이 낫고 학질이 다시 재발하지 않는 자는 모두 소음인 아이이고 복용한 후 학질이 나았다가 또다시 재발하는 자는 모두 소음인 아이가 아닌 것이다. 오직 소음인 아이 복학병의 난치자(難治者)에 한하여 이 약을 쓸 것이고 보통 학질에는 이런 상서롭지 못한 약을 쓸 필요가 없는 것이다. 보통 하루 걸러 나타나는 소음인의 학질에는 오한증을 일으킬 때 천궁계지탕(川芎桂枝湯) 2-3첩을 쓰면 낫지 않는 것이 없고 배 속에 가득 차서 대변이 굳으면 학질을 발하는 자라도 마땅히 파두(巴豆)를 써야 한다.

[8-23] 백약(百藥)이 모두 좋지 않은 약이 없지만 오직 소음인의 신비약(信砒藥)과 태음인의 과채약(瓜蒂藥)은 가장 유해한 약이라고 할 수 있다. 왜냐하면 소음인의 신석과 비상을 백병(百病)에 써보면 모두 위태롭고 마침내 한 가지 학질(瘡病)만을 다스리는 성능이 있으니 역시 유명무실한 것이라 생각되며 그리고 더욱이 약독(藥毒)이 항상 위태로워서 걱정이 없는 것이 아니니 만일에 계지(桂枝)

· 인삼(人蔘) · 백작약(白芍藥) 등으로 3,4첩 연복(連服)하여 학질을 치료하는 것만 같지 못하니 이것이 세상에 만 번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가? 태음인의 과체약은 백병에 써 보아도 모두가 그 독이 위태로웠고 다만 담연(痰涎)이 응색(壅塞)된 증만을 다스리는 성능이 있으나 또한 유명무실하고 더욱 약독이 위태로워 늘 걱정이 없지 않는 것이다. 만일에 길경(桔梗) · 맥문동(麥門冬) · 오미자(五味子) 등으로 3,4첩을 복용하여 담연이 응색함을 치료하는 것만 같지 못하니 이것이 세상에 만 번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가. 이 두 가지 약은 외치(外治)에 쓸 수 있는 것이고 내복에는 쓰지 못할 약이다.

[8-24] 내가 본 바에 의하면 소음인이 중기병(中氣病)에 허가 굳어서 말을 못하였다. 한 의사가 합곡혈(合谷穴)에 침을 놓으니 그 효능이 신기하였고 그것 외에 또다른 여러 가지 병이 약으로 속효를 보지 못하는 것을 침으로 능히 속효를 보는 자가 있으니 대개 침혈도 역시 태양인 · 소양인 · 태음인 · 소음인의 사상인에 응용하는 혈로서 반드시 승강완속(升降緩束)의 묘리가 있는 것이다. 그런즉 이것은 불가불 잘 살펴야 한 즉 삼가 후세의 근후(勤厚)하고 활인(活人)하기 좋아하는 사람이 나타나기를 기다리고자 한다.

새로 정한 소음인병의 주요 24처방

황기계지부자탕  
인삼계지부자탕  
승양익기부자탕  
인삼관계부자탕

이 네 가지 처방은 모두 망양위병에 쓰는 약이다. 망양병 환자의 소변이 맑고 양이 많으면 위중하지만 여지가 있는 것으로 부자 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다. 소변이 붉고 양이 적으면 위중하면서도 여지가 없는 것으로 부자 2돈을 써서 하루에 2-3번 복용시킨다. 병이 장차 위중해지려고 할 때는 1돈을 쓰고 병이 위중한 것을 벗어나도 1돈을 쓰며 병을 조리할 때도 역시 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다.

승양익기탕

인삼 · 계지 · 황기 · 백작약 각2돈, 백하수오 · 관계 · 당귀 · 자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

보중익기탕

인삼 · 황기 각 3돈, 자감초 · 백출 · 당귀 · 진피 각 1돈, 곽향 · 소엽 각3푼, 또는 5푼, 생강 3쪽, 대조 2개.

황기계지탕

계지 3돈 · 백작약 · 황기 각 2돈,, 백하수오 · 당귀 · 자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개

천궁계지탕

계지 3돈, 백작약 2돈, 천궁 · 창출 · 진피 · 자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

궁귀향소산

향부자 2돈, 자소엽 · 천궁 · 당귀 · 창출 · 진피 · 자감초 각1돈, 총백 5뿌리, 생강 3쪽, 대조 2개.

곽향정기산

곽향 1돈5푼, 자소엽 1돈, 창출 · 백출 · 반하 · 진피 · 청피 · 대복피 · 계피 · 건강 · 익지인 · 자감초 각5푼, 생강 3쪽, 대조 2개.

팔물군자탕

인삼 2돈, 황기 · 백출 · 백작약 · 당귀 · 천궁 · 진피 · 자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

본 처방에 백하수오로 인삼을 대체하면 백하오군자탕이라 한다. 본 처방에 인삼과 황기 각 1돈을 쓰고 백하수오와 관계 각1돈을 더한 것을 십전대보탕이라 한다. 본 처방에 인삼 1냥, 황기 1돈을 쓴 것을 독삼팔물탕이라 한다.

향부자팔물탕

향부자 · 당귀 · 백작약 각 2돈, 백출 · 백하수오 · 천궁 · 진피 · 자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

일찍이 부인이 생각이 너무 많아 비장을 상하여 목이 말고 혀가 건조하며 은은하게 두통이 있는 경우를 치료하여 신묘한 효과가 있었다.

#### 계지반하생강탕

생강 3돈, 계지·반하 각 2돈, 백작약·백출·진피·자감초 각 1돈. 허한하여 구토를 하거나 수결홍 등의 증상을 치료한다.

#### 향사양위탕

인삼·백출·백작약·자감초·반하·향부자·진피·건강·산사육·사인·백두구 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

#### 적백하오관중탕

백하수오·적하수오·건강·량강·청피·진피·향부자·익지인 각1돈, 대조 2개.

사지가 무겁고 늘어지며, 소변이 시원하지 않고, 양도가 일어나지 않고, 장차 부종이 생길 조짐이 있을 때 쓴다. 본 처방에 후박·지실·목향·대복피 각5푼을 더하면 또한 기맥을 통하게 하는 효과가 있다. 본 처방에 인삼으로 적하수오를 대체하면 인삼백하오관중탕이라 하며, 당귀로 적하수오를 대체하면 당귀백하오관중탕이라 한다. 옛 처방으로 건강·량강·청피·진피 등을 같은 분량으로 하여 다리거나 환을 만든 것을 관중탕이라 하는데, 일찍이 소음인이 소변이 시원하지 않고, 양도가 일어나지 않으며, 사지가 무겁고 늘어져 힘이 없는 경우에 썼는데 반드시 효과가 있는 것이 백발백중이었다. 또 관중환 본 처방에 오령지·익지인 각1돈을 더하면 복통을 치료하는데 신묘한 효과가 있다.

#### 산밀탕

백하수오·백출·백작약·계지·인진·익모초·적석지·앵속각 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개, 대산 5뿌리, 청밀 반 숟가락.

이질을 치료한다.

#### 계삼고

인삼 1냥, 계피 1돈, 닭 1마리.

진하게 달여서 복용하는데, 혹은 호초, 청밀로 맛을 돋우는 것도 무방하다. 이 처방은 예로부터 있던 처방으로 학질, 이질을 치료하는데 신묘한 효과가 있다. 일찍이 오래된 학질에 먼저 파두를 써서 대변을 보게 하고, 이어 수삼일을 연이어 계삼고를 쓰니 아주 효과가 있었다. 계피는 혹은 계심으로 바꾸어 대신 쓸 수 있다.

#### 파두단

파두 한 알. 껍질을 제거하고 알갱이를 따뜻한 물로 한 알 또는 반 알을 먹으며, 이어 탕약을 달인다. 약을 달이는 시각에 파두는 홀로 장위 사이에 작용하며 거의 약력이 쓰여진 후에 탕약을 복용하면 파두와 같이 다니며 장위를 시원하게 통하게 하며 그 기운을 끌어올리게 된다. 다시 약을 달여서 대변이 통한 후에 다시 연이어 복용해야 한다. 파두 한 알은 설사를 시키고, 반 알은 적을 없앤다.

#### 인삼진피탕

인삼 1냥, 생강·사인·진피 각1돈, 대조 2개.

본 처방에 포건강으로 생강을 대체하거나 계피 1돈을 더하면 더욱 위를 덥히고 냉기를 쫓아내는 힘이 있게 된다. 본 처방으로 일찍이 돌이 되지않은 아이의 음독만경풍을 치료한 적이 있는데, 연이어 수 일 동안 복용시켜 병이 흔쾌히 나았으며, 병이 나은 후에 다시 약을 먹이지 않았더니 재발하여 치료할 수 없었다.

#### 인삼오수유탕

인삼 1냥, 오수유·생강 각2돈, 백작약·당귀·관계 각1돈.

#### 관계부자이중탕

인삼 3돈, 백출·포건강·관계 각2돈, 백작약·진피·자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

#### 오수유부자이중탕

인삼·백출·포건강·관계 각2돈, 백작약·진피·자감초·오수유·소회향·파고지 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

#### 백하오부자이중탕

백하수오 · 백출(볶는다) · 백작약(약간 볶는다) · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 · 포부자 각1돈.

백하오이중탕

백하수오 · 백출 · 백작약 · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 각1돈.

인삼이 있으면 인삼을 쓰고, 인삼이 없으면 백하수오를 쓴다. 백하수오와 인삼은 그 성질과 기미가 서로 유사하나, 기운을 맑게 하고 널리 퍼지게 하는 힘은 미치지 못하고, 덥혀서 보하는 힘은 지나치니 같고 다름이 없지는 않다. 험병과 위증에 인삼 2돈 이상을 쓸 때는 백하수오로 모두 대신 쓸 수는 없다. 옛 처방에는 경험이 많지 않으므로 이 약재가 생소했던 것이다. 그러나 이 약만은 보약 중에서 뺄 수 없는 것이니, 옛 처방의 하인음은 백하수오 5돈을 써서 학질을 치료하였다.

이상의 소음인의 여러 약 중에 부자는 구워서 쓰고, 감초는 볶아서 쓰며, 건강은 구워서 쓰거나 날 것으로 쓰고, 황기는 구워서 쓰거나 날 것으로 쓴다. 궁벽한 산간 벽지에서 갑자기 병이 생길 때, 속수무책으로 그냥 놔두는 것보다 비록 단방이라도 쓰는 것이 좋다. 양명병에 황기 · 계피 · 인삼 · 작약 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있으며, 소음병에 부자 · 작약 · 인삼 · 감초 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 태양병에 소엽 · 총백 · 황기 · 계지 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있고, 태음병에 백출 · 건강 · 진피 · 곽향 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 먼저 단방을 쓰더라도 한편으로 온전한 처방을 구하여 쓴다면 병을 고칠 기회를 놓치지 않을 것이다. 그러나 약을 쓸 때에는 처방 중에 들어 있는 약만을 써야 하며, 처방에 없는 것은 써서는 안 된다.

동의수세보원 3권

소양인 비수한표한병론(45조)

[9-1] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병에 맥이 부(浮)하고 긴(緊)하며 열이 나고 추위를 싫어하며 몸이 아프고 땀이 나지 않으면서 번조(煩燥)하면 대청룡탕(大靑龍湯)을 쓴다고 하였다.

[9-2] 나는 논하기를 열이 나고 추위를 싫어하며 맥이 부하고 긴하며 몸이 아프며 땀이 나지 않으면서 번조한 것은 곧 소양인의 비(脾)가 찬 것을 받아 걸이 찬 병이니 이 증에는 대청룡탕(大靑龍湯)은 쓰지 말고 형방패독산(荊防敗毒散)을 써야 한다.

[9-3] 장중경(張仲景)이 말하기를 소양(少陽)의 병이 되면 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈앞이 어릿어릿하다.

[9-4] 눈앞이 어릿어릿하고 입이 쓰며 혀가 마르는 것은 소양(少陽)에 속한다.

[9-5] 입이 쓰고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것은 소양상풍증(少陽傷風證)이다.

[9-6] 입이 쓰고 목 안이 마르고 눈이 어릿어릿하고 귀가 먹고 가슴과 옆구리가 그득하며 또는 추웠다 더웠다 하며 구역질하는 것은 소양에 속하니 토법(吐法)과 하법(下法)은 경계해야 하고 소시호탕(小柴胡湯)으로 화해시켜야 한다고 하였다.

[9-7] 나는 말하기를 이와 같은 증에는 소시호탕(小柴胡湯)을 써서는 안 되고 형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 한다.

[9-8] 장중경(張仲景)이 말하기를 소양병에 입이 쓰고 목 안이 마르며 가슴과 옆구리가 그득하며, 또는 추웠다 더웠다 하는 증은 곧 소양인의 신국(腎局)의 음기(陰氣)가 열사(熱邪)에 빠지는 바가 되고, 비국(脾局)의 음기(陰氣)는 열사(熱邪)에 막히는 바가 되어 아래로 내려가서 신국에 연접하지 못하게 되어 등골 사이에 엉기어 모여 아교(阿膠)와 같이 굳어지면 갇혀서 막힌 병이다. 이 증에 구역이 나는 것은 바깥 찬 기운이 속의 열을 싸서 병을 끼고 위로 올라가기 때문이며, 한열(寒熱)이 왕래(往來)하는 것은 비국의 음기가 내려가려 하나 내려가지 못하다가 더러 내려가는 까닭에 한열이 왔다 갔다 하는 것이고, 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿하며 귀가 먹는 것은 음기가 등골 사이에 갇혀서 갇히게 되어 내려가지 못하는 까닭에 다만 숨기만 하고 열이 없어서 귀가 먹게 되는 것이다. 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿한 것은 예사로운 증상이나 귀가 먹는 것은 중한 증상이다. 가슴과 옆구리가 그득한 것은 결흉(結胸)으로 진행되는 징조이나 옆구리가 그득한 것은 오히려 가벼운 것이고 가슴이 그득한 것은 중한 증상이다. 옛 사람들이 이 증에 한(汗) · 토(吐) · 하(下)의 삼법(三法)을 쓰면 번번이 헛소리하는 괴증(壞證)이 생겨서 병이 더욱 위험하게 되는 까닭에 중경(仲景)이 이것을 변통하여 소시호탕(小柴胡湯)을 이용하여 담(痰)을 맑게 하고 담을 마르게 하

고 찬 약과 더운 약을 섞어서 골고루 화해시킴으로써 그 병의 전변(轉變)을 막아 스스로 낫도록 만  
들고자 하는 것이다. 이러한 법을 한(汗)·토(吐)·하(下)의 삼법으로 논한다면 잘되었다고 할 만하  
나 이 소시호탕(小柴胡湯) 역시 골고루 화해시켜 병의 전변(轉變)을 막는 약은 아니니 옛날부터 지  
금까지 이러한 병을 얻은 자는 진실로 한심하다. 귀가 먹고 가슴이 그득한 상풍병(傷風病)이 어찌  
소시호탕(小柴胡湯)으로 치료할 수 있겠는가? 아! 후세에 와서 공신(龔信)이 창제한 형방패독산(荊  
防敗毒散)이 어찌 소양인의 표한병(表寒病)의 삼신산불사약(三神山不死藥)이 아니겠는가? 이 증은  
이열(裏熱)을 맑게 하고 표음(表陰)을 내리면 담음(痰飲)이 저절로 흩어지며 결흉(結胸)의 증도 예방  
하여 생기지 못하게 할 것이다. 담을 맑게 하거나 말리면 음을 내리고 담을 흩어지게 하는 데 이익  
이 없고 공연히 병을 끌어오다가 장차 결흉(結胸)이 될 것이며, 또는 다른 괴상한 증이 생기게 된다.  
[9-9] 주공(朱肱)이 말하기를 무릇 땀을 내는데 허리 이상에서는 비록 땀이 줄줄 흐르더라도 허리  
아래와 발까지가 약간 축축하면 병이 결국 풀리지 않는다.

[9-10] 나는 논하기를 소양인의 병의 표병(表病)과 이병(裏病)을 막론하고 손·발바닥에 땀이 있  
면 병이 풀리고 손바닥과 발바닥에 땀이 없으면 비록 전체에 모두 땀이 있다 하여도 병이 풀리지  
못한다.

[9-11] 소양인의 상한병(傷寒病)이 재통(再痛)하거나 삼통(三痛)하여 땀을 내고 낫는 경우가 있는데  
이 병은 두 번, 세 번 풍한(風寒)에 감촉되어 재통에 땀을 내고 삼통에 땀을 내는 것이 아니다. 소양  
인이 머리가 아프고 뒤통수가 뻐뻐하며 추웠다 더웠다 하고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것이 더욱 심  
한 증은 원래 이러한 것이니, 표사(表邪)가 깊이 맺혀서 삼통에 이른 연후에야 바야흐로 풀리는 것  
이다. 초통(初痛)·재통(再痛)·삼통(三痛)을 막론하고 형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊  
防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 매일 두 첩씩 쓰되 병이 풀릴 때까지 쓰며 병이 풀린 후  
에도 10여 첩을 더 쓸 것이니, 이렇게 하면 저절로 뒤탈이 없고 완전히 건강해질 것이다.

[9-12] 장중경(張仲景)이 말하기를 소양증(少陽證)에 축축하게 땀이 나고 명치 아래가 더부룩하고  
땀땀하고 그득하고 옆구리가 당기며 아래까지 아프고 헛구역이 나고 숨을 짧게 쉬되 추위를 싫어  
하지 않는 것은 밖은 풀렸으나 속은 풀리지 못한 것이니 십조탕(十棗湯)이 좋다. 만일 하법(下法)을  
써야 하는데 하법(下法)을 쓰지 않으면 그 사람은 창만(脹滿)이 생기고 온몸에 부종(浮腫)이 생기게  
된다.

[9-13] 상한(傷寒)에 표증(表證)이 풀리지 않았는데 의사가 잘못하여 하법(下法)을 쓰면 흉격(胸膈)  
안이 막히어 아파서 손을 댈 수 없으며 명치 아래가 그득하고 땀땀하며 아픈 것은 결흉(結胸)이 된  
것으로 대함흉탕(大陷胸湯)이 좋다.

[9-14] 갈증이 나서 물을 마시고자 하나 물이 들어가면 곧 토하는 것을 수역(水逆)이라 하는데 오령  
산(五苓散)을 주로 쓴다.

[9-15] 두임(杜壬)이 말하기를 속이 아직 풀리지 않은 것은 대개 담(痰)과 조(燥)한 기운이 중초(中  
焦)에 막힌 것이다. 그러므로 머리가 아프고 헛구역을 하고 땀이 나는 것은 담이 막힌 것이니 십조  
탕(十棗湯)이 아니면 치료하지 못한다.

[9-16] 공신(龔信)이 말하기를 명치 아래가 땀땀하고 아파서 손을 가까이 대지 못하고 조갈(燥渴)증  
이 나고 헛소리를 하며 변비가 심하고 맥이 침(沈)하며 실(實)하고 힘이 있는 것을 대결흉(大結胸)이  
라 하는데 대함흉탕(大陷胸湯)으로 설사시켜야 한다. 이때 도리어 번조(煩燥)증이 더하게 되면 죽는  
다. 소결흉(小結胸)은 바로 명치 아래에 있어서 누르면 아픈 것이니 소함흉탕(小陷胸湯)이 마땅하  
다.

[9-17] 나는 논하기를 위의 장중경(張仲景)이 말한 세 가지 증은 모두 결흉병(結胸病)인데 흉격 안이  
막히고 아파서 손을 댈 수 없고 입이 마르고 갈증이 나며 헛소리하는 것은 결흉(結胸)의 가장 심한  
증상이고 물을 마시고 싶어 하나 물을 마시면 곧 토하고 명치 아래가 땀땀하고 그득하며 헛구역이  
나고 숨이 찬 것은 그 다음 가는 증상이다. 대개 결흉병(結胸病)은 약을 먹으면 곧 토하는데 오직 감  
수(甘遂) 가루를 입에 넣어 침으로 삼키고 따뜻한 물로 양치질하여 넘기면 약을 도로 토하지 않는  
다. 일찍이 결흉을 치료하는데 감수산(甘遂散)을 따뜻한 물에 먹었더니 다섯 번은 도로 토하고 여섯  
번째에 이르러 다시 토하지 않고 설사를 한 차례 했다. 이튿날 또 물을 마시면 토하여 다시 감수(甘  
遂)를 사용하니 바로 설사를 하고 병이 나았다. 무릇 결흉은 험증(險證)이 아닌 것이 없으니 마땅히  
먼저 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 형방도적산(荊防導赤散)을 달여 먹여서 병을 눌러야 한다. 헛구역질

하고 숨이 차나 약을 다시 토하지 않는 경우에는 감수(甘遂)를 쓰지 말고 단지 형방도적산(荊防導赤散)에 백복령(白茯苓)과 택사(澤瀉) 각각 1돈을 더 넣어서 쓰는데 2,3회 먹되 또 연일(連日) 먹으면 역시 병이 낫는다. 조갈(燥渴)하고 헛소리하는 것은 더욱 심한 험증(險證)이니 급히 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 지황백호탕(地黃白虎湯) 3,4첩으로 누르고 또 연일 지황백호탕(地黃白虎湯)을 먹는다. 장중경(張仲景)이 말하길 상한(傷寒)에 표증(表證)이 아직 풀리지 않았는데 의사가 도리어 설사시킨다고 한 것은 승기탕(承氣湯)으로 설사시킨 것을 이르는 것이며 십조탕(十棗湯)이나 함홍탕(陷胷湯)을 이르는 것은 아니다. 그러나 십조탕(十棗湯)과 함홍탕(陷胷湯)도 감수(甘遂) 한 가지만 사용하거나 또는 감수천일환(甘遂天一丸)을 쓰는 것만 못하다. 결흉(結胷)에 감수(甘遂) 가루를 보통 3푼(分)을 쓰고 대결흉(大結胷)에는 5푼(分)을 쓴다. 공신(龔信)이 말한 바 조갈(燥渴)하고 헛소리를 하며 번조(煩躁)하여 죽을 지경인 경우에도 만일 십조탕(十棗湯)으로 설사시킨 후에 헛소리하는 증을 다스리고 연이어 백호탕(白虎湯)을 사용하면 번조(煩躁)한 것도 반드시 치료하지 못할 수 없다.

[9-18] 감수(甘遂)는 표한(表寒)병에 물이 막힌 것을 헤치는 약이고, 석고는 이열(裏熱)병에 대변을 통하게 하는 약이다. 표병에는 감수(甘遂)를 쓸 수 있으나 석고는 쓸 수 없고, 이병에는 석고를 쓸 수 있으나 감수(甘遂)는 쓸 수 없다. 그러나 손발을 내젓고 물을 들이키고 설사를 하는 증에는 석고를 써야 하고, 팔·다리가 저리고 무릎이 시리고 대변이 막힌 증에는 감수(甘遂)를 써야 한다.

[9-19] 소음인의 상한(傷寒)병에 아랫배가 똥똥하고 그득한 증이 있고, 소양인의 상한(傷寒)병에 명치 아래에 결흉(結胸)증이 있으니, 이 두 가지 증은 다 같이 표기(表氣)의 음양이 허약하여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 다투어 여러 날 쾌유되지 못하는 증에 속의 기운 역시 비삽(秘澁)하고 고르지 못하여 이와 같은 증세로 변한 것이다.

[9-20] 이자건(李子建)의 《상한십권(傷寒十勸)》에 말하기를 상한(傷寒)에 배가 아픈 것에 열증도 역시 있으니 가벼이 온난한 약을 복용해서는 안 된다. 또 말하기를 상한(傷寒)에 저절로 설사가 나는 것은 마땅히 음증인지 양증인지 보아야 할 것이니 예사로이 온난한 약이나 설사를 막는 약을 복용해서는 안 된다.

[9-21] 주진형(朱震亨)이 말하기를 상한(傷寒)의 양증에 몸에서 열이 나고 맥이 삭(數)하며 조갈(燥渴)하여 물을 찾으며 대변이 저절로 설사하는 경우에는 시령탕(柴苓湯)이 마땅하다.

[9-22] 반룡산(盤龍山) 노인이 말하기를 소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사하는 경우에는 당연히 저령차전자탕(猪苓車前子湯)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 쓸 것이며 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우에는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦參湯)이나 형방지황탕(荊防地黃湯)을 써야 한다. 이러한 병을 망음병(亡陰病)이라 한다.

[9-23] 소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사가 있다가 1,2일 또는 3,4일 후에 설사가 이유 없이 그치나 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 낫지 않으며 대변이 도리어 막히는 것은 이것은 위증(危證)이니 머지않아 헛소리를 하게 된다.

[9-24] 설사한 후에 1주야간(晝夜間)에 간신히 한 번 활변(滑便)을 보거나 또는 3, 4, 5회 조금씩 활변(滑便)을 보고 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 그대로 있는 것은 변비가 될 징조다. 헛소리하기 전에 이러한 증상이 있으면 헛소리를 며칠 사이에 반드시 할 것이고, 헛소리한 후에 이러한 증상이 있으면 반드시 금방 풍이 일어날 것이다.

[9-25] 소양인이 갑자기 토하는 것은 반드시 괴상한 증상이 생길 것이니 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓴 후 그 동정을 살펴서 몸에 열이 있고 머리가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 석고를 써야 하고, 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 황련(黃連)과 고삼(苦參)을 써야 한다.

[9-26] 일찍이 돌이 채 안된 소양인 아이가 갑자기 한 번 토한 다음 설사를 하고 몸에 열이 있고 머리가 아프며 손발을 내젓고 몸을 옆치락뒤치락하며 물을 많이 마시고 설사를 4,5,6회 하여 횟수를 알 수 없는 것을 형방사백산(荊防瀉白散)을 하루에 3첩, 이틀에 6첩을 쓰고서야 설사가 그치고 몸에 열이 나고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어졌다. 다시 5,6첩을 더 쓰고 안정이 되었다.

[9-27] 소양인이 몸에 열이 나고 머리가 아프며 손발을 내젓고 물을 많이 마시는 것은 이것은 위험한 증상이니 비록 설사를 하여도 반드시 석고를 사용해야 하니 설사가 있고 없음을 막론하고 마땅히 형방사백산(荊防瀉白散)에 황련과 과루인을 각각 1돈(錢)을 더 넣고 쓰든지 아니면 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 한다.

[9-28] 무릇 소양인이 몸에 열이 있고 머리가 아프면 이미 가벼운 증상이 아닌데 겸하여 설사를 하는 것은 위험한 증상이니 반드시 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하는데 하루에 2,3회 복용하고 또 한 연일 복용하여 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어진 뒤라야 비로소 위험을 면할 수 있다.

[9-29] 소양인이 몸이 차고 배가 아프며 하루 밤낮 동안 설사를 3, 4, 5회 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦蓼湯)을 써야 하고 몸이 차고 배가 아프나 2,3일 밤낮을 설사를 하지 않거나 또는 간신히 1번 설사를 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦蓼湯)을 쓰거나 또는 숙지황고삼탕(熟地黃苦蓼湯)을 써야 한다.

[9-30] 일찍이 한 소양인이 항상 배가 아파서 고통 받는 사람을 본 일이 있는데 육미지황탕(六味地黃湯) 60첩을 쓰고 병이 나았다. 또 10여 년 동안 복통으로 고생하는 소양인을 본 일이 있는데 한 번 아프기 시작하면 5-6개월 또는 3-4개월, 1-2개월 동안 고통을 호소하였는데 매번 아프기 시작할 때마다 급히 활석고삼탕(滑石苦蓼湯) 10여 첩을 쓰고 아프지 않을 때에는 마음을 편안케 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 화내는 마음을 경계하였다. 그렇게 하기를 1년을 하였더니 병이 나았다. 또 소양인 소년이 항상 체증(滯症)이 있어 배가 더부룩하고 그득하며 간혹 배가 아프고 허리가 아팠으며, 또 구안와사(口眼喎斜) 초기 증상이 있는 것을 보았는데 독활지황탕(獨活地黃湯)을 100일 안에 200첩을 먹이고 마음을 편안히 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 노여워하는 마음을 경계하게 하였더니 100일 이 되어 몸이 건강해지고 병이 나았다.

[9-31] 옛 의사들이 머리는 차서 아픈 경우는 없고 배는 더워서 아픈 경우는 없다고 하였는데 이 말은 틀린 말이다. 어쩌서 그런가 하니 소음인은 원래 찬 기운이 많기 때문에 머리 아픈 것도 역시 더워서 아픈 것이 아니고 차서 아픈 것이며, 소양인은 원래 더운 기운이 많기 때문에 배가 아픈 것도 역시 차서 아픈 것이 아니라 더워서 아픈 것이다. 옛 의사들이 또한 말하기를 땀을 많이 흘리면 망양(亡陽)이 되고 설사를 많이 하면 망음(亡陰)이 된다고 하였는데 이 말은 맞는 말이다. 어쩌서 그런가 하니 소음인은 비록 찬 기운이 많다고 하나 그러나 음(陰)이 성(盛)하여 양(陽)과 다투어 패(敗)한 양(陽)이 밖으로 달아나게 되니 번열(煩熱)이 나며 땀을 많이 흘리게 된다. 이것을 일컬어 망양병(亡陽病)이라 한다. 소양인은 비록 더운 기운이 많으나 그러나 양이 성하여 음과 다투어 패한 음이 안으로 도망가니 찬 것을 두려워하고 설사를 많이 하게 되는데 이것을 일컬어 망음병(亡陰病)이라 한다. 망양병(亡陽病)과 망음병(亡陰病)은 약을 쓰지 않으면 반드시 죽고 급히 치료하지 않으면 반드시 죽는다.

[9-32] 망양(亡陽)이라는 것은 양이 위로 올라가지 못하고 도리어 아래로 내려가게 되어 망양(亡陽)이라 하고, 망음(亡陰)이라는 것은 음이 아래로 내려가지 못하고 도리어 위로 올라가게 되어 망음(亡陰)이라 한다. 음이 성하여 위에서 양과 다투면 양이 음에게 억눌리게 되어 흉격(胸膈)에 올라가지 못하고 아래로 대장에 빠져 밖으로 방광에 도망하니 등의 겉에 번열하면서 땀이 난다. 번열하면서 땀이 나는 것은 양이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 얼음 같고 밖은 숯불 같다는 것이니 양이 장차 없어지려는 징조이다. 양이 성하여 아래에서 음과 다투면 음이 양에게 막힘을 받아 방광으로 내려가지 못하고 위로 배려로 거슬러 올라가서 흉격 속으로 도망하니 장위(腸胃)가 찬 것을 싫어하고 설사를 한다. 찬 것을 두려워하고 설사하는 것은 음이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 숯불 같고 밖은 얼음 같다는 것이니 음이 장차 없어지려는 징조이다.

[9-33] 소음인의 병에 첫날 땀을 내는데 양기(陽氣)가 위로 올라가 인중혈(人中穴)에서 먼저 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 땀이 멈추지 않고 병이 낫지 않는 것은 양이 위로 올라가지 못하는 것이니 망양(亡陽)임을 의심할 필요가 없다. 소양인의 병에 첫날 설사를 시켜서 음기(陰氣)가 아래로 내려가 손바닥과 발바닥에서 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 설사가 그치지 않고 병이 낫지 않는 것은 음이 아래로 내려가지 못하는 것이니 망음(亡陰)임을 의심할 필요가 없다. 무릇 망양증(亡陽證)과 망음증(亡陰證)은 의학의 이치를 명확히 아는 경우라야 병들기 전에 미리 증을 파악하여 예방할 수 있고 병든 지 1,2일이 지나면 명백하게 쉽게 알 수 있다. 3일이 되면 비록 우둔한 사람이라도 증세를 알아내는 것이 역시 불을 보는 것처럼 환할 것이다. 약을 씹어 있어서는 반드시 2,3일을 넘기지 말아야 할 것이다. 4일이면 늦을 것이고 5일이면 위태로울 것이다.

[9-34] 소음인으로 평상시에 속이 답답하고 땀이 많은 경우에 병이 생기면 반드시 망양(亡陽)이 되

고, 소양인으로 평상시 걸이 차고 설사를 많이 하는 경우에 병이 생기면 반드시 망음(亡陰)이 된다. 망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 되는 사람은 평상시 음을 보하거나 양을 보하여 미리 치료하는 것이 마땅하고 망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 이르러 병을 얻어 위험하게 된 연후에 병을 치료하는 것은 마땅하지 않다.

[9-35] 소음인의 병이 낫는 경우의 땀은 인중(人中)에서 먼저 땀이 나고 한 번 발한(發汗)시켜도 가슴이 시원하고 활발해지나 망양(亡陽)이 된 경우의 땀은 인중(人中)에서 땀이 나고 나지 않음에 관계없이 여러 번 땀을 내도 가슴이 답답하고 조(躁)하며 기운이 없어진다. 소양인이 병이 낫는 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에 먼저 땀이 나고 한 번 설사시켜도 바깥 기운이 맑고 평안해지고 정신이 상쾌하고 명랑해지나, 망음(亡陰)이 된 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에서 땀이 나지 않고 여러 번 설사를 시켜도 바깥 기운이 거슬러서 차고 정신이 흐릿하다.

[9-36] 소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기(正氣)와 사기(邪氣), 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타나나, 소음인의 망양병(亡陽病)이나 소양인의 망음병(亡陰病)은 정기와 사기, 음과 양이 적수(敵手)가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 처음 증이 벌써 험증(險證)이 계속되고 그로 인하여 위증(危證)이 되는 것이다. 병사(兵士)를 썸에 비유한다면 양군이 대전하여 첫날 싸워서 정병(正兵)이 사병(邪兵)에 패하게 되어 정병의 얼마의 병수를 잃고 2일에 또 싸워서 다시 패하여 병사의 얼마를 다시 잃고 3일에 다시 싸워 또 패하여 병사의 얼마를 다시 잃으니 이 3일간 싸운 것으로 본다면 장차 싸움이 계속될수록 계속 패하게 되어 더욱더 병사를 잃을 것이다. 만일 4일에 다시 싸우고 5일에 다시 싸운다면 정병의 전군이 전멸할 것을 가히 알 수 있다. 그렇기 때문에 약을 썸에 있어서도 반드시 3일을 넘겨서는 안 된다.

[9-37] 반룡산(盤龍山) 노인이란 것은 이가(李家) 노인이 살고 있는 곳에 반룡산(盤龍山)이 있기 때문이니 이가(李家) 노인이 스스로 반룡산 노인이라 한 것이다. 이 책 가운데 '나는 논하기를'이라고 말한 구절은 반룡산 노인의 말이 아닌 것이 없으나 이 장에서 특히 반룡산 노인이라고 들어 말한 것은 대개 망양(亡陽)과 망음(亡陰)은 가장 험한 증인데도 사람들이 심상하게 보아서 예사로이 쉽게 치료하므로 특별히 반룡산 노인의 이름으로 크게 외쳐 경각심을 가지도록 하는 것이다.

[9-38] 망음증(亡陰證)에 대하여서는 옛 의사들이 별로 약을 쓰는 경험에 대해서 말한 이가 없고 이 자건(李子建)·주진형(朱震亨)의 저서 중에 약간 논급하였으나 그러나 명확한 경험은 없다. 이 병은 예로부터 지금까지 사람을 죽이는 것이 맹랑하고 매우 신속해서 경험으로 이치를 찾아낼 겨를이 없었기 때문이다.

[9-39] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 풀리지 않아 소양(少陽)으로 전입(轉入)된 것은 옆구리 아래가 땀땀하고 그득하며 헛구역이 나고 먹지를 못하고 추웠다 더웠다 하는 것이니 아직 토하거나 설사시키지 않고 맥이 침(沈)·긴(緊)한 경우라면 소시호탕(小柴胡湯)을 투여한다. 만일 이미 토하게 하거나 설사시키거나 땀을 내어 헛소리하는 것은 시호증(柴胡證)이 없어진 것이고 이것을 괴병(壞病)이라 하니 괴병(壞病) 치법에 의거해야 한다.

[9-40] 상한(傷寒)에 맥이 현(弦)하고 세(細)하며 머리가 아프고 열이 나는 것은 소양(少陽)에 속하니 땀을 내서는 안 되는데 땀을 내면 헛소리한다.

[9-41] 일찍이 소양인 상한(傷寒)에 발광(發狂)을 하고 헛소리하는 것은 치료한 적이 있는데 때는 을해년(乙亥年) 청명(淸明) 시기였다. 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 한(寒)이 많고 열(熱)이 적은 병에 걸려 4-5일 후 오미시(午未時)에 숨이 차고 호흡이 급한데 이때에 경험이 부족하여 단지 소양인의 약을 썸에 육미탕(六味湯)이 최고로 좋은 줄만 알아서 감히 다른 약은 쓸 생각을 못하여 다만 육미탕 1첩을 썼더니 병인이 숨이 찬 것이 즉시 진정되었다. 또 수일 후에 병인이 발광(發狂)하고 헛소리하며 숨이 찬 것이 다시 발생하여 또 육미탕 1첩을 썼는데 숨이 찬 것이 비록 조금 안정되었으나 전일과 같이 진정되지는 않았다. 병인이 3일을 이어서 발광하더니 오후에 숨이 찬 것이 다시 발생하여 다시 육미탕을 쓰니 숨이 찬 것이 조금도 안정되지 못하고 잠시 있다가 혀가 말리고 풍이 동하며 이를 악물고 말을 못하게 되니 여기에 비로소 육미탕으로 될 수 없는 것을 알고 급히 백호탕(白虎湯) 1첩을 달여 대나무 관으로 병인의 코에 넣어넣어 목구멍으로 넘어가게 하고 그 동정을 살피니 혀가 말리고 이를 악문 증상은 풀리지 않고 환자의 뱃속에서 약간 소리가 났다. 그래서 2개의 화로로 약을 달여 계속해서 코에 3첩을 부어넣었더니 환자의 뱃속에서 큰 소리가 나고 방귀가

나왔다. 세 사람이 도와서 환자를 붙들고 대나무 관으로 코에 약을 붙여넣으니 환자의 기력이 더욱 강하여 세 사람이 도와서 붙드는 힘으로는 거의 당하지 못하였다. 다시 쿣속으로 약을 부어 미신시(未申時)로부터 해자시(亥子時)에 이르기까지 석고를 8냥을 썼는데 마지막에 환자의 뱃속이 대단히 부르고 각궁반장(角弓反張)의 증세가 나더니 각궁반장한 후에 잠시 있다가 땀이 나고 잠이 들었다. 이튿날 동이 틀 때 환자에게 또 백호탕(白虎湯) 1첩을 먹고 해가 돋은 후에 활변(滑便)을 한 번 보고서 병이 나았다. 병이 나은 후에 눈병이 나서 석고와 황백(黃柏) 가루 각각 1돈을 하루에 2번씩 먹이니 7,8일 후에 눈병이 역시 나았다. 그때는 아직 대변으로 징험하는 법을 알지 못하였으므로 대변을 며칠이나 보지 못하였는지를 살피지 못하였으나, 생각컨대 그 환자는 먼저 표한(表寒)병을 얻은 후에 대변이 막혀서 이러한 증이 발생하였을 것이다.

[9-42] 그 후에 또 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 열(熱)이 많고 한(寒)이 적은 병을 얻어 어떤 사람이 꿩고기탕을 먹게 하여 이에 양독발반(陽毒發斑)이 되었기에 내가 이르기를 백호탕(白虎湯) 3첩을 계속 복용하라 하였으나 그 사람은 다만 반첩을 먹었다. 수일 후에 헛소리하고 병이 중하여 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니, 환자의 겉으로 나타난 증상은 정신이 혼미하여지고 벌써 풍이 동할 징조가 보이고 귀가 먹고 헛소리하고 혀 위에 백태(白苔)가 끼여 있었다. 약 주머니에 다만 석고 1근과 활석 1냥만 있고 다른 약은 없었으므로 급히 석고 1냥과 활석 1돈을 달여서 한꺼번에 먹이고 그 이튿날 또 석고 1냥, 활석 1돈을 먹였더니 2일간은 대변이 막힌 것이 하루 밤낮밖에 지나지 않았다. 3일째가 되어 환자의 집에서 석고를 너무 많이 쓴다 하여 집으로 돌아왔기 때문에 그날은 석고를 쓰지 못했다. 4일째가 되어 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니 환자가 대변이 막힌 것이 이틀 밤을 지나고도 하루 낮이 되니 말이 분명하지 않고 입을 꼭 물어서 물 마시는 것이 들어가지 않았다. 급하게 석고 2냥을 달여 간신히 목구멍으로 넘겨 보내니 절반은 토하고 절반은 넘어가서 잠시 후에 입은 열렸으나 말이 분명치 못한 것은 전과 같았다. 다시 석고 1냥을 연이어 쓰고 그 이튿날에는 오후에 풍이 동하면 약이 목구멍으로 넘어가지 못할 염려가 있어서 미리 오전에 약을 써서 풍이 동하는 것을 예방하고 또 5,6일 석고를 썼으니 전후(前後)로 쓴 석고가 무릇 14냥이 되었다. 나중에 수일 동안 발광(發狂)을 하고 나서 말소리가 웅장해지면서 병이 나았다. 수개월 후에 대문 밖을 나가게 되었다.

[9-43] 그 후에 또 소양인 한 사람이 처음에 몸에 열이 나고 머리가 아픈 표한(表寒)병이 걸렸는데 그 사이에 황련(黃連)·과루인(瓜蒌仁)·강활(羌活)·방풍(防風) 등에 속하는 약을 썼으나 병세가 좀 낫기는 하나 사뭇 쾌히 낫지 못하더니 이어 발광한지 3일이 되었다. 환자의 집에서는 가벼운 일 반적인 증상으로 보고 다만 황련과 과루인 등에 속하는 약만 쓰다가 또 헛소리한지 수일에 비로소 지황백호탕(地黃白虎湯) 1첩을 쓰기 시작했다. 그 다음날 오후에 풍이 동하여 급히 지황백호탕을 달여 3첩을 계속 써서 구급하니 간신히 목구멍으로 내려갔다. 그 다음날에도 백호탕(白虎湯)에 석고 1냥을 더하여 오전에 썼는데 풍이 동할 것을 대비하기 위함이고 3일을 계속하여 석고를 쓰니 환자가 스스로 일어나 앉고 서고 대소변도 보게 되어 병세가 전에 비하여 쾌히 덜하고 회복되었으나 불행하게도 병이 조금 낫다가 다시 나빠졌는데 내 생각이 완치하는 데까지 주밀하지 못하여 이 사람을 마침내 구원하지 못하였다. 한스러운 것은 오전에 다만 백호탕 2첩을 써서 풍이 동할 것을 예방하기만 하고 오후에는 전혀 약을 쓰지 않아서 이어주지 못하였다는 것이 잘못된 것이다. 이 세 사람의 병으로 살핀다면 발광(發狂)하고 헛소리하는 증에 백호탕을 다만 오전에만 써서 풍이 동할 것을 예방하기만 할 것이 아니라 하루에 5-6첩, 7-8첩, 10여 첩을 써서 밤낮을 계속하여 이어주는 것이 좋을 것이다. 굳이 헛소리한 다음을 기다려서 약을 쓸 필요가 없고 발광할 때 당연히 약을 쓰는 것이 마땅하며, 발광한 다음을 기다려서 약을 쓸 것이 아니고 발광하기 전에 발광의 조짐을 조기에 살펴서 약을 쓰는 것이 마땅하다.

[9-44] 그 후에 또 소양인 17세 여자 아이가 있었는데 평소에 간혹 딸꾹질이 나고 음식에 체하고 배가 아픈 증상이 있었다. 갑자기 하루는 머리가 아프고 추웠다 더웠다하고 음식에 체했는데, 한 의사가 소합향원(蘇合香元) 3개를 생강(生薑) 달인 물로 먹였더니 설사를 하는데 하루에 수십 번을 하고 십여 일이 지나도 그치지 않고 물이 먹히며 잠을 자지 못하고 가끔 헛소리하는 증상이 있었는데 그 때가 기해년(己亥年) 겨울 11월 23일이었다. 그날 밤으로 생지황(生地黃)·석고(石膏)를 각각 6냥, 지모(知母) 3냥을 썼더니 그날 밤 설사의 횟수가 절반으로 감소되었다. 그 이튿날 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 4돈을 더하여 2첩을 연이어 먹게 하니 편안히 자며 소변도 잘 통하게 되었으니 형

방지황탕(荊防地黃湯) 2첩의 약 효과가 지모백호탕(知母白虎湯)의 10배나 되는 것을 알 수 있었다. 이에 매일 이 약을 4첩씩 쓰는데 낮에 2첩을 이어서 먹고 밤에 2첩을 이어서 먹여 수일간 쓰니 설사가 아주 그치고 머리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 병난 아이의 헛소리하는 증상이 변하여 발광하는 증으로 되었는데 환자 집에서 놀라 의심을 하여 2일 밤낮을 약을 쓰지 못하였는데 병세가 위태하게 되어 머리에 땀이 나지 않고 오줌이 통하지 않게 되고 얼음을 씹을 때처럼 입에서 소리를 내고 사람을 알아보지 못하게 되어 병의 예후가 매우 나쁘게 되었다. 이러한 형세를 어찌할 것인가? 부득이한 계책으로 하룻밤에 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1냥을 더하여 10첩을 연이어 입에 부어 넣었더니 그 밤으로 소변이 통하여 3사발이나 누웠으나 광증(狂證)은 그치지 않고 다만 사람을 알고 얼굴을 보며 약간 제정신이 들었다. 그 다음날에 또 6첩을 쓰고 5일을 계속해서 4,5,6첩을 쓰니 발광이 그치기 시작하고 밤사이에 혹은 잠시 잠이 드나 오래 가지는 못하고 곧 깨기에 또 하루에 3,4첩을 5일 동안 이어서 쓰니 머리 정수리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 능히 반 시각 동안 자게 되고 죽을 조금씩 먹게 되었다. 그 후 매일 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈을 더하여서 하루에 2첩을 쓰되 대변을 하루 동안 보지 못하면 석고 4돈을 더하였더니 12월 23일에 이르러서 비로소 위태한 지경을 면하게 되었고 방 안에서 일어서게 되었다. 한 달 동안에 무릇 석고를 쓴 것이 45냥이 되었다. 신년(新年) 정월(正月) 5일에 능히 1리가 되는 거리를 걸어와서 나를 보고 갔다. 그 후에도 또한 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈(錢)을 더하여 새해 3월까지 계속 썼다.

[9-45] 나는 논하기를 소양인 병은 화열(火熱)이 그 병증이 되기 때문에 변동이 매우 빨라서 처음 증이 나타나더라도 경솔하게 쉽게 보아서는 안 될 것이다. 대개 소양인의 표병(表病)에 머리가 아픈 것이 있거나 이병(裏病)에 변비가 있으면 이미 중병이 된 것이니 중병에는 쓰지 못할 약을 1,2,3첩만 잘못 투여하여도 반드시 사람을 죽일 것이고 험한 병과 위태한 증에는 반드시 써야 할 약을 1,2,3첩을 제때에 못 써도 또한 생명을 구하지 못할 것이다.

#### 소양인 위수열리열병론(29조)

[10-1] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 8,9일에 학질(瘧疾)증상 같이 열이 나고 추위를 싫어하는데 추위보다는 열이 심하며 맥이 미(微)하고 추위를 싫어하는 것은 음과 양이 모두 허한 것이니 가벼이 땀을 내거나 설사시키거나 토하게 하지 말아야 한다. 얼굴빛이 도리어 열색(熱色) 있는 것은 병이 아직 풀리려고 하지 않는 것으로 조금이라도 땀을 내지 못하면 몸이 반드시 가려울 것이니 마땅히 계마각반탕(桂麻各半湯)을 써야 한다.

[10-2] 태양병(太陽病)이 학질(瘧疾) 같아서 열이 나고 추위를 싫어하며 열이 많고 한이 적으며 맥이 미(微)하고 약한 것은 이것은 망양(亡陽)이므로 몸이 가렵지 않으면 땀을 내지 말아야 한다. 마땅히 계비각반탕(桂婢各半湯)을 써야 한다.

[10-3] 나는 논하기를 이러한 증에 대변이 하루 밤낮을 지나지 않아서 통하는 경우는 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하고 대변이 하루 밤낮을 지나도 통하지 않는 경우는 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 할 것이다.

[10-4] 장중경(張仲景)이 말하기를 양명증(陽明證)에 오줌이 잘 나오지를 않으며 맥이 부(浮)하고 갈증이 있는 것은 저령탕(猪苓湯)을 주로 쓴다고 하였다.

[10-5] 삼양(三陽)이 합병(合病)되어 머리가 아프고 얼굴에 때가 끼고 헛소리하고 오줌이 저절로 나오고 속과 밖에 다 열이 있고 저절로 땀이 나고 번갈(煩渴)하며 배가 아프고 몸이 무거우면 백호탕(白虎湯)을 주로 쓴다.

[10-6] 나는 논하기를 양명증(陽明證)이란 것은 단지 열(熱)만 있고 한(寒)이 없는 것을 말하는 것이고 삼양(三陽)이 합병(合病)한다는 것은 태양·소양·양명증이 함께 있는 것을 말하는 것이다. 이러한 증에는 마땅히 저령탕(猪苓湯)이나 백호탕(白虎湯)을 써야 한다. 그러나 옛 처방인 저령탕이 새 처방인 저령차전자탕(猪苓車前子湯)의 구비한 것만 못하고, 옛 처방인 백호탕이 새 처방인 지황백호탕(地黃白虎湯)의 완전한 것만 못하다. 만일 양명병(陽明病)에 소변이 잘 나오지 않는 것에 겸하여 대변이 막히고 마른 것은 지황백호탕(地黃白虎湯)을 쓰는 것이 좋다.

[10-7] 주굉(朱肱)이 말하기를 양궐(陽厥)이란 것은 처음 병을 얻을 때 반드시 몸에 열이 나고 머리가 아프며 겉으로는 양증(陽證)이 있다가 4,5일에 이르러서야 장차 갈증이 일어나고 궐증(厥證)된

지 반 날이 지나서 도리어 몸에 열이 난다. 대개 열기가 심하면 장차 꺾증이 일어나는데 만일 약간 꺾랭(厥冷)하고 도리어 열이 나는 것은 열이 심하기 때문이다. 그 맥이 비록 복(伏)하나 누르면 활(滑)한 것은 속에 열이 있기 때문이며, 또는 물을 마시며 혹 손발을 내젓고 또는 번조하여 자지 못하며 대변이 막히고 소변이 붉으며 밖의 증세로는 정신이 혼미한 편이 많으면 백호탕을 쓴다.

[10-8] 나는 논하기를 소양인의 리열병(裡熱病)에 지황백호탕(地黃白虎湯)이 가장 좋은 약이나 이것을 쓰는 데에는 반드시 대변이 통하는지 통하지 않는지를 살펴야 한다. 대변이 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않으면 쓰는 것이 마땅하고 2일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 반드시 써야 한다. 무릇 소양인의 대변이 하루 밤낮을 통하지 않으면 위(胃)의 열이 이미 맺힌 것이고 2일 밤낮을 통하지 않으면 열이 중한 것이고 3일 밤낮을 통하지 않으면 위험한 것이니 40-42시간이나 2주야에 적당히 약을 쓸 것이고 3주야의 위험한 데까지 가게 하지 말아야 한다. 만일 헛소리하는 증에 변비(便秘)가 있으면 하루 밤낮을 지나지 말아야 한다.

[10-9] 소양인이 위(胃)에 열을 받으면 대변이 굳어지고 소양인이 비(脾)에 한을 받으면 설사를 한다. 그러므로 망음증(亡陰證)에 설사를 2,3일 하다가 대변이 굳기를 하루 밤낮이 되면 청 음(淸陰)이 장차 없어지게 되어서 위태로운 경지가 되고, 위열증(胃熱證)에 대변이 3일 밤낮을 통하지 않다가 땀이 나면 맑은 양(淸陽)이 장차 고갈(枯竭)되는 것으로 위태로운 경지가 된다.

[10-10] 소양인이 대변이 통하지 않는 병에 백호탕을 3,4회 복용해도 당일에 대변이 통하지 않는 것은 장차 녹아서 통하게 될 것으로 이것은 크게 좋은 징조이다. 의심할 필요 없이 이튿날 다시 2,3첩을 복용하면 통하지 않을 이유가 없다.

[10-11] 소양인의 표리병(表裏病)이 맺혔는가 풀렸는가 하는 것은 반드시 대변을 보아야 할 것이니 소양인의 대변이 처음은 조(燥)하다가 나중에는 활(滑)하며 덩이가 크고 잘 소통되는 것은 평상시에 병이 없는 경우의 대변이다. 그 다음은 크게 활변(滑便)을 보되 1,2차 시원하게 활설(滑泄)을 많이 하고 그치는 것은 병자의 병이 풀리려는 대변이다. 그 다음은 1,2차 보통 활변(滑便)을 보는 경우는 병자의 병이 병세가 더하지 않는 대변이다. 그 다음은 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않거나 또는 하루 밤낮 사이에 3,4,5차 조금씩 조금씩 활리(滑利)하는 것은 장차 대변이 막힐 징후니 좋은 대변이 아니므로 예방하는 것이 마땅하다.

[10-12] 소음인의 속이 찬 병에 배꼽 주위가 냉한 증세는 병의 초기에 벌써 배에서 소리가 나고 설사를 할 기미와 증험이 있어 집증(執證)이 쉬우므로 약을 빨리 쓸 수 있으나, 소양인의 속이 더운 병에 흉격열(膈熱)증은 병이 난 초기에 비록 가슴이 답답하고 어찌할 바를 모르는 기미와 증험이 있으나 그것이 심하게 나타나지 않으니 집증(執證)하기 어려워서 약을 쓰는 일이 너무 늦어진다. 만일 소양인이 가슴이 답답해서 가만히 있지 못하는 징후가 뚜렷하게 나타나서 다른 사람이 그것을 깨달을 수 있게 되면 그 병은 이미 험증(險證)이 되니 손쓰기 어려울 것이다. 대개 소양인의 표병(表病)에 머리 아픈 것이 있으면 이것이 표병(表病)임이 확실하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 물을 많이 마시고 오줌이 붉으면 가히 염려스럽고, 설사하고 손과 발을 내저으면 대단히 염려스러운 것이다. 소양인의 이병(裏病)에 대변이 하루 밤낮이 지나도록 통하지 않으면 이것으로 이병(裏病)임이 명백하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 대변이 3일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 위험한 것이다. 배옹(背癰) · 뇌저(腦疽) · 순종(脣腫) · 전후풍(纏喉風) · 인후(咽喉) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 위험증(危險證)이 된 것이며, 양독발반(陽毒發斑) · 유주단독(流注丹毒) · 황달(黃疸) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 험증(險證)이 된 것이며, 얼굴 · 눈 · 입 · 코 · 치아의 병은 병이 형성된 날부터 모두 중증(重證)이 된 것이다. 무릇 소양인의 표병에 머리 아픈 증이 있으면 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓰고 이 병에 대변이 하루 밤낮이 지나도 통하지 않는 증이 있으면 백호탕을 쓴다.

[10-13] 왕호고(王好古)가 말하기를 갈병(渴病)에 세 가지가 있는데 소갈(消渴) · 소중(消中) 그리고 소신(消腎)이다. 열기(熱氣)가 위로 올라가면 가슴 속이 번조(煩躁)하고 혀가 빨갛고 입술이 붉으니 이때의 갈(渴)은 항상 물을 많이 마시며 소변은 자주 보나 양은 적으니 병이 상초(上焦)에 속하는데 소갈(消渴)이라 이른다. 열기가 중초(中焦)에 쌓여 먹는 데로 삭여서 시장기를 느끼며 음식을 평상시의 배로 먹으나 살이 붙지 않는다. 이때의 갈(渴)은 역시 심한 번조(煩躁)는 아니나 소변이 잣고 그 맛이 달아 병이 중초(中焦)에 속하는데 소중(消中)이라 이른다. 열기가 하초(下焦)에 잠복되어 허벅지와 무릎이 말라서 가늘어지고 뼈마디가 쑤시고 물을 많이 마시지는 않으나 마시면 오줌으로

나오고 소변량이 많고 탁(濁)하니 병이 하초(下焦)에 속하는데 소신(消腎)이라 한다. 또 5가지 광물성 약재를 과도하게 먹은 사람으로 진기(眞氣)는 이미 다 없어지고 광물성 약의 기운만이 남아 있어서 음경(陰莖)이 역세게 일어나며, 성교(性交)하지 않아도 사정하는 것을 강중(強中)이라 한다. 소갈(消渴)은 경(輕)한 증세이고 소중(消中)은 심(甚)한 증세이고 소신(消腎)은 더욱 심한 증상이다. 만일 강중(強中)이 되면 그 죽음이 가히 서서 기다리는 것과 같다.

[10-14] 주진형(朱震亨)이 말하기를 상소(上消)라는 것은 혀가 빨갛고 갈라지며 갈증이 심하며 물을 찾으니 백호탕(白虎湯)을 주로 써야 하고, 중소(中消)라는 것은 음식을 잘 먹어도 마르며 땀이 저절로 나며 대변이 굳으며 소변은 자주 보니 황연저두환(黃連猪肚丸)을 주로 써야 하고, 하소(下消)라는 것은 번조하여 물이 당기고 소변은 마치 기름 같으며 허벅지와 무릎이 말라서 가늘어지니 육미지황탕(六味地黃湯)을 주로 써야 한다.

[10-15] 《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 갈증이 나서 물을 많이 마시는 것은 상소(上消)라 하고, 음식이 잘 삭아서 시장기를 느끼는 것은 중소(中消)라 하며, 갈증이 나며 소변을 자주 보고 기름 같은 것은 하소(下消)라 한다.

[10-16] 위역림(危亦林)이 말하기를 색욕(色慾)을 탐내거나 단석(丹石)을 복용하면 진기(眞氣)가 이미 빠진데다가 열사(熱邪)가 홀로 왕성하여 마치 끓는 물에 눈을 녹이듯이 먹고 마시나 살은 날로 말라 들어가고 소변은 마치 기름과 같고 음경(陰莖)이 강하게 일어나서 성교하지 않아도 정액(精液)을 설(泄)하는 것은 삼소(三消) 가운데서 가장 치료하기 어려운 것이다.

[10-17] 나는 논하기를 소갈(消渴)이라는 것은 환자의 마음이 너그럽고 원대하고 활달하지 못하고 견문이 좁고 완고하며 작은 일에 집착하여 보는 바가 알고 하고자 하는 바는 조급하며 계책은 골돌한데 생각은 모자라니 대장의 맑은 양이 위로 올라가는 기운이 자연히 만족하지 못하여 날이 갈수록 소모되고 노곤해서 이 병이 발생하는 것이다. 위국(胃局)의 맑은 양기(陽氣)가 상승하여 머리와 얼굴 그리고 사지(四肢)에까지 충족되지 못하면 상소(上消)가 되고, 대장국(大腸局)의 맑은 양기가 위로 올라가 위국(胃局)에까지 충족되지 못하면 중소(中消)가 된다. 상소(上消)는 자체가 중증이 되는데 중소(中消)는 상소(上消)보다 배는 중하고 중소(中消)는 자체가 험증이 되는데 하소(下消)는 중소(中消)보다 배는 험(險)한 병이다. 상소(上消)는 양격산화탕(涼膈散火湯)을 쓰는 것이 마땅하고, 중소(中消)는 인동등지골피탕(忍冬藤地骨皮湯)을 쓰는 것이 마땅하며, 하소(下消)는 숙지황고삼탕(熟地黃苦參湯)을 쓰는 것이 마땅하다. 또 마음을 너그럽고 넓게 가져야 할 것이고 작은 일에 집착하는 마음을 가져서는 안 될 것이니 마음을 너그럽고 넓게 가진다는 것은 하고자 하는 일을 반드시 완만하게 하는 것이니 맑은 양기가 위로 도달하고, 작은 일에 집착한다는 것은 하고자 하는 일을 반드시 조급하게 하는 것이니 맑은 양의 기운이 아래에서 소모될 것이다.

[10-18] 마음을 편안하게 하고 생각을 고요하게 하면 양기가 위로 올라가 가볍고 맑아져서 머리와 얼굴 그리고 사지에 충족할 것이니 이것은 원기(元氣)이고 맑은 양의 기운이다. 속을 썩히고 애를 태우면 양기가 아래로 빠져 내려가 무겁고 탁해져서 머리와 얼굴 그리고 사지에 멎쳐서 열이 될 것이니 이것은 화기(火氣)이고 소모된 양기이다.

[10-19] 위역림(危亦林)이 말하기를 소갈(消渴)에는 모름지기 옹저(癰疽)가 발생하는 것을 막아야 하니 인동등(忍冬藤)의 많고 적음에 관계없이 뿌리·줄기·꽃·잎을 모두 먹을 것이다.

[10-20] 이고(李杲)가 말하기를 소갈(消渴)의 질병에 음식을 잘 먹는 경우는 끝에 가서 반드시 뇌저(腦疽)나 등창(背瘡)이 생길 것이고, 음식을 잘 먹지 못하는 경우는 반드시 속이 팽만하거나 고창(鼓脹)이 될 것이다.

[10-21] 《동의의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 소갈(消渴)의 병은 변해서 옹저(癰疽)가 되기도 하고, 또는 수병(水病)이 되기도 하고 또는 두 눈이 멀기도 한다.

[10-22] 나는 논하기를 옹저(癰疽)와 눈병은 모두 중소(中消)의 변증(辯證)이다. 중소(中消)는 자체가 험한 증세이기 때문에 상소(上消)는 마땅히 일찍 치료해야 하고, 중소(中消)는 반드시 급히 치료해야 하고, 하소(下消)는 죽음에 임박한 것이다.

[10-23] 왕호고(王好古)가 말하기를 어떤 아이가 갓난아이부터 동자가 되기까지 잠자면서 땀을 흘리기가 7년이나 계속되었으나 모든 약이 효력이 없더니 양격산(涼膈散)을 3일간 복용하고 병이 멈췄다.

[10-24] 나는 논하기를 소양인의 대장의 맑은 양기가 위에 충족하여 머리와 얼굴 그리고 사지에 차

서 넘치면 땀이 반드시 나지 않는다. 소양인이 땀을 흘리는 것은 본래 양기가 약한 것인데 양격산(涼膈散)을 복용하고 병이 그쳤다는 것은 이 병은 곧 상소(上消)로 병이 경한 것이다.

[10-25] 《동의의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 무릇 갈(渴)이란 것은 자주 물을 마시는 것이니 그 사람이 반드시 머리와 얼굴이 어지럽고 등이 차고 구역이 날 것이니 허하기 때문이다.

[10-26] 공신(龔信)이 말하기를 대개 음이 허한 증은 매일 오후에는 추위를 싫어하고 열이 나다가 해가 저물 때에는 도리어 약간 땀이 나고 풀리는 것이니 학질(瘧疾)로 잘못 알고 치료하다가 혼히 구하지 못하는 지경에 이른다.

[10-27] 손사막(孫思邈)의 《천금방(千金方)》에서 말하기를 소갈(消渴)에는 마땅히 삼갈 것이 셋이 있는데 첫째는 술을 마시는 것이고, 둘째는 성생활이고, 셋째는 짠 것을 먹고 국수를 먹는 것이니 능히 이 세 가지를 삼가면 비록 약을 먹지 않아도 역시 저절로 나을 수 있다.

[10-28] 나는 논하기를 상소와 중소는 속의 양기의 올라가는 기운이 비록 허손(虛損)하나 겉의 음기의 내려가는 기운은 오히려 완장(完壯)하기 때문에 그 병이 비록 험하여도 오히려 능히 오랜 세월을 지탱해 나갈 수 있는 것이다. 만일 음이 허하여 낮에 열이 나고 물을 많이 마시고 등이 차고 구역하는 것은 겉과 속의 음양이 모두 허손된 것으로 병이 되는 까닭에 더욱 험하게 되고 하소와 더불어 경중이 서로 비슷하다는 것이다. 그러나 능히 몸과 마음을 잘 조섭하고 약을 먹는다면 10에 6,7은 오히려 살아날 수 있을 것이나 몸과 마음을 잘 조섭하지 않고 약을 먹는다면 백이면 백이 반드시 죽을 것이다. 이러한 증에는 당연히 독활지황탕(獨活地黃湯)이나 십이미지황탕(十二味地黃湯)을 써야 한다.

[10-29] 《주역(周易)》의 수괘(需卦)의 9,3효사(爻辭)에 말하기를 진흙 속에서 기다리는 것이니 도둑을 이르게 하는 것이라고 하였고, 상(象)에서 말하기를 진흙 속에서 기다린다는 것은 재앙이 밖에 있기 때문이다. 내가 스스로 도적을 부르는 것이니 공경하고 삼가면 패하지 않을 것이라고 하였다. 이 뜻을 모방하여 말한다면 음이 허하여 낮에 열이 나고 등이 차고 구역하는 것은 그 병이 비록 험하나 죽음은 아직 밖에 있으니 능히 그 마음을 재계하고 그 몸을 공경하고 또 좋은 약을 먹으면 죽지 않을 것이다.

소양인 범론(23조)

[11-1] 소양인 병의 중풍(中風) · 토혈(吐血) · 구토(嘔吐) · 복통(腹痛) · 식체비만(食滯痞滿)의 다섯 가지 증세는 다 같은 한 가지 등속(等屬)에서 나왔으며 스스로 경 · 중이 있고, 부종(浮腫)과 천촉(瞤促) · 결흉(結胸) · 이질(痢疾) · 한열왕래(寒熱往來) · 흉협만(胸脇滿)의 다섯 가지 증세는 다 같이 한 가지 등속에서 나왔으며 스스로 경 · 중이 있다.

[11-2] 소양인 중풍의 반신(半身)을 쓰지 못하는 것과 한쪽 팔을 쓰지 못하는 것은 어찌할 수 없는 병이다. 중한 경우는 반드시 죽고 경한 경우라도 살 수는 있으나 간간히 약을 복용하고 안정해서 회복되는데 스스로 낫기를 기다려야 하며 반드시 다스리는 법이 있는 병은 아니다.

[11-3] 소양인이 토혈(吐血)하는 경우는 반드시 강팍(剛愎)하고 편벽되고 급한 성질과 남과 더불어 나란히 말을 달려서 경쟁하는 것을 씻어버려야 하고 담백하게 먹으며 약을 복용하되 수양하기를 불교도 사람들과 같이 하면 100일이면 조금 나을 것이고 200일이면 많이 나을 것이고 1년이면 완전히 나을 것이고 3년이면 가히 그 수명을 보존할 수 있다. 무릇 토혈은 조리와 섭양을 옳게 못하면 반드시 재발할 것이나 재발하면 앞서의 공이 모두 다 허사로 돌아간다. 만일 재발하면 다시 재발한 날로부터 계산하여 100일이면 조금 나을 것이고 1년이면 완전히 나을 것이며, 만일 10년, 20년 조리와 섭양을 한다면 반드시 오랜 수명을 누릴 것이다.

[11-4] 무릇 소양인의 코에서 피가 간혹 조금 나거나 또는 입과 코의 가래와 침 가운데에 피가 있는 것은 비록 미세하다 하여도 모두 토혈에 속한다. 또 입 안에 남몰래 차가운 침이 있는 것이 거꾸로 올라오는 것은 비록 구토하지 않아도 역시 구토에 속한다. 소년(少年)이 이런 증세가 있는 경우는 흔히 요절(夭折)하게 되니 그것을 등한히 내버려두기 때문이다. 이 두 가지 증세는 반드시 중병과 험한 병의 반열에 있으니 예방의 차원에서 약을 먹는 것이 부득이하니 영원히 병의 근원을 제거한

연후에야 가히 보존할 수 있고 근심이 없을 것이다.

[11-5] 중풍은 병을 얻는 것이 아주 중하기 때문에 치료하는 방법에 확실한 것이 있다고는 할 수 없으나 토혈은 병을 얻는 것이 아직 경하기 때문에 치료하는 방법에 확실한 것이 있다고 할 수 있다. 중풍과 토혈은 조리(調理)와 자양(滋養)이 위주고 약을 복용하는 것은 다음이 된다.

[11-6] 구토 이하 복통, 식체비만은 약을 복용하고 조리하며 자양하면 그 병이 스스로 나을 것이다.

[11-7] 중풍과 구토에는 마땅히 독활지황탕(獨活地黃湯)을 쓸 것이고, 토혈(吐血)에는 마땅히십이미지황탕(十二味地黃湯)을 쓸 것이다.

[11-8] 부종이 병됨은 급히 치료하면 살 수 있고 급히 치료하지 않으면 위태로우니 약을 빨리 쓰면 쉽게 낫고 약을 빨리 쓰지 않으면 맹랑하게 죽는다. 이 병은 밖에 나타난 형세(形勢)가 평완하여 급하게 죽을 것 같지 않아서 사람들이 반드시 쉽게 생각하나 이 병은 실은 급한 증으로 4~5일 내에 반드시 그 질병을 치료해야 하며 늦어도 10일 이상을 논하는 것은 불가하다. 부종은 처음 발생했을 때 마땅히 목통대안탕(木通大安湯)을 써야 하며 혹은 형방지황탕(荊防地黃湯)에 목통(木通)을 더하여 하루 2회 먹으면 6~7일 내에 부종이 반드시 풀릴 것이다. 부종의 병이 풀린 후 백일 안에 반드시 형방지황탕에 목통 2-3돈을 더하여 써야 하는데 매일 1~2첩을 써서 소변을 맑게 하고 재발을 방지해야 할 것이니 재발하면 치료하기 어렵다. 부종이 처음 풀렸을 때에 음식은 시장기를 참아야 할 정도로 적게 먹어야 하니 만약 보통 사람처럼 많이 먹는다면 반드시 병이 재발하는 것을 면치 못할 것이다. 소변이 붉은 것을 크게 두려워해야 할 것이니 소변이 맑으면 부종이 풀리고 소변이 붉으면 부종이 맺혀진다.

[11-9] 소양인의 중소(中消)라는 것에 배가 팽만하면 반드시 고창(鼓脹)이 되고 고창은 다스리지 못한다. 소양인의 고창병은 소음인의 장결(藏結)병과 같아서 모두 5-6, 7-8개월 혹은 1년이 지나면 죽게 된다. 대게 소음인의 장결(藏結)은 표양(表陽)의 온기(溫氣)가 비록 거의 떨어졌으나 리음(裏陰)의 온기(溫氣)가 아직 완실(完實)하고 건장한 것이 미더운 것이고, 소양인의 고창(鼓脹)은 표양(表陽)의 청기(淸氣)가 비록 거의 떨어졌으나 표음(表陰)의 청기(淸氣)가 아직 완실하고 건장한 것이 미더운 까닭에 모두 오래 경과해서 죽게 된다.

[11-10] 소양인 상한(傷寒)의 천축(喘促)에는 먼저 영사(靈砂) 1푼을 따뜻한 물에 타서 먹고 형개(荊芥)·방풍(防風)·과루인(瓜蒌仁) 등에 속하는 약을 달여서 먹으면 반드시 약을 달이는 시각이 지체됨으로써 병을 구하지 못하는 일이 없을 것이다.

[11-11] 영사(靈砂)는 약의 힘이 급박하므로 마땅히 한 두 번만 쓸 것이고 여러 번 쓰는 것은 마땅하지 않으니 대게 급히 구하는 약일 따름이다. 약은 반드시 달여 먹어야 장과 위에 충만하여 능히 보음(補陰) 보양(補陽)을 할 수 있다.

[11-12] 이질(痢疾)은 결흉(結胸)에 비한다면 이질(痢疾)은 순한 병증이나 이질(痢疾)을 중증이라고 말하는 것은 그것은 부종과 가깝기 때문이다. 구토를 복통에 비한다면 구토는 순하지 못한 증이나 구토를 나쁜 증이라고 말하는 것은 그것은 중풍과 멀지 않기 때문이다.

[11-13] 소양인의 이질(痢疾)에는 마땅히 황연청장탕(黃連淸腸湯)을 써야 한다.

[11-14] 소양인의 학병(瘡病)에 이틀 간격으로 나타나는 것은 즉 노학(勞瘡)이다.. 천천히 치료해야 마땅하며 급히 치료하는 것은 마땅하지 않다. 이러한 증은 학질이 나타나지 않는 날에 독활지황탕(獨活地黃湯) 2첩을 아침과 저녁에 먹고 학질이 나타나는 날에는 형방패독산(荊防敗毒散) 2첩을 미리 달여서 오한이 발작할 때에 2첩을 연복한다. 1개월에 독활지황탕(獨活地黃湯) 40첩과 형방패독

산(荊防敗毒散) 20점을 목표로 하고 쓰면 반드시 물러나지 않을 이치가 없다.

[11-15] 소양인이 안으로 인후(咽喉)병이 나고 밖으로 목과 뺨이 붓는 것을 전후풍(纏喉風)이라고 하는데 2-3일. 안에 사람을 죽이니 최고로 급하다. 또한 윗입술의 인중혈(人中穴)의 종기(腫氣)를 순종(脣腫)이라 하는데 인중의 좌우에 손가락 하나 놓일 만한 곳에 종기가 나면 비록 그것이 좁쌀알 같이 작은 것이라도 또한 위태로운 증세이다. 이 두 가지 증세가 처음 나타나 가벼운 경우에는 마땅히 양격산화탕(涼膈散火湯)이나 양독백호탕(陽毒白虎湯)을 쓸 것이며 중한 경우에는 수은훈비방(水銀熏鼻方)을 써야 하는데 한 대를 태워 코에 연기를 쏘여서 목과 뺨에 땀이 나면 낫는다. 만약 급한 상황에서 훈비약(熏鼻藥)이 없다면 경분(輕粉) 가루 1푼 5리와 유향(乳香) · 몰약(沒藥) · 감수(甘遂) 각각 5푼씩을 고루 풀어 반죽한 다음 알약을 만들어 단번에 다 먹인다.

[11-16] 소양인 어린아이가 많이 먹으나 마르는 경우에는 마땅히 노회비아환(蘆薈肥兒丸)이나 인동등지골피탕(忍冬藤地骨皮湯)을 쓴다.

[11-17] 일찍이 소양인의 어깨 위에 독종(毒腫)이 있어 참기름을 불에 끓여 헌데에 부어 살이 검게 타도 그 뜨거움을 알지 못하는 것을 어떤 의사가 소의 뿔 조각을 숯불 위에 놓고 태우면서 연기를 쏘이라 하기에 연기가 헌데에 들어가서 독즙(毒汁)이 스스로 흘러내려 그 종기(腫氣)가 곧 낫는 것을 본 일이 있다.

[11-18] 일찍이 소양인 70노인이 뇌저(腦疽)가 생겼는데 어떤 의사가 복알을 가루 내어 붙이니 뇌저가 곧 낫는 것을 본 일이 있다. 복알은 지극히 독하여 돼지나 개가 그것을 먹게 되면 곧 죽게 되고 수풀과 나무 사이에 이것을 걸어 놓아 까마귀나 까치가 감히 먹지 못한다.

[11-19] 일찍이 소양인의 생안손을 치료한 적이 있는데 복알 가루 조금을 고약 위에 놓고 붙이되 1일에 1번씩 새 가루로 바꾸어 붙였더니 약을 붙인지 5~6일 만에 병에 효력이 있고 새살이 금방 생겼다. 그러나 굳은살이 생겨서 칼을 간 숯돌 가루를 붙였더니 굳은살이 곧 없어지면서 병이 나았다. 또한 연주담(連株痰)에도 썼는데 여러 날 붙이면 반드시 효과가 있었고, 이것을 숯불에 덴 데와 개에 물린데 벌레에 물린 데도 썼는데 효과를 보지 못한 경우가 없다.

[11-20] 일찍이 소양인 60노인을 치료한 적이 있는데 중풍으로 한쪽 팔을 쓰지 못하는 병에 경분(輕粉) 5리(厘)를 이용하니 그 병이 더 심해졌고, 소양인 20세 소년이 한쪽 다리가 약간 불편한 비풍(痺風)이 있어서 경분감수용호단(輕粉甘遂龍虎丹)을 2~3차 썼더니 효과를 보았다.

[11-21] 일찍이 소양인 인후(咽喉)병을 치료한 적이 있는데 물과 미음을 조금도 넘기지 못하고 대변이 3일이나 통하지 못하여 병이 위태한 지경에 이르렀는데 감수천일환(甘遂天一丸)을 써서 바로 효과를 보았다.

[11-22] 일찍이 소양인 70세 노인을 치료한 적이 있는데 대변이 4~5일 통하지 못하거나 혹은 6~7일 통하지 못하나 음식은 평상시와 같으며 무릎이 차고 힘이 없어서 경분감수용호단(輕粉甘遂龍虎丹)을 썼더니 대변이 바로 통하고 수일 후에 다시 변비가 생겨 다시 쓰고 여러 번 써서 마침내 대변이 1일에 1회씩 기준이 되어 병이 나았다. 이 노인은 80세까지 장수하였다.

[11-23] 일찍이 소양인이 앞니 두 개의 잇몸에서 피가 나오기 시작하여 잠시 동안에 두 사발씩이나 나와서 장차 위험한 지경에 이르게 되었는데 어떤 의사가 불에 끓인 참기름을 새 솜에 찍어서 뜨거운 때에 잇몸을 지지니 마침내 피가 멎는 것을 본 일이 있다.

[11-24] 어떤 소양인 한 사람이 매일 한 차례씩 머리를 빗고 수개월 후에 구안와사(口眼喎斜)병에 걸린 것을 본 일이 있으며 그 후에 또 소양인이 매일 머리를 빗고 와사병을 얻은 것을 무릇 세 사람

이나 더 보았다. 대개 머리를 빗는 것은 소양인에게 금기할 것이다. 일찍이 태음인 80세 노인이 매일 머리를 빗는 것을 본 일이 있는데 노인이 스스로 말하기를 매일 머리를 빗는 것은 매우 좋은 일이다. 내가 머리를 빗은 지가 이미 40년이나 되었다고 하였다.

#### 새로 정한 소양인병의 주요 17처방

##### 형방패독산

강활 · 독활 · 시호 · 전호 · 형개 · 방풍 · 적복령 · 생지황 · 지골피 · 차전자 각1돈.  
이 처방은 머리가 아프고 오한과 발열이 번갈아 나타나는 것을 치료하는데 쓴다.

##### 형방도적산

생지황 3돈, 목통 2돈, 현삼 · 과루인 각1돈5푼, 전호 · 강활 · 독활 · 형개 · 방풍 각1돈.  
이 처방은 머리가 아프고 가슴이 답답하며 열이 나는 것을 치료하는데 쓴다.

##### 형방사백산

생지황 3돈, 복령 · 택사 각2돈, 석고 · 지모 · 강활 · 독활 · 형개 · 방풍 각1돈.  
이 처방은 머리가 아프고 (방광으로 강음이 되지 않아) 속이 타며 조급해지는 것을 치료하는데 쓴다.

##### 저령차전자탕

복령 · 택사 각2돈, 저령 · 차전자 각1돈5푼, 지모 · 석고 · 강활 · 독활 · 형개 · 방풍 각1돈.  
이 처방은 머리와 배가 아프고 설사를 하는 것을 치료하는데 쓴다.

##### 활석고삼탕

복령 · 택사 · 활석 · 고삼 각2돈, 천황련 · 황백 · 강활 · 독활 · 형개 · 방풍 각1돈.  
이 처방은 배가 아프지만 설사는 없는 것을 치료하는데 쓴다.

##### 독활지황탕

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 복령 · 택사 각1돈5푼, 목단피 · 방풍 · 독활 각1돈.  
이 처방은 먹은 것이 체하여 막힌듯 그득한 것을 치료하는데 쓴다.

##### 형방지황탕

숙지황 · 산수유 · 복령 · 택사 각2돈, 차전자 · 강활 · 독활 · 형개 · 방풍 각1돈.  
기침에는 전호를 더하고, 혈증에는 현삼 · 목단피를 더하며, 편두통에는 황련 · 우방자를 더하고, 먹은 것이 체하여 막힌듯 그득한 것에는 목단피를 더하며, 화열증이 있으면 석고를 더하고, 머리가 아프며 답답하고 열이 나는 것이나 혈증에는 생지황을 쓰며, 석고를 더할 때에는 산수유를 뺀다. 형개 · 방풍 · 강활 · 독활은 모두 음을 보하는 약이니, 형개와 방풍은 가슴을 크게 맑게하며(시원하게 하며) 풍을 흩어버리고, 강활과 독활은 방광의 진음을 크게 보해준다. 두통, 복통, 비만, 설사 등을 막론하고 대개 허약한 사람에게 수백첩을 써서 반드시 효과를 보지 못한 경우가 없다는 것을 여러 번 시험하고 여러 번 증험하였다.

##### 십이미지황탕

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 백복령 · 택사 각1돈5푼, 목단피 · 지골피 · 현삼 · 구기자 · 복분자 · 차전자 · 형개 · 방풍 각1돈.

##### 지황백호탕

석고 5돈 혹은 1냥, 생지황 4돈, 지모 2돈, 방풍 · 독활 각1돈.

#### 양독백호탕

석고 5돈 혹은 1냥, 생지황 4돈, 지모 2돈, 형개 · 방풍 · 우방자 각1돈.  
이 처방은 양독으로 발진이 있고, 변비가 있는 경우에 쓴다.

#### 양격산화탕

생지황 · 인동등 · 연교 각 2돈, 산치자 · 박하 · 지모 · 석고 · 방풍 · 형개 각 1돈.  
이 처방은 상소를 치료하는데 쓴다.

#### 인동등지골피탕

인동등 4돈, 산수유 · 지골피 각2돈, 천황련 · 황백 · 현삼 · 고삼 · 생지황 · 지모 · 산치자 · 구기자 · 복분자 · 형개 · 방풍 · 금은화 각1돈.  
이 처방은 중소를 치료하는데 쓴다.

#### 숙지황고삼탕

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 백복령 · 택사 각1돈5푼, 지모 · 황백 · 고삼 각1돈.  
이 처방은 하소를 치료하는데 쓴다.

#### 목통대안탕

목통 · 생지황 각5돈, 적복령 2돈, 택사 · 차전자 · 천황련 · 강활 · 방풍 · 형개 각1돈.  
이 처방은 부종을 치료하는데 쓴다. 험병에 처음부터 끝까지 이 약을 쓰는 것이 백여첩에 이르러야 한다. 황연 · 택사는 귀한 약재이므로 없으면 혹 빼고 사용한다.

#### 황연청장탕

생지황 4돈, 목통 · 복령 · 택사 각2돈, 저령 · 차전자 · 천황련 · 강활 · 방풍 각1돈.  
이 처방을 이질을 치료하는데 쓴다. 목통 2돈을 빼고 형개 1돈을 더하면 임질이 있는 경우에 쓴다.

#### 주사익원산

활석 2돈, 택사 1돈, 감수 5푼, 주사 1푼. 이상을 가루를 내어 따뜻한 물이 정화수로 복용한다. 여름에 더위를 떨쳐내는데 쓴다.

#### 감수천일환

감수가루 1돈, 경분가루 1푼을 고루 섞어 풀에 반죽하여 환을 만드는데 나누어 10알을 만들고 주사로 옷을 입힌다. 환을 만들어 말리는 것을 오래하면 단단해져 녹이기 어려우니, 복용할 때 종이로 두세겹을 쌓아 공이로 뿔아 부수어 거친 가루로 만든다. 3, 4, 5조각을 입에 머금어 가루로 만들고 정화수로 녹여 삼키며, 3, 4시각을 기다려서 설사를 하지 않으면 다시 2알을 쓴다. 설사를 3회 하면 알맞고, 6회 하면 너무 지나친 것이니 미리 미음을 쑤어 설사 2, 3회 할 때 미음을 먹는다. 그렇지 않으면 기운이 꺼져 내려가 감당하기가 어렵다. 결흉으로 물 마신 것을 도로 토하는 것을 치료한다. 감수 1돈, 경분 5푼을 10알로 나누어 만든 것을 경분감수용호단이라 한다. 경분과 감수를 같은 분량으로 하여 10알로 나누어 만든 것을 경분감수자웅단이라 한다. 경분 1돈, 유향, 몰약, 감수 각 5푼을 30알로 나누어 만든 것을 유향몰약경분환이라 한다. 경분은 땀을 나게 하고, 감수는 수기를 내려가게 한다. 경분의 약력은 1푼이면 족하고, 5리면 미치지 못할 것이 없다. 감수의 약력은 1푼 5리면 족하고, 7, 8리면 미치지 못할 것이 없다. 경분과 감수는 독약으로 모두 1푼을 넘겨 쓰는 것을 가볍게 여겨서는 안되니 병증의 경중을 짐작하여 써야 한다. 병이 두뇌에 생기려 하면 화기를 씻어주어야 하니 경분을 군약으로 삼고, 병이 흉격에 생기려 하면 수기를 내려주어야 하니 감수를 군약으로 삼는다. 이상의 소양인 약물은 포구초외(炮炙炒煨)하여 사용하는 것이 불가하다.

#### 동의수세보원 4권

태음인 위완수한표한병론

[12-1] 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병 상한(太陽病 傷寒)에 두통이 있고 열이 나며 전신이 쭈시고 요통이 있고 뼈마디가 쭈시고 아프며 오한이 있으나 땀이 나지 않고 기침을 하면 마황탕(麻黃湯)을 쓴다.

[12-2] 주석으로 말하기를 상한에 두통이 나고 몸과 허리가 아픈 증세를 오래 끌어오다가 골절이 쭈시고 아프면 이는 태양병 상한으로 영혈(營血)이 고르지 못한 연고다.

[12-3] 이를 태음인(太陰人)의 상한 배추표병경증(背佳眞表病輕證)이라 하였다. 이 증에 마황탕이 사용되었으나 계지(桂枝)와 감초(甘草)는 불필요한 것이며 마땅히 마황발표탕(麻黃發表湯)을 사용해야 한다.

[12-4] 장중경(張仲景)이 말하기를 상한 4~5일에 궤증(厥證)이 있는데 반드시 발열이 있다. 궤(厥)이 심한 것은 열도 심하고 궤가 미약한 것은 열도 미약하다. 상한병에 궤 4일에 발열은 3일하고 다시 궤 5일하는 것은 궤다열소(厥多熱小)로서 그 병이 진행되는 것이다. 상한병에 발열 4일하고 궤 3일하는 것은 궤소열다(厥小熱多)로서 그 병은 스스로 낫는다.

[12-5] 이른바 궤이라 함은 단지 오한만 있고 발열이 없음을 말한 것이요, 수족(手足)의 궤역(厥逆)을 말한 것이 아니다. 태음인 상한 표증에 있어서 한궤(寒厥)이 된지 4, 5일후에 열이 나는 것은 중증(重證)이다. 이 증세에 열이 오르고 땀이 날 때에는 반드시 발제(髮際)에서 시작하여 이마로 통하고 며칠 후에 다시 열이 오르다가 눈썹 가에 땀이 통하고 또 며칠 후에는 열이 오르다가 뺨에서 땀이 나고 다시 며칠 후에는 열이 오르다가 입술과 턱에서 땀이 통하고 또 열이 오르다가 가슴에서 땀이 통한다. 이와 같이 이마에 땀이 몇 차례 난 뒤에는 눈썹 가에 이르고 눈썹 가에 땀이 몇 차례 난 뒤에는 뺨에 이르고 뺨에 땀이 몇 차례 난 후에는 입술과 턱에 이르러 불과 한차례 땀이 난 다음에 곧바로 가슴으로 통한다. 이 병 증세가 처음 시작하여 병이 낫기까지 근 20일이 걸려 한궤이 6, 7차 반복한 후에 풀리는데 이를 사람들은 장감병(長感病)이라 한다. 대체로 태음인 병은 먼저 이마 위와 눈썹 가에서 땀이 나는데 한 번 땀이 났는데도 병은 풀리지 않고 여러 번 땀을 낸 후 비로소 풀리는 것을 장감병이라고 하는 것이다.

[12-6] 태음인 병에 한궤 6~7일에 열이 나지 않고 땀도 나지 않으면 죽는다. 한궤 2~3일에 발열과 한출(汗出)이 있으면 경증(輕證)이다. 한궤 4~5일에 발열하고 이마 위에 약간 땀이 나는 것은 장감병으로 중증(重證)이다. 노심초사(勞心焦思)하여 위완(胃脘)이 쇠약해지고 표(表)가 허박(虛薄)해져서 한사(寒邪)를 이기지 못하고 한사에 에워싸여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 싸우는 형세인데 객(客)이 이기고 주인이 약한 것이다. 전장의 전세에 비유컨대 포위를 당하고 있는 외로운 군대가 포위망 속에서 거의 전군대가 모두 몰락의 위기에 있다가 선봉일대가 요행으로 뛰어나가서 결사적으로 전투를 하여 겨우 포위망을 뚫어 놓기는 하였으나 후군 전대가 아직 포위망 속에 있으니 앞으로 여러 차례를 전투를 한 다음에야 전군이 모두 나올 수 있게 되었으니 효상(爻象)이 진실로 능름한 기세인 것이다. 액상(額上)에서 땀이 나온 것은 선봉일대가 결사적으로 포위진을 뚫고 뛰어 나오는 상이요 미릉(眉稜)에서 땀이 나는 것은 전군 전대가 적진을 무찌르는 용감한 상이요 관상(顴上)에서 땀이 나는 것은 중군 반대(中軍 半隊)가 천천히 포위를 뚫고 나오는 상이니 이 병에서 미릉에서 땀이 나오면 위급한 것을 꽤히 면한 것이고 관상에서 한출하는 것은 병이 위급하지 않은 것이다.

[12-7] 태음인 땀은 이마 눈썹 뺨을 막론하고 땀방울이 기장알 같이 굵어야 하며 또 열이 약간 오래 있다가 들어가면 정기가 강하고 사기가 약한 것이니 상괘한 땀이지만 만일 땀방울이 적고 또 방울이 없이 잠시 후에 들어가면 정기가 약하고 사기가 강한 것이니 상괘하지 못한 땀이다.

[12-8] 태음인이 등 뒤 목덜미 아래에는 땀이 있어도 얼굴 발제(髮際) 아래로 땀이 나지 않는 것은

홍(匈)한 병세이고 또 얼굴 전면에 땀이 있어도 양쪽 이문(耳門)에서 땀이 나지 않는 것은 죽는 증세이다. 대체로 태음인의 땀은 귀 뒤의 높은 뼈와 안면 발제에서 시작하여 젖가슴에서 크게 통하면 이는 병이 풀리는 것이고 발제의 땀은 비로소 죽음을 면하기 시작한 것이고 이마에서 나는 땀은 겨우 위험을 면하는 것이고 눈썹 가에서 나는 땀은 위험을 완전히 면한 것이고 뺨에서 나는 땀은 살 길이 넉넉히 활짝 열린 땀이고 입술과 턱에서 나는 땀은 병이 이미 풀린 것이고 젖가슴에서 나는 땀은 병이 완전히 풀린 것이다. 대체로 모든 태음인의 땀은 귀 뒤 높은 뼈와 안면발제에서부터 시작하여 젖가슴에서 크게 통하면 병이 풀리는 것이다. 일찍이 이마에서 땀이 나기 시작하여 눈두덩위에 땀이 나려고 할 때에는 한궤를 일으키는 증상이 맹렬하지 못하고 뺨 위의 땀이 나서 입술과 턱에 일으키려는 땀은 한궤이 몹시 맹렬하여 한전(寒戰)을 일으켜 이빨을 부딪치면서 턱을 떠는 것이 완전히 동풍(動風)증을 일으킬 것처럼 되더니 그 땀이 양쪽 겨드랑이 밑으로 곧장 도달하는 것이다. 장중경이 말한 궤이 심한 것은 또한 열이 심하다 하였고 궤이 미약한 것은 또한 열도 미약하다 한 것은 모두 이 한궤하는 병증을 보고 이르는 말이다. 이 병증에서 한궤하는 증상이 여러 날 계속하는 것은 그 병이 중증이 되려는 형세이고 한궤하는 증상이 몹시 맹렬한 것은 중증이 될 병세가 아니다.

[12-9] 이런 증세를 경기도 사람은 장감병이라 하고 함경도 사람은 사십일통(四十日痛)이라 하고 혹은 무한건병(無汗乾病)이라고 하여, 흔히 쓰는 약이 형방패독산(荊防敗毒散) · 곽향정기산(藿香正氣散) · 보중익기탕(補中益氣湯)인데, 모두 이병을 잘못 치료하는 것이니 오직 웅담(熊膽)이 혹 맹인 직문(盲人直門)격으로 잘 듣는 수가 있는 것이다. 그러나 웅담을 쓰고도 다른 적당치 못한 약을 이어 쓰면 병세가 다시 변하는 것이다. 옛사람이 병이 사람을 죽이는 것이 아니라 약이 능히 사람을 죽일 수 있다 하였으니 과연 믿지 않을 수 있겠는가. 모든 병이 더하고 덜 하는 증상을 보통 식견으로 보고 추측하며 알기 어려워 더욱 이 병증은 더욱 심한 것이다. 이 병증에서 땀이 미릉과 관상에서 나오면 그런 때는 약을 쓰지 않아도 병이 스스로 나올 수 있는 것인데 병인이 의사를 불러 오게 하여 적당치 못한 약을 투약하면 관상에서 나오던 땀이 다시 액상으로 올라가면 외증(外證)인 한궤하는 증세가 좀 덜하게 되어 이것을 보고 의사는 자기의 약효가 난다고 믿고 또한 병인도 약효가 있다고 생각을 하여 또 잘못된 약을 며칠 더 쓰면 이번에는 액상에서 나오던 땀마저 끊어져 죽는 것이다. 그러므로 이 병은 땀의 진퇴로서 경중을 알 것이고, 한궤하는 증상이 맹렬하고 미약한 것은 병의 경중을 점쳐서는 안 된다. 장중경이 말하기를 그 병증에 약을 쓰지 않아도 스스로 나올 수 있다고 한 것이 어찌 진중하고 거짓이 없는 말이 아니겠는가? 그러나 장감병에 있어서 역기(疫氣)가 없는 환자는 스스로 낫기를 기다려도 좋겠으나 온병(瘟病)에 역기가 심한 사람은 병증과 약성을 밝게 알고 의심할 것이 없이 밝게 안다면 약을 쓰지 않고 심상하게 두어 병이 스스로 낫기를 기다려서는 안 된다. 그렇게 하면 기증(奇證)이 생길까 두렵기 때문이다.

[12-10] 태음인 병이 한궤 4일에 무한자(無汗者)는 중증이고 한궤 5일에 무한자는 험증이니 마땅히 웅담산을 쓰거나 혹 한다열소탕(寒多熱少湯)에 제조(蟻蟻) 5,7,9개를 가(加)하되 대변 묽으면 반드시 건율(乾栗) · 의이인(薏苡仁) 등을 써야하고 대변이 굳으면 갈근(葛根) · 대황(大黃) 등속을 써야 한다. 만약 이마, 눈두덩 위에서 땀이 보이면 스스로 병이 낫기를 기다리며 병이 나온 뒤에도 약을 써서 조리해야 한다. 그렇지 않으면 후유증이 생길 우려가 있다.

[12-11] 일찌기 태음인이 위완한증(胃脘寒證)의 온병(瘟病)을 치료한 적이 있다. 태음인 한 사람이 평소에 정충(怔忡), 무한(無汗), 기단(氣短), 결해(結咳)가 있었는데 갑자기 한 증세가 더하여 설사가 수 십일이 되어도 멎지 않는데 이것은 표병(表病)으로 중증(重證)이다. 태음조위탕(太陰調胃湯)에 저근백피(樗根白皮) 1돈을 가하여 매일 2첩씩 10일간 썼더니 설사가 멎으므로 계속 30일을 쓰니 매일 얼굴에서 땀이 흐르고 본디 갖고 있던 병증도 나아갔다. 그런데 별안간 그 집안사람 5, 6명이 한꺼번에 온역병에 걸려 이 사람이 그것을 간호하게 되어 수일간 약을 복용하지 못하였다. 또한 이 사람도 온병에 전염되어 입맛이 잃고 아무것도 먹지를 못한다. 곧, 태음조위탕에 승마(升麻) · 황금(黃芩) 각 1돈을 가하여 계속 10일간 복약하게 하였더니 얼굴에서 땀이 흐르고 역기도 약간 덜 하는데 대변을 이틀간 보지 못하므로 곧 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 5일간 썼더니 5일 동안 죽을 2배로

먹고 역기도 대감(大減)하면서 병이 풀리는 것이다. 또한 태음조위탕에 승마·황금을 가하여 40일간 조리시켰더니 역기는 이미 풀렸고 본래 앓던 병증도 완치되었다.

[12-12] 결해(結咳)라고 하는 것은 힘을 써서 기침을 하면서 가래를 뱉으려고 하여도 잘 떨어져 나오지 않기도 하고 혹 떨어져 나오기도 하는 것을 결해라 한다. 소음인 결해를 흉결해(胸結咳)라하고 태음인 결해를 함결해(頤結咳)라고 한다.

[12-13] 대개 온역은 먼저 그 사람의 평소의 병이 어떠한가를 살펴보아야 표리허실(表裏虛實)을 잘 알 수 있는 것이다. 평소 한증(寒證)의 병이 있는 사람이 온병(瘟病)에 걸리면 역시 한증이 되고 평소 열증의 병이 있는 사람이 온병에 걸리면 역시 열증(熱證)이 된다. 평소의 병이 경(輕)한 사람이 온병에 걸리면 중증(重證)이 되고 평소 병증이 중(重)한 사람이 온병에 걸리면 험증(險證)이 된다.

[12-14] 태음인 한사람의 평소 병이 목안이 건조하고 얼굴빛이 청백(淸白)하며 몸이 차고 설사를 하는 증세가 있었다. 목안이 건조한 것은 간열(肝熱)이고 얼굴이 청백하며 몸이 차고 혹 설사 하는 것은 위완한(胃脘寒)이다. 이 병은 표리가 모두 병이 된 것이니 평소 병이 매우 중(重)한 것이다. 이 사람이 온병이 전염되었는데 그 증세가 병이 시작하여 풀리기까지 20일 사이에 대변이 처음에는 활(滑) 혹 설사하기도 하고 중간은 활하다가 끝에 가서는 건조한 대변을 보기도 한다. 이와 같이하기를 매일 3,4회씩 보지 않는 날이 없었다. 그리하여 처음 약은 한다열소탕(寒多熱少湯)을 쓰고 병이 풀린 후에 조리폐원탕(調理肺元湯)을 40일 동안 써서 조리를 시켰더니 겨우 생명을 구하게 된 것이다. 이 병이 처음 시작할 때는 대변이 혹 묽기도 하고 혹 설사하기도 하며 6일까지는 이마 눈썹 뺨에 땀이 나고 음식과 기거가 평소와 같으므로 6일 후에 비로소 약을 쓰니 7일에는 발제이하 입술과 턱에 이르기까지 얼굴 전체에 땀이 줄줄 흐른다. 땀이 흡족히 흘러 떨어지더니 땀이 난 후에 얼굴색이 청색을 띠고 어눌증(語訥證)이 일어나더니 8,9일에는 어눌증에 이농증(耳聾證)을 더하면서 입술의 땀이 다시 뺨의 땀으로 돌아가고, 뺨의 땀이 돌아가 눈두덩이의 땀으로 되면서, 땀이 미립(微粒)모양으로 때로 있다 없다 하더니 단지 이마의 땀만 있고 숨이 몹시 차다. 10일째 되던 밤에는 이마의 땀마저 들어가고 어눌증과 이농증은 더욱 심하여지고 가래덩어리가 목에 막혀서 입으로 뱉어 내지 못하고 병인이 손가락으로 더듬어 고집어내었다. 11일에 호흡곤란이 더욱 심하여지더니 12일에 이르러 갑자기 죽을 2사발이나 먹었다. 이런 때는 웅담산(熊膽散)이나 써보는 것이 좋겠지만 웅담도 없으니 나의 생각으로는 이 사람이 반드시 오늘 저녁에 죽을 것이라고 짐작하고 있었다. 그러나 그 사람이 그날 초저녁부터 호흡이 잠깐 안정되는 것이다. 13일 새벽 계명(鷄鳴)시부터는 면부 발제(面部髮際)에 땀이 나고 14,15일 연 3일간 죽을 2, 3사발씩이나 먹으면서 이마 눈두덩 뺨에 차차 땀이 나고 얼굴에 청색이 없어지고 16일에는 가슴에서 비로소 땀이 나고 가래를 조금씩 뱉고 어눌증도 또한 없어졌다. 20일에 이르러서는 가슴에서 수차례 많은 땀이 나고 드디어 차츰 방안에서 걷기도 하고 모든 증상이 다 나았으나 아직 이롱증이 남아있다. 그리하여 병이 풀린 후에 약을 써서 40일간 조리 시켰더니 이롱증과 어지러운 증세도 스스로 없어지는 것이다.

태음인 간수열이열병론(40조)

[13-1] 주굉(朱肱)이 말하기를 양독(陽毒)은 얼굴에 붉은 반점이 있는데 그 반점이 마치 비단 무늬같이 나타나기도 하고 목구멍이 아프며 가래에 피고름이 섞여서 나오는 것이다. 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)·흑노환(黑奴丸)을 써야 한다. 양독과 괴증상한(壞證傷寒)은 의서(醫書)에 치법(治法)이 별로 없지만 정신과 기혈(氣血)이 이미 마른 것이라도 가슴에 아직 따뜻한 기가 있으면 입을 벌려 흑노환을 물에 부어 넣어 약물이 목구멍으로 넘어가기만 하면 즉시 살아난다.

[13-2] 이천(李梴)이 말하기를 미오한(微惡寒) 발열(發熱)에 마땅히 갈근해기탕이요, 눈알이 아프고 콧속이 마르며 땀이 쏟아지다가 막히고 조갈이 심하며 미친 사람같이 헛소리를 하면 조위승기탕(調胃承氣湯)을 쓰는 것이 좋다. 열이 표(表)에 있으면 눈이 아프고 잠을 이루지 못하니 마땅히 해기탕(解肌湯)을 쓰고 열이 리(裏)에 들어가면 미친 사람같이 헛소리를 하니 마땅히 조위승기탕을 쓴

다.

[13-3] 공신(龔信)이 말하기를 양명병(陽明病)에 눈알이 아프고 콧속이 마르고 잠을 이루지 못하면 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)을 쓴다.

[13-4] 삼양병(三陽病)이 심하면 양독으로 변한다. 얼굴이 붉고 눈이 빨가며 몸에는 노란 반점이 생기고 간혹 황적색의 설사를 하며 육맥(六脈)이 홍대(弘大)하면 마땅히 흑노환(黑奴丸)을 쓴다.

[13-5] 위의 증에는 갈근해기탕 흑노환을 사용한다.

[13-6] 영추(靈樞)에 말하기를 척맥(尺脈) 부위 피부에 열이 깊어서 맥(脈)이 성(盛)하고 조증(燥證) 있는 자는 온병(瘟病)이다.

[13-7] 왕숙화(王淑和)가 이르기를 온병맥(瘟病脈)은 음양(陰陽)이 다 같이 성하니 병의 열이 극도에 이르면 맥이 부지이활(浮之而滑)하며 침지이산삼(沈之而散溢)하다.

[13-8] 맥법(脈法)에 온병 2~3일에 몸에 열이 나고 배가 부르며 두통이 있으며 음식은 전과 같고 맥이 곧고 빠르면 8일에 죽고 온병이 4~5일이 되어서 두통이 나고 배가 부르면서 토하고 맥이 가늘면서 굳세게 나오면 12일에 죽는다. 또 8~9일이 되어서 머리와 몸이 아프지 않고 눈알이 붉거나 얼굴색이 변하지 않으나 설사를 하며 맥이 삼(澁)해도 누르면 없어지고 들면 크게 나타나고 명치 밑이 단단하면 17일에 죽는다.

[13-9] 공신(龔信)이 말하기를 온병에 열이 몹시 성하나 맥이 가늘게 나오면 죽는 것이고 온역에 설사가 심하고 배가 몹시 아픈 것도 죽는다.

[13-10] 공신이 또 말하기를 병술년(丙戌年)에 내가 대량(大梁) 땅에 살고 있을 때에 온역병(瘟疫病)이 크게 유행하여 많은 사람들이 죽어 가는 것을 보았다. 그 온역병의 증상을 말하면 병이 발생하는 초기부터 크게 고열이 발하면서 오한을 거듭하는 것이다. 그리고 이어 머리에서부터 얼굴 목 뺨에 이르기까지 붉게 붓고 인후에 염증을 일으켜 아프며 혼수상태가 된다. 그리하여 내가 한 가지 비방을 발명하고 이성구고환(二聖救苦丸)이라 하였다. 대황(大黃) 4양(兩)과 저아조각(豬牙皂角) 2양(兩)을 가루로 만들어 밀가루 풀로 환을 만드는데 녹두알 크기로 한다. 복용법은 1회에 50~70환(丸)을 한번만 먹게 한다. 한번 먹고 즉시 땀이 나고 그 병이 풀리니 건강한 사람들에게는 백발백중으로 낫는 것이다. 조각(皂角)은 땀구멍을 열고 사기(邪氣)를 땀으로서 밖으로 발산시키고 대황은 속에 있는 모든 열화와 사기(邪氣)를 설사로서 아래로 통하게 하는 것이다.

[13-11] 신이 또 말하기를 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절에 바르지 못한 나쁜 사기(邪氣)에 감염되면 사람으로 하여금 가래가 성하여 막히고 번열(煩熱)이 나고 머리와 온 몸이 쑤시고 아프면서 또 열이 크게 나서 오한증이 점점 더하여 목이 뻣뻣하며 눈동자가 쑤시며 혹은 음식과 기거하는 것은 보통 때와 다름없고 심하게 되면 목이 쉬고 혹은 눈이 벌겍게 되고 입안이 험고 뺨에는 크고 작은 부스럼이 생기며 목구멍이 아파서 기침하게 되면 끈끈한 가래가 나오고 재채기를 하는 것이다.

[13-12] 우측 제증에 증한 장열조삽자는 조각대황탕(皂角大黃湯) · 갈근승기탕(葛根承氣湯), 두면 항협적종자는 조각대황탕 · 갈근승기탕, 체열복만자리자는 열이 승하면 이증(裏證)이니 갈근해기탕(葛根解肌湯), 한이 승하면 표증(表證)이 태중이니 태음조위탕(太陰調胃湯)에 승마 · 황금을 가한다.

[13-13] 태음인이 소병으로 안병이 있어서 때로는 나왔다가 때로는 재발하곤 하였다. 이렇게 몇 해를 지내오던 참에 이 사람이 온병에 걸린 것이다. 1~5일 병 발생 첫 날 부터 열다한소탕을 3, 4, 5일을 계속 썼더니 대변이 흑 묽기도 하고 흑 설사를 하다가 6일에 이르러서 대변이 1일간 불통하는

것이다. 그리하여 즉시로 쓴 것이 갈근승기탕(葛根承氣湯)이었다. 3일간 계속 썼더니 죽을 곱 배나 더 먹고 3일간 또 다시 썼더니 역기가 크게 풀리고 나온 것이다. 병해 후 다시 열다한소탕(熱多寒少湯)을 쓰니 대변이 조삽하면 가 대항1돈하고, 묽거나 설사를 하면 대항을 빼고 썼다. 20일간 조리하니 완전히 건강해졌다.

[13-14] 이 병이 처음에는 구역구토(嘔逆嘔吐)하며 혼궤불성(昏憤不)하여 중통하더니 말경에 다시 가벼워져 20일로서 병이 풀린 것이다.

[13-15] 10세된 아이가 리열 온병(裏熱 瘟病)에 걸렸다. 미음이거나 약도 전혀 입으로 넘기지 못하고 열이 가득차서 때로 냉수를 마시는 것이다. 이렇게 11일에 이르러서 대변을 못 본지 이미 4일이 되었다고 한다. 무서워서 겁을 내며 헛소리하기를 각종 벌레가 방안에 가득하다고 하며 또 내 몸으로 쥐가 들어온다고 하며 황급히 엎드려 엉금엉금 기며 놀라 소리 지르며 눈물을 흘리며 우는 것이다. 열이 극도에 이를 때는 동풍이 생겨 두 손이 차가워지는 것이다. 급히 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 다려서 울고 있는 것도 꺼리지 않고 역지로 입안에 부어 넣었더니 그날로 미음을 곱으로 더 먹고 역기가 크게 풀려 요행으로 생명을 살린 것이다.

[13-16] 이 병이 발생한 지 4~5일 동안은 먹는 것이나 앉고 서는 것이 뒤틀터하여 보통 사람과 다름이 없다가 나중에 도리어 중병으로 변하여서 17일로서 병이 풀린 것이다.

[13-17] 내경에 말하기를 모든 조삽하여 깔깔한 것(澁)에 몸이 여위고 마르고 쭈글쭈글하게 되어 천하게 된 것은 모두 조삽(燥)에 속하는 것이라 하였다.

[13-18] 태음인이 면색이 청백자는 다무조증(多無燥證)하고 면색이 황적흑자는 다유조증(多有燥證)이니 모두 간열폐조(肝熱肺燥)하기 때문이다.

[13-19] 내가 일찌기 태음인의 간열폐조증(燥熱證)을 치료하여 본 바 있다. 그 증상이 손가락이 붉으레 검은 반점에 창병이 있었다. 처음에 왼손 가운데 손가락이 붉으레 검게 되고 힘이 없더니 2년이 채 못 되어서 한 손가락이 검은 피가 탄 것처럼 엉키어서 손바닥을 지나고 손등까지 부어 있는 것이다. 칼로 손가락을 잘라버렸더니 또 1년이 채 못 되어서 반창이 몸 전체에 두루 퍼진 것이다. 큰 것은 큰 엽전과 같고 작은 것은 작은 엽전과 만큼 되어 있다. 이런 악한 병에 잡힌 지 이미 3년이 나 지내었다. 한창때인 청장년인 사람으로서 손에 힘이 없어 불과 반시간도 일 할 수 없고 다리 힘이 없어서 1일에 30회도 걷지 못하는 것이다. 열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본 2돈, 대항 1돈을 가하여 28첩을 썼더니 대변이 비로소 묽어지다가 겨우 하루나 이틀을 지나더니 굳어지는 것이다. 그리하여 다시 20첩을 썼더니 대변이 심한 설사가 아니고 묽게 나감으로서 얼굴에 반창이 조금 차도가 있고 손의 힘 다리의 힘이 조금 효과가 있는 것이다. 다시 20첩을 쓰고 그 병이 쾌차하였다.

[13-20] 영추에 이양결(二陽結)을 소(消)라 이름이니 음수1 소변2(飲一溲二)면 죽는 것으로 불치라고 하였고 주(註)에 이양결은 위와 대장의 열결(熱結)이라고 하였다.

[13-21] 편작 《난경(難經)》에 소갈 맥은 긴실이삭(緊實而數)인데 오히려 침색(沈瀦)하고 미(微)한 것은 사증이다 하였다.

[13-22] 장중경이 소갈병에 소변이 오히려 많아 음수 일두(一斗)에 소변이 역시 일두하면 신기환(腎氣丸)으로 치료한다.

[13-23] 이병은 소양인 소갈병이 아니고, 태음인 조열병이다. 신기환(腎氣丸)을 사용치 말고 열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본과 대항은 가하여 쓴다.

[13-24] 태음인 50세 가까운 사람이 심히 쇠약해진 것이다. 이 사람이 조열증으로 물을 많이 마시고 소변을 많이 누며 변비가 되었다. 열다한소탕(熱多寒少湯)을 쓰는데 고본 2돈, 대황 2돈을 가해서 20첩을 쓰고 효과를 보았다. 그 후 1개월 후에 다른 의원에게서 약을 5첩 쓰니 다시 병이 재발되는 것이다. 그리하여 또 다시 열다한소탕을 쓰는데 고본과 대황을 가해서 50~60첩을 썼더니 약을 쓰는 기간에 겨우 지탱하다가 결국 사망하였다. 태음인 년소자가 조열병에 걸렸다. 열다한소탕에 고본·대황을 가하여 300첩을 썼는데 겨우 1년 지탱하다가 사망을 면치 못하였다. 이 사람이 병이 생긴 지 1년 쯤 되었으니 간혹 다른 의사의 처방을 썼는 지 알 수 없는 연고로 어찌 할 수 없도다. 대개 조열병은 물 한 사발 마시면 오줌 두 사발을 누며 병이 극에 이르면 고치기 어렵다. 무릇 태음인이 대변이 비조(秘燥)하고 오줌이 많다고 생각되며 물이 많이 먹히거든 빨리 약을 써서 미리 예방해야 한다.

[13-25] 이 병은 반드시 불치병이 아니다. 이 젊은 사람은 병을 얻고 약을 사용한지 1년 후에 비로소 죽었다. 대개 이병은 원래 치락무염(修樂無厭)하여 불같은 욕심(慾火)이 매우 심하여 간열이 크게 성하게 되고 폐조가 매우 심하게 된 까닭이다. 만약 그 젊은 사람이 백일동안 안심척욕(安心滌慾)하면서 약을 쓴다면 어찌 불치병이 될 이치가 있겠는가? 대개 병이 시작하는 날로 부터 죽는 날까지 욕심이 불같이 밖으로 내달리지 않는 날이 없었기 때문인 것이다. 속담에 말하기를 당대 이전의 대대 어른들의 덕택은 비록 낱알이 갠 수는 없지만 마음을 공손히 삼가는 은덕의 혜택은 반드시 하나하나 갠음을 받지 않는 것이 없다 하니 무릇 어떠한 병자를 막론하고 그 마음을 삼가 공경하며 불같은 욕심을 깨끗이 씻고 마음을 가라앉히고 착한 마음을 가지면 100일이면 그 병이 낫지 않을 이치가 없고 200일을 안정하여 치료하면 그 사람이 완전하게 되지 않을 이치가 없는 것이다. 마음을 공손히 삼가는 덕택을 낱알이 받는 것과 같이 100가지 일이 다 그러하므로 질병에 있어서는 더욱 그러한 것이다.

[13-26] 위역림이 말하기를 음혈이 모갈(耗竭)하여 이롱(耳聾), 목암(目暗), 각약(脚弱), 요통이 오면 흑원단(黑元丹)을 쓴다 하였다.

[13-27] 무릇 남자가 떳떳한 기운이 한창인 젊은 사람으로서 오히려 겁을 내는 것은 천품 본래의 성질이 약한 것이며 신체가 허한 것은 아니다. 자익(滋益) 처방이 고루 많이 있으나 약력이 미약하여 그 효과를 보기가 어려운 것이니 본연의 선천적인 원기를 보하여 수승화강(水升火降)하게 하면 오장이 스스로 순화하여 백병이 생기지 않으니 공진단(拱辰丹)을 사용한다.

[13-28] 이러한 병세에 흑원단·공진단이 좋기는 하지만 당귀나 산수유는 태음인에게 벌레와 같은 약이므로 공진흑원단(拱辰黑元丹)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 써야 한다.

[13-29] 태음인의 병증에 음식을 먹은 후에 가슴과 배가 더부룩하며 다리에 힘이 없는 병세가 있으니 마땅히 공진흑원단(拱辰黑元丹)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)·태음조위탕(太陰調胃湯)·조위승청탕(調胃升淸湯)을 써야 한다.

[13-30] 태음인 병증에 설사병이 있으니 표한증설사(表寒證泄瀉)에 태음조위탕(太陰調胃湯)을 쓰고 표열증설사(表熱證泄瀉)에 갈근나복자탕(葛根蘿菥子湯)을 쓴다.

[13-31] 태음인 병증에 해수(咳嗽)병이 있으니 마땅히 태음조위탕(太陰調胃湯)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)·공진흑원단(拱辰黑元丹)을 써야 한다.

[13-32] 태음인 병증에 효천(哮喘)병이 있으니 중증(重證)이다. 마땅히 마황정천탕(麻黃定喘湯)을 써야 한다.

[13-33] 태음인 병증에 흉복통(胸腹痛)병이 있으니 위험증(危險證)이다. 마땅히 마황정통탕(麻黃定痛湯)을 써야 한다.

痛湯)을 써야 한다.

[13-34] 태음인 소아가 설사를 10여 번 이상 거듭하면 반드시 만경풍(慢驚風)을 일으키게 되므로 보폐원탕(補肺元湯)으로 예방해 주어야 한다.

[13-35] 태음인이 복창부종(腹脹浮腫)하는 병이 있으니 마땅히 건율제조탕(乾栗蟻蟮湯)을 써야 한다. 이 병은 지극히 위험한 병으로 열의 아홉은 죽는 병이다. 비록 약을 써서 나았더라도 3년 안에 재발되지 않아야 비로소 살았다고 말할 수 있는 것이다. 사치와 향락을 경계하고 하고 싶은 것과 욕심을 버려야 하며 3년 동안 반드시 그 몸과 마음을 공경해야 하는 것이니 섭생하고 조심하는 것은 반드시 그 사람의 마음에 달려 있는 것이다.

[13-36] 무릇 태음인의 병에 있어서 만약 부종이 이미 발한 후에 이를 다스리면 열에 아홉은 죽는 병이다. 그런즉 이 병을 병으로 논해서는 안 되고 죽음으로 논하는 것이 옳을 것이다. 그렇다면 이 렇게 위독한 병을 어찌하여야 좋은가? 무릇 태음인이 노심초사(勞心焦思)하여 자주 도모한 일이 이루어지지 못한 자이거나 혹은 설사와 이질병이 오래된 자와 혹은 임병(淋病)으로 소변불리한 자와 식후에 비만증이 있으면서 퇴각무력(腿脚無力)한 병들이 모두 점차 부종이 되는 것이다. 이미 병이 중하여 험병(險病)이 되었으니 이때부터 부종으로 논해서 탕척욕화(蕩滌慾火)하고 공경기심(恭敬其心)하여 약을 써서 치료함이 옳을 것이다.

[13-37] 태음인의 병에 몽설병(夢泄病)이 있는데 1개월에 3-4회를 발설하는 것은 허로(虛勞)로서 중증(重證)이다. 대변이 하루 변비가 되면 열다한소탕(熱多寒少湯)에 대항 1돈을 가하고 대변이 매일 굳지 않으면 대항을 빼고 용골(龍骨)을 가하여 쓴다. 혹은 공진흑원단(拱辰黑元丹)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 쓴다. 이 병은 모려태다(謀慮太多)하고 사상무궁(思想無窮)하여 생긴 병이다.

[13-38] 태음인이 졸중풍(卒中風)병이 있는데 가슴이 짝 막혀 숨이 통하지 못하고 가래 끓는 소리가 나고 두 눈을 딱 부릅뜨고 있는 자에게는 반드시 과체산(瓜蒂散)을 써야 한다. 손발에 경련이 나고 눈을 감고 있는 자에게는 마땅히 우황청심환(牛黃清心丸)을 써야 한다. 평소 얼굴빛이 황적흑(黃赤黑)한 사람들은 눈을 부릅뜨는 자가 많고 평소 얼굴빛이 창백한 사람들은 대개 눈을 감는 자가 많다. 얼굴빛이 창백하고 눈을 감는 자가 손발에 경련이 일어난다면 그 병은 위급하게 된 것이다. 경련이 일어나기를 기다릴 필요가 없이 눈을 감고 있으며 평소 얼굴빛이 창백한 사람이라면 급히 청심환(淸心丸)을 써야 한다. 고방청심환(古方淸心丸)이 번번이 실효한 것이다. 눈을 부릅뜨는 자는 병이 급히 발생하나 조금 완완하게 죽는 것이고 눈을 감은 자는 병이 급히 발하고 급히 죽는다. 그러나 눈을 부릅뜨는 자도 병이 완만한 것이라고만 생각하면 옳지 않으며 급히 치료를 하여야 한다.

[13-39] 우황청심환(牛黃清心丸)은 집집마다 반드시 있는 약물이 아니므로 마땅히 원지(遠志)·석창포(石菖蒲) 분말 각 1돈씩을 입에 넣어주고 이어서 조각(皂角)가루 3푼을 코에다가 붙여넣는다. 이 병증에 손발에 경련을 일으키고 목이 뻣뻣해지면 위험한 것이다. 곁에 있는 사람들이 손으로 환자의 두 손목을 잡고 양쪽 어깨를 좌우로 운동시켜 주어야 하며 또 환자의 두 발목을 잡고서 양 무릎을 굴신시킨다. 태음인 중풍은 환자의 양쪽 어깨와 다리를 요동시켜 주는 것이 좋다. 소양인 중풍은 환자의 수족을 요동시키면 크게 해롭고 앉히거나 안아서 일으키는 것도 좋지 않다. 소음인 중풍은 곁에 사람들이 환자를 꺼안아 일으켜 앉히는 것은 좋으나 양쪽 어깨를 흔드는 것은 좋지 않고 환자의 수족을 천천히 문질러 안마해 주는 것이 좋다.

[13-40] 중독으로 토사(吐瀉)할 때는 마땅히 사향(麝香)을 써야 한다.

새로 정한 태음인병의 주요 24처방

태음조위탕

의이인 · 건물 각3돈, 나복자 2돈, 오미자 · 맥문동 · 석창포 · 길경 · 마황 각1돈.

#### 갈근해기탕

갈근 3돈, 황금 · 고본 각1돈5푼, 길경 · 승마 · 백지 각1돈.

#### 조위승청탕

의이인 · 건물 각3돈, 나복자 1돈5푼, 마황 · 길경 · 맥문동 · 오미자 · 석창포 · 원지 · 천문동 · 산조인 · 용안육 각1돈.

#### 청심연자탕

연자육 · 산약 각2돈, 천문동 · 맥문동 · 원지 · 석창포 · 산조인 · 용안육 · 백자인 · 황금 · 나복자 각1돈, 감국화 3푼.

#### 마황정천탕

마황 3돈, 행인 1돈5푼, 황금 · 나복자 · 상백피 · 길경 · 맥문동 · 관동화 각1돈, 백과(볶아서 누른빛을 띄는 것) 21개.

#### 마황정통탕

의이인 3돈, 마황 · 나복자 각2돈, 행인 · 석창포 · 길경 · 맥문동 · 오미자 · 사군자 · 용안육 · 백자인 각1돈, 건물 7개.

#### 열다한소탕

갈근 4돈, 황금 · 고본 각2돈, 나복자 · 길경 · 승마 · 백지 각1돈.

#### 한다열소탕

의이인 3돈, 나복자 2돈, 맥문동 · 길경 · 황금 · 행인 · 마황 각1돈, 건물 7개.

#### 갈근승기탕

갈근 4돈, 황금 · 대황 각 2돈, 길경 · 승마 · 백지 각1돈.

본 처방에 대황 2돈을 가하면 갈근대승기탕이라고 하고, 대황 1돈을 빼면 갈근소승기탕이라고 한다.

#### 조리폐원탕

맥문동 · 길경 · 의이인 각2돈, 황금 · 마황 · 나복자 각1돈.

#### 마황발표탕

길경 3돈, 마황 1돈5푼, 맥문동 · 황금 · 행인 각1돈.

#### 보폐원탕

맥문동 3돈, 길경 2돈, 오미자 1돈.

산약 · 의이인 · 나복자 각1돈을 더하면 더욱 신묘하다.

#### 녹용대보탕

녹용 2, 3, 4돈, 맥문동 · 의이인 각1돈5푼, 산약 · 천문동 · 오미자 · 행인 · 마황 각1돈.

○ 허약한 사람의 표증으로 한증이 많은 경우에 써야 한다.

#### 공진흑원단

녹용 4, 5, 6냥, 산약 · 천문동 각4냥, 제조 1, 2냥, 사향 5돈.

오매육을 삶아 고가 되면 섞어서 오자대 크기로 환을 만든다. 5, 7, 10환을 따뜻한 물에 복용하거나 소주로 먹어도 된다.

○ 허약한 사람의 리증이 많은 경우에 써야 한다.

#### 조각대황탕

승마 · 갈근 각3돈, 대황 · 조각자 각1돈.

○ 이 처방을 쓰는 경우에 3, 4첩을 넘게 써서는 안되니, 승마 3돈과 대황 · 조각은 같은 약력을 가진 것으로 강하고 맹렬하기 때문이다.

#### 갈근부평탕

갈근 3돈, 나복자 · 황금 각2돈, 자배부평 · 대황 각1돈, 제조 10개

○ 부중에 리증으로 열증이 많은 경우에 써야한다.

#### 건율제조탕

건율 100개, 제조 10개.

다려서 복용하거나 혹은 구워 먹는다. 황율과 제조 10개를 가루로 만들어 , 별도로 황율 다린 물로 복용한다.

○ 부중에 표증으로 한증이 많은 경우에 써야한다.

#### 건율저근피탕

건율 1냥, 저근백피 3, 4, 5돈.

○ 이질을 치료한다. 혹은 다려서 복용하고, 혹은 환으로 만들어 복용하는데, 환으로 복용하는 경우에는 저근백피 5돈을 쓰기도 한다.

#### 과체산

과체를 볶아서 누렇게 된 것을 가루로 만들어 3. 5푼을 따뜻한 물로 복용하거나, 혹은 말린 과체 1돈을 신속히 다려서 복용한다.

○ 졸중풍병으로 가슴이 가로막혀 틀어막힌 소리가 있으면서 눈을 부릅뜨는 경우에는 반드시 써야 한다. 이 약은 이 병과 증에는 쓸 수 있으나, 다른 병과 증에 써서는 안 된다.

○ 면색청백, 이소유한증, 표허자, 졸중풍, 즉당용, 웅담산 · 우황청심원 · 석창포원지산, 이불가용과 체산. (원문에는 해석이 없으나, 의미상: 얼굴빛이 푸르거나 희면서 평소에 한증으로 표허한 사람이 중풍에 걸린 경우에는 웅담산 · 우황청심환 · 석창포원지산 등을 써야 하며, 과체산을 써서는 안 된다.)

#### 웅담산

웅담 3, 5푼

따뜻한 물로 복용한다.

#### 사향산

사향 3, 5푼

따뜻한 물로 복용하거나, 따뜻한 술에 복용한다. 단지 3, 5푼을 거론했지만, 4푼도 해당된다.

#### 석창포원지산

원지 · 석창포 각1돈, 저아조각 가루낸 것 3푼.

따뜻한 물로 복용한다. 혹은 원지 · 석창포 가루를 따뜻한 물에 복용하고, 조각가루는 코에 붙여 넣는다.

#### 맥문동원지산

맥문동 3돈, 원지·석창포 각1돈, 오미자 5푼.

#### 우황청심원

○ 이상의 태음인약 여러 종류 중에 행인은 두 개의 씨알맹이와 피침(알맹이 끝의 씨눈)을 제거하고, 맥문동과 원지는 심을 빼버리며, 백과와 황을 껍질을 제거하고, 대황은 술로 찌거나 날 것으로 쓰며, 녹용과 조각은 졸인 젖을 발라서 볶고, 산조인, 행인 백과는 볶아서 쓴다.

#### 태양인 외감 요척병론(4조)

[14-1] 내경(內經)에 말하기를 척맥(尺脈)이 완삽(緩澁)한 것을 일러 해역(解佚)이라 한다. 해석하여 말하기를 척맥(尺脈)은 음부(陰部)가 되고 간(肝)과 신(腎)이 주한다. 완(緩)은 열중(熱中)한 것이고 삽(澁)은 망혈(亡血)이 되기 때문에 해역(解佚)이라 일컬은 것이다. 해역(解佚)이라는 것은 추운 듯 하나 춥지도 않고 더운 듯하나 덥지도 않고 약한 듯하나 약하지도 않고 씹직한 것 같으나 씹직하지도 않으니 괴상하기를 무엇이라고 이름 할 수 없어서 해역(解佚)이라 일컬은 것이다.

[14-2] 영추(靈樞)에 말하기를 골수(骨髓)가 상하면 말라 버려서 종아리가 저리고 몸이 해역(解佚)하여서 가지를 못한다. 가지를 못한다는 것은 걸어서 가지를 못한다는 것을 일컬은 것이다.

[14-3] 나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 요척(腰脊)병으로 아주 중한 증이니 반드시 너무 슬퍼함을 경계(警戒)하고 성내는 것을 멀리하며 마음을 태평하게 한 후에야 그 병이 가히 나을 수 있다. 이 증에는 마땅히 오가피장척탕(五加皮壯脊湯)을 쓸 것이다.

[14-4] 해역(解佚)이라는 것은 상체(上體)는 완전히 건강하나 하체(下體)가 해역(解佚)하여 다리 힘으로 걸아갈 수 없는 것이다. 그러나 그 다리가 마비(痲痺), 종통(腫痛)의 증은 없는 것이며 다리의 힘도 심히 약한 것은 아니니 이것은 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않고 추운 듯하나 춥지도 않고 더운 듯하나 더운 것도 아니니 이 병은 요척(腰脊)의 병이 된다. 해역의 증이 있는 경우는 반드시 심히 오한하거나 발열 또는 신체동통(身體疼痛) 등의 증은 없다. 태양인이 만약 심한 오한이나 발열 또는 신체동통 등증이 있다면 이것은 요척(腰脊)의 표기(表氣)가 충실한 것이다. 이 병은 쉽게 치료되며 그 사람도 역시 완전하게 건강하다.

#### 태양인 내측 소장병론(11조)

[15-1] 주진형(朱震亨)이 말하기를 열격(噎膈), 반위(反胃)의 병은 혈(血)과 액(液)이 같이 소모되어서 위완(胃脘)이 건조하여지는 것이다. 그 건조한 것이 위에 있어서 목구멍에 근접하면 물을 넘길 수 있으나 음식물은 들어가지가 어려우며 또한 많이 들어가지도 못하니 이것을 말하여 열(噎)이라고 하고, 그 건조한 것이 아래에 있어서 위와 근접하면 음식을 넘기기가 어렵고 어렵게 위에 들어가도 오래지 않아 다시 나오니 이것을 말하여 격(膈)이라 하며 또한 말하여 반위(反胃)라 한다. 대변이 마르고 적으며 마치 양의 똥과 같으니 이름이 비록 같지 않으나 병은 한 곳에서 나온 것이다. 또 말하기를 상초의 열격(噎膈)은 음식물이 내려가면 위완으로부터 가슴에까지 치받쳐서 아프다가 잠시 후에 토하게 되니 음식물이 나오면 아픈 것이 곧 멎고, 중초의 열격은 음식물은 아래로 내려가나 위에 들어가지가 어렵고 얼마 후에 다시 나온다. 하초의 열격은 아침에 먹으면 저녁에 토하고 저녁에 먹으면 아침에 토하니 기혈이 모두 허한 경우는 입안에서 거품을 많이 토한다. 다만 반드시 거품이 많이 나오는게 보이는 경우는 죽는다. 대변이 양의 똥 같은 경우도 치료하기 어렵고 음식을 담백하게 먹지 않는 경우도 치료하기 어렵다.

[15-2] 장계봉(張鷟)이 말하기를 열(噎)은 당연히 신(神)과 사(思)사이의 병이니 오직 안을 살피서 스스로 자양(滋養)해야만 가히 치료할 수 있다.

[15-3] 공신(龔信)의 《의감(醫監)》에 말하기를 반위(反胃), 격(膈), 열(噎)이 병이 되는 것은 모두 같은데 열격(噎膈)의 증은 허에 속하지도 않고 실에 속하지도 않고 냉에 속하지도 않고 열에 속하지도 않으니 곧 신기(神氣) 중의 한 가지 병이다.

[15-4] 나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 소장병(小腸病)이 아주 중한 증이니 반드시 진노(嗔怒)를 멀리하고 기름진 음식을 끊은 연후에야 그 병이 나을 것이다. 이 증에는 마땅히 미후등식장탕(彌猴藤植腸湯)을 써야 한다.

[15-5] 음식물이 밖으로부터 들어오는 데에 방해받는 바가 있는 것을 열(噎)이라고 말하며, 안으로부터 받아들이는 데 막히는 바가 있는 것을 격(膈)이라고 말하며, 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저녁에 먹은 것을 아침에 토하는 것을 반위(反胃)라고 말한다. 그러나 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저녁에 먹은 것을 아침에 토하는 것은 먹은 것을 모두 토하는 것은 아니고 방해받는 바가 있어서 위(胃)의 상구(上口)에서 막혀서 체류되었던 음식물이 저절로 토하여지는 것이니 반위(反胃)도 역시 열격이다. 대개 열격은 위완의 열격이며 반위는 위구(胃口)의 열격이나 다 같은 병증이다. 열격의 증이 있는 경우는 반드시 복통, 장명(腸鳴), 설사, 이질(痢疾)의 증은 없다. 태양인이 만약 복통, 장명, 설사, 이질의 증이 있다면 소장의 리기(裏氣)가 충실한 것이니 그 병은 쉽게 치료되고 그 사람은 역시 완전히 건강하다.

[15-6] 해역과 열격은 모두 중증이지만 중증 중에서도 경중의 등급이 있으니 해역만 있고 열격이 없으면 해역의 경증이고 열격만 있고 해역이 없으면 열격의 경증이다. 만약 해역에 열격을 겸하거나 열격에 해역을 겸한다면 그것이 위험한 증이라는 것을 더 말할 여지가 없으나 위험한 증에도 역시 경중이 있으니 태양인의 해역 열격은 사경(死境)에 이르기 전에는 기거(起居)와 음식(飲食)이 여전하므로 사람들이 반드시 쉽게 생각하고 보통의 병으로 보기 때문에 위경(危境)한 지경에 들어가는 구원할 수 없는 것이다. 나는 본래 체질이 태양인인데 일찍이 이 병을 앓아 6-7년간. 연말(涎沫)을 토하다가 수 십년을 몸을 섭양하여 다행히 요절을 면하였다. 이것을 기록하여 태양인으로서 병든 경우에 경계하도록 한다. 만약 치법을 논한다면 한마디로 말하여 진노(嗔怒)를 멀리하라고 할 따름이다.

[15-7] 태양인은 의지(意志)가 강하고 조행(操行)이 약하다. 의지가 강하면 위완의 기가 위로 올라가서 호산(呼散)하는 것이 많아지고 넘친다. 조행(操行)이 약하면 소장의 기운이 가운데 뭉쳐서 흡취(吸取)되는 것이 부족하여 위축된다. 이러한 병을 일러 열격(噎膈), 반위(反胃)라 한다.

[15-8] 어떤 사람이 묻기를 주진형(朱震亨)이 열격(噎膈)과 반위(反胃)에 대하여 논하여 말하기를 혈액(血液)이 모두 소모되고 위완(胃脘)이 건조하여 마르게 되어 음식물이 들어가기 어렵다고 하니 그 말이 어떠한 것인가? 대답하기를 수곡(水穀)은 위에 들어가서 비의 보호를 받고 대장에 나가서는 신의 보호를 받으니 비와 신이라는 것은 수곡이 나가고 들어오는 창고로서 교대로 보태고 빠지는 것이다. 기액(氣液)은 위완에서 내보낼 때는 폐의 보호를 받고 소장에서 흡수될 때는 간의 보호를 받으니 폐와 간은 기액을 호흡하는 문호(門戶)로서 교대로 들어오고 나가는 것이다. 그러므로 소양인은 대장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒)한 기가 부족하기 때문에 위중(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 반드시 성하고, 태양인은 소장에서 흡수되는 기액의 음량(陰涼)한 기가 부족하기 때문에 위완에서 흡수되는 기액의 양온(陽溫)한 기가 반드시 성하다. 위완의 양온한 기가 너무 성하면 위완의 혈과 액이 건조하여 마르게 되는 것은 당연한 이치이다. 그러나 비단 건조하여 마르게 되어서만이 아니라 위로 내보내는 기가 너무 과도하여 안으로 흡수되어지는 기가 너무 부족하게 되니 음식물이 흡인(吸引)되지 못하고 다시 나오는 것이다.

[15-9] 어떤 사람이 또 묻기를 주진형(朱震亨)이 논한 열격과 반위라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인의 병이라고 지명하였으며, 내경에서 논한 해역이라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인

의 병이라고 지명하였는가? 말을 억지로 끌어다가 그럴 듯하게 꾸며낸 것이 아니냐? 원컨데 그 설명을 듣고 싶다. 답하기를 소양인이 구토가 있다면 반드시 높은 열이 있고, 소음인이 구토가 있다면 반드시 대한(大寒)이 있고, 태음인이 구토가 있다면 반드시 병이 낫는다. 지금 이 열격과 반위가 차지도 않고 덥지도 않고 실(實)하지도 않고 허(虛)하지도 않으니 이것이 태양인의 병이 아니고 무엇이라? 해역이라는 것은 상체(上體)는 건강하나 하체(下體)가 해역하여 종아리가 시리고 걸어가질 못하는 것을 이르는 것으로 소음인, 소양인, 태음인이 이러한 증이 있다면 다른 증이 겹쳐진 것으로 또한 반드시 추운 듯하나 춥지 않고 더운 듯하나 덥지 않고 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않을 이치가 없을 것이다.

[15-10] 어떤 사람이 또 문기를 당신이 태양인의 해역병(解痲病)의 치료법을 논하여 말하기를 깊이 슬퍼함을 경계하며 진노(嗔怒)하는 것을 멀리하며 마음을 수양하여 깨끗하고 바르게 하라 하였고, 열격병(嘔膈病)의 치료법을 논하여 말하기를 진노하는 것을 멀리하고 기름진 음식을 끊으라고 하였으니 생각하건대 태양인의 해역병이 열격병보다 중하며 애심(哀心)에 손상된 것이 노심(怒心)에 손상된 것보다 더 중한 것인가? 답하기를 그렇지 않다. 태양인의 열격병은 해역병보다 더욱 중하고 노심(怒心)에 손상을 받은 것이 애심(哀心)에 손상을 받은 것 보다 더욱 중하다. 태양인의 애심(哀心)이 심하면 표기(表氣)가 상하고 노심(怒心)이 폭발하면 리기(裏氣)가 상하는 고로 해역의 표증에는 슬퍼함을 경계하고 노여워하는 것을 멀리하라고 검하여 말한 것이다. 어떤 사람이 문기를 그러면 소양인의 노성(怒性)은 입과 방광의 기를 상하게 하고 애정(哀情)은 신과 대장의 기를 상하게 하고, 소음인의 락성(樂性)은 눈과 여(膂)의 기를 상하게 하고 희정(喜情)은 비와 위의 기를 상하게 하고, 태음인의 희성(喜性)은 귀와 뇌주의 기를 상하게 하고 락정(樂情)은 폐와 위완의 기를 상하게 하는가? 답하기를 그렇다.

[15-11] 태양인의 대변은 첫째로 활(滑)한 것이 좋고 둘째로 덩어리가 굵고 많은 것이 좋으며, 소변은 첫째로 많은 것이 좋고 둘째로 자주 보는 것이 좋다. 얼굴빛은 흰 것이 좋고 검은 것은 좋지 않으며, 살은 여윈 것이 좋고 살찐 것은 좋지 않다. 구미(鳩尾)아래에 뭉친 것이 있으면 좋지 않으니 덩어리가 작으면 병이 경하며 그 덩어리는 쉽게 없어지나 덩어리가 크면 병이 중하고 그 덩어리가 없어지기 어렵다.

본초서에 있는 태양인병에 경험된 주요 단방 10종 및 이천·공신의 경험된 단방 2처방

본초서에서 이르기(오가피(땃드름))는 양쪽 다리가 아프고 저리거나, 뼈마디에 쥐가 나며 땅기거나, 걷지 못하는 것을 치료한다. 아이가 3세가 되도록 걷지를 못하였는데, 이를 복용하고 바로 걸어다니게 되었다. 송절은 다리가 무르고 약한 것을 치료한다. 모과(모과의 열매)는 구역질을 멈추게 한다. 삶아 즙을 마시는 것이 가장 좋다. 포도근(포도의 뿌리)은 구토와 딸꾹질을 멎게 한다. 진하게 다린 물을 조금씩 마시면 좋다. 미후도(다래)는 열이 막아서 된 반위를 치료한다. 즙을 내서 복용한다. 덩굴의 즙은 매우 매끄러워서 위가 막혀 토하는데 주로 쓰며, 즙을 내서 복용하는 것이 매우 좋다. 노근은 헛구역질과 오열로 가슴이 답답한 것을 치료한다. 노근 5냥을 물에 달여 1되를 단번에 마시니, 3되를 넘지않고 즉시로 낫는다. 방합은 반위로 토하는 것을 치료한다. 붕어는 반위를 치료한다. 순채는 붕어와 함께 끓여 먹는다. 반위로 음식을 내려 보내지 못하는 것을 다스리고, 구토를 멎게 한다. 모밀은 장과 위를 실하게 하고, 기력을 더해 준다.

○ 이천이 말하기를 저두강(절구 방망이 끝에 묻은 가는 겨)은 목이 막혀서 음식을 내려 보내지 못하는 것과 목구멍이 막히는데 주로 쓴다. 자잘한 겨 1냥으로 흰죽을 쑤어 숯농에 타서 복용한다.

○ 공신이 말하기를 방합은 반위를 치료한다.

새로 정한 태양인병의 주요 2처방

### 오가피장척탕

오가피 4돈, 모과 · 청송절 각2돈, 포도근 · 노근 · 앵도육 각1돈, 교맥미 반 숟가락.  
청송절이 없는 약재이면 좋은 송엽으로 대체한다. 이 처방은 표증을 치료한다.

### 미후등식장탕

미후도 4돈, 모과 · 포도근 각2돈, 노근 · 앵도육 · 오가피 · 송화 각1돈, 저두강 반 숟가락.  
미후도가 없는 약재이면 덩굴로 대체한다. 이 처방은 리증을 치료한다.

○ 무릇 채소와 과일의 부류들은 맑고 고르며 성기고 담백한 약들로 모든 간의 약이다. 조개의 부류도 역시 간을 보한다.

○ 논하여 말하기를 약의 겹허이 넓지 못한 것은 병의 경험의 넓지 못하기 때문이다. 태양인 수는 예로부터 매우 적어서 옛날 의서에도 이에 대한 증상과 약을 실은 것이 또한 매우 드물다. 지금 이 오가피장척탕과 미후등식장탕의 처방을 만든 것이 보잘 것 없고 비록 수가 모자라 두루하지 못하기는 하나, 만약 태양인이 병을 얻었을 때 이 두 가지 처방을 가지고 그 이치를 자세히 궁리하고 변통하여 새로운 처방을 만들 수 있다면 어찌 좋은 약인 없는 것을 걱정할 필요가 있겠는가?

### 광제설(23조)

[16-1] 1세부터 16세까지를 유년(幼年)이라고 말하며, 17세부터 32세까지를 소년(少年)이라고 말하며, 33세부터 48세까지를 장년(壯年)이라고 말하며, 49세부터 64세까지를 노년(老年)이라고 말한다.

[16-2] 무릇 사람은 유년기에는 듣고 보기를 좋아하고 부모를 사랑하고 어른을 공경하니 봄날에 돋아나는 새싹과 같고, 소년기에는 용맹을 좋아하고 날뛰며 빠르니 여름날에 자라나는 어린 묘목과 같고, 장년기에는 교제하기를[交結]좋아하고 닭고 수양을 하니 가을날에 수확하는 열매와 같고, 노년기에는 계책을 좋아하고 비밀을 잘 지키니 겨울날에 숨어 있는 뿌리와 같다.

[16-3] 유년기에 문자를 좋아하는 사람은 유년의 호걸(豪傑)이요, 소년기에 어른과 노인을 공경하는 사람은 소년의 호걸이요, 장년기에 널리 사람을 사랑할 줄 아는 사람은 장년의 호걸이요, 노년기에 올바른 사람을[可人] 보호할 줄 아는 사람은 노년의 호걸이다. 좋은 재능이 있고 또 좋은 마음씨까지 넉넉하게 간직한 사람은 참된 호걸이고, 좋은 재능이 있어도 좋은 마음씨까지 넉넉하게 간직하지 못한 사람은 재능만 있을 뿐이다.

[16-4] 유년기 7-8세 전에 보고 듣는 것이 부족하여 기뻐하고 성내고 슬퍼하고 즐거워하는 것이 교착(膠着)되면 병이 되니 자애로운 어머니가 마땅히 보호해야 할 것이며, 소년기 24-25세 전에 용맹이 부족하여 기뻐하고 성내고 슬퍼하고 즐거워하는 것이 교착되면 병이 되니 지혜로운 아버지와 능숙한 형이 마땅히 보호해야 할 것이며, 장년기 38-39세 전에는 착한 동생과 좋은 벗이라야 가히 도울 수가 있을 것이며, 노년기 56-57세 전에는 효자효손이라야 가히 부양할 수가 있을 것이다.

[16-5] 착한 사람의 집에는 반드시 착한 사람이 모이고 악한 사람의 집에는 반드시 악한 사람이 모인다. 착한 사람이 많이 모이면 착한 사람의 장기(臟氣)가 활동하고 악한 사람이 많이 모이면 악한 사람의 심기(心氣)가 왕성해진다. 술 · 여색 · 재물 · 권세를 좋아하는 집에는 악한 사람이 많이 모이는 까닭에 그 집의 효남, 효부가 병을 얻게 되는 것이다.

[16-6] 권세를 좋아하는 집에는 파벌꾼들이 싸고 도니 그 집을 패망케 하는 자는 파벌꾼들이며, 재물을 좋아하는 집에는 자손이 교만하고 어리석으니 그 집을 패망케 하는 자는 자손이다.

[16-7] 어느 사람의 집안이든지 모든 일이 잘되지 않고 질병이 끊이지 않으며 선과 악이 서로 대치되어 그 집이 장차 패망할 지경에 이르면 오직 현명하고 자애로운 아버지나 효자라야 이에 대처할 방법을 갖고 있는 것이다.

[16-8] 교만하고 사치하면 수명을 감소시키고, 게으르고 나태하면 수명을 감소시키고, 성질이 편급하면 수명을 감소시키고, 욕심이 많으면 수명을 감소시킨다. 사람됨이 교만하고 사치하면 반드시 여자를 탐하고, 사람됨이 게으르고 나태하면 반드시 술과 음식을 탐하고, 사람됨이 편급하면 반드시 권세를 다투고, 사람됨이 욕심이 많으면 반드시 돈과 재물 때문에 목숨을 잃게 된다.

[16-9] 간약(簡約)하면 장수하고, 근간(勤幹)하면 장수하고, 경계(警戒)하면 장수하고, 문견(聞見)하면 장수한다. 사람됨이 간약(簡約)하면 반드시 여자를 멀리하고, 사람됨이 근간(勤幹)하면 반드시 술과 음식에 청결하고, 사람됨이 경계(警戒)할 줄 알면 반드시 권세를 피하고, 사람됨이 문견(聞見)이 있으면 반드시 돈과 재물에 청백하다.

[16-10] 거처(居處)가 쓸쓸하고 적막한 것은 여색 때문이며, 행신(行身)이 불량하고 비루한 것은 술 때문이며, 용심(用心)이 문란한 것은 권세 때문이며, 사무(事務)가 혼란한 것은 재물 때문이다.

[16-11] 만약 숙녀를 존경한다면 여색에서 공정한 도리를 얻을 것이요, 만약 좋은 벼를 사귀면 술에서 좋은 덕행을 얻을 것이요, 만약 현명한 사람을 사모하면 권세에서 정당한 술수를 얻을 것이요, 만약 어려운 처지에 있는 사람을 도와준다면 재물에서 온전한 공적을 얻을 것이다.

[16-12] 술과 여색, 재물과 권세는 예로부터 경계하는 바로써 네 개의 담장이라고 말하고 감옥에 비유하였다. 비단 일신의 수요(壽夭)와 일가의 화복에만 관계되는 것이 아니라 천하가 다스려짐과 어지러워짐이 역시 여기에 달려 있다. 만약 천하의 술과 여색, 재물과 권세로 하여금 어긋난 기풍에 휩쓸리지 않게 한다면 거의 요순(堯舜)·주남(周南)·소남(召南)의 세상에 근접하게 될 것이다.

[16-13] 무릇 사람이 간약하고 부지런하며 경계하고 문견이 있는 이 네 가지를 다 온전하게 갖춘 자는 저절로 장수하고, 간약하고 부지런하면서 경계하거나 혹은 문견이 있고 경계하면서 부지런하거나 하여 세 가지를 갖춘 자는 그 다음으로 장수하고, 교활하며 사치하면서 부지런하거나 경계하면서 탐욕스럽거나 혹은 간약하면서 나태하거나 편급하면서도 문견이 있어서 이 두 가지를 갖춘 자는 공경하면 장수하고 나태하면 요절할 것이다.

[16-14] 무릇 사람은 공경(恭敬)하면 반드시 장수하고 태만(怠慢)하면 반드시 요절하며, 부지런(勤幹)하면 반드시 장수하고 허탐(虛貪)하면 반드시 요절할 것이다. 배고픈 자의 창자가 먹을 것을 얻기에 급급하면 창자의 기운이 흐트러질 것이며, 가난한 자의 뼈가 재물을 얻음에 급급하면 뼈의 힘이 말라붙을 것이다. 배고픈 자도 편안히 주린다면 창자의 기운이 제대로 간직되고, 가난한 자도 편안히 가난하다면 뼈의 힘이 제구실을 할 것이다. 그러므로 음식은 능히 배고픔을 참고 배부름을 탐하지 않는 것이 공경이고, 의복은 능히 찬 것을 견디고 따뜻한 것을 탐내지 않는 것이 공경이고, 근력은 부지런히 일하고 편안한 것을 탐내지 않는 것이 공경이고, 재물은 능히 근실히 하고 무리한 횡재를 얻는 것을 탐내지 않는 것이 공경이다.

[16-15] 산골 사람은 문견(聞見)이 없으면 요절의 화를 당하고, 도시 사람은 간약(簡約)하지 않으면 요절의 화를 당하고, 농촌 사람은 근간(勤幹)하지 않으면 요절의 화를 당하고, 독서하는 사람은 경계(警戒)하지 않으면 요절의 화를 당한다.

[16-16] 산골 사람은 마땅히 문견(聞見)이 있어야 하는데 문견이 있으면 장수의 복을 누리고, 도시 사람은 마땅히 간약(簡約)해야 하는데 간약하면 장수의 복을 누리고, 농촌 사람은 마땅히 근간(勤幹)해야 하는데 근간하면 장수의 복을 누리고, 학문하는 선비는 마땅히 경계(警戒)해야 하는데 경계하면 장수의 복을 누린다.

[16-17] 산골 사람이 만약 문견(聞見)이 있으면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 산중의

호걸이며, 도시 사람이 만약 간약(簡約)하다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 도시의 호걸이며, 농촌사람이 만약 근간(勤幹)하다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 농촌의 호걸이며, 학문하는 선비가 만약 경계(警戒)한다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 학문하는 선비의 호걸이다.

[16-18] 어떤 사람이 말하기를 "농부들은 원래 힘으로 농사를 지으니 가장 근간(勤幹)한 자들인데 왜 근간하지 않는다고 하였으며, 선비들은 원래 독서를 하고 있으니 가장 경계(警戒)하는 자들인데 왜 경계하지 않는다고 하였는가?" 내가 대답하기를 백 마지기의 농토를 잘못 다스릴까봐 그것을 제 걱정으로 삼는 것이 농부의 임무인 것이니 농부를 선비와 비교한다면 진정 그들은 나태한 자들이다. 선비들이란 무던히 독서하기 때문에 마음은 항상 헛되이 뿔내고, 농부들은 눈으로 글자를 볼 줄 모르기 때문에 마음은 항상 몸에 차고 돌에 새기듯 기억하고 있으니 선비들은 농부들과 비교한다면 진정 그들은 경계하지 않는 자들이다. 만약 농부들이 글자를 익히는 데 부지런하거나 선비들이 힘써 일하는 습관을 들인다면 재주나 성품이 조밀해지고 장기(臟氣)도 견고해질 것이다.

[16-19] 교만하고 사치(驕奢)하는 자의 마음은 여염집의 살림살이를 경시하며, 사회와 가정을 경솔히 여기고, 보고 느끼는 것은 교활하고 방탕하여 산업의 어려운 고비에 대해서는 까맣게 모르고, 재력을 마련하는 방략은 심히 서투르면서 매양 여색에 빠져서 종신토록 뉘우칠 줄을 모른다.

[16-20] 태만(懶怠)한 자의 마음은 극히 거칠고 사나워서 조금씩 쌓아올릴 생각은 하지 않고 매양 헛되이 큰 꿈만을 꾸려고 하며, 대체로 그의 마음가짐은 심히 부지런함을 꺼려하기 때문에 자신의 몸을 술 세계로 도망치려고 하는 것이니 부지런하기를 피하려는 일시적인 계책인 것이다. 대체로 태만한 자치고 술주정뱅이가 되지 않는 자는 없는 것이니 술주정뱅이만 만나보더라도 반드시 나태한 사람의 마음이 거칠고 사납다는 것을 알 수 있을 것이다.

[16-21] 술과 색이 사람을 죽인다고 하는 사람들은 모두 말하기를 "술독이 창자를 마르게 하고 색로(色勞)가 정력을 말라붙게 한다"고 하지만 이는 그 중의 하나를 알고 둘은 모르는 말이다. 술에 방종하는 자는 그 몸을 부지런하게 쓰기를 싫어하기 때문에 걱정이 태산 같고, 색에 미혹된 자는 계집을 깊이 사랑하기 때문에 걱정이 칼날 같아서 만 갈래로 찢어지고 이지러진 마음이 술독과 색로와 함께 힘을 합하여 공격하므로 사람을 죽이게 하는 것이다.

[16-22] 광동(狂童)은 반드시 음녀(淫女)를 사랑하고 음녀는 또한 광동을 사랑하며, 우부(愚夫)는 반드시 투부(妬婦)를 사랑하고 투부는 또한 우부를 사랑하는 것이니, 만물의 이치로 이를 따져보더라도 음녀는 단연코 광동의 배필에 합당할 것이요, 우부는 또한 투부의 배필함이 마땅할 것이다. 대개 음녀나 투부는 악인이나 천인(賤人)의 배필이 될 수는 있어도 군자나 귀인의 배필이 될 수는 없는 것이다. 칠거지악 중에서도 음란한 것과 질투하는 것이 그 으뜸되는 악이지만 세상 사람들은 '투'자의 의미를 잘 모르고 단지 많은 첩들을 미워하며 투기하는 것만을 이야기한다. 귀인이 후사를 이어야 한다는 것은 가장 소중한 일이기 때문에 귀인이 첩을 갖는 것을 부인이 미워하며 투기하는 것은 절대로 안 되는 법이다. 그러나 가정의 법도를 어지럽히는 근본이 일찍이 많은 첩을 거느리는 데 있기 때문에 부인이 첩들의 간교하고 아첨하는 것을 미워하며 투기하는 것은 오히려 부인의 현명한 품성이 될 수도 있으니 어찌 투자의 뜻과 일치한다고 할 수가 있겠는가? 《시경(詩經)》에 이르기를 "복숭아나무 옛되고 예뻐이여, 그 잎도 짙게 푸르도다. 이 아가씨 시집감이여 그 집안사람들을 화목케 하도다"라고 하였으니 그 집안사람과 화목하게 한다는 것은 현인을 좋아하며 선행을 즐기면서 그 집안사람과 화목하다는 것을 이름이요, 그 집안사람들을 화목하게 하지 못한다는 것은 현인을 미워하며 남의 재능을 투기하면서 그 집안사람들을 화목하지 못하게 한다는 것을 이름이다. 대체로 어느 사람의 집안에서 질병이 잇따르고 사망이 뒤따르며 자손은 천치바보가 되고 재산은 몰락하여 없어지는 것은 우부나 투부가 현인을 시기하며 남의 재능을 질투하는 데서 기인되지 않는 것이 없다.

[16-23] 천하의 악은 어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것보다 더 많은 것은 없을 것이요, 천하의 선은 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것보다 더 큰 것은 없다. 어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것이 아닌데도 악이라고 한다면 악이라 하더라도 그리 많지는 않을 것이요, 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것이 아닌데도 선이라고 한다면 선이라 하더라도 그리 크지는 않을 것이다. 옛 글을 낱낱이 참고하면 천하의 병에 걸린다고 하는 것은 어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것에서 나오는 것이요, 천하의 병을 구원한다는 것은 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것에서 나오는 것이다. 그러므로 나는 말하기를 "어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것은 천하에서도 가장 많은 병이요, 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것은 천하에서도 아주 큰 약이 되는 것이다."

#### 사상인 변증론(28조)

[17-1] 태소음양인(太少陰陽人)을 오늘까지 관찰한 결과 한 고을에 사람 수가 대략 1만 명이라 하고 논하면 그 중에서 태음인이 5,000명이고 소양인이 3,000명이고 소음인이 2,000명이며 태양인의 수는 극히 적어서 한 고을에 3,4명 내지 10여 명에 불과하다.

[17-2] 태양인 체형의 기상(體形氣像)은 뇌추(腦頤)의 기세가 웅장하고 허리 주위(腰圍)의 서 있는 형세가 연약하다. 소양인의 체형기상은 흉금(胸襟)의 벌어진 형세가 웅장하고 방광(膀胱)의 좌세(坐勢)가 연약하다. 태음인의 체형기상은 허리 주위(腰圍)의 서 있는 형세가 장하고 뇌추(腦頤)의 기세가 연약하다. 소음인의 체형기상은 방광(膀胱)의 좌세가 웅장하고 흉금(胸襟)의 벌어진 형세가 연약하다.

[17-3] 태양인의 성질(性質)은 활달한 것이 장점이며 재간(材幹)은 교우(交遇)에 능하다. 소양인의 성질은 용감한 것이 장점이며 재간은 사무(事務)에 능하다. 태음인의 성질은 성취하는 것이 장점이며 재간은 거처(居處)에 능하다. 소음인의 성질은 단정한 것이 장점이며 재간은 당여(黨與)에 능하다.

[17-4] 태양인의 체형은 원래 감별하기 어렵지 않으나 사람 수가 드물기 때문에 가장 감별하기 어려운 것이다. 그 체형은 뇌추(腦頤)의 기세가 웅장하고 성질은 활발하며 또 과단성이 있고 그 병은 열격(噎膈)·반위(反胃)·해역(解信) 등 증상이 있으니 역시 스스로 변증하기가 쉬우며 별로 큰 증세가 없으며 아무 병이 없고 건강한 사람 같다.

[17-5] 소음인 노인도 또한 열격증(噎證)이 있으니 태양인으로 오진하고 치료하지 말아야 한다.

[17-6] 태양인 여자는 체형이 건장하고 실하나 간이 적고 옆구리가 좁아서 자궁이 부족하므로 아이를 낳을 수 없으니 가축으로 말하면 태양의 암소와 말은 체형이 건장하고 실하나 역시 생산치 못하는 것은 그 이치가 동일한 것이다.

[17-7] 소양인의 체형은 위가 성하고 아래가 허하여 가슴이 실하고 발이 가벼워 매우 날카롭고 용기를 좋아(剽銳好勇)하며 사람 수도 또한 많으니 사상인(四象人) 중에 가장 감별하기가 쉬운 것이다.

[17-8] 소양인도 혹 몸이 작고 적으며 성질이 조용하고 아담하여 외형이 소음인과 흡사한 자가 있으니 그 병세의 한열(寒熱)을 보아 자세히 집증(執證)할 것이며 잘못 소음인으로 알고 치료하지 말 것이다.

[17-9] 태음인과 소음인의 체형이 혹은 서로 비슷하여 가리기 어렵다. 그러나 그 병증을 관찰하면 반드시 구별하지 못할 것이 없다. 태음인이 허한(虛汗)이 있으면 완실(完實)하고 소음인이 허한이

있으면 큰 병이다. 태음인이 피부가 강하고 견밀(堅密)하면 큰 병이고 소음인이 피부가 강하고 견밀하면 완실할 것이다. 태음인은 흉격정충증(胸膈怔忡證)이 있고 소음인은 수족문란증(手足悞亂證)이 있다. 태음인은 눈초리가 위로 땅기는 증(目眦上引證)이 있으며 또 안구 동통증이 있고 소음인은 이런 증이 없다. 소음인은 평시에 호흡이 고르나 간혹 큰 한숨(太息呼吸)을 쉬는 일이 있고 태음인은 이렇게 큰 한숨을 쉬는 일이 없다. 태음인은 학질(瘧疾)·오한(惡寒) 중에도 능히 냉수를 마시나 소음인은 학질·오한 중에 냉수를 마시지 않는다. 태음인의 맥은 장(長)하고 긴(緊)하나 소음인의 맥은 완(緩)하고 약(弱)하다. 태음인의 기육(肌肉)은 견실하나 소음인의 기육은 부드럽다. 태음인은 용모와 말하는 기운(容貌詞氣)은 생활이 의젓하고 잘못을 고쳐 바로잡으며 소음인은 용모와 말하는 기운(容貌詞氣)은 동작이 자연스럽고 간편하면서 약간 기교가 있다.

[17-10] 소음인의 체형은 왜단(矮短)하나 장대(長大)하여 8,9척이 되는 자도 있으며 태음인의 체형은 장대하나 6척이 되는 왜단한 자도 있다.

[17-11] 태음인은 항상 겁내는 마음(怯心)이 있으니 겁내는 마음이 안정하고 고요하면 거처가 편안하며 실력(자질)이 축적되어서 도에 나아갈 것이고 겁내는 마음이 더욱 많으면 방심되고 자유스럽지 못하여 시기에 의하여 동요된다. 만약 겁내는 마음이 두려운 마음(怕心)에 이르게 되면 큰 병이 발생하여 정충(怔忡)이 될 것이니 정충증은 태음인 병에서 중증이다.

[17-12] 소양인은 항상 두려운 마음(懼心)이 있으니 두려운 마음이 안정되고 고요하면 거처가 편안하며 실력(자질)이 축적되어서 도에 나아갈 것이고 두려운 마음이 더욱 풍부하면 몸이 자유스럽지 못하여 시기에 따라 동요한다. 만약 두려운 마음이 공포심(恐心)에 이르게 되면 큰 병이 일어나 건망증(健忘症)이 될 것이니 건망증은 소양인 병에서 위험한 증세이다.

[17-13] 소음인은 항상 불안정한 마음(不安定之心)이 있으니 불안정한 마음이 안정되고 고요하면 비장의 기(脾氣)가 곧 활발할 것이다. 태양인은 항상 급박한 마음(急迫之心)이 있으니 급박한 마음이 안정되고 고요하면 간장의 혈(肝血)이 곧 조화될 것이다.

[17-14] 소음인은 인후증(咽喉證)이 있으면 그 병이 대단히 중하면서도 장기적 질환으로 변하니 등한히 보지 않을 것이다. 마땅히 삼계팔물탕(蔘桂八物湯)을 쓰며 혹은 노루의 간이나 또는 금사주(金蛇酒)를 쓸 것이다.

[17-15] 태양인이 8,9일간 대변 불통증이 있으면 그 병은 위태한 증세가 아니다. 의혹할 것은 아니며 또한 약이 있으니 마땅히 미후등오가피탕(獼猴藤五加皮湯)을 쓸 것이다.

[17-16] 태양인은 소변이 많으면 건강하고 병이 없으며(完實而無病), 태음인은 땀이 잘 나면 건강하고 병이 없으며, 소양인은 대변이 잘 통하면 건강하고 병이 없으며, 소음인은 음식이 잘 소화되면 건강하고 병이 없는 것이다.

[17-17] 태양인은 열격이 되면 위완(胃脘)의 상초(上焦)가 시원한 것이 바람과 같고, 태음인은 이질이 나면 소장(小腸)의 중초가 막힌 것이 안개 같고, 소양인은 대변이 통하지 않으면 흉격이 반드시 열화와 같이 뜨겁고, 소음인은 설사가 그치지 않으면 배꼽 아래가 반드시 얼음과 같이 차다.

[17-18] 똑똑하게 그 사람을 감별하고 또 똑똑하게 그 증세를 알면 응용하는 약 처방은 반드시 의심할 것이 없을 것이다.

[17-19] 사람의 형용(체형과 용모)을 자세히 관찰하여 채삼 연구하되 만약 의혹되는 점이 있으면 병증(病證)을 참작하여 똑똑히 보아 의심이 없는 연후에 약을 쓸 것이고 결코 경솔하게 한 첩의 약이라도 투약하지 말 것이다. 중병 위증에는 잘못 투약하면 한 첩의 약이라도 반드시 사람을 죽이는

것이다.

[17-20] 화타(華他)가 말하기를 양생의 방법은 적당한 노력(小勞)을 할 것이고 공연히 과로는 하지 말 것이다. 한 노인이 말하기를 사람은 하루 두 번만 먹고(再食) 4,5번씩 먹지 말아야 하며 또 이미 먹고 난 후에는 더 먹지 말아야 할 것이다. 이렇게만 하면 반드시 장수하지 않을 수가 없다.

[17-21] 나는 이것을 보충하여 말하겠다. 태음인은 밖을 살피 항상 겁내는 마음(怯心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 소양인은 안을 살피 두려운 마음(懼心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 태양인은 한 걸음 물러서서 항상 급박한 마음(急迫之心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 소음인은 한 걸음 나아가서 항상 불안정한 마음(不安定之心)을 안정시키고 고요히 할 것이니 이렇게만 하면 반드시 장수하지 않을 수가 없을 것이다.

[17-22] 또 말하겠다. 태양인은 항상 노여운 마음과 슬픈 마음을 경계할 것이며, 소양인은 항상 슬픈 마음과 노여운 마음을 경계할 것이며, 태음인은 항상 즐거운 마음과 기쁜 마음을 경계할 것이며, 소음인은 항상 기쁜 마음과 즐거운 마음을 경계할 것이니 이렇게만 하면 장수하지 않을 수 없을 것이다.

[17-23] 대순(大舜)이 밭을 갈고 심고 질그릇을 굽든지 고기 잡는 일을 하든지 모든 것을 대중 속에서 배워 선을 행하였고, 공자는 말하기를 세 사람만 동행하면 반드시 나의 스승이 있다고 하였다. 이것으로써 연구하여 보면 천하에 대중의 재능을 성인이 반드시 널리 배우고 자세히 물어서 다 소유하였다. 그러므로 집대성한 것이다. 태소음양인의 식견과 재능은 각각 장점이 있다. 문필(文筆)·사어(射御)·가무(歌舞)·음양(揖讓)으로부터 장기와 바둑, 그리고 작은 기능과 세세한 동작에 이르기까지 온갖 행동이 각각 같지 않으며 다 그 묘한 것이 다르니 실로 대중의 재능이란 자연 조화의 가운데 아주 많은 것이다.

[17-24] 《영추(靈樞)》중에 태소음양오행인론이 있는데 대략 외형만 말하고 오장 이치는 말하지 않았다. 대개 태소음양인을 벌써 옛적에도 발명하였으나 정밀하게 다 연구하지 못하였던 것이다.

## 발문

이 글을 계사(癸巳) 7월 13일부터 시작하여 잠시도 쉴 새 없이 주야로 연구하고 써서 그 이듬해 갑오(甲午)년 4월 13일에 이르러서 끝내었다. 그런데 소음소양인론은 대략 정리되었으나 태음태양인론은 겨우 간략한 정도로서 되었으니 이것은 경험이 많지 못하였고 정력도 이미 소모된 까닭이다. 《예기(禮記)》에 '보고서 이해하지 못할 것이면 생각하여 보라'고 하였으니 만약 태음태양인을 생각하여서 해득하게 되면 간략한 것이 또한 무슨 손실이 있겠는가.

만호가 되는 음에서 한 사람이 그릇을 만들면 그릇이 부족할 것이고 백호가 되는 촌에서 한 사람이 의원을 하면 치료 사업이 부족할 것이다. 반드시 널리 의학을 발전시켜서 집집마다 의학을 알게 되고 사람마다 병리를 알게 된 연후에야 세상을 장수하게 하고 원기를 보전할 것이다.

광서(光緒) 갑오(甲午) 4월 12일 함흥 이제마는 한남(漢南) 산중에서 쓴다.

아! 공(公)께서는 갑오년(1894년)에 다 쓰고 을미년(1895년)에 고향에 돌아왔다. 경자년(1900년)에 이 책을 다시 수정하는데 의원론(醫源論)으로부터 태음인 제론(諸論)에 이르기까지는 각각 수정하였고 기타 제론을 수정하지 못하였으므로 신구본에 의하여 인쇄 발생한다.

문인 김영관, 한직연, 송현수, 한창연, 최겸용, 위준혁, 이섭향