

東醫壽世保元 卷之二
동의수세보원 2권
醫源論(9條)
의원론(9조)

[5-1] 書曰, 若藥不瞑眩, 厥疾不瘳, 商高宗時, 已有瞑眩藥驗, 而高宗, 至於稱歎, 則醫藥經驗, 其來, 已久於神農黃帝之時, 其說, 可信於真也, 而本草素問, 出於神農黃帝之手, 其說, 不可信於真也. 何以言之. 神農黃帝時, 文字應無, 後世, 文字澆漓例法, 故也. 衰周秦漢以來, 扁鵲有名, 而張仲景, 具備得之, 始爲成家著書, 醫道始興, 張仲景以後, 南北朝隋唐醫繼之, 而至于宋, 朱肱, 具備得之, 著活人書, 醫道中興, 朱肱以後, 元醫, 李杲, 王好古, 朱震亨, 危亦林, 繼之, 而至于明, 李梴, 龔信, 具備得之, 許浚, 具備傳之, 著東醫寶鑑, 醫道復興. 蓋自神農黃帝以後, 秦漢以前, 病證藥理, 張仲景傳之, 魏晉以後, 隋唐以前, 病證藥理, 朱肱傳之, 宋元以後, 明以前, 病證藥理, 李梴, 龔信, 許浚傳之, 若以醫家勸勞功業, 論之, 則當以張仲景, 朱肱・許浚, 爲首, 而李梴・龔信, 次之.

《서경(書經)》에 이르기를 "만일 약이 명현(瞑眩)하지 않으면 그 병이 낫지 않는다"고 하였다. 상(商)나라 고종 때 이미 명현(瞑眩)하게 하는 약이 있어서 고종이 감탄하였은즉 의약의 경험이 그 유래가 이미 신(神農)・황제(黃帝) 때만큼 오래된다고 하는 설(說)은 진실하다고 믿을 수 있다. 그러나 《본초(本草)》・《소문(素問)》이 신농・황제의 손에서 나왔다고 하는 것은 진실하다고 믿기가 어렵다. 왜냐하면 신농황제 때에는 응당 문자가 없었을 것이요, 후세에 이르면서 문자의 용례가 점차 발전했을 것이기 때문이다. 주(周)가 쇠하고 진한(秦漢)시대 이후부터는 편작(扁鵲)이 유명했고, 장중경(張仲景)이 이를 습득하여 비로소 훌륭한 학자가 되어서 저서를 내놓음으로써 의학이 비로소 발전되었다. 장중경 이후에는 남북조(南北朝)와 수(隋)・당(唐)시대의 의학자들이 이를 계승하였고, 송(宋)나라에 이르러 주광(朱肱)이 모든 의술을 갖추어 《활인서(活人書)》를 저술함으로써 의도가 중흥되었다. 주광 이후에는 원(元)나라의 의학자 이고(李杲)・왕호고(王好古)・주진형(朱震亨)・위역림(危亦林) 등이 이를 계승했고, 명(明)나라에 이르러 이천(李梴)・공신(龔信) 등이 모든 의술을 갖추었으며, 허준(許浚)이 이것을 자세히 전수하여 《동의보감(東醫寶鑑)》을 저술하여 의학이 다시 발전하게 되었다. 대체로 신농・황제 이후로 진한 이전까지의 병증약리(病證藥理)는 모두 장중경이 전하였고, 위(魏)・진(晉) 이후로 수・당 이전까지의 병증약리(病證藥理)는 주광이 전하였고, 송・원 이후부터 명 이전의 병증약리(病證藥理)는 이천・공신・허준이 전하였다. 만일 의가의 공로와 업적으로 말한다면 마땅히 장중경・주광・허준을 으뜸이라 해야 할 것이며, 이천과 공신이 그 다음이라고 해야 할 것이다.

[5-2] 本草, 自神農黃帝以來, 數千年世間, 流來經驗, 而神農時, 有本草, 殷時, 有湯液本草, 唐時, 有孟詵, 食療本草, 陳藏器, 本草拾遺, 宋時, 有龐安常, 本草補遺, 日華子本草, 元時, 有王好古, 湯液卒草. 본초(本草)는 신농・황제 이후로 수천 년 동안 내려오면서 경험한 것으로, 신농 때에 이미 《본초(本草)》가 있었고, 은(殷)나라 때에는 《탕액본초(湯液本草)》가 있었으며 당나라 때에는 맹선(孟詵)의 《식료본초(食療本草)》와 진장기(陳藏器)의 《본초습유(本草拾遺)》가 있었고, 송나라 때에는 방안상(龐安常)의 《본초보유(本草補遺)》와 《일화자본초(日華子本草)》가 있었고, 원나라 때에는 왕호고의 《탕액본초(湯液卒草)》가 있었다.

[5-3] 少陰人病證藥理, 張仲景, 庶幾乎昭詳發明, 而宋元明諸醫, 盡乎昭詳發明. 少陽人病證藥理, 張仲景, 半乎昭詳發明, 而宋元明諸醫, 庶幾乎昭詳發明. 太陰人病證藥理, 張仲景, 暑得影子, 而宋元明諸醫, 太半乎昭詳發明. 太陽人病證藥理, 朱震亨, 暑得影子, 而本草, 暑有藥理.

소음인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 거의 상세하게 밝혔으나, 송・원・명의 모든 의학자들이 거의 완벽할 만큼 자세하게 밝혔다. 소양인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 절반 정도 상세하게 밝힌 것을 송・원・명의 모든 의학자들이 거의 상세하게 밝혔다. 태음인의 병증약리(病證藥理)는 장중경이 대략 그림자만 비친 것을 송・원・명의 모든 의학자들이 절반쯤 상세하게 밝혔다. 태양인의 병증약리(病證藥理)는 주진형이 약간 그림자만 얻었고 본초에도 약의 이치가 대략 적혀 있다.

[5-4] 余生於醫藥經驗，五六千載後，因前人之述，偶得四象人臟腑性理，著得一書，名曰，壽世保元。原書中，張仲景所論，太陽病，少陽病，陽明病，太陰病，少陰病，厥陰病，以病證名目，而論之也。余所論，太陽人，少陽人，太陰人，少陰人，以人物名目，而論之也。二者，不可混看，又不可厭煩然後，可以探其根株，而採其枝葉也。若夫脈法者，執證之一端也，其理在於浮沉遲數，而不必究其奇妙之致也。三陰三陽者，辨證之同異也，其理，在於腹背表裡，而不必究其經絡之變也。

나는 의약의 경험이 있는지 5000-6000년 후에 태어나서 옛 사람들의 저술을 통하여 우연히 사상인의 장부성리(臟腑性理)를 깨닫고 한 의서를 저술하니 이름을 《수세보원(壽世保元)》이라고 한다. 이 책 중에서 장중경이 논한 태양병(太陽病)·소양병(少陽病)·양명병(陽明病)·태음병(太陰病)·소음병(少陰病)·궐음병(厥陰病)이라 한 것은 병의 증세를 지목해서 논한 것이고, 내가 말한 태양인·소양인·태음인·소음인은 인물을 지목해서 논한 것이다. 그러므로 이 두 가지를 혼동해서 보지 말아야 하며 또한 번거로운 생각을 버린 연후에 그 뿌리를 찾아내고 그 가지와 잎을 채취할 수 있을 것이다. 대체로 맥을 본다는 것은 병의 증세를 판단하는 한 가지 방법이다. 그 이치는 맥의 부(浮)하고 침(沈)하고 지(遲)하고 삭(數)한 데 있는 것이니 이것을 가지고 그 기묘한 이치를 찾을 필요는 없다. 삼음삼양(三陰三陽)이란 변증(辨證)하는 데 같고 다름이며, 그 이치가 배(腹)와 등(背)과 안(裏)과 밖(表)에 있을 뿐이니, 이것으로 반드시 경락의 변동을 구하려 할 필요는 없는 것이다.

[5-5] 古人，以六經陰陽，論病，故張仲景，著傷寒論，亦以六經陰陽，該病證，而以頭痛，身疼，發熱，惡寒，脈浮者，謂之太陽病證。以口苦，咽乾，目眩，耳聾，腦脇滿，寒熱往來，頭痛，發熱，脈弦細者，謂之少陽病證。以不惡寒，反惡熱，汗自出，大便秘者，謂之陽明病證。以腹滿時痛，口不燥，心不煩，而自利者，謂之太陰病證。以脈微細，但欲寐，口燥，心煩，而自利者，謂之少陰病證。以初無腹痛，自利等證，而傷寒六七日，脈微緩，手足厥冷，舌卷囊縮者，謂之厥陰病證。六條病證中，三陰病證，皆少陰人病證也。少陽病證，卽少陽人病證也。太陽病證，陽明病證，則少陽人，少陰人，太陰人病證，均有之，而少陰人病證，居多也。古昔以來，醫藥法方，流行世間，經歷累驗者，仲景採摭，而著述之。蓋，古之醫師，不知心之愛惡所欲，喜怒哀樂偏着者，爲病，而但知脾胃水穀，風寒暑濕觸犯者，爲病，故其論病論藥全局，都自少陰人脾胃水穀中出來，而少陽人胃熱證藥，間或有焉，至於太陰人太陽人病情，則全昧也。

옛 사람들이 육경(六經)·음양(陰陽)으로 병을 논하였으므로 장중경이 《상한론(傷寒論)》을 저술함에 도 역시 육경·음양으로서 병의 증세를 구별했다. 두통이 있고 온몸이 아프고 신열이 있고 오한이 나고 맥이 부하면 이를 태양병의 증세라 했고, 입이 쓰고 목이 마르며 현기가 나고 귀가 안 들리며 가슴이 답답하고 한열(寒熱)이 오락가락하며 두통이 나고 열이 나며 맥이 현(弦)하고 세(細)한 것을 가리켜 소양병의 증세라 하고, 또 오한이 없이 도리어 오열이 나고 땀이 저절로 나고 변비가 있는 자를 양명병의 증세라 하였다. 배가 가득하고 때때로 배가 아프지만 입이 건조하지 않고 명치가 답답하지도 않으면서 저절로 설사를 하면 태음병의 증세라 하고, 맥이 미(微)하고 세(細)하면서 자고만 싶고 입이 마르고 심장이 답답하면서 저절로 설사를 하면 소음병의 증세라고 하였다. 처음에는 배가 아프거나 설사를 하는 증상이 없다가 상한이 된지 6, 7일만에 맥이 미완(微緩)하며 손과 발이 매우 차고 혀가 굳어지고 음낭이 수축되면 궐음병의 증세라고 하였다. 이상 여섯 가지 병의 증세 중에서 삼음병증(三陰病證)은 모두 소음인에게 있는 병이고, 소양병의 증세는 곧 소양인에게 있는 증상이며 태양병의 증세나 양명병의 증세는 소양인·소음인·태음인에게 고루 있는 병이나 이 중에서도 소음인 병증이 가장 많다. 예로부터 의약의 법(法)과 방(方)이 세상에 유행되고, 많은 경험에 축적된 것을 장중경이 수집하여 《상한론》을 저술하였다. 대개 옛 사람들은 사람의 마음에서 생기는 사랑하고 미워하고 탐욕하며 기뻐하고 성내며 슬퍼하고 즐거워하는 것을 지나치게 하는 것이 병이 됨을 알지 못하고, 다만 비위(脾胃)의 음식과 풍(風)·한(寒)·서(暑)·습(濕)이 침범된 것으로만 병이 되는 줄 알았다. 그러므로 그 병론과 약론이 모두 소음인의 비위 음식 중에서 나왔고 이밖에 간혹 소양인의 위열증(胃熱證)에 대한 약이 있으며, 태음인·태양인의 병의 증세에 대해서는 전혀 알지 못하였다.

[5-6] 岐伯曰，傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強，二日，陽明受之，陽明主肉，其脈，挾鼻絡於目，故身熱，目疼而鼻乾，不得臥也，三日，少陽受之，少陽主膽，其脈，循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾，三陽

經絡, 皆受其病, 而未入於藏, 故可汗而已, 四日, 太陰受之, 太陰脈, 布胃中絡於嗌, 故腹滿而嗌乾, 五日, 少陰受之, 少陰脈, 貫腎絡於肺, 繫舌本, 故口燥, 舌乾, 而渴, 六日, 厥陰受之, 厥陰脈, 循陰器, 而絡於肝, 故煩滿而囊縮, 三陰三陽, 五臟六腑, 皆受病, 榮衛不行, 五藏不通, 則死矣.

기백(岐白)이 말하기를 상한병의 1일에는 거양(巨陽)이 병을 받기 때문에 머리와 목이 아프며 허리와 척추가 뻣뻣해진다. 2일에는 양명(陽明)이 병을 받으니 양명은 육(肉)을 주관하고 그 맥이 코의 옆을 지나서 눈으로 연락되므로 몸에 열이 나고 눈알이 아프며 콧속이 마르고 잠을 자지 못한다. 3일에는 소양(少陽)이 병을 받으니 소양은 담을 주관하며 그 맥이 옆구리를 끼고 귀로 연락되므로 가슴과 옆구리가 아프고 귀가 안 들린다. 이렇게 삼양경락이 모두 그 병을 받고서 아직 장부 속에는 들어가지 않았기 때문에 땀만 낼 것이다. 4일에는 태음(太陰)이 병을 받으니 태음맥은 위(胃)에 퍼져서 다시 목구멍으로 연락되므로 배가 가득 차고 목이 마른다. 5일에는 소음(少陰)이 병을 받으니 소음맥은 신장을 관통하여 폐장에 연락한 후에 혀의 뿌리에 연속되므로 입과 혀가 마르고 갈증이 난다. 6일에는 궤음(厥陰)이 병을 받으며 궤음맥은 음기(陰器)를 돌아서 간으로 연락되므로 가슴이 답답하고 음낭이 수축된다. 이와 같이 삼음삼양(三陰三陽), 오장육부(五藏六腑)가 모두 병을 받아서 기혈이 순행하지 못하고 오장이 서로 통하지 못하게 되면 곧 사망하는 것이다.

[5-7] 兩感於寒者, 必不免於死, 兩感於寒者, 一日, 巨陽少陰, 俱病, 則頭痛, 口乾而煩滿, 二日, 陽明太陰, 俱病, 腹滿, 身熱, 不飲食, 譫語, 三日, 少陽厥陰, 俱病, 耳聾, 囊縮而厥, 水漿不入口, 不知人, 六日, 死, 其死, 皆以六七日之間, 其愈, 皆以十日已上.

상한에 양감(兩感)이 되면 반드시 죽음을 면치 못한다. 상한에 양감된 자는 1일에는 거양과 소음이 모두 병이 들어 머리가 아프고 입이 마르며 가슴이 답답하다. 2일에는 양명과 태음이 함께 병들어 배가 부르고 몸에 열이 나며 음식을 먹지 못하며 헛소리를 한다. 3일에는 소양과 궤음이 같이 병든 것이니 귀가 먹고 음낭이 수축되면서 손발이 차고 물과 미음을 넘기지 못하고 의식도 없으니 6일 만에 사망하는 것이다. 죽는 것은 모두 6, 7일 사이지만, 낫는 것은 모두 10일 이상인 것이다.

[5-8] 論曰, 靈樞素問, 假托黃帝, 異怪幻惑, 無足稱道, 方術好事者之言, 容或如是, 不必深責也. 然, 此書, 亦是古人之經驗, 而五臟六腑, 經絡針法, 病證修養之辨, 多有所啓發, 則實是醫家, 格致之宗主, 而苗脈之所自出也, 不可全數其虛誕之罪, 而廢其啓發之功也. 蓋, 此書, 亦古之聰慧博物之言, 方士淵源修養之述也, 其理, 有可考, 而其說, 不可盡信.

나는 논하기를 《영추(靈樞)》와 《소문(素問)》을 황제가 지었다고 거짓 핑계하는 것은 실로 괴이하고 이상해서 사람들을 현혹시키는 것이니 이 같은 것은 말할 가치가 없다. 그러나 방술(方術)이나 별난 것을 좋아하는 자들의 말이 혹 이와 같을 수도 있는 것이니 반드시 깊이 책망할 필요도 없다. 그러나 이 글이 역시 옛 사람의 경험이고 오장육부·경락·침법·병증·수양 등에 대하여 많이 깨우쳐 준 바 있으므로 사실상 의학하는 사람들의 연구하는 종주(宗主)가 되는 것이요, 또 묘맥(苗脈)이 여기서 나온 것이다. 그러므로 그 전체를 헛되다고만 나무라서 그 깨우쳐 준 공로마저도 없애버려서는 안 된다. 대개 이 글은 옛 사람들의 총명과 지혜와 사물을 넓게 아는 말들과 방사(方士)들의 수양의 연원을 기록한 것이니 그 이치는 고찰해 봄 직하지만, 그 학설을 그대로 다 믿을 바는 못 된다.

[5-9] 岐伯所論, 巨陽少陽少陰經病, 皆少陽人病也. 陽明太陰經病, 皆太陰人病也. 厥陰經病, 少陰人病也.

기백이 말한 거양·소양·소음경병은 모두 소양인의 병이고 양명·태음경병은 모두 태음인의 병이고 궤음경병은 소음인의 병이다.

少陰人 腎受熱表熱病論(52條)

소음인 신수열표열병론(52조)

[6-1] 張仲景, 傷寒論曰, 發熱, 惡寒, 脈浮者, 屬表, 卽太陽證也.

장중경(張仲景) 《상한론》에서 말하기를 열이 오르고 오한이 있으며 맥이 부(浮)하면 이는 표병(表病)에 속하였으니, 즉 태양증인 것이다.

[6-2] 太陽傷風, 脈陽浮而陰弱, 陽浮者, 熱自發, 陰弱者, 汗自出. 藹藹惡寒, 淅淅惡風, 翕翕發熱, 鼻鳴乾嘔, 桂枝湯主之.

태양병에 상풍(傷風)으로 된 맥은 양맥(陽脈)이 부(浮)하고 음맥(陰脈)이 약(弱)하다. 양맥이 부하면 열이 저절로 나고, 음맥이 약하면 땀이 저절로 난다. 오슬오슬 춥고 오싹오싹 바람이 싫으며 후끈후끈 열이 오르고 코에서 쉼쉼 소리가 나고 마른 구역이 나면 주로 계지탕(桂枝湯)을 쓴다.

[6-3] 危亦林, 得效方曰, 四時瘟疫, 當用香蘇散.

위역림(危亦林)의 《득효방(得效方)》에서 말하기를 사시온역(四時溫疫)에는 향소산(香蘇散)을 써야 한다.

[6-4] 龔信, 醫鑑曰, 傷寒, 頭痛, 身疼, 不分表裏證, 當用藿香正氣散.

공신(龔信)의 《의감(醫鑑)》에서 말하기를 상한(傷寒)에 머리가 아프고 몸이 쑤시나 표증(表證)인지 이증(裏證)인지 분별하기 어려울 때에는 곽향정기산(藿香正氣散)을 쓰라 하였다.

[6-5] 論曰, 張仲景所論, 太陽傷風, 發熱惡寒者, 卽少陰人腎受熱表熱病也. 此證, 發熱惡寒, 而無汗者, 當用桂枝湯・川芎桂枝湯・香蘇散・芎歸香蘇散・藿香正氣散. 發熱惡寒, 而有汗者, 此陽初證也, 必不可輕易視之, 先用黃芪桂枝湯・補中益氣湯・升陽益氣湯. 三日連服, 而汗不止病不愈, 則當用桂枝付子湯・人蔘桂枝付子湯・升陽益氣付子湯.

나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 태양상풍증(太陽傷風證)에 열이 나고 오한이 있다고 한 것은 곧 소음인의 신(腎)에 열을 받아 밖에 열이 나는 병이니 이 증후에 발열하며 오한이 나고 땀이 없으면 계지탕(桂枝湯)・천궁계지탕(川芎桂枝湯)・향소산(香蘇散)・궁귀향소산(芎歸香蘇散)・곽향정기산(藿香正氣散) 같은 것을 써야하고, 오한발열이 있으면서 땀이 나면 망양증 초증(亡陽證 初證)이므로 절대로 가볍게 보아 넘겨서는 안 된다. 황기계지탕(黃芪桂枝湯)・보중익기탕(補中益氣湯)・승양익기탕(升陽益氣湯)을 3일간 계속 먹어도 땀이 그치지 않고 병이 풀리지 않으면 계지부자탕(桂枝付子湯)・인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)・승양익기부자탕(升陽益氣付子湯)을 써야 한다.

[6-6] 張仲景曰, 太陽病, 脈浮緊, 發熱無汗, 而衄者, 自愈也.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병에 맥이 부(浮)하고 긴(緊)하며 열이 나고 땀이 없이 코피가 나면 병이 저절로 낫는다고 하였다.

[6-7] 太陽病六七日, 表證因在, 脈微, 而沉, 反不結胸, 其人如狂者, 以熱在下焦, 小腹當滿, 小便自利者, 下血乃愈, 抵當湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병이 6, 7일 되었는데도 표증이 남아 있고 맥이 미(微)하면서 침(沈)하되 도리어 결흉(結胸)이 되지 않고, 그 사람이 미친 것 같은 것은 열이 하초(下焦)에 있기 때문이다. 비록 아랫배가 가득할지라도 소변이 순조로운 자는 하혈(下血)을 시키면 곧 낫는 것이다. 여기에 주로 저당탕(抵當湯)을 쓴다.

[6-8] 太陽證, 身黃發狂, 小腹硬滿, 小便自利者, 血證, 宜抵當湯. 傷寒小腹滿, 應小便不利, 今反利者, 以有血也.

태양증에 몸이 노랑고 발광하면서 아랫배가 똥똥히 붓고 소변이 잘 나오는 것은 혈증(血證)이니 마땅히 저당탕을 쓴다. 상한에 아랫배가 가득하면 응당 소변이 잘 나오지 않을 것인데 지금 도리어 소변이 순조로운 것은 혈이 있기 때문이다.

[6-9] 太陽病不解, 熱結膀胱, 其人如狂, 血自下者, 自愈. 但小腹急結者, 宜攻之, 宜桃仁承氣湯.

태양병이 풀리지 않고 열이 방광에 맺혀 있어 미친 사람 같으면서 스스로 하혈(下血)하는 증은 병이 저절로 낫는 것이나, 아랫배가 급히 맺히는 증에는 마땅히 공격해야 하니 도인승기탕(桃仁承氣湯)을 써야 한다.

[6-10] 太陽病外證, 未除, 而數下之, 遂下利不止, 心下痞硬, 表裡不解, 人參桂枝湯主之.

태양병 외증(外證)이 아직 다 풀리지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설사가 그치지 아니하며 명치끝이 막히고 단단히 굳어진다. 이것은 표증과 이증이 다 풀리지 않은 것이니 주로 인삼계지탕(人參桂枝湯)을 쓴다.

[6-11] 論曰, 此證, 其人如狂者, 腎陽困熱也, 小腹硬滿者, 大腸怕寒也. 二證俱見, 當先其急. 腎陽困熱, 則當用, 川芎桂枝湯・黃芪桂枝湯・八物君子湯, 升補之. 大腸怕寒, 則當用, 藿香正氣散・香砂養胃湯, 和鮮之. 若外熱包裡冷, 而毒氣, 重結於內, 或將有養虎遺患之弊, 則當用, 巴豆丹. 下利一二度, 因以, 藿香正氣散・八物君子湯, 和鮮, 而峻補之.

나는 논하기를 이와 같은 증세에 환자가 미친 것 같은 것은 신양(腎陽)이 열을 받았기 때문에 곤궁에 빠진 상태이고 아랫배가 단단하면서 가득하다는 것은 대장(大腸)이 한기(寒氣)를 받고 벌벌 떠는 상태이다. 이렇게 두 가지 증세가 함께 나타날 때에는 마땅히 그 급한 증부터 먼저 치료하는 법이다. 만일 신양이 곤열(困熱)한 것이 더 급하면 우선 천궁계지탕(川芎桂枝湯)・황기계지탕(黃芪桂枝湯)・팔물군자탕(八物君子湯)을 써서 승보(升補)를 하고, 만일 대장이 한기를 받고 벌벌 떠는 것이 급하면 마땅히 곽향정기산(藿香正氣散)・향사양위탕(香砂養胃湯)을 써서 화해(和鮮)케 하고, 만일 외열(外熱)이 이랭(裏冷)을 에워싸고 있으면 내(內)에 독기(毒氣)가 거둡 맺혀서 혹 장차 호랑이를 길러 화를 당하는 폐단이 있는 것인즉 마땅히 파두단(巴豆丹)을 써서 설사를 1, 2차 시키고 곧 곽향정기산・팔물군자탕으로서 화해를 시키면서 한편 크게 보하는 약을 써 주어야 한다.

[6-12] 張仲景所論, 下焦血證, 卽少陰人, 脾局陽氣, 爲寒邪所掩抑, 而腎局陽氣, 爲邪所拒, 不能直升, 連接於脾局, 鬱縮膀胱之證也. 其人如狂者, 其人亂言也, 如見鬼狀者, 恍惚譫語也. 太陽病表證因在者, 身熱煩惱, 而惡寒之證, 間有之也. 太陽病外證除者, 身熱煩惱, 而惡寒之證, 都無之也. 此證, 益氣而升陽, 則得其上策也, 破血而鮮熱, 則出於下計也. 太陽病外證未除, 而數下之逐下利不止云云者, 亦可見, 古人之於此證, 用承氣湯, 則下利不止, 故遂變其方, 而用抵當桃仁湯耳. 太陽病外證未除, 則陽氣其力, 雖有鬱抑, 猶能振寒, 而與寒邪相爭於表也. 若外證盡除, 則陽氣其力, 不能振寒, 而遂爲窮困縮伏之勢也. 攻下之藥, 何甚好藥, 而必待陽氣窮困縮伏之時, 而應用耶. 人參桂枝湯, 不亦晚乎.

장중경(張仲景)이 말한 하초혈증(下焦血證)이란 것은, 즉 소음인이 비국(脾局)의 양기(陽氣)가 한사(寒邪)에 억눌린 바가 되어서 신국(腎局)의 양기가 그 한사의 저항을 받아 위로 곧장 올라가 비국과 연결(連接)하지 못하고 방광에 울축(鬱蓄)되는 증세이다. 또 그 사람이 미친 것 같다는 것은 그 사람이 횡설수설하는 것이요, 귀신을 보았다는 것은 헛것을 보고 중얼거리는 것이다. 태양병 표증(太陽病 表證)이 아직 있다는 것은 신열(身熱)로 몹시 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한(惡寒)이 간간이 있는 것이다. 그러나 태양병에 외증(外證)이 없는 자는 신열로 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한이 간간이 있는 증세는 전혀 없는 것이다. 이런 증후에 기운을 돋우며 양기를 끌어올리면 상책을 얻었다고 할 것이요, 파혈(破血)을 하면서 열을 푸는 것은 졸렬한 계책에서 나온 것이다. 태양병 외증이 아직 다 제거되지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설사가 그치지 않는다고 운운한 것은 역시 옛 사람들이 이런 증세에 승기탕(承氣湯)을 쓰면 설사(泄瀉)가 그치지 않았기 때문에 그 처방을 고쳐서 저당도인탕(抵當桃仁湯)을 썼을 따름이었던 것이다. 태양병에 외증이 모두 제거되지 않았을 때에는 양기(陽氣)의 힘이 비록 울체(鬱滯)되어 막히긴 하였으나 오히려 한(寒)을 떨치고 겉[表]에서 한사(寒邪)와 서로 싸울 수가 있지만 만일 외증이 다 없어졌다면 양기의 힘이 한을 떨치지 못하고 곤궁(困窮)에 빠져 위축되어 엎드려진 형세이다. 공하(攻下)하는 약이 얼마나 좋은 약이길래 반드시 양기가 곤궁에 빠져서 위축되어 엎드려질 때까지 기다려 약을 써야 하는 것인가? 그렇다면 인삼계지탕(人參桂枝湯)이 또한 늦지 않겠는가?

[6-13] 張仲景曰, 婦人傷寒發熱, 經水適來斷, 晝日明了, 夜則譫語, 如見鬼狀, 此爲熱入血室, 無犯胃氣及上二焦, 必自愈.

장중경(張仲景)이 말하기를 부인 상한에 발열하고 경수(經水)가 적래적단(適來適斷)하며 낮에는 정신이 맑았다가 밤이 되면 헛소리를 하기를 귀신 같은 것이 보인다고 하는 것은 열이 자궁에 들어

있기 때문이다. 그러나 위기(胃氣)와 상초(上焦)·중초(中焦)를 범하지 않았으면 반드시 저절로 낫는 것이다.

[6-14] 陽明病, 口燥, 嗽水, 不欲嚥, 此必衄, 不可下.

양명병(陽明病)에 입이 말라서 양치질을 하고도 그 물을 넘기고자 하지 않는 것은 반드시 코피가 터지려는 징조이다. 설사를 시켜서는 안 된다.

[6-15] 陽明病, 不能食, 攻其熱, 必噦. 傷寒嘔多, 雖有陽明, 不可攻. 胃家實, 不大便, 若表未解, 及有半表者, 先以桂枝柴胡, 和解, 乃可下也.

양명병의 음식을 먹지 못하는 증에 열을 공격하면 반드시 딸꾹질을 하는 것이고 상한에 구역기(嘔逆氣)가 많은 증에는 비록 양명증이 있어도 공격하는 약을 써서는 안 된다. 양명병 위가실(胃家實) 증으로 대변을 보지 못하는데 만일 표증이 풀리지 않았거나 표증이 반쯤 풀렸을 경우에는 먼저 계지(桂枝)·시호(柴胡)를 써서 화해(和解)를 시킨 후에 설사를 시켜야 한다.

[6-16] 論曰, 右諸證, 當用藿香正氣散・香砂養胃湯・八物君子湯.

위의 모든 증세에는 곽향정기산(藿香正氣散)·향사양위탕(香砂養胃湯)·팔물군자탕(八物君子湯)을 써야 한다.

[6-17] 張仲景曰, 陽明之爲病, 胃家實也. 問曰, 緣何得陽明病. 答曰, 太陽病, 發汗, 若下, 若利小便者, 此亡津液, 胃中乾燥, 因轉屬陽明, 不更衣, 內實, 大便難者, 此名陽明病也.

장중경(張仲景)이 말하기를 양명병이 되면 위가실(胃家實)로 되는 것이다. 묻기를 '어떠한 까닭으로 양명병을 얻게 되는가?' 대답하기를 태양병이 되었을 때 땀을 너무 많이 내었거나 설사를 많이 하였거나 이뇨(利尿)를 많이 시키면 진액이 없어져서 위중(胃中)이 건조하게 되어 양명병으로 전속(轉屬)하게 되면 내실(內實)하여 대변이 통하기 어려운 증을 양명증이라고 한다.

[6-18] 傷寒轉屬陽明, 其人澀然微汗出也.

상한(傷寒)에 양명병(陽明病)으로 전속(轉屬)하면 그 사람은 땀이 축축하게 난다.

[6-19] 傷寒, 若吐, 若下後, 不解, 不大便五六日, 至十餘日, 日晡所發潮熱不惡寒, 狂言如見鬼狀, 若劇者發, 則不識人, 循衣摸床, 惕而不安, 微喘直視, 脈弦者生, 脈澀者死.

상한에 만일 토하고 하리(下利)를 한 후에도 병이 풀리지 않고 대변을 5, 6일내지 10여 일을 보지 못하면서 해 질 무렵에 발열하며 오한이 없으면서 미친 소리를 하고 귀신 같은 것이 보인다고 한다. 몹시 심한 자는 발열하면서 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬으며 불안해 하고 약간 숨이 가빠지면서 눈동자를 곧추세운다. 이렇게 된 증에는 맥(脈)이 현(弦)한 사람은 살고 맥이 삽(澀)한 사람은 죽는 것이다.

[6-20] 論曰, 秦漢時醫方治法, 大便秘燥者, 有大黃治法, 無巴豆治法. 故張仲景, 亦用大黃大承氣湯, 治少陰人, 太陽病轉屬陽明. 其人澀然微汗出, 胃中燥煩實, 不大便五六日, 至十餘日, 日晡發潮熱, 不惡寒, 狂言如見鬼狀之時, 而用之則神效. 若劇者, 發則不識人, 循衣摸床, 惕而不安, 微喘直視, 用之於此, 則脈弦者生, 脈澀者死. 蓋此方, 治少陰人太陽病轉屬陽明, 不大便五六日, 日晡發潮熱者, 可用而其他, 則不可用也. 仲景, 知此方, 有可用不可用之時候, 故亦能昭詳, 少陰人, 太陽陽明病證候也. 蓋仲景, 一心精力, 都在於深得, 大承氣湯可用時候, 故不可用之時候, 亦昭詳知之也. 仲景, 太陽陽明病, 藥方中, 惟桂枝湯・人蔘桂枝湯, 得其彷彿, 而大承氣湯, 則置人死生於茫無津涯之中. 必求大承氣湯, 可用之時候, 而待其不大便五六日, 日晡發潮熱, 狂言時, 是豈美法也哉. 蓋少陰人病候, 自汗不出, 則脾不弱也, 大便秘燥, 則胃實也. 少陰人, 太陽陽明病, 自汗不出, 脾不弱者, 輕病也, 大便雖硬, 用藥, 則易愈也, 故大黃・枳實・厚朴・芒硝之藥, 亦能成功於此時, 而劇者, 猶有半生半死. 若用八物君子湯・升陽益氣湯, 與巴豆丹, 則雖劇者, 亦無脈弦者生, 脈澀者死之理也. 又太陽病表證, 因在時, 何不早用溫補升陽之藥, 與巴豆, 預圖其病, 而必待陽明病, 日晡發潮熱, 狂言時, 用承氣湯, 使人半生半死耶.

나는 논하기를 진나라 · 한나라 때에는 의방치법(醫方治法)에 대변이 비조(秘燥)한 자에게는 대황(大黃)으로 치료하는 방법은 있어도 파두(巴豆)로서 치료하는 방법은 없었기 때문에 장중경(張仲景)도 대황대승기탕(大黃大承氣湯)을 써서 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 병증을 치료하는 것이다. 그 환자의 병증은 끈끈하게 땀이 나와서 위중(胃中)이 조변실(燥煩實)하여 대변을 5, 6일 내지 10여 일을 보지 못하고 매일 해질 무렵이면 조열(潮熱)을 발하며 오한증은 없고 미친 소리를 하면서 귀신 같은 것이 보인다고 할 때 대승기탕(大承氣湯)을 쓰면 신효(神效)하다 하고, 병증이 몹시 심한 자는 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬고 두려워하면서 불안해 하고 약간 숨이 차고 눈동자를 곧추세우는 것이다. 이렇게 되어 있는 병증에는 대승기탕(大承氣湯)을 쓰는데 맥(脈)이 현(弦)한 자는 살고 맥이 삽(澁)한 자는 죽는다고 하였으니 대개 이 처방은 소음인의 태양병이 양명병으로 전속하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵이면 조열(潮熱)이 나는 경우에는 쓸 수 있으나 그 외에는 쓸 수 없는 것이다. 장중경(張仲景)이 이 처방을 쓰고 못 쓰는 때와 증후(證候)를 잘 알기 때문에 또한 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 증후도 잘 알 수 있었다. 대개 중경의 일심 정력(一心精力)이 대승기탕을 쓸 수 있는 시기와 증후를 찾아내는 데 있기 때문에 또한 써서는 안 되는 시기와 증후도 소상히 잘 알았던 것이다. 장중경(張仲景)의 《상한론》 태양양명병증(太陽陽明病證) 처방 중에 오직 계지탕 · 인삼계지탕이 그 효력이 근사한 처방이지만 대승기탕은 사람의 생사(生死)를 아득히 끝없는 바닷가에 내버려두고, 반드시 대승기탕을 쓸 때와 증후를 구하고자 하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵에 조열(潮熱)이 나타나고 헛소리 할 때를 기다리고 있다면 이것이 어찌 좋은 치료법이라고 하겠는가? 대체로 소음인의 병증에는 땀이 저절로 나지 않으면 비(脾)가 약(弱)하지 않은 것이고 대변이 비조(秘燥)하면 위가실증(胃家實證)이 된다. 소음인의 태양증이 양명병으로 전속되었어도 저절로 땀이 나지 않으면 비가 약한 것이 아니고 오히려 경병(輕病)이다. 대변이 비록 굳다고 하더라도 약을 쓰면 잘 낫기 때문이다. 그렇기 때문에 대황(大黃) · 지실(枳實) · 후박(厚朴) · 망초(芒硝) 같은 약도 또한 성공하는 것이 이때이지만 그러나 병이 극심하여 반생반사(半生半死)하게 되어 있는 때라도 팔물군자탕(八物君子湯) · 승양익기탕(升陽益氣湯)을 파두(巴豆)와 함께 쓰면 비록 극심한 자라도 또한 맥이 현한 사람은 살고 맥이 삽한 사람은 죽어야 할 이치가 없다. 또 태양병의 표증이 그대로 있을 때 어찌하여 일찍부터 온보승양(溫補升陽)하는 약과 파두를 함께 써서 미리 그 병을 다스리지 않고서 꼭 양명병으로 전속되어서 해질무렵이 되면 조열이 나고 헛소리 할 때를 기다려 대승기탕을 써서 사람으로 하여금 반생반사하게 하는가.

[6-21] 許叔微, 卒事方曰, 一人, 病傷寒, 大便秘利, 日晡發潮熱, 手循衣縫, 兩手撮空, 直視喘急, 諸醫, 皆走, 此誠惡候. 仲景, 雖有證而無法, 但云, 脈弦者生, 脈澁者死. 謾且救之, 與小承氣湯, 一服, 而大便秘利, 諸疾漸退, 脈且微弦, 半月愈.

허숙미(許叔微)의 《본사방(本事方)》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데 대변이 나오지 않고 해질 무렵 조열이 나면서 손으로 옷깃을 어루만지고 꿰매는 형용을 하며 두 손으로 허공을 저어 잡고 자 하고 눈동자가 곧추서고 몹시 숨이 차하는 증세에 의사들이 모두 달아나버리니 실로 나쁜 상태이다. 장중경(張仲景)의 방(方)에 비록 그 증세는 있어도 치법은 없고 단지 말하기를 맥현자(脈弦者)는 살고 맥삽자(脈澁者)는 죽는다고 한 것뿐이다. 우선 치료해보고자 소승기탕(小承氣湯) 한 첩을 달여 먹이니 대변이 통하고 모든 증세가 점점 물러가고 맥도 또한 미현(微弦)해지더니 15일만에 나았다.

[6-22] 王好古, 海藏書曰, 一人, 傷寒, 發狂欲走, 脈虛數, 用柴胡湯, 反劇. 以蔘芪 · 歸朮 · 陳皮 · 甘草, 煎湯一服, 狂定, 再服, 安睡而愈.

왕호고(王好古)의 《해장서(海藏書)》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데 발광(發狂)을 하면서 밖으로 달아나고자 하며 맥은 허삭(虛數)하여 시호탕(柴胡湯)을 썼더니 병이 도리어 심해졌다. 곧 인삼(人蔘) · 황기(黃芪) · 당귀(當歸) · 백출(白朮) · 진피(陳皮) · 감초(甘草) 등속을 한 첩 달여서 먹이니 발광병(發狂病)이 멎고 또 한 첩을 먹이니 편안히 잠이 들면서 나았다.

[6-23] 醫學綱目曰, 嘗治循衣摸床者, 數人, 皆用大補氣血之劑. 惟一人, 兼潤振脈代, 遂於補劑中, 畧加桂, 亦振止, 脈和, 而愈.

《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 이전에 손으로 옷깃을 어루만지거나 침상을 더듬는 환자 몇 사람을 치료한 경험이 있었다. 모두 기혈(氣血)을 대보(大補)하는 약을 썼더니 그 중 한 사람만이 눈꺼풀에 경련이 일어나고 대맥(代脈)이 나오는 증을 겸하는 것이다. 그리하여 보제(補劑) 중에 계지(桂枝)·관계(官桂)를 가하여 다스렸더니 또한 눈의 경련이 멎고 맥이 화(和)하여지고 대맥이 없어지면서 나았다

[6-24] 成無己, 明理論曰, 潮熱屬陽明, 必於日晡時發者, 乃爲潮熱也. 陽明之爲病, 胃家實也, 胃實, 則譫語, 手足澀然汗出者, 此, 大便已鞭也. 譫語有潮熱, 承氣湯下之, 熱不潮者, 勿服.

성무기(成無己)의 《명리론(明理論)》에 말하기를 조열(潮熱)은 양명증에 속하는 것이니 반드시 해질 무렵 열이 나는 것을 조열이라 한다. 양명병이라고 하는 것은 위가(胃家)가 실(實)해지는 것이다. 위가가 실하게 되면 헛소리를 하고 손발에서 끈끈하게 땀이 흐르는 데 이것은 대변이 이미 굳어 있는 것이다. 조열이 있고 헛소리를 하면 승기탕(承氣湯)으로 하리를 시키고 조열이 없으면 승기탕을 써서는 안된다.

[6-25] 朱震亨, 丹溪心法曰, 傷寒壞證, 昏沉垂死, 一切危急之證, 好人蔘一兩, 水煎一服而盡, 汗自鼻梁上出, 涓涓如水.

주진형(朱震亨)의 《단계심법(丹溪心法)》에 말하기를 상한괴증(傷寒壞證)에 정신이 혼미하여 거의 죽게 된 경우와 일체 위급한 병증에는 좋은 인삼 1냥을 물에 달여 단번에 먹게 하면 땀이 콧등에서 물방울 흐르듯 떨어진다.

[6-26] 論曰, 右論, 皆以張仲景, 大承氣湯, 始作俑, 而可用不可用時候, 難知. 故紛紜多惑, 而始知張仲景之不可信也. 張仲景, 大承氣湯, 元是殺人之藥, 而非活人之藥, 則大承氣湯, 不必舉論. 此胃家實病, 不更衣發狂證, 當用巴豆全粒, 或用獨蔘八物君子湯, 或先用巴豆, 後用八物君子湯, 以壓之.

나는 논하기를 위에서 말한 모든 사람의 논술한 바가 모두 장중경(張仲景)의 대승기탕(大承氣湯)을 대상으로 하였으나 이를 쓸 수 있는 시후(時候)와 쓰지 못하는 시후를 잘 알기 어려워 여러 가지로 의혹이 분분하다가 비로소 장중경의 이론을 믿을 수 없음을 깨닫게 된 것이다. 장중경의 대승기탕은 원래 소음인에게 살인하는 약이고 사람을 살리는 약이 아니므로 대승기탕을 말할 필요도 없는 것이다. 이렇게 위가실(胃家實)하여 대변을 보지 못하고 발광을 하는 증에는 마땅히 파두(巴豆)를 한 알 쓰거나 또는 독삼팔물탕(獨蔘八物湯)을 쓰는 것이고 또는 먼저 파두를 쓰고 후에 팔물군자탕(八物君子湯)을 써서 병을 눌러야 한다.

[6-27] 張仲景曰, 陽明病, 外證, 身熱, 汗自出, 不惡寒, 反惡熱.

장중경(張仲景)이 말하기를 양명병 외증(陽明病 外證)은 신열(身熱)이 나고 땀이 저절로 나면서 오한증은 없고 도리어 열을 싫어한다.

[6-28] 傷寒陽明病, 自汗出, 小便數, 則津液內竭, 大便必難, 其脾爲約, 麻仁丸主之.

상한 양명병에 땀이 저절로 나고 소변이 잦으면 진액이 안에서 마르기 때문에 대변을 보기가 어렵게 되는 것이다. 그것은 비(脾)가 약(約)해진 것이다. 주로 마인환(麻仁丸)을 쓴다.

[6-29] 陽明病, 自汗出, 小便自利者, 此爲津液內竭, 大便雖鞭, 不可攻之, 宜用蜜導法, 通之.

양명병증에 땀이 저절로 나면서 소변이 잦은 것은 진액이 안에서 말랐기 때문이다. 비록 대변이 굳어 있을지라도 공격하는 약을 써서는 안 되고 마땅히 밀도법(蜜導法)을 써서通便(通便)하게 해야 한다.

[6-30] 陽明病, 發熱汗多者, 急下之, 宜大承氣湯.

양명병에 발열(發熱)하면서 땀이 몹시 흐르면 급히 설사를 시켜야 한다. 마땅히 대승기탕을 쓴다.

[6-31] 李梴, 醫學入門曰, 汗多不止, 謂之亡陽, 如心痞胃煩, 面青膚潤者, 難治, 色黃手足溫者, 可治.

凡汗漏不止，眞陽脫，故謂之亡陽，其身必冷，多成痺寒，四肢拘急，桂枝附子湯主之。

이천(李延)의 《의학입문(醫學入門)》에 말하기를 땀이 많이 나고 그치지 않는 것을 망양증(亡陽證)이라고 하니 가슴이 답답하고 심하(心下)를 꼭 틀어막는 것 같고 얼굴빛이 푸르고 살이 떨어지는 증은 치료하기 어려운 것이고, 면색(面色)이 누렇게 수족이 따뜻한 자는 치료할 수 있다. 무릇 땀이 몹시 흐르고 그치지 않으면 진양(眞陽)이 빠져 나가기 때문에 이것을 망양증이라고 한다. 그 몸이 반드시 차고 대개는 비한(痺寒)이 되어 사지가 굳고 까부라진다. 주로 계지부자탕(桂枝附子湯)을 써야 한다.

[6-32] 嘗治，少陰人，十一歲兒，汗多亡陽病，此兒，勞心焦思，素證，有時以泄瀉爲憂，而每飯時，汗流滿面矣。忽一日，頭痛發熱，汗自出，大便秘燥。以此兒，素證，泄瀉爲憂，故頭痛身熱，便秘汗出之熱證，以其反於泄瀉寒證，而曾不關心，尋常治之，以黃芪・桂枝・白芍藥等屬，發表矣。至于四五日，頭痛發熱不愈。六日平明，察其證候，則大便秘結已四五日，小便赤澀二三匙，而一晝夜間，小便度數不過二三次，不惡寒，而發熱，汗出度數，則一晝夜間二三四次不均，而人中，則或有時有汗，或有時無汗，汗流滿面滿體，其證可惡。始覺汗多亡陽證候，真是危證也。急用巴豆一粒，仍煎黃芪桂枝附子湯，用附子一錢，連服二貼，以壓之。至于未刻，大便通，小便稍清，而稍多。其翌日，即得病七日也。以小兒附子太過之慮，故以黃芪桂枝附子湯一貼，分兩日服矣。兩日後，其兒，亡陽證，又作，不惡寒，發熱，汗多，而小便赤澀，大便秘結如前，面色帶青，間有乾咳，病勢比前太甚。其日即得病九日也，時，則巳時未刻也。急用巴豆一粒，仍煎人蔘桂枝附子湯，用人蔘五錢，附子二錢，連二貼，以壓之。至于日晡，大便始通，小便稍多，而色赤，則一也，又用人蔘桂枝附子湯，人蔘五錢，附子二錢，一貼服矣。至于二更夜，其兒，側臥，而頭不能舉，自吐痰一二匙，而乾咳仍止。其翌日，又用人蔘桂枝附子湯，人蔘五錢，附子二錢，三貼，食粥二三匙，每用藥後，則身清涼，無汗，小便稍多，而大便必通。又翌日，用此方二貼，食粥半碗。又翌日，用此方二貼，食粥半碗有餘，身清涼，自起坐房室中，此日，即得病十二日也。此三日內，身清涼，無汗，大便通，小便清而多者，連用附子二錢，日二三貼之，故也。于十三日，又起步門庭，而舉頭不能仰面，懲前小兒附子太過之慮，用黃芪桂枝附子湯，用附子一錢，每日二貼服。至于七八日，頭面，稍得仰舉，而面部浮腫，又每日二貼服。至于七八日，頭面，又得仰舉，而面部浮腫，亦減。其後，用此方每日二貼服，自得病初，至於病解，前後一月餘，用附子，凡八兩矣。

일찍이 소음인 11세 된 아이가 한다망양병(汗多亡陽病)을 앓는 것을 치료한 일이 있다. 이 아이는 평소에도 노심초사하는 편이며 때때로 설사하는 것이 걱정이었으며, 밥을 먹을 때마다 온 얼굴에 구슬 같은 땀을 흘린다. 그러다가 하루는 갑자기 두통・발열하면서 땀이 저절로 흐르고 대변도 굳어서 불통(不通)하게 되었다. 이 아이의 평소 설사증을 걱정했기 때문에 두통・신열・변비・한출(汗出) 등의 열증(熱證)은 한증(寒證)인 설사와 반대되므로 관심을 두지 않고 예사로 치료하여 황기(黃芪)・계지(桂枝)・백작약(白芍藥)으로 발표(發表)만 해 주었더니 4,5일이 되었어도 두통・발열이 낫지 않는 것이다. 6일이 되던 날 아침에야 그 병세를 자세히 살펴보니 대변이 굳어서 못 본지가 이미 4,5일이 되었고 또 소변 빛이 붉고 깔깔하여서 잘 나오지 않아 한 번에 두세 손가락 밖에 되지 않는다. 오한증은 없으면서 발열을 하며 땀이 흘러나오는 횟수는 하루에 2,3,4차로서 불규칙하였다. 인중(人中)에는 혹 땀이 있는 때도 있고 또는 땀이 없는 때도 있었다. 그리고 땀이 얼굴과 온몸에 줄줄 흐르고 있으니 그 병이 과연 나쁜 것이라 비로소 한다망양병(汗多亡陽病)의 증후란 것을 깨닫고 보니 진실로 위급한 병증인 것이다. 급히 파두(巴豆) 한 알을 거각(去殼)하여 먹이고 거둬 황기계지부자탕(黃芪桂枝附子湯)을 쓰는데 부자(附子)를 1돈을 넣고 달여서 2첩을 연복(連服)케 하여 병을 눌러놓았더니 오후 1시부터 3시 사이에 대변이 통하고 소변도 약간 맑아지고 양도 조금 많아졌다. 그 다음날은 병을 얻은 지 7일이 되는 날이다. 그 동안에 소아에게 부자를 너무 과하게 쓰지 않았는가 걱정이 되므로 황기계지부자탕(黃芪桂枝附子湯) 1첩을 2일간 나누어 먹게 하였더니 이틀 후 그 아이의 망양증(亡陽證)이 다시 발작하여 오한증은 없이 발열하면서 땀을 몹시 흘리고, 소변은 빛이 붉고 깔깔하며 대변은 굳어서 전번과 같이 통하지 않고 온 얼굴에 푸른빛을 띠고 간간히 마른기침을 하였다. 병세가 전번에 비하여 극히 심하게 된 것이다. 그 날은 그 아이가 병을 얻은 지 9일이 되는 날이고 시간은 상오 11시경이었다. 그리하여 급히 파두 한 알을 거각하여 먹이고 이번에는 인삼계지부자탕(人蔘桂枝附子湯)을 써야 되겠기에 인삼(人蔘) 5돈, 부자(附子) 2돈을 물에 넣어 달여서 2첩을 연복시켜서 병을 눌러놓

있더니 해질 무렵 되어서 대변을 비로소 통하고 소변은 조금 많아졌으나 빛깔이 붉은 것은 전과 같았다. 또다시 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)에 인삼 5돈, 부자 2돈을 물에 달여서 1첩을 먹이니 그날밤 10시쯤 되어서 그 아이가 모로 눕기는 하나 머리를 들지는 못하고 저절로 가래를 한두 손가락쯤 토하더니 기침도 곧 멎었다. 그 다음날 또다시 인삼계지부자탕(人蔘桂枝付子湯)을 인삼 5돈, 부자 2돈 하여 3첩을 썼더니 죽을 두세 손가락을 먹고 매번 약을 먹은 후에는 몸이 식고 땀이 없어졌다. 소변도 조금씩 많아지면서 대변도 잘 통하였다. 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 쓰니 죽을 반사발이나 먹었다. 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 썼더니 죽을 반사발도 더 먹었다. 몸이 식으면서 방 안에서 스스로 일어나 앉았다. 바로 이날은 병이 생긴지 12일이 되는 날이다. 이렇게 3일 동안에 몸이 맑고 개운해지면서 땀이 없어지고 대변이 잘 통하고 소변이 맑으면서 많아지게 된 것은 부자 2돈을 넣고 하루에 두세 첩씩 연 3일 동안에 계속 썼기 때문에 그와 같은 좋은 효과를 본 것이다. 13일이 되는 날에는 또 일어나서 문 밖에 나가 걷기도 하나 힘이 없어서 머리와 얼굴을 잘 들지 못한다. 이것은 소아에게 부자를 너무 과하게 쓴 때문으로 생각되어 황기계지부자탕(黃芪桂枝付子湯)에 부자를 1돈씩 넣고 매일 2첩을 복용케 하여 7, 8일이 되자 머리와 얼굴은 조금은 들기는 하지만 얼굴이 부었다. 또 매일 2첩씩 7, 8일을 썼더니 얼굴을 더욱 잘 들고 얼굴에 부종(浮腫)도 내렸다. 그 후에도 이 처방대로 매일 2첩씩 썼다. 이 한다망양병이 생긴 날로부터 병이 다 낫기까지 1개월이 조금 지났는데 그 동안 부자를 쓴 분량이 모두 8냥이었다.

[6-33] 張仲景曰, 陽明病, 有三病, 太陽陽明者, 脾約是也. 正陽陽明者, 胃家實是也. 少陽陽明者, 發汗利小便, 胃中燥煩實, 大便難是也.

장중경(張仲景)이 말하기를 양명병에는 세 가지 병이 있으니 태양양명(太陽陽明)이라 함은 비약(脾約)이 이것이고 정양양명(正陽陽明)이라 함은 위가실(胃家實)이고 소양양명(少陽陽明)이라 함은 땀을 많이 내거나 리소변(利小便)을 많이 해서 위중(胃中)이 조변(躁煩)하고 내실(內實)이 되어 대변불통(大便不通)이 된 것이다.

[6-34] 論曰, 張仲景所論, 陽明三病, 一曰, 脾約者, 自汗出, 小便利之證也, 二曰, 胃家實者, 不更衣, 大便難之證也, 三曰, 發汗利小便, 胃中燥煩實者, 此亦胃家實也, 其實, 非三病也, 二病, 而已. 仲景意, 脾約云者, 津液漸竭, 脾之潤氣, 漸約之謂也, 胃家實云者, 津液已竭, 胃之全局, 燥實之謂也. 中古戰國秦漢之時, 醫家單方經驗, 其來已久, 汗吐下三法, 始爲盛行, 太陽病表證因在者, 或以麻黃湯發汗, 或以猪苓湯利小便, 或以承氣湯下之. 承氣湯下之, 則下利不止之證, 作矣, 麻黃湯・猪苓湯, 發汗利小便, 則胃中燥煩實, 大便難之證, 作矣. 仲景有見於此, 故以脾約之自汗出, 自利小便者, 脾之潤氣, 漸約, 亦將爲胃燥實之張本矣. 然, 脾約, 自脾約也, 胃家實, 自胃家實也, 寧有其病, 先自脾約, 而後, 至於胃家實之理耶.

나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 바 양명병의 세 가지 병에 첫째, 비약(脾約)이라 함은 땀이 저절로 나고 소변을 많이 보는 증이고, 둘째, 위가실(胃家實)이라 한 것은 대변을 보고자 하여도 굳어서 나오지 않는 증이고, 셋째, 발한(發汗)과 소변을 너무 많이 시켜서 위중(胃中)이 말라서 실(實)하게 된다는 것은 이것 또한 위가실이다. 그 실상인즉 양명병이 세 가지 증이 아니고 두 가지 증일 따름이다. 장중경(張仲景)이 비약(脾約)이라고 말한 뜻은 진액이 점점 말라 비장(脾臟)의 윤기(潤氣)마저 점점 약(約)해지는 것을 말하는 것이고, 위가실이라 말한 것은 진액이 이미 말라서 위의 전체가 조실(燥實)하게 된 것을 말하는 것이다. 옛날 중국 전국(戰國)・진한시대(秦漢時代)에는 의가(醫家)들의 단방(單方) 경험이 이미 오래 전부터 전해져 왔고 한토하(汗吐下)의 3법(法)이 성행하기 시작하였다. 태양병 표증이 그대로 있는 사람을 또는 마황탕(麻黃湯)으로 발표(發表)시키고 또는 저령탕(猪苓湯)을 써서 리소변(利小便)시키고 또는 승기탕(承氣湯)을 써서 설사를 시켰다. 승기탕을 써서 설사를 시키면 설사가 멎지 않는 증이 생기고 마황탕・저령탕을 써서 발한과 리소변시키면 위중(胃中)이 조변실(躁煩實)하고 대변이 불통하는 증이 생긴다. 중경이 이렇게 되는 것을 보았기 때문에 비약(脾約)으로 땀이 저절로 나오고 소변이 잘 나오는 것은 비장의 윤기가 점점 약(約)해져 또한 장차 위가 조실(燥實)하게 되는 근원이 된다고 하였으나 비약(脾約)은 본래가 비약이고 위가실(胃家實)은 본래가 위가실이다. 정녕 그 병이 먼저 비가 약해지고 후에 얼마 있다가 위가실이 될 이치가 있겠는가?

[6-35] 胃家實, 脾約二病, 如陰證之太陰少陰病, 虛實證狀, 顯然不同, 自太陽病, 表證因在時, 已爲兩路分歧, 元不相合. 太陽病, 表證因在, 而其人如狂者, 鬱狂之初證也, 陽明病, 胃家實, 不更衣者, 鬱狂之中證也, 陽明病, 潮熱, 狂言, 微喘直視者, 鬱狂之末證也, 太陽病, 發熱惡寒, 汗自出者, ㊦陽之初證也, 陽明病, 不惡寒, 反惡熱, 汗自出者, ㊦陽之中證也, 陽明病, 發熱汗多者, ㊦陽之末證也, 蓋鬱狂證, 都是身熱, 自汗不出也. ㊦陽證, 都是身熱, 自汗出也.

위가실과 비약의 두 가지 병은 음증의 태음병, 소음병과 같아서 허실 증상이 현저히 다르다. 태양병 표증이 있을 때부터 두 길이 이미 나뉘어져 있기 때문에 원래 서로 합할 도리가 없는 것이다. 태양병 표증이 아직 남아 있어서 그 사람이 미친 자와 같은 것은 울광증 초증(鬱狂證 初證)이요, 양명병(陽明病)에 위가(胃家)가 실(實)하게 되고 대변을 보고자 하여도 불통되는 자는 울광증 중증(鬱狂證 中證)이고, 양명병에 해질 무렵이 되면 고열이 나타나서 헛소리를 하고 약간 헛떡거리며 눈동자를 곧추세우는 자는 울광증 말증(鬱狂證 末證)이 된 것이다. 태양병에 발열하고 오한증을 일으키면서 땀이 저절로 흘러나오는 자는 망양증 초증(㊦陽證 初證)인 것이고, 양명병에 오한은 없고 오히려 오열(惡熱)하며 땀이 저절로 흘러나오는 것은 망양증 중증(㊦陽證 中證)인 것이고, 양명병에 발열하고 땀이 몹시 많이 흘러나오는 자는 망양증 말증(㊦陽證 末證)이 된 것이다. 울광증(鬱狂證)은 모두 신열이 있고 땀이 나오지 않는 것이고 망양증은 모두 신열이 있고 땀이 저절로 많이 흘러나오는 것이다.

[6-36] 陰證, 口中和, 而有腹痛泄瀉者, 太陰病也, 口中不和, 而有腹痛泄瀉者, 少陰病也, 陽證, 自汗不出, 而有頭痛身熱者, 太陽陽明病, 鬱狂證也, 自汗出, 而有頭痛身熱者, 太陽陽明病, ㊦陽證也. 陰證之太陰病, 陽證之鬱狂病, 有輕證重證也. 陰證之少陰病, 陽證之㊦陽病, 有險證危證也. ㊦陽少陰病, 自初痛, 已爲險證, 繼而爲危證也.

음증(陰證)에 입 안이 부드러우면서 복통·설사하는 것은 태음증(太陰證)이고 입 안이 부드럽지 못하고 복통·설사를 하는 것은 소음증(少陰證)이다. 양증(陽證)에 땀이 나오지 않고 두통·신열이 있는 것은 태양양명병 울광증(太陽陽明病 鬱狂證)이고 땀이 저절로 나면서 두통·신열이 있는 것은 태양양명병 망양증(太陽陽明病 ㊦陽證)이다. 음증의 태음증과 양증의 울광증은 경증(輕證)·중증(重證)이 있고, 음증의 소음증과 양증의 망양증은 험증(險證)·위증(危證)이 있다. 망양증과 소음증은 병이 시작되면서부터 험증이 되고 계속하여 위증이 되는 것이다.

[6-37] ㊦陽病證, 非但觀於汗也, 必觀於小便多少也. 若小便清利, 而自汗出, 則脾約病也, 此險證也. 小便赤澀, 而自汗出, 則陽明病, 發熱汗多也, 此, 危證也. 然, 少陽人裡熱證, 太陰人表熱證, 亦有汗多, 而小便赤澀者, 宜察之, 不可誤藥.

망양병증은 비단 땀만을 볼 것이 아니라 반드시 소변이 많고 적은 것도 보아야 한다. 만일 소변이 맑고 많으면서 땀이 저절로 나오면 비약병(脾約病)이 되는 것이니 이는 험증이다. 소변이 붉고 깔깔하게 나오면서 저절로 땀이 나게 되면 양명병에 발열다한증(發熱多汗證)이니 이는 위증이다. 그러나 소양인 이열병증(裡熱病證)과 태음인 표열병(表熱病)에도 또한 땀이 많이 나오면서 오줌이 붉고 깔깔한 자가 있으니 판단하여 함부로 약을 잘못 써서는 안 된다.

[6-38] 胃家實病, 其始焉, 汗不出, 不惡寒, 但惡熱, 而其病垂危, 則澀然微汗出, 潮熱也. 澀然微汗出潮熱者, 表寒振發之力, 永竭, 故也, 胃竭之候也. 脾約病, 其始焉, 身熱, 汗自出, 不惡寒, 而若其病垂危, 則發熱汗多, 而惡寒也. 發熱汗多, 而惡寒者, 裡熱撐支之勢, 已窮, 故也, 脾絕之候也.

위가실병은 처음 시작할 때에는 땀이 나지 않고 오한증도 없다. 다만 열이 심하다가 거의 죽게 되면 끈끈하게 땀이 약간 나고 열이 조수(潮水)처럼 올랐다 내렸다 하는 것이니 위와 같이 되는 것은 한사(寒邪)를 겉으로 멀쳐 내보내는 힘이 아주 고갈되었기 때문에 나타나는 것이므로 위기(胃氣)가 아주 말라버린 증후인 것이다. 비약병(脾約病)은 시초에 신열이 있고 땀이 저절로 나오나 오한증은 없다가 그 병으로 거의 죽게 되면 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것이다. 이렇게 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것은 리열(裡熱)을 지탱해 내는 세력이 이미 다하였기 때문에 비기(脾氣)가 끊어지는 증후인 것이다.

[6-39] 張仲景曰, 厥陰證, 手足厥冷, 小腹痛, 煩滿, 囊縮, 脈微欲絕, 宜當歸四逆湯.

장중경(張仲景)이 말하기를 귓음증(厥陰證)은 수족(手足)이 냉(冷)해지고 아랫배가 아프며 가슴이 답답하고 음낭이 쪼그라 들어가고 맥이 가늘어서 끊어지려고 하는 것이니 마땅히 당귀사역탕(當歸四逆湯)을 써야 한다.

[6-40] 凡厥者, 陰陽氣, 不相順接, 便爲厥. 厥者, 手足逆冷, 是也.

장중경(張仲景)이 말하기를 대개 귓(厥)이라 하는 것은 음기와 양기가 서로 순합하지 못하고 한편으로 기울어져 귓이 되는 것이니, 귓한다고 하는 것은 수족으로부터 거슬러 냉해지는 것이다.

[6-41] 傷寒, 六七日, 尺寸脈微緩者, 厥陰受病也. 其證, 小腹痛滿, 而囊縮, 宜用承氣湯, 下之.

상한병이 6,7일이 되어서 촌척맥(寸尺脈)이 미완(微緩)하면 귓음경(厥陰經)에 병이 든 것이다. 그 증세는 소복(小腹)이 번만(煩滿)하면서 음낭이 쪼그라 들어가는 것이니 마땅히 승기탕(承氣湯)으로 설사를 시키는 것이다.

[6-42] 六七日, 脈至皆大, 煩而口噤, 不能言, 躁擾者, 必欲鮮也.

상한병이 6,7일이 되어 맥이 크게 뛰고 번민(煩悶)하면서 입이 굳어져서 말은 못 하는데 떠들고 소란을 피우는 자는 병이 반드시 풀리고자 하는 것이다.

[6-43] 朱肱, 活人書曰, 厥者, 手足逆冷, 是也. 手足指頭微寒者, 謂之清, 此疾爲輕. 陰厥者, 初得病, 便四肢厥冷, 脈沉微而不數, 足多攣.

주공(朱肱)의 《활인서(活人書)》에 말하기를 귓(厥)은 수족이 역랭(逆冷)하는 것이다. 수족지두(手足指頭)가 약간 찬 것을 청(淸)이라 하는데 이 병은 경증(輕證)이고 음귓증(陰厥證)은 병을 처음 얻을 때부터 오로지 사지가 귓랭(厥冷)하고 맥은 침(沈)하고 미약(微弱)하며 또 빠르지 않다. 흔히 다리에 경련을 일으키는 예가 많다.

[6-44] 傷寒六七日, 煩滿, 囊縮, 尺寸俱微緩者, 足厥陰經受病也. 其脈微浮爲欲愈, 不浮爲難愈. 脈浮緩者, 必囊不縮, 外證, 必發熱惡寒, 爲欲愈, 宜桂麻各半湯. 若尺寸, 俱沉短者, 必囊縮, 毒氣入腹, 宜承氣湯下之, 速用承氣湯, 可保五生一死. 六七日, 脈微浮者, 否極泰來, 水升火降, 寒熱作, 而大汗鮮矣.

상한병이 6,7일에 번만낭축(煩滿囊縮)하고 촌척맥(寸尺脈)이 모두 미완(微緩)한 것은 족귓음경(足厥陰經)에 병을 받은 것이다. 그 맥이 약간 부(浮)하면 병이 낫고자 하는 것이고 부맥(浮脈)이 없으면 난치(難治)인 것이다. 맥이 부완(浮緩)하면 반드시 낭축(囊縮)하지 않고 외증(外證)에 오한·발열이 있으면 병이 낫고자 하는 것이다. 마땅히 계마각반탕(桂麻各半湯)을 쓴다. 만일 촌척맥이 모두 침단(沉短)하면 반드시 낭축(囊縮)하는 것이고 독기(毒氣)가 복중(腹中)으로 들어가는 것이니 마땅히 승기탕(承氣湯)을 써서 설사를 시켜야 한다. 승기탕을 빨리 서둘러서 쓰면 5명은 살고 1명 정도 죽는 것을 보장할 수 있는 것이다. 상한병이 6,7일에 맥이 약간이라도 부맥(浮脈)이 있는 자는 꼭 막혔다가 극에 이르면 태평해지는 것처럼 수기(水氣)는 상승하고 화기(火氣)는 하강하여 한열이 생기면서 땀을 흘린 후 병이 풀리는 것이다.

[6-45] 諸手足厥冷, 皆屬厥陰, 不可汗下. 然, 有須汗須下者, 謂手足雖逆冷時有溫時, 手足掌心, 必煖, 非正厥逆, 當消息之.

모든 수족역랭은 다 귓음경(厥陰經)에 속하는 것이니 땀을 내거나 설사를 시켜서는 안 된다. 그러나 잠깐 땀을 내거나 설사를 시켜야 할 자가 있으니 비록 수족이 역랭하다 할지라도 때로 따뜻한 때도 있어서 손바닥과 발바닥이 따뜻한 것이니 그것은 완전한 귓역(厥逆)이 아니다. 마땅히 짐작하여 볼 것이다.

[6-46] 李梴曰, 舌卷厥逆, 冷過肘膝, 小腹絞痛, 三味蓼莢湯・四順湯主之. 囊縮, 手足乍冷乍溫, 煩滿者, 大承氣湯主之.

이천(李梴)이 말하기를 허가 말리고 사지가 꺾역(厥逆)하여 한랭(寒冷)한 기가 팔꿈치와 무릎을 지나며 아랫배가 급하게 잡아 트는 것과 같이 아프면 삼미삼유탕(三味蓼莢湯)·사순탕(四順湯)을 주로 쓰고, 수족이 잠깐 차졌다 잠깐 더워졌다 하면서 속에는 번열(煩熱)이 꼭 차서 번민(煩悶)하는 자에게는 대승기탕(大承氣湯)을 주로 쓴다.

[6-47] 論曰, 張仲景所論厥陰病, 初無腹痛・下利等證, 而六七日猝然, 而厥, 手足遂冷, 則此非陰證之類也. 乃少陰人, 太陽傷風, 惡寒發熱, 汗自出之證, 正邪相持日久, 當解不解, 而變爲此證也. 此證, 當謂之太陽病, 厥陰證也. 此證, 不必用當歸四逆湯・桂麻各半湯, 而當用蓼莢湯・人蓼吳茱萸湯・獨蓼八物湯. 不當用大承氣湯, 而當用巴豆.

나는 논하기를 장중경(張仲景)이 말한 꺾음병(厥陰病)은 처음에는 복통・설사 같은 증상이 없다가 6,7일이 되면 갑작스럽게 꺾증(厥證)을 일으키고 손발이 꺾랭(厥冷)해진다면 이는 음증(陰證)의 종류가 아니고 곧 소음인의 태양상풍증(太陽傷風證)에 오한・발열하며 땀이 저절로 나는 증이니 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 여러 날을 서로 대치함으로써 마땅히 풀릴 것이 풀리지 못하고 변하여 이와 같은 증이 된 것이다. 이 병증은 태양병꺾음증(太陽病厥陰證)이라 말하는 것이 마땅하다. 이와 같은 증에는 당귀사역탕(當歸四逆湯)・계마각반탕(桂麻各半湯) 등의 약은 필요가 없는 것이고 마땅히 삼유탕(三莢湯)・인삼오수유탕(人蓼吳茱萸湯)・독삼팔물탕(獨蓼八物湯)의 처방을 써야 한다. 그리고 대승기탕(大承氣湯)을 써서는 안 되고 마땅히 파두(巴豆)를 써야 한다.

[6-48] 凡少陰人, 外感病六七日, 不得汗解, 而死者, 皆死於厥陰也. 四五日, 觀其病勢, 用黃芪桂枝湯・八物君子湯, 三四五貼豫防, 可也.

무릇 소음인의 외감병(外感病)에 6,7일이 되어 땀을 내지 못하고 죽는 것은 다 꺾음에 가서 죽는 것이니 4,5일에 그 병세를 자세히 관찰하고 황기계지탕(黃芪桂枝湯)・팔물군자탕(八物君子湯)을 3,4,5첩을 써서 미리 예방하여 주면 되는 것이다.

[6-49] 朱肱曰, 厥陰病, 消渴, 氣上衝心, 心中疼熱, 飢不欲食, 食則吐蛔.

주굉(朱肱)이 말하기를 꺾음병 소갈(消渴)은 기운이 위로 심장(心臟)까지 치받쳐서 심중(心中)이 뜨겁고 아프며 배가 고파도 먹지 않으며 만일 먹으면 회충을 토한다.

[6-50] 龔信曰, 傷寒, 有吐蛔者, 雖有大熱, 忌下, 涼藥犯之必死. 盖, 胃中有寒, 則蛔不安所, 而上膈, 大衄之兆也, 急用理中湯.

공신(龔信)이 말하기를 상한병에 회충을 토하는 증은 비록 대열(大熱)이 있어도 찬 약으로 설사시켜서는 안 된다. 만일 이것을 어기면 반드시 죽는다. 대개 위중(胃中)에 냉한기(冷寒氣)가 있으면 회충이 있을 바를 찾지 못하여 흥격으로 올라가는 것이니 대단히 흉한 징조이다. 급히 이중탕(理中湯)을 써야 한다.

[6-51] 論曰, 此證, 當用理中湯, 日三四服, 又連日服, 或理中湯加陳皮・官桂・白何烏.

나는 논하기를 이러한 토회증(吐蛔證)에는 반드시 이중탕(理中湯)을 1일에 3,4첩을 써야 하고 매일 복용시켜야 한다. 또는 이중탕에 진피(陳皮)・관계(官桂)・백하수오(白何首烏)를 가하여 쓰면 더욱 좋다.

[6-52] 重病危證, 藥不三四服, 則藥力不壯也, 又不連日服, 則病加於少愈也, 或病愈, 而不決也. 連日服者, 或日再服, 或日一服, 或日三服, 或二三日連日服, 或五六日連日服, 或數十日連日服, 觀其病勢, 圖之.

중병(重病)과 위증(危證)에는 약을 하루에 3,4첩씩 쓰지 않으면 약력(藥力)이 충분치 못하고, 또 약을 연일 복용하지 않으면 병이 조금 나아다가 더하기도 하고 또는 병이 나아어도 완쾌되지 못하는 것이다. 연일 복용이라 함은 혹은 1일에 2번 또는 1일에 1번 또는 1일에 3번씩, 또는 2,3일간 연복(連服)하고 또는 5,6일간 연복하고 또는 수십 일간 계속하여 복용하는 것이다. 그 병의 병세를 잘 헤아려서 다스려야 한다.

少陰人 胃受寒裏寒病論(67條)

소음인 위수한리한병론(67조)

[7-1] 張仲景曰, 太陰之證, 腹滿而吐, 食不下, 自利益甚, 時腹自痛.

장중경(張仲景)이 말하기를 태음증(太陰證)은 배가 더부룩하면서 토하고 먹은 것이 소화가 되지 않고 설사가 더욱 심하며 복통이 때때로 일어난다.

[7-2] 腹滿時痛, 吐利不渴者, 爲太陰, 宜四逆湯・理中湯. 腹滿不減, 減不足言, 宜大承氣湯.

복만(腹滿)하고 때때로 아프면서 토하고 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음증(太陰證)이 된 것이다. 사역탕(四逆湯)・이중탕(理中湯)을 쓰고 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 덜하다고 할 수 없는 것은 대승기탕(大承氣湯)을 쓴다.

[7-3] 傷寒, 自利不渴者, 屬太陰, 以其藏有寒, 故也, 當溫之, 宜用四逆湯.

상한에 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음증에 속한다. 그것은 장(臟)에 한기(寒氣)가 있기 때문이니 마땅히 속을 따뜻하게 해 주어야 할 것이니 사역탕(四逆湯)을 써야 한다.

[7-4] 太陰證, 腹痛自利不渴, 宜理中湯・理中丸・四順理中湯丸, 亦主之.

태음증은 복통・설사를 하면서도 갈증이 없는 것이다. 마땅히 이중탕(理中湯)・이중환(理中丸)을 쓰고 사순이중탕(四順理中湯)과 환(丸)도 주로 쓴다.

[7-5] 論曰, 右證, 當用理中湯・四順理中湯・四逆湯, 而古方草朮, 藥力不具備, 此證, 當用白何烏理中湯・白何烏付子理中湯. 腹滿不減, 減不足言者, 有痼冷積滯也, 當用巴豆, 而不當用大承氣湯.

나는 논하기를 이러한 증에 마땅히 이중탕・사순이중탕・사역탕을 써야 한다고 했지만, 고방(古方)이 초창기의 처방이기에 약력(藥力)이 갖추어지지 못하므로 이러한 증에는 마땅히 백하오이중탕(白何烏理中湯)・백하오부자이중탕(白何烏付子理中湯)을 써야 한다. 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 뱃속이 답답하다고 말하는 자는 고랭적체(痼冷積滯)가 되어 있는 것이니 마땅히 파두(巴豆)를 써야 하며 대승기탕(大承氣湯)을 써서는 안 된다.

[7-6] 張仲景曰, 病發於陰, 而反下之, 因作痞, 傷寒, 嘔而發熱者, 若心下滿而不痛, 此爲痞, 半夏瀉心湯主之. 胃虛氣逆者, 亦主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 병이 음증(陰證)으로 발(發)한 것을 도리어 설사를 시키면 이로 인하여 비증(痞症)을 일으킨다. 상한에 발열하고 구역(嘔逆)하면서 가슴이 팍 막혀 답답해하면서도 통증이 없다면 이는 비증이 된 것이다. 주로 반하사심탕(半夏瀉心湯)을 쓰고 또 위(胃)가 허(虛)하여 기역(氣逆)하는 데도 또한 반하사심탕을 주로 쓴다.

[7-7] 下後, 下利日數十行, 穀不化, 腹雷鳴, 心下痞硬, 乾嘔心煩, 此乃結熱, 乃胃中虛, 客氣上逆, 故也, 甘草瀉心湯主之.

설사를 시킨 후에 설사를 하루에 수십 번씩 하는데 곡물(穀物)이 소화되지 않은 그대로 배설되며 배에서는 천둥소리가 울리며 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 마른 구역질을 하면서 가슴이 답답한 것은 열이 맺힌 것이다. 곧 위중(胃中)이 허(虛)하여 객기(客氣)가 거슬러 올라오기 때문이다. 감초사심탕(甘草瀉心湯)을 주로 쓴다.

[7-8] 太陰證, 下利清穀, 若發汗則必脹滿, 發汗後, 腹脹滿, 宜用厚朴半夏湯.

태음증(太陰證)에 음식물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 증에 만일 발한(發汗)을 시키면 반드시 배가 창만(脹滿)해진다. 발한 후에 배가 창만해진 데는 마땅히 후박반하탕(厚朴半夏湯)을 써야 한다.

[7-9] 汗解後, 胃不和, 心下痞硬, 脇下有水氣, 腹中雷鳴, 下利者, 生薑瀉心湯主之.

땀을 내고 난 후에 위(胃)가 편안하지 못하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 옆구리에 수기(水氣)가 있고 배에서 천둥소리가 나며 설사를 하는 증에는 생강사심탕(生薑瀉心湯)을 주로 쓴다.

[7-10] 傷寒, 下利, 心下痞硬, 服瀉心湯後, 以他藥下之, 利不止, 與理中湯, 利益甚, 赤石脂禹餘糧湯主之.

상한에 하리(下利)를 하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하게 뭉치는 병증에 사심탕(瀉心湯)을 복용시키고 후에 다른 약방(藥方)으로 설사시켰더니 설사가 그치지 않으므로 이내 이중탕(理中湯)을 썼으나 설사가 더욱 심하다. 이렇게 될 때에는 적석지우여량탕(赤石脂禹餘糧湯)을 주로 써야 한다.

[7-11] 論曰, 病發於陰, 而反下之云者, 病發於胃弱, 當用藿香正氣散, 而反用大黃下之之謂也. 麻黃・大黃, 自是太陰人藥, 非少陰人藥, 則少陰人病, 無論表裏, 麻黃・大黃, 汗下, 元非可論. 少陰人病, 下利清穀者, 積滯自解也. 太陰證, 下利清穀者, 當用, 藿香正氣散・香砂養胃湯・薑朮寬中湯, 溫胃, 而降陰. 少陰證, 下利清穀者, 當用, 官桂付子理中湯, 健脾, 而降陰.

나는 논하기를 병이 음증(陰證)에서 발생한 것을 도리어 하리(下利)시켰다고 말한 것은 곧 위가 약하여 병이 생긴 것이다. 마땅히 곽향정기산(藿香正氣散)을 써야 할 것인데 도리어 대황(大黃)으로 하리를 시켰다는 것을 말하는 것이다. 마황(麻黃)과 대황(大黃)은 본시 태음인의 약이고 소음인의 약이 아니다. 소음인의 병에는 표증・이증을 막론하고 마황・대황으로 땀을 내거나 하리를 시킨다는 것은 원래 말할 필요가 없는 것이다. 소음인 병에 곡물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 것은 적체(積滯)가 스스로 풀리는 것이다. 태음증(太陰證)에 음식이 삭지 않은 것을 사(瀉)하면 곽향정기산(藿香正氣散)・향사양위탕(香砂養胃湯) 또는 강출관중탕(薑朮寬中湯) 같은 것을 써서 위를 덥히고 음기를 내리게(溫胃降陰) 해야 하고 소음증(少陰證)에 음식이 삭지 않은 것을 사(瀉)하면 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)으로 건비강음(健脾降陰)해야 할 것이다.

[7-12] 藿香正氣散・香砂六君子湯・寬中湯・蘇合元, 皆張仲景瀉心湯之變劑也. 此所謂靑於藍者, 出於藍, 噫, 靑雖自靑, 若非其藍, 靑何得靑.

곽향정기산(藿香正氣散)・향사육군자탕(香砂六君子湯)・관중탕(寬中湯)・소합원(蘇合元)은 모두 장중경 사심탕(瀉心湯)의 변제(變劑)이니 이것이 이른바 청출어람이다. 청(靑)이 비록 푸르나 그 남초(藍草)가 아니었으면 어찌 푸른 것을 얻었겠는가?

[7-13] 張仲景曰, 傷寒陰毒之病, 面靑, 身痛如被杖, 五日可治, 七日不治.

장중경(張仲景)이 말하기를 상한 음독병(陰毒病)은 얼굴빛이 푸르고 온몸이 뭉뚱이로 얻어맞은 것처럼 쭈시며 아프다. 이러한 병증은 5일이 된 것은 치료할 수 있지만 7일이 된 것은 치료할 수 없다.

[7-14] 李梴曰, 三陰病深, 必變爲陰毒, 其證, 四肢厥冷, 吐利不渴, 靜謐, 而臥, 甚, 則咽痛鄭聲, 加以頭痛頭汗, 眼睛內痛, 不欲見光, 面脣指甲靑黑, 身如被杖, 又此證, 面靑白黑, 四肢厥冷多睡.

이천(李梴)이 말하기를 삼음병(三陰病)이 심해지면 반드시 음독(陰毒)으로 변하게 된다. 그 증상은 수족이 꺾랭(厥冷)하며 토하고 설사를 하여도 갈증이 나지 않고 몸을 구부리고 조용히 누워서 잠자기를 좋아하고 극히 심하면 인통(咽痛)이 있으며 헛소리를 하고 여기에 두통과 머리에서 땀이 흐르는 증을 일으키며 눈동자가 아파서 햇빛을 싫어하며 얼굴・입술・손톱이 푸르고 검으며 몸에는 뭉뚱이로 얻어맞은 것처럼 되어 있다. 또 이 증세에는 면색(面色)이 청백흑(靑白黑)하며 사지가 꺾랭하고 잠을 많이 자는 것이 특징이다.

[7-15] 論曰, 右證, 當用人蔘桂皮湯・人蔘付子理中湯.

위의 증세에는 마땅히 인삼계피탕(人蔘桂皮湯)・인삼부자이중탕(人蔘附子理中湯)을 써야 한다.

[7-16] 張仲景曰, 傷寒直中陰經, 初來無頭痛, 無身熱, 無渴, 怕寒踡臥, 沉重欲眠, 脣靑厥冷, 脈微而欲

絶, 或脈伏, 宜四逆湯. 四逆者, 四肢逆冷也.

장중경(張仲景)이 말하기를 상한병에 음경(陰經)을 직중(直中)한 것은 처음부터 두통·신열·갈증과 같은 증세는 없고 추워하며 구부리고 누워서 침중(沈重)한 모양으로 거들 잠에 빠지고자 하며 입술이 파랗고 사지가 차가워지며 맥이 가늘어서 끊어지려고 하고 혹 맥이 숨어서 나타나지 않는다. 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야한다. 사역(四逆)이란 것은 사지가 차갑다는 것이다.

[7-17] 論曰, 嘗治, 少陰人, 直中陰經, 乾霍亂關格之病, 時屬中伏節候, 少陰人, 一人, 面部氣色, 或青或白, 如彈丸圈, 四五點成團, 起居如常, 而坐於房室中倚壁, 一身委靡無力, 而但欲寐, 問其這間原委, 則曰, 數日前, 下利清水一二行, 仍爲便閉, 至今爲兩晝夜, 別無他, 故云問所飲食, 則曰, 食麥飯云. 急用巴豆如意丹, 一半時刻, 其汗, 自人中穴出, 而達于面上, 下利一二度, 時當日暮. 觀其下利, 則青水中, 雜穢物, 而出, 終夜下利十餘行, 翌日, 平明至日暮, 又十餘行下利, 而清穀麥粒, 皆如黃豆大, 其病, 爲食滯, 故連三日, 絶不穀食, 日所食, 但進好熟冷, 一二碗, 至第三日平明, 病人面色, 則無不顯明, 而一身皆冷, 頭頸墜下, 去地二三寸, 而不能仰舉, 病證更重, 計出無聊, 仔細點檢, 病人一身, 則手足膀胱腰腹, 皆如冰冷, 臍下全腹, 堅硬如石, 而胃腹上中元, 熱氣熏騰, 炙手可熱, 最爲可觀, 至第五日平朝, 一發吐清沫, 而清沫中, 雜米穀一朶而出, 自此, 病勢大減, 因進米飲聯服數碗, 其翌日, 因爲粥食, 此病, 在窮村, 故未暇溫胃和鮮之藥. 其後, 又有少陰人, 一人, 日下利數次, 而仍下清水, 全腹浮腫, 初用桂附霍陳理中湯, 倍加人蔘·官桂 各二錢, 付子二錢 或一錢, 日四服, 數日後, 則日三服, 至十餘日, 遂下利清穀, 連三日三四十行, 而浮腫, 大減. 又少陰人, 小兒一人, 下利青水, 面色青黯, 氣陷如睡, 用獨蔘湯, 加生薑二錢·陳皮·砂仁各一錢, 日三四服, 數日後, 下利十餘行, 大汗解. 盖, 少陰人, 霍亂關格病, 得人中汗者, 始免危也, 食滯大下者, 次免危也, 自然能吐者, 快免危也. 禁進粥食, 但進好熟冷, 或米飲者, 扶正抑邪之良方也. 宿滯之彌留者, 得好熟冷, 乘熱溫進, 則消化, 無異於飲食, 雖絶食, 二三四日, 不必爲慮.

나는 논하기를 일찍이 소음인이 직중음경(直中陰經)하여 건곽란(乾霍亂)과 관격병(關格病)이 된 것을 치험한 것인데 때는 중복절후(中伏節候)였다. 소음인 한 사람이 얼굴의 기색(氣色)이 흑청흑백(或靑或白)한데 마치 탄환 크기의 반점이 4,5개씩 둥글게 이루어져 있고, 기거(起居)는 평시와 같으나 실내의 벽에 기대어 앉아 온몸에 힘이 없고 늘어지면서 잠만 자려고 하였다. 그 동안의 원인을 물어본즉 대답하기를 며칠 전에 하리청수(下利清水) 1,2회 하고 이내 변폐(便閉)가 되어서 지금까지 2주야(晝夜)가 되었고 그 밖에 다른 이상은 없었다고 한다. 또 음식은 무엇을 먹었는가 물으니 보리밥을 먹었다고 한다. 급히 파두여의단(巴豆如意丹)을 썼더니 한 시간쯤 지나서 땀이 인중혈(人中穴)에서 나와 얼굴에 퍼졌고 설사를 한두 번 하였다. 때는 해가 저물 때였다. 그 설사한 것을 자세히 살펴보니 묽은 물에 찌꺼기가 섞여 나오더니 그날 밤 밤새도록 설사를 10여 번 하고 또 다음날 새벽부터 해가 저물 때까지 설사를 10여 번 하는데 보리알이 마치 콩알만 하게 붙어 있었다. 그 병이 식체(食滯)로 된 것이기 때문에 계속하여 3일 동안 음식을 먹지 못하게 하고 매일 먹는 것이라고는 다만 좋은 숯을 한두 사발 먹게 하였더니 3일째 되던 날 새벽에 이르러서는 환자의 얼굴빛이 밝게 되었으나 몸 전체가 얼음같이 차고 머리와 목을 땅에서 2,3촌까지밖에 들지 못하였다. 병증이 더욱 위중하게 되었으니 어찌할 바를 모르다가 병자의 온몸을 자세히 점검해 보니 수족과 방광부(膀胱部)와 요복(腰腹)이 모두 얼음같이 차고 배꼽 아래 전체가 돌같이 딱딱한데 흉부와 복부 상중완(上中脘)에는 열기가 찌는듯하여 손이 구워질 정도로 뜨거운 것이니 아주 가관이였다. 5일째 새벽에 이르러 한 번 토하더니 맑은 거품이 나왔다. 그 맑은 거품 가운데에 잡미곡(雜米穀)이 한웅큼이나 섞여 나오더니 이때부터 병세가 대감(大減)하여 미음을 몇 사발 연이어 먹고 그 이튿날에는 죽을 먹게 되었다. 이 병자는 빈궁한 촌에 살고 있었기 때문에 온위(溫胃)하는 약과 화해(和解)하는 약을 쓸 사이가 없었던 것이다. 그 후에 또 소음인 한 사람이 하루에 몇 차례 설사를 하는데 맑은 물만 설사하고 온 배에 부종(浮腫)이 생겼다. 처음에는 계부곽진이중탕(桂附霍陳理中湯)을 쓰되 거기에 더하여 인삼(人蔘)·관계(官桂) 각 2돈 하고 부자(附子) 2돈 혹 1돈 하여 1일 4복 하고 수일 후에는 1일 3복하여 10여 일에 이르러서 마침내 청곡설사(淸穀泄瀉)를 연이어 3일간을 하는데 3일에 30-40차쯤 하고서 부종이 크게 줄었다. 또 소음인 소아가 물 설사를 하고 면색이 검고 푸르며 기운이 빠져서 졸고 있는 것이다. 독삼탕(獨蔘湯)을 쓰되 생강(生薑) 2돈, 진피(陳皮)·사인(砂仁) 각 1돈을 가하여 1일에 3,4복 하였더니 수일 후에 설사를 10여 번하고 크게 땀을 흘리고 병이 풀린 것이

다. 대체로 소음인은 객란(穢亂)・관격병(關格病)에 인중에서 땀이 나면 비로소 위험을 면하게 된 것이고, 식체(食滯)가 뭉려서 크게 설사를 하면 다음으로 위험을 면한 것이고, 저절로 토하는 것은 꽤히 위험을 면하게 되는 것이다. 소음인의 병증이 위와 같을 때에는 밥이나 죽을 가까이하는 것을 금하고 다만 좋은 송농이나 미음을 먹게 하는 것이 정기(正氣)를 붙들어 주고 사기(邪氣)를 억누르는 좋은 방법이 된다. 체증(滯症)이 오래되어서 병이 위중할 때에는 좋은 송농을 따뜻하게 하여 마시게 하면 소화가 잘되고 영양이 되기 때문에 다른 음식을 먹는 것과 다르지 아니하니 비록 절식을 2,3,4일쯤 할지라도 걱정할 필요가 없는 것이다.

[7-18] 張仲景曰, 少陰病, 脈微細, 但欲寐.

장중경(張仲景)이 말하기를 소음병(少陰病)은 맥이 미세(微細)하고 다만 잠만 자려고 하는 것이다.

[7-19] 傷寒, 欲吐不吐, 心煩, 但欲寐, 五六日, 自利, 而渴者, 屬少陰, 小便色白, 宜四逆湯.

상한에 토하고자 하여도 토하지 못하고 가슴이 답답하면서 잠만 자려 하다가 5,6일에 이르러 설사를 하면서 갈증이 있으면 소음에 속하니 소변 색이 흰 것은 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 한다.

[7-20] 少陰病, 身體痛, 手足寒, 骨節痛, 脈沉者, 付子湯主之.

소음병에 전신이 아프면서 수족(手足)이 한랭(寒冷)하고 골절(骨節)이 쑤시고 맥이 침(沈)하면 부자탕(附子湯)을 써야 한다.

[7-21] 下利腹脹滿, 身體疼痛, 先溫其裡, 乃攻其表, 溫裡, 宜四逆湯, 攻表, 宜桂枝湯.

설사를 하고 복창만(腹脹滿)하면서 신체가 쑤시고 아프다고 하면 그 속(裏)을 먼저 따뜻하게 하고서야 그 겉(表)을 다스려야 한다. 온리(溫裏)를 하려면 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 하고 겉을 다스리려면 마땅히 계지탕(桂枝湯)을 써야 한다.

[7-22] 論曰, 右證, 當用官桂付子理中湯.

나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다.

[7-23] 張仲景曰, 少陰病, 始得之, 反發熱, 脈沉者, 麻黃付子細辛湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 소음병이 처음 시작할 때 도리어 열이 나고 맥이 침(沈)한 것은 마황부자세신탕(麻黃附子細辛湯)을 주로 쓴다.

[7-24] 少陰病, 一二日, 口中和, 背惡寒, 宜付子湯.

소음병 1,2일에 입안이 부드럽고 등이 오싹오싹하면 마땅히 부자탕(附子湯)을 써야 한다.

[7-25] 少陰病, 二三日, 用麻黃付子甘草湯, 微發之, 以二三日, 無證, 故微發汗也, 無證, 謂無吐利厥證也.

소음병이 2,3일이 될 때에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)을 써서 약간 땀을 내게 한다. 2,3일이 되었어도 증상이 없기 때문에 약간 발한(發汗)을 시키는 것이다. 증상이 없다 함은 토하거나 설사를 하거나 수족이 꺾랭(厥冷)하는 증세가 없다는 것이다.

[7-26] 下利, 脈沉, 而遲, 其人, 面小赤, 身有微汗, 下利清穀, 必鬱冒汗出, 而鮮, 病人, 必微厥, 所以然者, 其面戴陽, 下虛, 故也.

설사를 하고 맥이 침지(沈遲)하며 그 사람의 얼굴이 약간 붉으면서 몸에서 땀이 약간 나고 청곡(淸穀)을 설사하면 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 풀리나 환자가 반드시 약간 꺾랭하였을 것이니 그 이유는 얼굴에 양(陽)이 떠 있고 하초(下焦)는 허(虛)해졌기 때문인 것이다.

[7-27] 少陰病, 脈細沉數, 病爲在裡, 不可發汗, 少陰病, 但厥無汗, 而強發之, 必動其血, 或從口鼻, 或從目出, 是爲下厥上竭, 難治.

소음병에 맥이 세침삭(細沉數)하면 병이 속(裏)에 있는 것이니 발한(發汗)을 시켜서는 안 된다. 소음병에 다만 궤랭(厥冷)만 있고 땀이 없는 증상을 강제로 발한을 시키면 그 피가 동(動)하여서 입·코 또는 눈에서 출혈한다. 이렇게 되는 것은 하초(下焦)는 궤랭(厥冷)해지고 상초(上焦)는 피가 고갈된 것이니 난치인 것이다.

[7-28] 論曰, 張仲景所論, 太陰病, 少陰病, 俱是少陰人, 胃氣虛弱泄瀉之證, 而太陰病泄瀉, 重證中平證也, 少陰病泄瀉, 危證中險證也. 人, 但見泄瀉, 同是一證, 而易於尋常做圖, 少陰病泄瀉, 尋常做圖, 則必不免死. 蓋太陰病泄瀉, 大腸之泄瀉也, 少陰病泄瀉, 胃中之泄瀉也. 太陰病泄瀉, 溫氣逐冷氣之泄瀉也, 少陰病泄瀉, 冷氣逼溫氣之泄瀉也.

나는 논하기를 장중경(張仲景)이 논한 바의 태음병과 소음병은 모두 소음인의 위기(胃氣)가 허약하여 설사하는 증세이다. 태음병의 설사는 중증(重證) 중에서도 평증(平證)이지만 소음병의 설사는 위증(危證) 중에서도 험증(險證)인 것이다. 사람들이 다만 설사만을 보고서 동일한 것으로 여겨 대수롭지 않게 취급한다. 소음병의 설사를 대수롭지 않게 취급한다면 반드시 죽음을 면치 못할 것이다. 태음병 설사는 대장(大腸)의 설사이고 소음병 설사는 위중(胃中)의 설사이다. 태음병 설사는 온기(溫氣)가 냉기(冷氣)를 쫓아내는 설사이고, 소음병 설사는 냉기가 온기를 핍박하는 설사인 것이다.

[7-29] 少陰病, 欲自愈則面小赤, 身有微汗, 必鬱冒汗出而鮮, 故古人, 有見於此, 少陰病, 但厥無汗者, 亦以麻黃, 強發汗, 欲其自愈, 而反動其血, 從口鼻出, 故於是乎, 始爲戒懼, 凡少陰病, 不敢輕易用麻黃, 而少陰病, 始得之, 一二日, 二三日, 初證, 以麻黃付子甘草湯, 微發之也. 然, 麻黃, 爲少陰病害藥, 則雖二三日, 初證, 必不可用麻黃發之也. 此證, 當用官桂付子理中湯, 或以桂枝, 易官桂.

소음병이 저절로 낫고자 하면 얼굴빛이 조금 붉어지고 몸에는 약간 땀이 있고 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 병이 풀린다. 그러므로 옛 사람들이 이것을 보고 소음병에 다만 궤증(厥證)만 있고 땀이 나지 않는 경우에도 마황(麻黃)을 써서 억지로 발한을 시켜 병이 저절로 낫게 하려다 도리어 그 혈(血)을 동하게 하여 입과 코로부터 출혈을 하는 까닭에 이제서야 비로소 삼가고 두려워한 것이다. 모든 소음병에 마황을 감히 손쉽게 써서는 안 된다. 소음병이 시작된 지 1,2일이 되었거나 2,3일이 된 초증에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)으로 약간 땀을 내게 하였으나 그러나 마황은 본디 소음병에 해로운 약인즉 비록 2,3일이 되는 초증이라도 마황을 써서 발한을 시키면 안 되는 것이다. 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다. 혹 관계(官桂)·계지(桂枝)로 대신 바꾸기도 한다.

[7-30] 少陰病, 初證, 因爲險證, 繼而爲危證, 此病, 初證, 早不辨證而措置, 則危境也. 凡腹痛自利, 無口渴, 口中和者, 爲太陰病, 腹痛自利, 而有口渴, 口中不和者, 爲少陰病. 少陰病, 有身體痛骨節痛表證, 此, 則表裡俱病, 而大腸寒氣, 必勝胃中溫氣, 而上升也. 太陰病, 無身體痛骨節痛表證, 此則裡病, 表不病, 而胃中溫氣, 猶勝大腸寒氣, 而下降也.

소음병은 초기 증상에 이어 험증(險證)이 되고 이어서 위증(危證)이 되는 것이니 이 병은 초증에 일찍 병증을 잘 관찰하여 조치하지 않으면 나중에 위험한 처지에 빠지는 것이다. 복통이 있으면서 하리를 하며 구갈(口渴)이 없고 구중(口中)이 부드러우면 태음병이고 복통·자리(自利)하면서 구갈이 있고 구중이 갈갈하면 소음병이다. 소음병에 신체와 골절이 아픈 표증(表證)이 있는 것은, 즉 표리(表裏)가 다 병이 된 것으로써 대장한기(大腸寒氣)가 반드시 위중(胃中)의 온기(溫氣)를 이기고 위로 올라가는 것이다. 태음병에는 신체통과 골절통과 같은 표증이 없는데 이것은 속이 병든 것이고 겉은 병든 것이 아니니 위중의 온기가 오히려 대장의 한기를 이기고서 내려가는 것이다.

[7-31] 張仲景曰, 少陰病, 自利純青水, 心下痛, 口燥乾者, 宜大承氣湯.

장중경(張仲景)이 말하기를 소음병에 순전히 푸른빛 물설사를 하고 명치 밑이 아프며 입 안이 바짝 마르는 자에게는 마땅히 대승기탕(大承氣湯)을 쓴다

[7-32] 朱肱曰, 少陰病, 口燥咽乾, 而渴, 宜急下之, 非若陽明宜下而可緩也.

주광(朱肱)이 말하기를 소음병에 입과 목 안이 마르고 갈증이 있으면 급히 설사를 시켜야 하니 양

명병에 천천히 설사시켜도 괜찮은 것과는 다르다.

[7-33] 李杲, 東垣書曰, 少陰證, 口中辨, 口中和者, 當溫, 口中乾燥者, 當下. 少陰證, 下利辨, 色不青者, 當溫, 色青者, 當下.

이고(李杲)가 《동원서(東垣書)》에 말하기를 소음증은 구중(口中)을 보고서 판단해야 할 것이니 입안이 부드러운 자는 마땅히 온약(溫藥)을 써야 하고 입안이 말라서 물기가 없는 자는 마땅히 하리를 시켜야 한다. 또 소음증은 하리를 보고서 판단해야 하는 것이니 대변 색이 푸르지 않으면 마땅히 온(溫)한 약을 써야 하고, 대변이 청색(青色)이면 마땅히 설사를 시켜야 한다.

[7-34] 李挺曰, 舌乾口燥, 或下利清水, 謔語便閉, 宜小承氣湯, 脣青, 四肢厥冷, 指甲青黑, 宜薑附湯. 이천(李挺)이 말하기를 혀가 마르고 입 안에 물기가 없으며 또는 맑은 물 설사를 하다가 변이 막히고 헛소리를 하거든 마땅히 소승기탕(小承氣湯)을 쓰고 입술이 푸르고 사지가 귤랭(厥冷)하면서 손톱이 청흑(靑黑)하면 마땅히 강부탕(薑附湯)을 써야 한다.

[7-35] 論曰, 下利青水者, 欲下之, 則當用巴豆, 欲溫之, 則當用官桂付子理中湯, 下利清水, 仍爲便閉者, 先用巴豆, 後用薑朮寬中湯.

내가 논하기를 푸른 물 설사를 하는 것을 하리시키고자 한다면 마땅히 파두(巴豆)를 써야 하고 따듯하게 하고자 한다면 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다. 또 맑은 물 설사를 하고 이내 대변이 막히면 먼저 파두를 쓰고 후에 강출관중탕(薑朮寬中湯)을 써야 한다.

[7-36] 嘗見, 少陰人, 十歲兒, 思慮耗氣, 每有憂愁, 一二日, 則必腹痛泄瀉, 一二日, 用白何烏理中湯, 二三四貼, 或甚, 則付子理中湯, 一二貼, 則泄瀉必愈矣. 忽一日, 此兒, 心有憂愁, 氣度不平, 數日, 故豫治次, 用白何烏理中湯, 二貼則泄瀉因作, 下利青水, 連用六貼, 青水不止, 急用付子理中湯六貼, 青水變爲黑水, 又二貼, 黑水泄瀉, 亦愈, 又二三貼調理, 以此觀之, 則下利青水者, 病人, 有藹亂關格, 而後, 成此證也, 此證, 當用巴豆, 破積滯痼冷, 自是無疑. 此兒, 十歲, 冬十二月, 有下利青水病, 十一歲, 春二月, 又得△陽病.

내가 일찍이 소음인 10세 아이가 생각이 많아 기운이 소모되어 매번 하루 이틀 근심하는 일이 있으면 반드시 복통을 일으키고 설사를 하는 증을 보았다. 그리하여 하루 이틀쯤 백하오이중탕(白何烏理中湯)을 2,3,4첩을 쓰거나 심할 때에는 부자이중탕(付子理中湯)을 1,2첩을 쓰면 설사가 반드시 나았다. 그러다가 하루는 갑자기 이 아이가 근심 걱정으로 기가 고르지 못하게 된지가 며칠이 지났기 때문에 예방치료로 백하오이중탕(白何烏理中湯)을 몇 첩 썼더니 설사가 나오는데 곧 하리청수(下利清水)를 하는 것이다. 계속하여 6첩을 더 써도 청수가 그치지 않는다. 그리하여 급히 부자이중탕(付子理中湯) 6첩을 쓰니 청수가 변하여 흑수(黑水)가 나오고 또 2첩을 쓰니 흑수설사(黑水泄瀉)가 치유되었다. 또 2,3첩을 써서 조리를 시켰다. 이로써 살펴보면 청수를 설사하는 것은 환자가 곽란·관격(襋亂·關格)된 후에 이런 증세가 일어나는 것이다. 이런 증세에는 마땅히 파두(巴豆)를 써서 고랭적체(固冷積滯)를 뚫어버리는 것이 스스로 옳은 법이기에 의심할 필요가 없다. 이 아이가 10세 12월에 청수하리병을 앓았고 또 11세 되던 해 2월에 망양병(△陽病)을 얻었다.

[7-37] 朱肱曰, 躁無暫定, 而厥者, 爲藏厥.

주굉(朱肱)이 말하기를 조증(躁證)으로 잠시도 가만히 있지 못하고 사지가 귤랭(厥冷)한 것은 장궤(藏厥)이 된 것이다.

[7-38] 李挺曰, 藏厥者, 發躁無休息時, 發熱七八日, 脈微, 膚冷而躁, 或吐或瀉, 無時暫安者, 乃厥陰眞藏氣絕, 故曰藏厥, 仲景無治法, 而四逆湯, 冷飲救之, 又少陰病, 厥而吐利發躁者, 亦不治, 而三味蓼莢湯, 救之.

이천(李挺)이 말하기를 장궤는 조증을 일으켜 잠시라도 멎는 때가 없는 것이니, 발열한지 7,8일에 맥이 미약(微弱)해지고 피부는 차면서 조증이 발작하며, 또는 토하고 또는 설사가 나서 잠시도 안정을 이룰 수가 없는 것은 곧 궤음(厥陰)의 진장(眞藏)의 기운이 끊어진 것이다. 그러므로 장궤(藏厥)

이라 이름 한 것이다. 중경도 치법이 없어서 사역탕(四逆湯)을 차게 마심으로써 구해 보고자 하였다. 소음병에 사지궤랭(四肢厥冷)하고 토하고 설사를 하면서 조바심을 하는 증에도 또한 치법이 없으니 삼미삼유탕(三味蓼莢湯)으로 구해 보라고 하였다.

[7-39] 論曰, 少陰人, 喜好不定, 而計窮力屈, 則心煩躁也. 少陰病傷寒, 欲吐不吐, 心煩, 但欲寐者, 此非計窮力屈者之病乎. 盖喜好者, 所慾也. 何, 故至於計窮力屈, 而得此少陰病乎, 何不早用君子寬平心乎. 然, 初證傷寒, 欲吐不吐, 心煩, 但欲寐者, 早用藥, 則猶可免死也. 其病, 至於躁無暫定, 而厥, 則勢在極危也, 豈不可憐乎. 此證, 當用蓼莢湯・四逆湯・官桂付子理中湯・吳茱萸付子理中湯.

나는 논하기를 소음인이 기빠하고 좋아하는 것이 일정치 않아 계교와 힘이 다하게 되면 가슴이 번조하게 된다. 소음병 상한에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자는 이는 계교가 궁하고 힘에 부쳐서 생긴 병이 아니겠는가? 대개 희호(喜好)라 함은 욕심내는 바이니 어찌하여 계교와 힘이 다한 후에 이르러 이런 소음병을 얻었는가? 어찌하여 일찍부터 군자의 너그럽고 평온한 마음씨를 쓰지 못하였는가? 그러나 상한 초증(初證)에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자에는 일찍부터 약을 쓰면 오히려 죽음을 면할 수 있지만, 그러나 그 병이 조증이 되어 잠시도 안정을 이루지 못하고 수족이 궤랭(厥冷)하기에 이르러선 병세가 극히 위험한 지경에 놓여 있으니 어찌 가련하지 않겠는가? 이 병증에는 마땅히 삼유탕(蓼莢湯)・사역탕(四逆湯)・관계부자이중탕(官桂付子理中湯)・오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 써야 한다.

[7-40] 朱肱曰, 病人, 身冷, 脈沉細, 而疾, 煩躁, 而不飲水者, 陰盛隔陽也, 若飲水者, 非此證也. 厥陰病, 渴欲飲水者, 小小與之, 愈.

주공(朱肱)이 말하기를 환자의 몸이 차고 맥이 침세(沉細)하고 빠르며 번조를 하면서도 물을 마시지 못하는 것은 음(陰)이 성(盛)하여 양(陽)을 막고 있는 증이다. 만일 물을 마시는 자는 이증이 아니다. 궤음병(厥陰病)에는 목이 말라서 물을 마시고자 하는 자에게는 조금씩 먹게 하면 병이 낫는다.

[7-41] 成無己曰, 煩, 謂心中鬱煩也, 躁, 謂氣外熱躁也. 但煩不躁, 及先煩後躁者, 皆可治. 但躁不煩, 及先躁後煩者, 皆不可治. 先躁後煩, 謂怫怫然更作躁悶, 此, 陰盛隔陽也. 雖大躁, 欲於泥水中臥, 但水不得入口是也, 此, 氣欲絕, 而爭, 譬如燈將滅而暴明.

성무기(成無己)가 말하기를 번(煩)은 가슴 속이 답답하고 갑갑한 것을 말하는 것이고 조(躁)는 기운이 밖으로 나와 더워서 손발을 흔드는 것을 말하는 것이다. 번증만 있고 조증은 없는 것과 선번후조(先煩後躁)하는 증은 다 치료할 수 있지만 조증만 있고 번증은 없는 것과 선조후번(先躁後煩)하는 증은 다 치료할 수 없다. 이것은 마치 벌떡 성을 낸 후 다시 답답하여 괴로워하는 심정과 같으니 이는 음성격양(陰盛隔陽)이 된 것이다. 비록 조증이 크게 심하여서 진흙탕 물에라도 들어가 눕고자 하면서도 물을 입으로 넘기지도 못하는 것이 바로 이것이다. 이는 진기가 끊어지려고 하여 투쟁하는 것이니 비유하면 등잔불이 거의 꺼지려고 할 때 별안간 반짝 밝아졌다가 꺼지는 것과 같은 것이다.

[7-42] 李梴曰, 傷寒, 陰盛隔陽, 其證, 身冷反躁, 欲投井中, 脣青面黑, 渴欲飲水復吐, 大便自利黑水, 六脈, 沉細, 而疾, 或無脈, 陰盛隔陽, 大虛證也, 宜霹靂散. 又曰, 厥逆煩躁者, 不治.

이천(李梴)이 말하기를 상한에 음성격양(陰盛隔陽)은 그 증세가 몸은 얼음같이 차가운데 도리어 번조가 심해서 우물에라도 뛰어들려고 하고 입술은 검푸르며 얼굴빛은 검으며 목이 몹시 말라서 물을 마시고는 도로 토하며 설사를 하되 빛이 검다. 육맥(六脈)이 침세(沉細)하면서 빠르며 또는 맥이 없어진다. 이것은 음성격양의 대허증(大虛證)이다. 마땅히 벽력산(霹靂散)을 써야 하고 또 말하기를 궤역하면서 번조하면 불치하는 것이다.

[7-43] 論曰, 此證, 當用官桂付子理中湯・吳茱萸付子理中湯, 或用霹靂散.

나는 논하기를 위의 병증에 관계부자이중탕(官桂附子理中湯)・오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 마땅히 써야 하고 또는 벽력산(霹靂散)을 쓴다.

[7-44] 藏厥與陰盛隔陽病情, 大同小異, 俱在極危, 如存一髮, 措手難及. 若論此病之可治, 上策, 莫如此證未成之前, 早用, 官桂付子理中湯・吳茱萸付子理中湯.

장궤과 음성격양은 병정(病情)이 대동소이하여 모두 지극히 위급한 증세이다. 진기가 마치 머리카락 한 올이 남아 있는 것이라 너무 급하여 손을 댈 틈이 없게 된 것이다. 만일에 이 병을 다스리는 데 제일 좋은 대책을 말한다면 이와 같이 막심한 병증이 생기기 전에 일찍부터 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)・오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 써야 한다.

[7-45] 凡觀少陰人病, 泄瀉初證者, 當觀於心煩與不煩也. 心煩, 則口渴, 而口中不和也. 心不煩, 則口不渴, 而口中和也. 觀少陰人病, 危證者, 當觀於躁之有定無定也. 欲觀躁之有定無定, 則必占, 心之範圍, 有定無定也. 心之範圍, 綽綽者, 心之有定, 而躁之有定也. 心之範圍, 耿耿者, 心之無定, 而躁之無定也. 心雖耿耿忽忽, 猶有一半時刻, 綽綽卓卓, 則其病, 可治, 可治者, 用薑附, 而可效也.

무릇 소음인의 병에 설사를 처음 할 때에 마땅히 잘 살펴보아야 할 것은 심번증이 있나 없나를 꼭 살펴야 하는데 심번증이 있으면 입이 말라서 구중(口中)이 불화(不和)하고 심번증이 없으면 입이 마르지 않고 구중이 부드러운 것이다. 또 소음인병의 위증(危證)에 있어서는 마땅히 조증(躁證)이 안정한가 안정되지 못한가를 잘 살펴야 한다. 조증이 안정한가 안정되지 못한가를 살펴보려면 반드시 마음의 범위가 안정되어 있나 안정하지 못한가를 알아보아야 한다. 마음의 범위가 침착하고 여유가 있는 자는 그 마음도 안정되고 조증도 안정되어 있는 것이고, 마음의 범위가 편안치 못한 자는 그 마음도 안정되지 못하고 조증도 안정되지 못한 것이다. 비록 마음이 편안하지 못하여 깜짝깜짝 놀랄지라도 오히려 그 마음을 잠시 동안 만이라도 침착하고 여유롭게 한다면 그 병을 치료할 수 있는 것이다. 치료 가능한 것은 건강(乾薑)・부자(附子)를 쓰면 효과를 보는 것이다.

[7-46] 凡少陰人泄瀉, 日三度, 重於一二度也, 四五度, 重於二三度也, 而日四度泄瀉, 則太重也. 泄瀉一日, 輕於二日也, 二日, 輕於三四日也, 而連三日泄瀉, 則太重也. 少陰人, 平人, 一月間, 或泄瀉二三次, 則不可謂輕病人也. 一日間, 乾便三四度, 則不可謂輕病人也. 下利清穀者, 雖日數十行, 口中必不燥乾, 而冷氣外鮮也. 下利清水者, 腹中, 必有青水也, 若下利黃水, 則非清水, 而又必雜穢物也.

무릇 소음인이 설사하는 데 1일에 3회 한다면 1,2회보다는 중하고 1일에 4,5회 한다면 2,3회보다 중하다. 설사를 1일 4회 한다면 매우 중한 것이다. 설사를 하루 하는 것은 2일 하는 것보다 경(輕)하고 2일간 하는 것은 3,4일간보다는 경하다. 설사를 3일간 계속하는 것은 태중(太重)한 것이다. 소음인으로서 보통 건강한 사람이 1개월간에 설사를 2,3차 한다면 경증 환자라 볼 수 없고 또 하루에 굳은 대변이라도 3,4회 본다면 경증 환자라 볼 수 없다. 청곡(淸穀) 설사를 하는 것은 비록 1일에 수십 번을 하더라도 반드시 구중이 건조하지 않고 냉기가 밖으로 풀리는 것이다. 청수(淸水) 설사하는 것은 복중에 반드시 청수가 있는 것이고, 황수(黃水) 설사를 한다면 이것은 청수가 아니고 반드시 찌꺼기가 섞여 있는 것이다.

[7-47] 張仲景曰, 傷寒七八日, 身黃如梔子色, 小便不利, 腹微滿, 屬太陰, 宜茵陳蒿湯, 傷寒, 但頭汗出, 餘無汗, 劑頸而還, 小便不利, 身必發黃.

장중경(張仲景)이 말하기를 상한 7,8일에 몸이 치자색 같이 노랗고 소변이 나오지 않으며 복부가 약간 부르면 태음증에 속하는 것이니 마땅히 인진호탕(茵陳蒿湯)을 써야 한다. 상한에 다만 머리에 서 땀이 나고 다른 곳은 나지 않으며 목둘레에 까지만 땀이 나고 소변이 잘 나오지 않으면 반드시 몸에 황달이 발생하는 것이다.

[7-48] 李梴曰, 天行疫癘, 亦能發黃, 謂之瘟黃, 殺人最急, 宜瘧疸丸.

이천(李梴)이 말하기를 유행하는 역려(疫癘)에서도 황달이 되는 경우가 있는데 이것을 온황(瘟黃)이라 한다. 사람을 죽게 하는 것이 가장 급하니 마땅히 장달환(瘧疸丸)을 써야 한다.

[7-49] 論曰, 右證, 當用 茵陳橘皮湯・茵陳付子湯・茵陳四逆湯・瘧疸丸, 或用巴豆丹.

나는 논하기를 위와 같은 황달병에는 마땅히 인진궤피탕(茵陳橘皮湯)・인진부자탕(茵陳付子湯)・인진사역탕(茵陳四逆湯)・장달환(瘧疸丸)・파두단(巴豆丹)을 쓴다.

[7-50] 醫學綱目曰, 但結胃, 無大熱者, 此爲水結, 但頭汗出, 名曰水結胃, 小半夏湯主之.

《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 다만 결흉증(結胸證)만 있고 대열(大熱)이 없는 것은 수기(水氣)가 맺힌 것이다. 머리에서만 땀이 흐르는 것을 이름하여 수결흉(水結胸)이라 한다. 소반하탕(小半夏湯)을 쓴다.

[7-51] 龔信曰, 寒實結胃, 無熱證者, 宜三物白散.

공신(龔信)이 말하기를 한기(寒氣)가 실(實)하여 결흉하고 열이 없는 증에는 마땅히 삼물백산(三物白散)을 쓴다.

[7-52] 論曰, 右證, 當用 桂枝半夏生薑湯・赤白何烏寬中湯・三物白散, 或用豆巴丹.

나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 계지반하생강탕(桂枝半夏生薑湯)・적백하오관중탕(赤白何烏寬中湯)・삼물백산(三物白散) 또는 파두단(巴豆丹)을 쓴다.

[7-53] 少陽人病, 心下結硬者, 名曰結胃病, 其病, 可治也. 少陰人病, 心下結硬者, 名曰藏結病, 其病, 不治也. 醫學綱目, 醫鑑所論, 水結胃, 寒實結胃證藥, 俱是少陰人太陰病, 而與張仲景, 茵陳蒿湯證, 相類, 則此病, 想必非眞結硬於心下, 而卽痞滿於心下者也. 張仲景, 瀉心湯證, 傷寒下利, 心下痞硬, 汗解後, 心下痞硬云者, 亦皆痞滿於心下, 或臍上近處, 結硬也, 而非眞結硬於心下者也. 若少陰人病, 而心下右邊, 結硬則不治.

소양인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 결흉(結胸)이라 하는데 그 병은 치료할 수가 있고, 소음인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 장결(藏結)이라고 하는데 그 병은 불치의 병이다. 《의학강목(醫學綱目)》과 《의감(醫鑑)》에서 논한 바의 수결흉(水結胸)과 한실결흉(寒實結胸)의 약물은 모두 소음인의 태음병에 쓰는 약물로서 장중경의 인진호탕과 서로 같은 류에 속하므로 이것은 반드시 명치 밑이 진짜로 단단한 것이 아니고 더부룩하면서 가득한 것이라고 생각이 된다. 장중경의 사심탕(瀉心湯)증에서 상한에 설사를 하고서 심하가 비경(痞硬)하거나 땀을 많이 내고서 심하가 비경한다고 운운한 것은 모두 심하가 비만(痞滿)하였거나, 또는 제상(臍上) 부근에 경결이 된 것이겠고 진짜로 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 장결병은 아니다. 만일 소음인의 병에 명치 밑이 오른쪽으로 단단하게 굳어 뭉친 장결병이라면 그것은 불치인 것이다.

[7-54] 張仲景曰, 病有結胃, 有藏結, 其狀如何, 曰按之痛, 寸脈浮, 關脈沉, 名曰結胸也. 何謂藏結, 曰如結胃狀, 飲食如, 故時時下利, 寸脈浮, 關脈細小沉緊, 名曰藏結, 舌上白胎滑者, 難治. 病人胃中, 素有痞, 連在臍傍, 引入小腹, 入陰筋者, 此名藏結, 死.

장중경(張仲景)이 말하기를 병에 결흉(結胸)과 장결(藏結)이 있으니 그 증상이 어떻게 다른가? 대답하기를 누르면 아프고 촌맥(寸脈)이 부(浮)하고 관맥(關脈)이 침(沈)한 것을 결흉병이라 한다. 장결 증은 어떠한가? 대답하기를 결흉병 증상과 비슷하고 음식은 여전하고 때때로 설사하며 촌맥이 부하고 관맥이 세소침긴(細小沈緊)한 것을 장결병이라고 한다. 위와 같을 때 설상(舌上)에 백태(白苔)가 끼고 뻘뻘하하면 난치하고 환자가 평소에 가슴 속이 답답한 증상이 있고 이것이 배꼽 아래로 내려와서 아랫배로 들어가서 당기고 음근(陰根)에까지 들어가는 것을 장결병이라고 한다. 이것은 죽는 병이다.

[7-55] 朱肱曰, 藏結, 狀如結胃, 飲食如, 故時時下利, 而舌上白胎. 歌曰, 飲食如常, 時下利, 更加舌上白胎時, 連臍腹痛, 引陰筋, 此疾, 元來死不醫.

주굉(朱肱)이 말하기를 장결은 그 증상이 결흉과 거의 같고 음식은 보통 때와 같으면서 때때로 설사하고 설상에 백태가 낀다. 이를 노래로 하면 음식은 예나 다름없고 때로 설사를 하니 다시금 혀에 백태가 끼는구나. 배꼽 아래 아픈 것이 음근까지 당기니, 아! 이 병은 애당초 죽고 마는 병인가 보다.

[7-56] 論曰, 嘗見, 少陰人, 一人, 心下右邊結硬, 百藥無效, 與巴豆如意丹, 反劇, 搖頭動風, 有頃, 而止,

數月後死, 其後, 又有, 少陰人, 一人, 有此證者, 用巴豆丹, 面上身上, 有汗, 而獨上脣人中穴左右邊, 無汗, 此人, 一周年後, 亦死. 凡少陰人, 心下結硬, 有此證者, 目睹四五人, 或半年, 或一年, 針灸醫藥, 無不周至, 而個個, 無回生之望, 此, 卽藏結病, 而少陰人病也.

나는 논하기를 일찍이 소음인 한 사람이 명치 밑 오른쪽에 단단하게 굳어 뭉친 것이 있어서 백약을 써도 효과가 없다. 그리하여 파두여의단(巴豆如意丹)을 주었더니 도리어 병이 심하여 머리를 흔들며 풍증을 일으키다가 잠깐 그치더니 몇 달 후에 죽은 것이다. 또 그 후에 소음인 한 사람이 이와 같은 병증이 있어 파두단(巴豆丹)을 썼더니 얼굴과 몸에서는 땀이 나고 있으나 유독히 윗입술 인중혈(人中穴) 좌우 쪽에서는 땀이 나지 아니하더니 이 사람은 1년 후에 죽은 것이다. 무릇 소음인이 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉쳐 있는 환자 4-5명을 실제로 보았으나 혹 6개월간 혹 1년간 침구(針灸) 의약(醫藥)을 두루 써보지 않은 것이 없었으나 날날이 회생할 희망이 없었으니 이는 곧 장결병으로 소음인의 병인 것이다.

[7-57] 張仲景曰, 黃疸之病, 當以十八日, 爲期, 十日以上, 宜差, 反劇, 爲難治. 發於陰部, 其人必嘔, 發於陽部, 其人振寒而發熱.

장중경(張仲景)이 말하기를 황달병은 마땅히 18일로서 기간을 잡는 것이니 10일 이상이면 차도가 있어야 하는데 도리어 병이 더욱 심한 것은 다스리기 어려운 것이다. 병이 음부(陰部)에서 발(發)하면 그 사람이 반드시 구역을 하고 병이 양부(陽部)에서 발생을 하면 그 사람이 추워서 떨며 발열을 하는 것이다.

[7-58] 諸疸, 小便黃赤色者, 爲濕熱, 當作濕熱治. 小便色白, 不可除熱者, 無熱也, 若有虛寒證, 當作虛勞治.

각종 황달병에 소변색이 노랑고 붉으면 이는 습열(濕熱)로 된 것이니 마땅히 습열로 다스려야 하고, 소변이 맑아서 열을 제(除)해서는 안 될 것은 열이 없는 것이다. 만일 허한증(虛寒證)이 있으면 마땅히 허로증(虛勞證)으로 다스려야 한다.

[7-59] 腹脹滿, 面萎黃, 躁不得睡.

배가 부르고 얼굴이 누렇게 여위면 조바심이 나서 잠을 이루지 못하는 것이다.

[7-60] 黃家日晡時, 當發熱, 反惡寒, 此爲女勞得之. 膀胱急, 小腹滿, 一身盡黃, 額上黑, 足下熱, 因作黑疸. 腹脹如水狀, 大便黑, 或時瀉, 此女勞之病, 非水也, 腹滿者, 難治.

대개 황달병들은 오후 4시쯤 마땅히 발열하는 것인데 도리어 오히려 있는 것은 여로(女勞)를 얻은 것이다. 방광이 아프고 아랫배가 부르며 온몸이 다 누렇게 되어도 이마는 검은빛을 띠고 발바닥에서 발열하면 흑달(黑疸)이 되는 것이다. 배가 부른 것이 마치 물이 찬 것 같고 대변이 검고 혹 때로는 묽으면 이것은 여로(女勞)로 병이 된 것이고 물이 차서 있는 것은 아니다. 배가 부른 증은 치료하기 어렵다.

[7-61] 朱肱曰, 陰黃, 煩躁, 喘嘔不渴, 宜用茵陳橘皮湯. 一人, 傷寒發黃, 脈微弱, 身冷, 次第用藥, 至茵陳四逆湯, 大效. 一人, 傷寒發黃, 脈沉細遲無力, 次第用藥, 至茵陳附子湯, 大效.

주굉(朱肱)이 말하기를 음증(陰證)으로 된 황달증은 마음이 답답하여 조바심하며 숨이 차며 구역이 나서 입 안이 마르지 않는다. 마땅히 인진굴피탕(茵陳橘皮湯)을 써야 한다. 한 사람이 상한병에 황달이 발하여 맥(脈)이 미약(微弱)하고 몸이 냉한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진사역탕(茵陳四逆湯)을 쓰고 크게 효과를 보았다. 또 한 사람이 상한병에 황달이 되었는데 맥이 침세무력(沈細無力)한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진부자탕(茵陳附子湯)을 쓰고 대효를 본 것이다.

[7-62] 醫學綱目曰, 濕家之黃, 色暗不明, 一身不痛, 熱家之黃, 如橘子, 一身盡痛.

《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 습(濕)으로 된 황달은 색이 어둡고 밝지 못하여 온몸이 아프지 아니하고 열로 된 황달증은 피부가 굴빛같이 노랑고 온몸이 쑤시고 아프다.

[7-63] 王好古曰, 凡病, 當汗而不汗, 當利小便而不利, 亦生黃.

왕호고(王好古)가 말하기를 모든 병에 있어서 마땅히 땀을 내야 할 것을 땀을 못 내거나 소변을 잘 나가게 해야 할 것을 이뇨(利尿)시키지 못하면 또한 황달이 발생하게 되는 것이다.

[7-64] 朱震亨曰, 黃疸, 因食積者, 下其食積, 其餘, 但利小便, 小便利白, 其黃自退.

주진형(朱震亨)이 말하기를 황달병이 식적(食積)으로 인한 것은 식적을 내려야 하고 그 밖의 황달병에는 다만 소변을 잘 나오게 하면 된다. 소변이 잘 나오고 색이 맑으면 그 황달이 스스로 물러가는 것이다.

[7-65] 李梴曰, 黃疸十日以上, 入腹, 喘滿煩渴, 面黑者, 死.

이천(李梴)이 말하기를 황달이 10일을 넘어서 배로 들어가면 숨이 차고 번갈하며 얼굴빛이 검어지는 자는 죽는다.

[7-66] 王叔和, 脈經曰, 黃家寸口脈, 近掌無脈, 口鼻冷, 黑色, 並不可治.

왕숙화(王叔和)의 《맥경(脈經)》에 말하기를 황달병은 촌구맥(寸口脈)이 손바닥 쪽에서부터 없어지고 입과 코에서 냉기(冷氣)가 나오고 얼굴빛이 검어진 것은 모두 치료할 수 없다.

[7-67] 論曰, 陰黃, 卽少陰人病也, 當用朱氏茵陳橘皮湯・茵陳四逆湯. 女勞之黃, 熱家之黃, 利小便之黃, 想或非少陰人病, 而余所經驗, 未嘗一遇黃疸, 而治之, 故未得仔細裏許. 然, 痞滿・黃疸・浮腫, 同出一證, 而有輕重. 若欲利小便, 則乾薑・良薑・陳皮・青皮・香附子・益智仁, 能利少陰人小便. 荊芥・防風・羌活・獨活・茯苓・澤瀉, 能利少陽人小便.

나는 논하기를 음황(陰黃)은 곧 소음인의 병이다. 주씨인진굴피탕(朱氏茵陳橘皮湯)・인진사역탕(茵陳四逆湯)을 써야 하고, 여로의 황달과 열가(熱家)의 황달과 이소변(利小便)을 시켜야 할 황달증은 혹 소음인 병이 아닌 것으로 생각된다. 내가 황달 치료를 한 번도 해본 경험이 없어서 그 내막은 자세히 말하지 못하나 비만(痞滿)・황달(黃疸)・부종(浮腫)은 같은 병인에서 생긴 증으로 다만 경증(輕證)・중증(重證)이 있을 따름이다. 건강(乾薑)・양강(良薑)・청피(靑皮)・진피(陳皮)・향부자(香附子)・익지인(益智仁)은 소음인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이고 형개(荊芥)・방풍(防風)・강활(羌活)・독활(獨活)・복령(茯苓)・택사(澤瀉)는 소양인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이다.

少陰人 泛論(24條)

소음인 범론(24조)

[8-1] 論曰, 發熱惡寒者, 爲太陽病, 發熱不惡寒者, 爲陽明病. 太陽陽明之發熱形證, 一也, 而惡寒不惡寒之間, 相去遠甚, 而陽氣之進退強弱, 泰山之比岡陵也, 自利而不渴者, 爲太陰病, 自利, 而渴者, 爲少陰病, 太陰少陰之自利形證, 一也, 而渴不渴之間, 相去遠甚, 而冷氣之聚散輕重, 雲夢之比瀟澤也. 是, 故藿香正氣散・香砂養胃湯之證勢, 平地駿馬之病勢也. 獨蓼八物湯・桂付理中湯之證勢, 太行短筇之病勢也. 若使一天下, 少陰人稟賦者, 自知其病之陽明少陰證, 如太行之險路, 得之可畏, 救之不易. 攝身療病, 戒懼謹慎之道, 有若大路然, 而不迷, 則其庶幾乎.

나는 논하기를 발열(發熱)하며 오한(惡寒)하는 증은 태양병(太陽病)이고, 발열 하면서 오한이 없으면 양명병(陽明病)이다. 태양병과 양명병의 발열상태는 같으나 오한・불오한(不惡寒)하는 거리가 심히 멀기 때문에 양기(陽氣)의 진퇴(進退)가 태산(泰山)과 언덕에 비하는 것과 같다. 설사를 하면서 구갈(口渴)하지 않는 증은 태음병(太陰病)이고 자리(自利)하면서 구갈하는 병은 소음병(少陰病)이다. 태음병과 소음병은 설사하는 증상은 같고 구갈하고 구갈하지 않는 사이가 서로 심히 멀어서 냉기(冷氣)의 취산(聚散)・경중(輕重)은 큰 호수와 작은 못을 비교하는 것과 같다. 그렇기 때문에 곽향정기산(藿香正氣散)・향사양위탕(香砂養胃湯)을 쓰는 증세는 준마가 평지를 달리는 격이고, 독삼팔물탕(獨蓼八物湯)・계부이중탕(桂付理中湯)을 쓰는 병세는 짧은 지팡이를 짚고 크고 높고 험한 산을 넘어가는 형세와 같은 것이다. 만일 온 세상에 소음인으로 태어난 자로 하여금 양명병과 소음병이 마치 태행산(太行山)의 험한 산길을 가는 사람과 같아서 그 병을 얻으면 과연 두려운 것이고 참

으로 구명하기가 쉽지 않은 것을 알게 한다면 몸을 섭양하고 병을 치료하는 일에 경계하고 삼가 조심함에 마치 넓은 길을 걷는 것같이 하여 미혹하지 않게 해야 하지 않겠는가.

[8-2] 太陽病汗出, 熱氣卻寒氣之汗出也. 陽明病汗出, 寒氣犯熱氣之汗出也. 太陰病下利, 溫氣逐冷氣之下利也. 少陰病下利, 冷氣逼溫氣之下利也.

태양병에 땀이 나는 것은 열기(熱氣)가 한사(寒邪)를 물리치는 땀이고 양명병에 땀이 나는 것은 한사가 열기에 침범하는 땀이다. 태음증 하리는 온기(溫氣)가 냉기(冷氣)를 몰아내는 하리이고 소음증 하리는 냉기가 온기를 핍박하는 하리인 것이다.

[8-3] 少陰人病, 有二吉證, 人中汗, 一吉證也, 能飲水, 一吉證也.

소음인 병에 두 길증(吉證)이 있다. 하나는 인중(人中)에서 땀이 나는 것이요, 또 하나는 물을 능히 마시는 것이다.

[8-4] 少陰人病, 有二急證, 發熱汗多, 一急證也. 下利清水, 一急證也.

소음인 병에 두 급증(急證)이 있다. 하나는 발열하면서 땀이 너무 많이 흐르는 것이요, 또 하나는 맑은 물 설사를 하는 것이다.

[8-5] 少陰人病, 有六大證, 一曰, 少陰病, 二曰, 陽明病, 三曰, 太陰病陰毒證也, 四曰, 太陽病厥陰證也, 五曰, 太陰病黃疸證也, 六曰, 太陽病胃家實證也.

소음인 병에 육대증(六大證)이 있으니 첫째로 소음병(少陰病), 둘째로 양명병(陽明病), 셋째로 태음병음독증(太陰病陰毒證), 넷째로 태양병궤음증(太陽病厥陰證), 다섯째로 태음병황달증(太陰病黃疸證), 여섯째로 태양병위가실증(太陽病胃家實證)이다.

[8-6] 發熱汗出, 則病必解也, 而發. 熱汗出, 而病益甚者, 陽明病也. 通滯下利, 則病必解也, 而通滯下利, 而病益甚者, 少陰病也, 陽明少陰, 以邪犯正之病, 不可不急用藥也, 惡寒汗出, 則病必盡解也, 而惡寒汗出, 而其病, 半解半不解者, 厥陰之漸也, 腹痛下利, 則病必盡解也, 而腹痛下利, 而其病, 半解半不解者, 陰毒之漸也, 厥陰陰毒, 正邪相傾之病, 不可不預用藥也, 發熱一汗, 而病即解者, 太陽之輕病也, 食滯一下, 而病即解者, 太陰之輕病也, 太陽太陰之輕病, 不用藥, 而亦自愈也, 發熱三日, 不得汗解者, 太陽之尤病也, 食滯三日, 不能化下者, 太陰之尤病也, 太陽太陰之尤證 已不可謂輕證, 而用藥二三貼, 亦自愈也, 發熱六日, 不得汗解, 食滯六日, 不能化下者, 太陽太陰之胃家實黃疸病也, 太陽太陰之胃家實黃疸, 正邪壅錮之病, 不可不大用藥也.

발열하고 땀이 나면 병이 반드시 풀려야 하는데 발열하고 땀이 나고서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 양명병이고 체한 것이 뚫리면서 설사를 하면 병이 반드시 풀려야 하는데 체기(滯氣)가 뚫리고 설사를 하고서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 소음병인 것이다. 양명병과 소음병은 사기(邪氣)가 정기(正氣)를 범(犯)하는 병이기 때문에 급하게 약을 쓰지 않을 도리가 없다. 추워 떨고서 땀이 나면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 오한하고 땀이 나고서도 그 병이 반만 풀리고 반은 풀리지 않는 것은 점차 궤음병(厥陰病)으로 전변(轉變)하려는 증이다. 복통에 설사를 하면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 복통에 하리(下利)를 하고서도 그 병이 반만 풀리고 반은 풀리지 않는다면 점차 음독병(陰毒病)으로 전변하려는 증이다. 궤음병과 음독증은 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 힘을 기울이는 병이니 불가불 미리 약을 써서 정기를 도와주어야 한다. 발열하고 땀이 한 번 나고 병이 풀리는 것은 태양의 경병(輕病)이고 식체에 한 번 설사를 하고서 병이 풀리는 것은 태음의 경병이다. 태양과 태음의 경병(輕病)은 약을 쓰지 않고서도 저절로 낫는 것이다. 발열 3일에 땀이 나지 않아 병이 풀리지 않는 것은 태양의 심한 병증이고 식체 3일에 소화가 되지 않아 내려가지 않는 것은 태음의 심한 병증이다. 태양병과 태음병의 심한 병증을 이미 경증이라고 말할 수 없으므로 약을 2-3첩을 쓰면 또한 스스로 낫는다. 발열이 있는 지 6일이 되어서도 땀이 나지 않고 열이 풀리지 않는 증과 식체 6일에 소화가 안 되어 내려지 않는 증은 태양병·태음병의 위가실황달병이다. 위가실황달병은 정기와 사기가 꼭 막힌 병이기 때문에 약을 크게 쓰지 않을 도리가 없는 병증이다.

[8-7] 太陽太陰之病, 六七日, 或成危證, 或成重證, 而十日內, 必有險證, 陽明少陰之病, 自始發, 已爲重證, 而二三日內, 亦致險證. 是, 故陽明少陰之病, 不可不察於始發也, 太陽太陰之病, 不可不察於四五日間也.

태양병과 태음병은 6-7일에는 혹 위증(危證)이 되거나 혹 중증(重證)을 일으켜 10일 내에는 반드시 험증(險證)이 되는 것이고 양명병과 소음병은 처음부터 중증이 되므로 2-3일 내에 또한 험증을 일으키는 것이다. 그렇기 때문에 양명병과 소음병은 불가불 병이 시발(始發)할 때부터 잘 살펴야 하고 태양병과 태음증은 불가불 4-5일 내에 증세를 잘 살펴야 한다.

[8-8] 太陽太陰之病, 病勢緩, 而能曠日持久, 故變證多也. 陽明少陰之病, 病勢急, 而不能曠日持久, 故變證少也. 蓋陽明少陰病, 過一日, 而至二日, 則不可不用藥也. 太陽太陰病, 過四日, 而至五日, 則不可不用藥也. 太陽太陰之厥陰陰毒, 皆六七日之死境也, 尤不可不謹也.

태양병과 태음증은 병세가 느리므로 능히 여러 날을 이끌어 갈 수 있기 때문에 변증(變證)이 많이 생기고 양명병·소음병은 병세가 급하므로 여러 날을 끌어갈 수 없기 때문에 변증이 적다. 대개 양명병과 소음병은 1일이 지나고 2일이 되면 불가불 약을 써야 하며 태양병과 태음병은 4일이 지나 5일이 되면 불가불 약을 써야 한다. 태양·태음에서 궤음(厥陰)과 음독(陰毒)이 된 것은 모두 6-7일이 되면 죽음에 이르게 되므로 더욱 삼가지 않을 수가 없는 것이다.

[8-9] 陽明太陽之危者, 獨蓼八物湯・補中益氣湯, 可以解之, 而病勢危時, 若非日三四服, 而又連日服, 則難解也. 少陰太陰之危者, 獨蓼付子理中湯・桂付藿陳理中湯, 可以解之, 而病勢危時, 若非日三四服, 而又連日服, 則難解也. 病勢極危時, 日四服, 病勢半危時, 日三服, 病勢不減, 則日二服, 病勢少減, 則二日三服, 而一日, 則一服, 一日, 則二服, 病勢大減, 則日一服, 病勢又大減, 則間二三四五日, 一服, 蓋有病者, 可以服藥, 無病者, 不可以服藥, 重病可以重藥, 輕病不可以重藥, 若輕病好用重藥, 無病者好服藥, 臟氣脆弱, 益招病矣.

양명병과 태양병의 위급한 자에게는 독삼팔물탕(獨蓼八物湯)·보중익기탕(補中益氣湯)이라야 병을 풀 수가 있고 병세가 위급할 때에는 만일에 1일에 3-4첩을 탕복하지 않거나 또 연 일복(連日服)하지 않으면 난치하고, 소음병과 태음병의 위급한 자는 독삼부자이중탕(獨蓼付子理中湯)·계부곽진이중탕(桂付藿陳理中湯) 등이라야 가히 풀릴 수가 있고 병세가 위급할 때에는 매일 3-4첩을 탕복(湯服)하지 아니하거나 또는 연일 복용하지 아니하면 난치한다. 또 병세가 극히 위급할 때에는 1일에 4첩을 탕복해야 하고 또 병세가 반 정도로 위급할 때에는 1일에 3첩을 복용한다. 그리고 다음부터는 병세가 더 감(減)해지지 않더라도 1일에 2첩을 복용하고 또 병세가 조금 감해지면 2일간에 3첩을 쓰거나 1일에 1첩을 쓰기도 하고 1일에 2첩을 쓰기도 한다. 병세가 크게 덜하게 되면 1일에 1첩을 쓰고 또 병세가 더욱 크게 덜하게 되면 2일간에 1첩을 쓰든지 3일간에 1첩, 4일 간에 1첩, 5일 간에 1첩을 쓰기도 한다. 그리고 병이 있는 사람은 약을 써야 하지만 병이 없는 사람이 약을 복용하는 것은 옳지 않다. 중병에는 중한 약을 써야 하고 경병자에게는 중한 약을 써서는 안 된다. 만일에 병이 가벼운데 중한 약 쓰기를 좋아하거나 또 병이 없는 자가 약을 먹기를 좋아하면 내장의 기가 연약하게 되며 더욱 병을 불러오게 한다.

[8-10] 膏粱, 雖, 則助味, 常食, 則損味, 羊裘, 雖, 則禦寒, 常着, 則攝寒, 膏粱羊裘, 猶不可以常食常着, 況藥乎, 若論常服藥之有害, 則反爲百倍於全不服藥之無利也. 蓋有病者, 明知其證, 則必不可不服藥, 無病者, 雖明知其證, 必不可服藥. 歷觀於世之服鴉片烟, 水銀・山參・鹿茸者, 屢服, 則無不促壽者, 以此占之, 則可知矣.

고량진미(膏粱珍味)가 비록 입맛에는 좋으나 늘 먹으면 도리어 입맛을 잃는 것이니 양피나 양털의 복이 비록 추위를 잘 막지만 늘 입으면 추위를 타게 된다. 기름진 음식이나 양털 옷도 항상 먹고 입으면 오히려 좋지 않은데 하물며 약이야 이보다 더하지 않겠는가? 만일 늘상 약을 먹는 해로움을 논한다면 전혀 약을 먹지 않는 것보다 도리어 백배나 이롭지 못한 것이다. 대개 병이 있는 사람은 그 병증을 밝게 안다면 반드시 약을 먹어야 하고 병이 없는 사람은 비록 병세를 밝게 안다고 할지라도 반드시 약을 먹을 필요는 없다. 지나간 역사와 현세를 살펴보건대 아편을 피우거나 수은(水銀)·산삼(山蔘)·녹용(鹿茸) 같은 것을 자주 먹으면 목숨을 재촉하는 경우가 없지 않으니 이것을 가지

고 미루어 보아도 가히 알 수 있을 것이다.

[8-11] 少陰人, 吐血, 當用獨蓼八物湯, 咽喉痛, 當用獨蓼官桂理中湯.

소음인 토혈(吐血)에 마땅히 독삼팔물탕(獨蓼八物湯)을 사용한다. 소음인 인후통(咽喉痛)에 마땅히 독삼관계이중탕(獨蓼官桂理中湯)을 사용한다.

[8-12] 嘗見, 少陰人, 飲食倍常, 口味甚甘, 不過一月, 其人, 浮腫而死, 少陰人, 食消, 卽浮腫之屬, 而危證也, 不可不急治, 當用芎歸葱蘇理中湯.

일찍이 소음인이 입맛이 달아서 음식을 평상시보다 배를 더 먹더니 불과 1개월 내에 부종이 생겨서 죽는 것을 보았다. 소음인 식소(食消)는 부종에 속한 것으로서 매우 위험한 병세이다. 불가불 급히 치료를 해야 한다. 마땅히 궁귀충소이중탕(芎歸葱蘇理中湯)을 사용한다.

[8-13] 嘗見, 少陰人浮腫, 獐肝一部, 切片作臈, 一服盡, 連用五部, 其病卽效, 又有, 少陰人, 服獐肝一部, 眼力倍常, 眞氣湧出, 少陽人虛勞病, 服獐肝一部, 其人, 吐血而死.

일찍이 소음인 부종병에 노루의 간 일부를 썰어서 회로 만들어 한 번에 다 먹고 계속하여 5번을 하니 그 병이 곧 나았고, 소음인 한 사람이 노루의 간 일부를 먹고 시력이 배로 좋아지고 원기가 솟구쳐 나왔다. 그러나 소양인이 허로병에 노루의 간 일부를 먹더니 피를 토하며 죽은 것을 보았다.

[8-14] 嘗見, 少陰人浮腫, 有醫, 教以服海塩, 自然汁, 日半匙, 四五日服, 浮腫大減, 一月服, 永爲完健, 病不再發.

일찍이 소음인의 부종병에 어떤 의사가 소금에서 흘러내린 즙을 1일에 반 숟갈씩 먹어보라고 가르쳐 주기에 4,5일 먹었더니 부종이 크게 줄어 1개월간을 먹고 오래도록 완건하여 병이 재발하지 않는 것을 보았다.

[8-15] 嘗見, 少陰人, 咽喉痛, 經年不愈, 有醫, 教以服金蛇酒, 卽效, 金蛇酒, 卽金色黃章蛇釀酒者也.

일찍이 소음인이 인후통(咽喉痛)이 1년이 지나도록 낫지 않는 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기를 금사주(金蛇酒)를 먹어보라고 하여 먹었더니 낫는 것이다. 금사주는 금색 같은 누런 점들이 있는 뱀으로 술을 빚은 것이다.

[8-16] 嘗見, 少陰人, 痢疾, 有醫, 教以服項赤蛇煎湯, 卽效, 項赤蛇, 去頭斷尾, 納二疊紬囊中, 藥缸內, 別設橫木, 懸空掛之, 用水五碗, 煎取一碗服, 二疊紬囊, 懸空掛煎者, 恐犯蛇骨, 故也, 蛇骨有毒.

일찍이 소음인의 이질병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 목이 붉은 뱀을 달여서 먹으라고 하여 달여서 먹고 낫는 것을 보았다. 항적사의 머리와 꼬리는 잘라버리고 명주 베 두 겹 주머니에 넣어서 약항아리 안에 나무를 가로 걸쳐놓고 거기에 매달아 놓은 뒤에 물을 다섯 사발 붓고 달여서 한 사발이 되면 이를 복용한다. 두 겹 명주 주머니에 넣고 허공에 달아 달이는 것은 뱀의 뼈가 범할까 두렵기 때문이다. 뱀의 뼈는 독이 있다.

[8-17] 嘗見, 少陰人, 痢疾, 有醫, 教以大蒜三顆, 清蜜半匙, 同煎, 三日服, 卽效.

내가 본 바에 의하면 소음인 이질에 어떤 의사가 큰 마늘 3통과 꿀 반 숟갈을 함께 달여서 3일간 먹이라고 가르쳐 주었는데 곧 효과를 보았다.

[8-18] 嘗見, 少陰人, 乳傍近脇, 有漏瘡, 歷七八月, 瘡口不合, 惡汁常流, 有醫, 教以山參・熊膽末各一分, 傅之卽效, 又少陰人, 一人, 滿身有瘡, 以人蓼末, 塗傅卽效.

내가 본 바에 의하면 일찍이 소음인의 유방 근처 늑골 밑에 누창(漏瘡)이 나서 7, 8개월이 되도록 창구가 아물지 않으며 악즙(惡汁)이 늘 흘러내리는 것이다. 어떤 의사가 가르쳐 주기를 산삼말(山蓼末)・웅담말(熊膽末) 각 1분(分)을 붙이라고 하여 붙였더니 곧 효과를 보았다. 소음인 한 사람이 전신에 창(瘡)이 생긴 것을 인삼말(人蓼末)을 바르고 즉시 효과를 보았다.

[8-19] 嘗見, 少陰人, 乳傍近脇, 發內癰, 有醫, 教以火針取膿. 醫曰, 內癰外證, 惡寒發熱, 似傷寒, 而有痛處也. 察其痛處, 明知有膿, 則不可不用火針.

내가 본 바에 의하면 소음인의 유방 근처에 내용(內癰)이 발생한 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기를 화침(火針)으로 고름을 뽑아내도록 하였는데 또 말하기를 내용의 외증(外證)이 오한·발열하는 것이 마치 상한병과 비슷하지만 일정한 곳에 압통점이 있는 것이니 그 아픈 곳을 잘 살펴서 고름이 들어 있는 것을 밝게 안다면 불가불 화침을 써야 하는 것이다.

[8-20] 嘗見, 少陰人, 背癰, 有醫, 教以火刀裂瘡. 醫曰, 火刀裂瘡, 宜早也. 若疑訝, 而緩不及事, 則全背堅硬, 悔之無及.

내가 본 바에 의하면 소음인의 등창에 어떤 의사가 화도(火刀)로 그 종창을 절개하라고 가르쳐 주었다. 의사가 말하기를 화도로 등창을 찢는 것은 가급적 빨리해야 하며, 만일 의심스럽게 여겨서 때를 놓치면 등 전체가 단단하게 굳어질 것이니 후회해도 소용이 없는 것이다.

[8-21] 嘗見, 少陰人, 半身不遂病, 有醫, 教以服鐵液水, 得效.

내가 본 바에 의하면 소음인의 반신불수병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 담금질한 물을 먹으라고 하여 매일 먹고 효험이 있는 것을 보았다.

[8-22] 嘗見, 少陰人小兒, 腹瘧病, 有醫, 教以瘧病將發之早朝, 用火煨金頂砒, 極細末六理, 生甘草湯, 調下即效, 醫曰, 砒藥, 必金頂砒然後, 可用, 而又火煨然後可用也. 必不可過六理, 而又不可不及六理也. 過六理, 則藥毒, 太過也, 不及六理, 則瘧不愈也. 此藥, 屢試屢驗, 而有一服愈後, 瘧又再發者, 又用之, 則其病, 益甚而危. 蓋此藥, 可以一服, 不可再服云. 聽醫言, 而究其理, 則一服愈, 而瘧不再發者, 皆少陰人兒也, 一服愈, 而瘧又再發者, 皆非少陰人兒也. 惟少陰人兒, 腹瘧病難治者, 用此藥, 尋常瘧, 不必用此不祥之藥, 少陰人, 尋常間日瘧, 惡寒時, 用川芎桂枝湯, 二三貼, 則亦無不愈. 又腹中, 實滿, 而大便秘, 瘧發者, 亦可用巴豆.

내가 본 바에 의하면 소음인 아이의 복학병(腹瘧病)에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 학질(瘧病)이 발(發)하는 이른 아침에 화하(火煨)한 금정비(金頂砒)를 쓰되 극히 세말(細末)하여 6리(厘)를 생감초 달인 물에 같이 복용하라 하니 곧 효과가 있었다. 의사가 말하기를 비약(砒藥)은 반드시 금정비(金頂砒)를 만들어서 써야 하고 또 화하(火煨)해야만 쓸 수가 있다고 한다. 그리고 먹는 분량은 1회에 6리(厘)가 넘어서도 안 되고 6리가 못 되어도 안 된다. 그것은 6리가 넘으면 약독이 두렵기 때문이고 모자라면 학질이 낫지 않는 것이다. 이 약은 여러 번 시험하고 자주 치험한 바가 있는 것으로 한 번 복용한 후 잠깐 학질이 나왔다가 또 재발하는 자가 있으니 이러한 자에게 또 한 번 쓰면 그 병이 더욱 심하고 위태롭게 된다. 대개 이 약은 한 번만 쓸 것이고 다시 한 번 복용할 수 없다고 말하는 의사의 말을 듣고 그 이치를 궁리하여 본즉 한 번 복용한 후 병이 낫고 학질이 다시 재발하지 않는 자는 모두 소음인 아이이고 복용한 후 학질이 나왔다가 또다시 재발하는 자는 모두 소음인 아이가 아닌 것이다. 오직 소음인 아이 복학병의 난치자(難治者)에 한하여 이 약을 쓸 것이고 보통 학질에는 이런 상서롭지 못한 약을 쓸 필요가 없는 것이다. 보통 하루 걸러 나타나는 소음인의 학질에는 오한증을 일으킬 때 천궁계지탕(川芎桂枝湯) 2-3첩을 쓰면 낫지 않는 것이 없고 배 속에 가득 차서 대변이 굳으면 학질을 발하는 자라도 마땅히 파두(巴豆)를 써야 한다.

[8-23] 百藥, 莫非善藥, 而惟少陰人信砒藥, 太陰人瓜蒂藥, 最爲惡藥也, 何哉. 少陰人信砒藥, 百病, 用之皆殆, 而祇有治瘧之一能者, 亦有名無實, 不無危慮, 萬不如桂枝, 人蔘·白芍藥, 三四服之治瘧, 則此非天下萬害無用之藥乎, 太陰人瓜蒂藥, 百病, 用之皆殆, 而祇有治痰涎壅塞之一能者, 亦有名無實, 不無危慮, 萬不如桔梗·麥門冬·五味子, 三四服之, 治痰涎壅塞, 則此非天下萬害無用之藥乎. 此二藥, 外治, 可用, 內服, 不可用.

백약(百藥)이 모두 좋지 않은 약이 없지만 오직 소음인의 신비약(信砒藥)과 태음인의 과체약(瓜蒂藥)은 가장 유해한 약이라고 할 수 있다. 왜냐하면 소음인의 신석과 비상을 백병(百病)에 써보면 모두 위태롭고 마침내 한 가지 학질(瘧病)만을 다스리는 성능이 있으니 역시 유명무실한 것이라 생각되며 그리고 더욱이 약독(藥毒)이 항상 위태로워서 걱정이 없는 것이 아니니 만일에 계지(桂枝)·인

삼(人蔘)·백작약(白芍藥) 등으로 3,4첩 연복(連服)하여 학질을 치료하는 것만 같지 못하니 이것이 세상에 만 번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가? 태음인의 과체약은 백병에 써 보아도 모두가 그 독이 위태로웠고 다만 담연(痰涎)이 웅색(壅塞)된 증만을 다스리는 성능이 있으나 또한 유명무실하고 더욱 약독이 위태로워 늘 걱정이 없지 않는 것이다. 만일에 길경(桔梗)·맥문동(麥門冬)·오미자(五味子) 등으로 3,4첩을 복용하여 담연이 웅색함을 치료하는 것만 같지 못하니 이것이 세상에 만 번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가. 이 두 가지 약은 외치(外治)에 쓸 수 있는 것이고 내복에는 쓰지 못할 약이다.

[8-24] 嘗見, 少陰人, 中氣病, 舌卷不語, 有醫, 針合谷穴, 而其效如神, 其他諸病之藥, 不能速效者, 針能速效者, 有之. 蓋針穴, 亦有太少陰陽四象人 應用之穴, 而必有升降緩束之妙, 繫是不可不察, 敬俟後之謹厚, 而好活人者.

내가 본 바에 의하면 소음인이 중기병(中氣病)에 허가 굳어서 말을 못하였다. 한 의사가 합곡혈(合谷穴)에 침을 놓으니 그 효능이 신기하였고 그것 외에 또다른 여러 가지 병이 약으로 속효를 보지 못하는 것을 침으로 능히 속효를 보는 자가 있으니 대개 침혈도 역시 태양인·소양인·태음인·소음인의 사상인에 응용하는 혈로서 반드시 승강완속(升降緩束)의 묘리가 있는 것이다. 그런즉 이것은 불가불 잘 살펴야 한 즉 삼가 후세의 근후(勤厚)하고 활인(活人)하기 좋아하는 사람이 나타나기를 기다리고자 한다.

新定 少陰人病 應用要藥 二十四方
새로 정한 소음인병의 주요 24처방

黃芪桂枝付子湯
황기계지부자탕

人蔘桂枝付子湯
인삼계지부자탕

升陽益氣付子湯
승양익기부자탕

人蔘官桂付子湯
인삼관계부자탕

右四方, 皆亾陽危病藥也. 亾陽病人, 小便白而多. 危有餘地, 則用付子 一錢, 日再服, 小便赤而少, 危無餘地, 則用付子 二錢, 日二三服, 病在將危, 用一錢, 病在免危, 用一錢, 病在調理, 亦一錢, 日再服.

이 네 가지 처방은 모두 망양위병에 쓰는 약이다. 망양병 환자의 소변이 맑고 양이 많으면 위중하지만 여지가 있는 것으로 부자 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다. 소변이 붉고 양이 적으면 위중하면서도 여지가 없는 것으로 부자 2돈을 써서 하루에 2-3번 복용시킨다. 병이 장차 위중해지려고 할 때는 1돈을 쓰고 병이 위중한 것을 벗어나도 1돈을 쓰며 병을 조리할 때도 역시 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다.

升陽益氣湯
승양익기탕

人蔘·桂枝·黃芪·白芍藥 各二錢, 白何首烏·官桂·當歸·炙甘草 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚. 人蔘·계지·황기·백작약 각2돈, 백하수오·관계·당귀·자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

補中益氣湯
보중익기탕

人蔘・黃芪 各三錢, 炙甘草・白朮・當歸・陳皮 各一錢, 藿香・蘇葉 各三分, 或五分, 生薑 三片, 大棗 二枚.

인삼・황기 각 3돈, 자감초・백출・당귀・진피 각 1돈, 곽향・소엽 각3푼, 또는 5푼, 생강 3쪽, 대조 2개.

黃芪桂枝湯

황기계지탕

桂枝 三錢, 白芍藥・黃芪 各二錢, 白何首烏・當歸・炙甘草 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚.

계지 3돈・백작약・황기 각 2돈,, 백하수오・당귀・자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개

川芎桂枝湯

천궁계지탕

桂枝 三錢, 白芍藥 二錢, 川芎・蒼朮・陳皮・炙甘草 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚.

계지 3돈, 백작약 2돈, 천궁・창출・진피・자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

芎歸香蘇散

궁귀향소산

香付子 二錢, 紫蘇葉・川芎・當歸・蒼朮・陳皮・炙甘草 各一錢, 葱白 五莖, 生薑 三片, 大棗 二枚.

향부자 2돈, 자소엽・천궁・당귀・창출・진피・자감초 각1돈, 총백 5뿌리, 생강 3쪽, 대조 2개.

藿香正氣散

곽향정기산

藿香 一錢五分, 紫蘇葉 一錢, 蒼朮・白朮・半夏・陳皮・青皮・大腹皮・桂皮・乾薑・益智仁・炙甘草 各五分, 生薑 三片, 大棗 二枚.

곽향 1돈5푼, 자소엽 1돈, 창출・백출・반하・진피・청피・대복피・계피・건강・익지인・자감초 각5푼, 생강 3쪽, 대조 2개.

八物君子湯

팔물군자탕

人蔘 二錢, 黃芪・白朮・白芍藥・當歸・川芎・陳皮・炙甘草 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚.

인삼 2돈, 황기・백출・백작약・당귀・천궁・진피・자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

本方, 以白何首烏, 易人蔘, 則名曰白何首烏君子湯. 本方, 用蔘耆 各一錢, 加白何首烏・官桂 各一錢, 則名曰十全大補湯. 本方, 用人蔘 一兩, 黃芪 一錢, 則名曰獨蔘八物湯.

본 처방에 백하수오로 인삼을 대체하면 백하오군자탕이라 한다. 본 처방에 인삼과 황기 각 1돈을 쓰고 백하수오와 관계 각1돈을 더한 것을 십전대보탕이라 한다. 본 처방에 인삼 1냥, 황기 1돈을 쓴 것을 독삼팔물탕이라 한다.

香付子八物湯

향부자팔물탕

香付子・當歸・白芍藥 各二錢, 白朮・白何首烏・川芎・陳皮・炙甘草 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚. 嘗治, 婦人思慮傷脾, 咽乾舌燥, 隱隱有頭痛, 神效.

향부자・당귀・백작약 각 2돈, 백출・백하수오・천궁・진피・자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

일찍이 부인이 생각이 너무 많아 비장을 상하여 목이 말고 혀가 건조하며 은은하게 두통이 있는 경우를 치료하여 신묘한 효과가 있었다.

桂枝半夏生薑湯

계지반하생강탕

生薑 三錢, 桂枝・半夏 各二錢, 白芍藥・白朮・陳皮・炙甘草 各一錢. 治虛寒嘔吐, 水結胃, 等證.
생강 3돈, 계지・반하 각 2돈, 백작약・백출・진피・자감초 각 1돈. 허한하여 구토를 하거나 수결
홍 등의 증상을 치료한다.

香砂養胃湯
향사양위탕

人蔘・白朮・白芍藥・炙甘草・半夏・香付子・陳皮・乾薑・山楂肉・砂仁・白豆蔻 各一錢, 生薑
三片, 大棗 二枚.
인삼・백출・백작약・자감초・반하・향부자・진피・건강・산사육・사인・백두구 각1돈, 생강 3
쪽, 대조 2개.

赤白何烏寬中湯
적백하오관중탕

白何首烏・赤何首烏・良薑・乾薑・青皮・陳皮・香付子・益智仁 各一錢, 大棗 二枚.
백하수오・적하수오・건강・량강・청피・진피・향부자・익지인 각1돈, 대조 2개.

治四體倦怠, 小便不快, 陽道不興, 將有浮腫之漸者, 用之. 本方, 加厚朴・枳實・木香・大腹皮 各五分,
則又有通氣脈之功力. 雖浮腫已成者, 安心靜慮一百日, 而日再服, 則自無不效之理. 本方, 以人蔘, 易赤
何首烏, 則名曰, 人蔘白何烏寬中湯. 以當歸, 易赤何首烏, 則名曰, 當歸白何烏寬中湯. 古方, 有乾薑・
良薑・青皮・陳皮等分, 作湯丸, 名曰, 寬中湯. 嘗治, 少陰人, 小便不快, 陽道不興, 四體倦怠, 無力者,
用之, 必效, 百發百中. 又, 寬中丸, 本方, 加五靈脂・益智仁 各一錢, 則治腹痛, 神效.

사지가 무겁고 늘어지며, 소변이 시원하지 않고, 양도가 일어나지 않고, 장차 부종이 생길 조짐이
있을 때 쓴다. 본 처방에 후박・지실・목향・대복피 각5푼을 더하면 또한 기맥을 통하게 하는 효과
가 있다. 본 처방에 인삼으로 적하수오를 대체하면 인삼백하오관중탕이라 하며, 당귀로 적하수오를
대체하면 당귀백하오관중탕이라 한다. 옛 처방으로 건강・량강・청피・진피 등을 같은 분량으로
하여 다리거나 환을 만든 것을 관중탕이라 하는데, 일찍이 소음인이 소변이 시원하지 않고, 양도가
일어나지 않으며, 사지가 무겁고 늘어져 힘이 없는 경우에 썼는데 반드시 효과가 있는 것이 백발백
중이었다. 또 관중환 본 처방에 오령지・익지인 각1돈을 더하면 복통을 치료하는데 신묘한 효과가
있다.

蒜蜜湯
산밀탕

白何首烏・白朮・白芍藥・桂枝・茵陳・益母草・赤石脂・罌粟殼 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚, 大
蒜・五根 淸蜜, 半匙.
백하수오・백출・백작약・계지・인진・익모초・적석지・앵속각 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개, 대산
5뿌리, 청밀 반 숟가락.

治痢疾.
이질을 치료한다.

鷄蔘膏
계삼고

人蔘 一兩, 桂皮 一錢, 鷄 一首.
인삼 1냥, 계피 1돈, 닭 1마리.

濃煎服, 或以胡椒, 淸蜜, 助滋味, 無妨. 此方, 自古有方, 治瘧疾, 痢疾, 神效. 嘗治久瘧, 先用巴豆, 通利
大便, 後數三日連用, 鷄蔘膏, 快效, 桂皮, 或以桂心, 代用.

진하게 달여서 복용하는데, 혹은 호초, 청밀로 맛을 돋우는 것도 무방하다. 이 처방은 예로부터 있던 처방으로 학질, 이질을 치료하는데 신묘한 효과가 있다. 일찍이 오래된 학질에 먼저 파두를 써서 대변을 보게 하고, 이어 수삼일을 연이어 계삼고를 쓰니 아주 효과가 있었다. 계피는 혹은 계심으로 바꾸어 대신 쓸 수 있다.

巴豆丹

파두단

巴豆 一粒. 去殼取粒, 溫水吞下, 全粒, 或半粒, 仍煎湯藥. 以煎藥時刻, 巴豆, 獨行腸胃間, 太半用力, 然後, 服湯藥, 則湯藥, 可以與巴豆, 同行. 通快腹胃, 升提其氣也. 再煎湯藥, 大便通後, 又連服之. 巴豆全粒, 下利, 半粒, 化積.

파두 한 알. 껍질을 제거하고 알갱이를 따뜻한 물로 한 알 또는 반 알을 먹으며, 이어 탕약을 달인다. 약을 달이는 시각에 파두는 홀로 장위 사이에 작용하며 거의 약력이 쓰여진 후에 탕약을 복용하면 파두와 같이 다니며 장위를 시원하게 통하게 하며 그 기운을 끌어올리게 된다. 다시 약을 달여서 대변이 통한 후에 다시 연이어 복용해야 한다. 파두 한 알은 설사를 시키고, 반 알은 적을 없앤다.

人蔘陳皮湯

인삼진피탕

人蔘 一兩, 生薑・砂仁・陳皮 各一錢, 大棗 二枚.

인삼 1냥, 생강・사인・진피 각1돈, 대조 2개.

本方, 以炮乾薑, 易生薑, 又加桂皮一錢, 則尤有溫胃逐冷之力. 以本方, 嘗治, 未周年, 小兒陰毒慢風, 連服數日, 病快愈矣. 病愈後, 更不服藥, 再發不治.

본 처방에 포건강으로 생강을 대체하거나 계피 1돈을 더하면 더욱 위를 덥히고 냉기를 쫓아내는 힘이 있게 된다. 본 처방으로 일찍이 돌이 되지않은 아이의 음독만경풍을 치료한 적이 있는데, 연이어 수 일 동안 복용시켜 병이 흔쾌히 나았으며, 병이 나은 후에 다시 약을 먹이지 않았더니 재발하여 치료할 수 없었다.

人蔘吳茱萸湯

인삼오수유탕

人蔘 一兩, 吳茱萸・生薑 各三錢, 白芍藥・當歸・官桂 各一錢.

인삼 1냥, 오수유・생강 각2돈, 백작약・당귀・관계 각1돈.

官桂付子理中湯

관계부자이중탕

人蔘 三錢, 白朮・乾薑炮・官桂 各二錢, 白芍藥・陳皮・炙甘草 各一錢, 付子炮 一錢, 或二錢.

인삼 3돈, 백출・포건강・관계 각2돈, 백작약・진피・자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

吳茱萸付子理中湯

오수유부자이중탕

人蔘・白朮・乾薑炮・官桂各二錢, 白芍藥・陳皮・炙甘草・吳茱萸・小茴香・破故紙各一錢, 付子炮 一錢, 或二錢.

인삼・백출・포건강・관계 각2돈, 백작약・진피・자감초・오수유・소회향・파고지 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

白何烏付子理中湯

백하오부자이중탕

白何首烏・白朮炒・白芍藥微炒・桂枝・乾薑炮 各二錢, 陳皮・炙甘草・付子炮 各一錢.

백하수오 · 백출(볶는다) · 백작약(약간 볶는다) · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 · 포부자 각1돈.

白何烏理中湯
백하오이중탕

白何首烏 · 白朮 · 白芍藥 · 桂枝 · 乾薑炮 各二錢, 陳皮 · 炙甘草 各一錢.

백하수오 · 백출 · 백작약 · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 각1돈.

有人蔘, 則用人蔘, 無人蔘, 則用白何首烏. 白何首烏, 與人蔘, 性味相近, 而清越之力, 不及, 溫補之力, 過之, 不無異同之處, 險病, 危證, 人蔘二錢以上, 不可全恃, 白何首烏代用, 古方, 經驗不多, 藥材生疎, 故也. 然, 此一味, 必不可遺棄於補藥中, 而古方, 何人飲, 用白何首烏五錢, 治瘧病.

인삼이 있으면 인삼을 쓰고, 인삼이 없으면 백하수오를 쓴다. 백하수오와 인삼은 그 성질과 기미가 서로 유사하나, 기운을 맑게 하고 널리 퍼지게 하는 힘은 미치지 못하고, 덥혀서 보하는 힘은 지나치니 같고 다름이 없지는 않다. 험병과 위증에 인삼 2돈 이상을 쓸 때는 백하수오로 모두 대신 쓸 수는 없다. 옛 처방에는 경험이 많지 않으므로 이 약재가 생소했던 것이다. 그러나 이 약만은 보약 중에서 뺄 수 없는 것이니, 옛 처방의 하인음은 백하수오 5돈을 써서 학질을 치료하였다.

右少陰人藥諸種, 付子, 炮用, 甘草, 灸用, 乾薑, 炮用, 或生用, 黃芪, 灸用, 或生用. 窮巷僻村, 病起倉卒, 雖單方, 猶百勝於束手無策. 陽明病, 雖單黃芪 · 桂皮 · 人蔘 · 芍藥, 亦可用. 少陰病, 雖單付子 · 芍藥 · 人蔘 · 甘草, 亦可用. 太陽病, 雖單蘇葉 · 蔥白 · 黃芪 · 桂枝, 亦可用. 太陰病, 雖單白朮 · 乾薑 · 陳皮 · 藿香, 亦可用. 爲先用單方, 而一邊求得全方, 則必無救病失機之理. 然, 當用, 全方中, 所有之藥, 不當用, 全方中, 所無之藥.

이상의 소음인의 여러 약 중에 부자는 구워서 쓰고, 감초는 볶아서 쓰며, 건강은 구워서 쓰거나 날 것으로 쓰고, 황기는 구워서 쓰거나 날 것으로 쓴다. 궁벽한 산간 벽지에서 갑자기 병이 생길 때, 속수무책으로 그냥 놔두는 것보다 비록 단방이라도 쓰는 것이 좋다. 양명병에 황기 · 계피 · 인삼 · 작약 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있으며, 소음병에 부자 · 작약 · 인삼 · 감초 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 태양병에 소엽 · 총백 · 황기 · 계지 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있고, 태음병에 백출 · 건강 · 진피 · 곽향 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 먼저 단방을 쓰더라도 한편으로 온전한 처방을 구하여 쓴다면 병을 고칠 기회를 놓치지 않을 것이다. 그러나 약을 쓸 때에는 처방 중에 들어 있는 약만을 써야 하며, 처방에 없는 것은 써서는 안 된다.

東醫壽世保元 卷之三

동의수세보원 3권

少陽人 脾受寒表寒病論(45條)

소양인 비수한표한병론(45조)

[9-1] 張仲景曰, 太陽病, 脈浮緊, 發熱惡寒, 身痛不汗出, 而煩躁者, 大青龍湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병에 맥이 부(浮)하고 긴(緊)하며 열이 나고 추위를 싫어하며 몸이 아프고 땀이 나지 않으면서 번조(煩燥)하면 대청룡탕(大靑龍湯)을 쓴다고 하였다.

[9-2] 論曰, 發熱惡寒, 脈浮緊, 身痛不汗出, 而煩躁者, 卽, 少陽人脾受寒表寒病也. 此證, 不當用, 大青龍湯, 當用, 荊防敗毒散.

나는 논하기를 열이 나고 추위를 싫어하며 맥이 부하고 긴하며 몸이 아프며 땀이 나지 않으면서 번조한 것은 곧 소양인의 비(脾)가 찬 것을 받아 걸이 찬 병이니 이 증에는 대청룡탕(大靑龍湯)은 쓰지 말고 형방패독산(荊防敗毒散)을 써야 한다.

[9-3] 張仲景曰, 少陽之爲病, 口苦, 咽乾, 目眩.

장중경(張仲景)이 말하기를 소양(少陽)의 병이 되면 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈앞이 어릿어릿하다.

[9-4] 眩而口苦, 舌乾者, 屬少陽.

눈앞이 어릿어릿하고 입이 쓰며 혀가 마르는 것은 소양(少陽)에 속한다.

[9-5] 口苦, 耳聾, 胷滿者, 少陽傷風證也.

입이 쓰고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것은 소양상풍증(少陽傷風證)이다.

[9-6] 口苦咽乾, 目眩耳聾, 胷脇滿, 或往來寒熱而嘔, 屬少陽, 忌吐下, 宜小柴胡湯和之.

입이 쓰고 목 안이 마르고 눈이 어릿어릿하고 귀가 먹고 가슴과 옆구리가 그득하며 또는 추웠다 더웠다 하며 구역질하는 것은 소양에 속하니 토법(吐法)과 하법(下法)은 경계해야 하고 소시호탕(小柴胡湯)으로 화해시켜야 한다고 하였다.

[9-7] 論曰, 此證, 不當用, 小柴胡湯, 當用荊防敗毒散・荊防導赤散・荊防瀉白散.

나는 말하기를 이와 같은 증에는 소시호탕(小柴胡湯)을 써서는 안 되고 형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 한다.

[9-8] 張仲景所論, 少陽病, 口苦咽乾, 胷脇滿, 或往來寒熱之證, 卽, 少陽人, 腎局陰氣, 爲熱邪所陷, 而脾局陰氣, 爲熱邪所壅, 不能下降, 連接於腎局, 而凝聚膈間, 膠固囚滯之病也. 此證, 嘔者, 外寒包裡熱, 而挾疾上逆也. 寒熱往來者, 脾局陰氣, 欲降未降而或降, 故寒熱或往或來也. 口苦, 咽乾, 目眩, 耳聾者, 陰氣囚滯膈間, 欲降未降, 故但寒無熱, 而至於耳聾也. 口苦咽乾, 目眩者, 例證也, 耳聾者, 重證也. 胷脇滿者, 結胷之漸也, 脇滿者, 猶輕也, 胷滿者, 重證也. 古人之於此證, 用汗吐下三法, 則其病, 輒生譴語壞證, 病益危險, 故仲景, 變通之, 而用小柴胡湯, 清痰燥痰, 溫冷相雜, 平均和鮮, 欲其病不轉變而自愈. 此法, 以汗吐下三法, 論之, 則可謂近善而巧矣. 然, 此小柴胡湯, 亦非平均和鮮, 病不轉變之藥, 則從古斯今, 得此病者, 真是寒心矣. 耳聾胷滿, 傷風之病, 豈可以小柴胡湯, 擬之乎. 噫, 後來, 龔信所製, 荊防敗毒散, 豈非少陽人, 表寒病, 三神山, 不死藥乎. 此證, 清裡熱, 而降表陰, 則痰飲自散, 而結胷之證, 預防不成也. 清痰, 而燥痰, 則無益於陰降痰散, 延拖結胷, 將成, 而或別生奇證也.

장중경(張仲景)이 말하기를 소양병에 입이 쓰고 목 안이 마르며 가슴과 옆구리가 그득하며, 또는 추웠다 더웠다 하는 증은 곧 소양인의 신국(腎局)의 음기(陰氣)가 열사(熱邪)에 빠지는 바가 되고, 비국(脾局)의 음기(陰氣)는 열사(熱邪)에 막히는 바가 되어 아래로 내려가서 신국에 연결하지 못하게 되어 등골 사이에 엉기어 모여 아교(阿膠)와 같이 굳어지면 갇혀서 막힌 병이다. 이 증에 구역이 나는 것은 바깥 찬 기운이 속의 열을 싸서 병을 끼고 위로 올라가기 때문이며, 한열(寒熱)이 왕래(往來)하는 것은 비국의 음기가 내려가려 하나 내려가지 못하다가 더러 내려가는 까닭에 한열이 왔다 갔다 하는 것이고, 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿하며 귀가 먹는 것은 음기가 등골 사이에 갇혀서 갇히게 되어 내려가지 못하는 까닭에 다만 출기만 하고 열이 없어서 귀가 먹게 되는 것이다. 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿한 것은 예사로운 증상이나 귀가 먹는 것은 중한 증상이다. 가슴과 옆구리가 그득한 것은 결흉(結胸)으로 진행되는 징조이나 옆구리가 그득한 것은 오히려 가벼운 것이고 가슴이 그득한 것은 중한 증상이다. 옛 사람들이 이 증에 한(汗)・토(吐)・하(下)의 삼법(三法)을 쓰면 번번이 헛소리하는 괴증(壞證)이 생겨서 병이 더욱 위험하게 되는 까닭에 중경(仲景)이 이것을 변통하여 소시호탕(小柴胡湯)을 이용하여 담(痰)을 맑게 하고 담을 마르게 하고 찬 약과 더운 약을 섞어서 골고루 화해시킴으로써 그 병의 전변(轉變)을 막아 스스로 낫도록 만 들고자 하는 것이다. 이러한 법을 한(汗)・토(吐)・하(下)의 삼법으로 논한다면 잘되었다고 할 만하나 이 소시호탕(小柴胡湯) 역시 골고루 화해시켜 병의 전변(轉變)을 막는 약은 아니니 옛날부터 지금까지 이러한 병을 얻은 자는 진실로 한심하다. 귀가 먹고 가슴이 그득한 상풍병(傷風病)이 어찌 소시호탕(小柴胡湯)으로 치료할 수 있겠는가? 아! 후세에 와서 공신(龔信)이 창제한 형방패독산(荊防敗毒散)이 어찌 소양인의 표한병(表寒病)의 삼신산불사약(三神山不死藥)이 아니겠는가? 이 증은

이열(裏熱)을 맑게 하고 표음(表陰)을 내리면 담음(痰飲)이 저절로 흩어지며 결흉(結胸)의 증도 예방하여 생기지 못하게 할 것이다. 담을 맑게 하거나 말리면 음을 내리고 담을 흩어지게 하는 데 이익이 없고 공연히 병을 끌어오다가 장차 결흉(結胸)이 될 것이며, 또는 다른 괴상한 증이 생기게 된다.

[9-9] 朱肱曰, 凡發汗, 腰以上, 雖淋漓, 而腰以下, 至足微潤, 則病終不鮮.

주굉(朱肱)이 말하기를 무릇 땀을 내는데 허리 이상에서는 비록 땀이 줄줄 흐르더라도 허리 아래와 발까지가 약간 축축하면 병이 결국 풀리지 않는다.

[9-10] 論曰, 少陽人病, 無論表裡病, 手足掌心有汗, 則病鮮. 手足掌心不汗, 則雖全體皆汗, 而病不鮮.

나는 논하기를 소양인의 병의 표병(表病)과 이병(裏病)을 막론하고 손·발바닥에 땀이 있으면 병이 풀리고 손바닥과 발바닥에 땀이 없으면 비록 전체에 모두 땀이 있다 하여도 병이 풀리지 못한다.

[9-11] 少陽人, 傷寒病, 有再痛三痛, 發汗而愈者, 此病, 非再三感風寒, 而再痛發汗, 三痛發汗也. 少陽人, 頭痛腦強, 寒熱往來, 耳聾胃滿, 尤甚之病, 元來如此, 表邪深結, 至於三痛然後, 方鮮也. 無論初痛再痛三痛, 用荊防敗毒散, 或荊防導赤散·荊防瀉白散. 每日二貼式, 至病鮮, 而用之, 病鮮後, 又用十餘貼, 如此, 則自無後病而完健.

소양인의 상한병(傷寒病)이 재통(再痛)하거나 삼통(三痛)하여 땀을 내고 낫는 경우가 있는데 이 병은 두 번, 세 번 풍한(風寒)에 감촉되어 재통에 땀을 내고 삼통에 땀을 내는 것이 아니다. 소양인이 머리가 아프고 뒤통수가 뻐뻐하며 추웠다 더웠다 하고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것이 더욱 심한 증은 원래 이러한 것이니, 표사(表邪)가 깊이 맺혀서 삼통에 이른 연후에야 바야흐로 풀리는 것이다. 초통(初痛)·재통(再痛)·삼통(三痛)을 막론하고 형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 매일 두 첩씩 쓰되 병이 풀릴 때까지 쓰며 병이 풀린 후에도 10여 첩을 더 쓸 것이니, 이렇게 하면 저절로 뒤탈이 없고 완전히 건강해질 것이다.

[9-12] 張仲景曰, 少陽證, 澼澼汗出, 心下痞硬滿, 引脇下痛, 乾嘔短氣, 不惡寒, 表鮮裡未和也, 宜十棗湯. 若合下不下, 令人脹滿, 遍身浮腫.

장중경(張仲景)이 말하기를 소양증(少陽證)에 축축하게 땀이 나고 명치 아래가 더부룩하고 뚫뚫하고 그득하고 옆구리가 당기며 아래까지 아프고 헛구역이 나고 숨을 짧게 쉬되 추위를 싫어하지 않는 것은 밖은 풀렸으나 속은 풀리지 못한 것이니 십조탕(十棗湯)이 좋다. 만일 하법(下法)을 써야 하는데 하법(下法)을 쓰지 않으면 그 사람은 창만(脹滿)이 생기고 온몸에 부종(浮腫)이 생기게 된다.

[9-13] 傷寒, 表未鮮, 醫反下之, 膈內拒痛, 手不可近, 心下滿, 而硬痛, 此爲結胃, 宜大陷胃湯.

상한(傷寒)에 표증(表證)이 풀리지 않았는데 의사가 잘못하여 하법(下法)을 쓰면 흉격(膈膈) 안이 막히어 아파서 손을 댈 수 없으며 명치 아래가 그득하고 뚫뚫하며 아픈 것은 결흉(結胸)이 된 것으로 대함흉탕(大陷胸湯)이 좋다.

[9-14] 渴欲飲水, 水入即吐, 名曰水逆, 五苓散主之.

갈증이 나서 물을 마시고자 하나 물이 들어가면 곧 토하는 것을 수역(水逆)이라 하는데 오령산(五苓散)을 주로 쓴다.

[9-15] 杜壬曰, 裡未和者, 蓋痰與燥氣, 壅於中焦, 故頭痛, 乾嘔, 汗出, 痰隔也, 非十棗湯, 不治.

두임(杜壬)이 말하기를 속이 아직 풀리지 않은 것은 대개 담(痰)과 조(燥)한 기운이 중초(中焦)에 막힌 것이다. 그러므로 머리가 아프고 헛구역을 하고 땀이 나는 것은 담이 막힌 것이니 십조탕(十棗湯)이 아니면 치료하지 못한다.

[9-16] 龔信曰, 心下硬痛, 手不可近, 燥渴譫語, 大便實, 脈沉實有力, 爲大結胃, 大陷胃湯, 下之, 反加煩躁者, 死. 小結胃, 正在心下, 按之, 則痛, 宜小陷胃湯.

공신(龔信)이 말하기를 명치 아래가 뚫뚫하고 아파서 손을 가까이 대지 못하고 조갈(燥渴)증이 나고

헛소리를 하며 변비가 심하고 맥이 침(沈)하며 실(實)하고 힘이 있는 것을 대결흉(大結胸)이라 하는데 대함흉탕(大陷胷湯)으로 설사시켜야 한다. 이때 도리어 번조(煩燥)증이 더하게 되면 죽는다. 소결흉(小結胷)은 바로 명치 아래에 있어서 누르면 아픈 것이니 소함흉탕(小陷胷湯)이 마땅하다.

[9-17] 論曰, 右張仲景, 所論三證, 皆結胷病, 而膈內拒痛, 手不可近, 燥渴譫語者, 結胷之最尤甚證也. 飲水水入, 卽吐, 心下痞硬滿, 乾嘔短氣者, 次證也. 凡結胷病, 皆藥湯入口, 輒還吐, 惟甘遂末入口, 口涎含下, 因以溫水, 嗽口, 而下, 則藥不還吐. 嘗治結胷, 用甘遂散, 溫水調下, 五次輒還吐, 至六次, 不還吐, 而下利一度. 其翌日, 又水還吐, 又用甘遂, 一次快通利, 而病愈. 凡結胷, 無非險證, 當先用甘遂, 仍煎荊防導赤散, 以壓之. 乾嘔短氣, 而藥不還吐者, 不用甘遂, 但用荊防導赤散, 加茯苓・澤瀉各一錢, 二三服, 又連日服, 而亦病愈. 燥渴譫語者, 尤極險證也, 急用甘遂, 仍煎地黃白虎湯, 三四貼, 以壓之, 又連日服地黃白虎湯. 張仲景曰, 傷寒表未解, 醫反下之云者, 以大承氣湯下之之謂也, 非十棗陷胷下之之謂也. 然, 十棗陷胷, 不如單用甘遂, 或用甘遂天一丸, 結胷, 甘遂末, 例用三分, 大結胷, 用五分. 龔信所論, 燥渴譫語煩躁死者, 若十棗湯下後, 因以譫語證, 治之, 連用白虎湯, 則煩躁者, 必無不治之理.

나는 논하기를 위의 장중경(張仲景)이 말한 세 가지 증은 모두 결흉병(結胷病)인데 흉격 안이 막히고 아파서 손을 댈 수 없고 입이 마르고 갈증이 나며 헛소리하는 것은 결흉(結胷)의 가장 심한 증상이고 물을 마시고 싶어 하나 물을 마시면 곧 토하고 명치 아래가 뚝뚝하고 그득하며 헛구역이 나고 숨이 찬 것은 그 다음 가는 증상이다. 대개 결흉병(結胷病)은 약을 먹으면 곧 토하는데 오직 감수(甘遂) 가루를 입에 넣어 침으로 삼키고 따뜻한 물로 양치질하여 넘기면 약을 도로 토하지 않는다. 일찍이 결흉을 치료하는데 감수산(甘遂散)을 따뜻한 물에 먹었더니 다섯 번은 도로 토하고 여섯 번째에 이르러 다시 토하지 않고 설사를 한 차례 했다. 이튿날 또 물을 마시면 토하여 다시 감수(甘遂)를 사용하니 바로 설사를 하고 병이 나았다. 무릇 결흉은 험증(險證)이 아닌 것이 없으니 마땅히 먼저 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 형방도적산(荊防導赤散)을 달여 먹여서 병을 눌러야 한다. 헛구역질하고 숨이 차나 약을 다시 토하지 않는 경우에는 감수(甘遂)를 쓰지 말고 단지 형방도적산(荊防導赤散)에 백복령(白茯苓)과 택사(澤瀉) 각각 1돈을 더 넣어서 쓰는데 2,3회 먹되 또 연일(連日) 먹으면 역시 병이 낫는다. 조갈(燥渴)하고 헛소리하는 것은 더욱 심한 험증(險證)이니 급히 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 지황백호탕(地黃白虎湯) 3,4첩으로 누르고 또 연일 지황백호탕(地黃白虎湯)을 먹는다. 장중경(張仲景)이 말하길 상한(傷寒)에 표증(表證)이 아직 풀리지 않았는데 의사가 도리어 설사시킨다고 한 것은 승기탕(承氣湯)으로 설사시킨 것을 이르는 것이며 십조탕(十棗湯)이나 함흉탕(陷胷湯)을 이르는 것은 아니다. 그러나 십조탕(十棗湯)과 함흉탕(陷胷湯)도 감수(甘遂) 한 가지만 사용하거나 또는 감수천일환(甘遂天一丸)을 쓰는 것만 못하다. 결흉(結胷)에 감수(甘遂) 가루를 보통 3푼(分)을 쓰고 대결흉(大結胷)에는 5푼(分)을 쓴다. 공신(龔信)이 말한 바 조갈(燥渴)하고 헛소리를 하며 번조(煩躁)하여 죽을 지경인 경우에도 만일 십조탕(十棗湯)으로 설사시킨 후에 헛소리하는 증을 다스리고 연이어 백호탕(白虎湯)을 사용하면 번조(煩躁)한 것도 반드시 치료하지 못할 수 없다.

[9-18] 甘遂, 表寒病, 破水結之藥也. 石膏, 裡熱病, 通大便之藥也. 表病, 可用甘遂, 而不可用石膏, 裡病, 可用石膏, 而不可用甘遂. 然, 揚手擲足, 引飲泄瀉證, 用石膏, 痺風膝寒, 大便不通證, 用甘遂. 감수(甘遂)는 표한(表寒)병에 물이 막힌 것을 헤치는 약이고, 석고는 이열(裏熱)병에 대변을 통하게 하는 약이다. 표병에는 감수(甘遂)를 쓸 수 있으나 석고는 쓸 수 없고, 이병에는 석고를 쓸 수 있으나 감수(甘遂)는 쓸 수 없다. 그러나 손발을 내젓고 물을 들이키고 설사를 하는 증에는 석고를 써야 하고, 팔・다리가 저리고 무릎이 시리고 대변이 막힌 증에는 감수(甘遂)를 써야 한다.

[9-19] 少陰人, 傷寒病, 有小腹硬滿之證. 少陽人, 傷寒病, 有心下結胷之證. 此二證, 俱是表氣陰陽, 虛弱, 正邪相爭, 累日不決之中, 裡氣亦秘滯不和, 而變生此證也.

소음인의 상한(傷寒)병에 아랫배가 뚝뚝하고 그득한 증이 있고, 소양인의 상한(傷寒)병에 명치 아래에 결흉(結胸)증이 있으니, 이 두 가지 증은 다 같이 표기(表氣)의 음양이 허약하여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 다투어 여러 날 깨유되지 못하는 증에 속의 기운 역시 비삽(秘滯)하고 고르지 못하여 이와 같은 증세로 변한 것이다.

[9-20] 李子建, 傷寒十勸論曰, 傷寒腹痛, 亦有熱證, 不可輕服溫煖藥. 又曰, 傷寒自利, 當觀陰陽證, 不可例服, 溫煖及止瀉藥.

이자건(李子建)의 《상한십권(傷寒十勸)》에 말하기를 상한(傷寒)에 배가 아픈 것에 열증도 역시 있으니 가벼이 온난한 약을 복용해서는 안 된다. 또 말하기를 상한(傷寒)에 저절로 설사가 나는 것은 마땅히 음증인지 양증인지 보아야 할 것이니 예사로이 온난한 약이나 설사를 막는 약을 복용해서는 안 된다.

[9-21] 朱震亨曰, 傷寒陽證, 身熱脈數, 煩渴引飲, 大便自利, 宜柴苓湯.

주진형(朱震亨)이 말하기를 상한(傷寒)의 양증에 몸에서 열이 나고 맥이 삭(數)하며 조갈(煩渴)하여 물을 찾으며 대변이 저절로 설사하는 경우에는 시령탕(柴苓湯)이 마땅하다.

[9-22] 盤龍山老人, 論曰, 少陽人, 身熱頭痛泄瀉, 當用, 猪苓車前子湯・荊防瀉白散, 身寒腹痛泄瀉, 當用, 滑石苦參湯・荊防地黃湯. 此病, 名謂之亡陰病.

반룡산(盤龍山) 노인이 말하기를 소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사하는 경우에는 당연히 저령차전자탕(猪苓車前子湯)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 쓸 것이며 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우에는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦參湯)이나 형방지황탕(荊防地黃湯)을 써야 한다. 이러한 병을 망음병(亡陰病)이라 한다.

[9-23] 少陽人, 身熱頭痛泄瀉, 一二日, 或三四日, 而泄瀉無, 故自止, 身熱頭痛, 不愈, 大便反秘者, 此, 危證也, 距諺語不遠.

소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사가 있다가 1,2일 또는 3,4일 후에 설사가 이유 없이 그치나 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 낫지 않으며 대변이 도리어 막히는 것은 이것은 위증(危證)이니 머지않아 헛소리를 하게 된다.

[9-24] 泄瀉後, 大便, 一晝夜間, 艱辛一次滑利, 或三四五次, 小小滑利, 身熱頭痛, 因存者. 此, 便秘之兆也, 諺語前, 有此證, 則諺語當在數日, 諺語後, 有此證, 則動風必在咫尺.

설사한 후에 1주야간(晝夜間)에 간신히 한 번 활변(滑便)을 보거나 또는 3, 4, 5회 조금씩 활변(滑便)을 보고 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 그대로 있는 것은 변비가 될 징조다. 헛소리하기 전에 이러한 증상이 있으면 헛소리를 며칠 사이에 반드시 할 것이고, 헛소리한 후에 이러한 증상이 있으면 반드시 금방 풍이 일어날 것이다.

[9-25] 少陽人, 忽然有吐者, 必生奇證也, 當用荊防敗毒散, 以觀動靜, 而身熱頭痛泄瀉者, 用石膏無疑, 身寒腹痛泄瀉者, 用黃連, 苦參無疑.

소양인이 갑자기 토하는 것은 반드시 괴상한 증상이 생길 것이니 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓴 후 그 동정을 살펴서 몸에 열이 있고 머리가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 석고를 써야 하고, 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 황련(黃連)과 고삼(苦參)을 써야 한다.

[9-26] 嘗見, 少陽人兒, 生未一周年, 忽先一吐, 而後泄瀉, 身熱頭痛, 揚手擲足, 轉輾其身, 引飲泄瀉, 四五六次, 無度數者, 用荊防瀉白散, 日三貼, 兩日六貼然後, 泄瀉方止, 身熱頭痛, 清淨, 又五六貼而安. 일찍이 돌이 채 안된 소양인 아이가 갑자기 한 번 토한 다음 설사를 하고 몸에 열이 있고 머리가 아프며 손발을 내젓고 몸을 옆치락뒤치락하며 물을 많이 마시고 설사를 4,5,6회 하여 헛수를 알 수 없는 것을 형방사백산(荊防瀉白散)을 하루에 3첩, 이틀에 6첩을 쓰고서야 설사가 그치고 몸에 열이 나고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어졌다. 다시 5,6첩을 더 쓰고 안정이 되었다.

[9-27] 少陽人, 身熱頭痛, 揚手擲足, 引飲者, 此, 險證也, 雖泄瀉, 必用石膏. 無論, 泄瀉有無, 當用荊防瀉白散, 加黃連・瓜蒌 各一錢, 或地黃白虎湯.

소양인이 몸에 열이 나고 머리가 아프며 손발을 내젓고 물을 많이 마시는 것은 이것은 위험한 증상

이니 비록 설사를 하여도 반드시 석고를 사용해야 하니 설사가 있고 없음을 막론하고 마땅히 형방사백산(荊防瀉白散)에 황련과 과루인을 각각 1돈(錢)을 더 넣고 쓰든지 아니면 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 한다.

[9-28] 凡少陽人, 有身熱頭痛, 則已非輕證, 而兼有泄瀉, 則危險證也. 必用荊防瀉白散, 日二三服, 又連日服, 身熱頭痛, 清淨然後, 可免危險.

무릇 소양인이 몸에 열이 있고 머리가 아프면 이미 가벼운 증상이 아닌데 겹하여 설사를 하는 것은 위험한 증상이니 반드시 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하는데 하루에 2,3회 복용하고 또한 연일 복용하여 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어진 뒤라야 비로소 위험을 면할 수 있다.

[9-29] 少陽人, 身寒腹痛泄瀉, 一晝夜間, 三四五次者, 當用滑石苦參湯, 身寒腹痛, 二三晝夜間, 無泄瀉, 或艱辛一次泄瀉者, 當用滑石苦參湯, 或用熟地黃苦參湯.

소양인이 몸이 차고 배가 아프며 하루 밤낮 동안 설사를 3, 4, 5회 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦參湯)을 써야 하고 몸이 차고 배가 아프나 2,3일 밤낮을 설사를 하지 않거나 또는 간신히 1번 설사를 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦參湯)을 쓰거나 또는 숙지황고삼탕(熟地黃苦參湯)을 써야 한다.

[9-30] 嘗見, 少陽人, 恒有腹痛患苦者, 用六味地黃湯, 六十貼, 而病愈, 又見, 少陽人, 十餘年, 腹痛患苦, 一次起痛, 則或五六個月, 或三四個月, 一二個月, 叫苦者, 每起痛臨時, 急用滑石苦參湯, 十餘貼, 不痛時, 平心靜慮, 恒戒哀心怒心, 如此延拖, 一周年, 而病愈, 又見少陽人, 少年兒, 恒有滯證痞滿, 間有腹痛腰痛, 又有口眼喎斜, 初證者, 用獨活地黃湯, 一百日內, 二百貼服, 使之平心靜慮, 恒戒哀心怒心, 一百日, 而身健病愈.

일찍이 한 소양인이 항상 배가 아파서 고통 받는 사람을 본 일이 있는데 육미지황탕(六味地黃湯) 60첩을 쓰고 병이 나았다. 또 10여 년 동안 복통으로 고생하는 소양인을 본 일이 있는데 한 번 아프기 시작하면 5-6개월 또는 3-4개월, 1-2개월 동안 고통을 호소하였는데 매번 아프기 시작할 때마다 급히 활석고삼탕(滑石苦參湯) 10여 첩을 쓰고 아프지 않을 때에는 마음을 편안케 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 화내는 마음을 경계하였다. 그렇게 하기를 1년을 하였더니 병이 나았다. 또 소양인 소년이가 항상 체증(滯症)이 있어 배가 더부룩하고 그득하며 간혹 배가 아프고 허리가 아팠으며, 또 구안와사(口眼喎斜) 초기 증상이 있는 것을 보았는데 독활지황탕(獨活地黃湯)을 100일 안에 200첩을 먹이고 마음을 편안히 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 노여워하는 마음을 경계하게 하였더니 100일 이 되어 몸이 건강해지고 병이 나았다.

[9-31] 古醫, 有言頭無冷痛, 腹無熱痛, 此言非也. 何謂然耶. 少陰人, 元來冷勝, 則其頭痛, 亦自非熱痛, 而即冷痛也. 少陽人, 元來熱勝, 則其腹痛, 亦自非冷痛, 而即熱痛也, 古醫, 又言汗多陽, 下多陰, 此言是也. 何謂然耶. 少陰人, 雖, 則冷勝, 然, 陰盛格陽, 敗陽外遁, 則煩熱, 而汗多也, 此之謂陽病也. 少陽人, 雖則熱勝, 然, 陽盛格陰, 敗陰內遁, 則畏寒而泄下也, 此之謂陰病也. 陽病, 非用藥, 必死也, 不急治, 必死也.

옛 의사들이 머리는 차서 아픈 경우는 없고 배는 더워서 아픈 경우는 없다고 하였는데 이 말은 틀린 말이다. 어째서 그런가 하니 소음인은 원래 찬 기운이 많기 때문에 머리 아픈 것도 역시 더워서 아픈 것이 아니고 차서 아픈 것이며, 소양인은 원래 더운 기운이 많기 때문에 배가 아픈 것도 역시 차서 아픈 것이 아니라 더워서 아픈 것이다. 옛 의사들이 또한 말하기를 땀을 많이 흘리면 망양(陽)이 되고 설사를 많이 하면 망음(陰)이 된다고 하였는데 이 말은 맞는 말이다. 어째서 그런가 하니 소음인은 비록 찬 기운이 많다고 하나 그러나 음(陰)이 성(盛)하여 양(陽)과 다투어 패(敗)한 양(陽)이 밖으로 달아나게 되니 번열(煩熱)이 나며 땀을 많이 흘리게 된다. 이것을 일컬어 망양병(陽病)이라 한다. 소양인은 비록 더운 기운이 많으나 그러나 양이 성하여 음과 다투어 패한 음이 안으로 도망가니 찬 것을 두려워하고 설사를 많이 하게 되는데 이것을 일컬어 망음병(陰病)이라 한다. 망양병(陽病)과 망음병(陰病)은 약을 쓰지 않으면 반드시 죽고 급히 치료하지 않으면 반드시 죽는다.

[9-32] 陽者，陽不上升，而反爲下降，則陽也。陰者，陰不下降，而反爲上升，則陰也。陰盛格陽於上，則陽爲陰抑，不能上升於胃膈，下陷大腸，而外通膀胱，故背表煩熱，而汗出也。煩熱，而汗出者，非陽盛也，此所謂內冰外炭，陽將亡之兆也。陽盛格陰於下，則陰爲陽壅，不能下降於膀胱，上逆背膈，而內通膈裡，故腸胃畏寒，而泄下也。畏寒，而泄下者，非陰盛也，此所謂內炭外冰，陰將亡之兆也。

망양(亡陽)이라는 것은 양이 위로 올라가지 못하고 도리어 아래로 내려가게 되어 망양(亡陽)이라 하고, 망음(亡陰)이라는 것은 음이 아래로 내려가지 못하고 도리어 위로 올라가게 되어 망음(亡陰)이라 한다. 음이 성하여 위에서 양과 다투면 양이 음에게 억눌리게 되어 흉격(胸膈)에 올라가지 못하고 아래로 대장에 빠져 밖으로 방광에 도망하니 등의 겉에 번열하면서 땀이 난다. 번열하면서 땀이 나는 것은 양이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 얼음 같고 밖은 숯불 같다는 것이니 양이 장차 없어지려는 징조이다. 양이 성하여 아래에서 음과 다투면 음이 양에게 막힘을 받아 방광으로 내려가지 못하고 위로 배려로 거슬러 올라가서 흉격 속으로 도망하니 장위(腸胃)가 찬 것을 싫어하고 설사를 한다. 찬 것을 두려워하고 설사하는 것은 음이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 숯불 같고 밖은 얼음 같다는 것이니 음이 장차 없어지려는 징조이다.

[9-33] 少陰人病，一日發汗，陽氣上升，人中穴，先汗，則病必愈也，而二日三日，汗不止，病不愈，則陽不上升，而亡陽無疑也。少陽人病，一日滑利，陰氣下降，手足掌心，先汗，則病必愈也，而二日三日，泄不止，病不愈，則陰不下降，而亡陰無疑也。凡亡陽亡陰證，明知醫理者，得病前，可以預執證也。得病一二日，明白易見也，至于三日，則雖患者，執證，亦明若觀火矣。用藥，必無過二三日矣，四日，則晚矣，五日，則臨危也。

소음인의 병에 첫날 땀을 내는데 양기(陽氣)가 위로 올라가 인중혈(人中穴)에서 먼저 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 땀이 멈추지 않고 병이 낫지 않는 것은 양이 위로 올라가지 못하는 것이니 망양(亡陽)임을 의심할 필요가 없다. 소양인의 병에 첫날 설사를 시켜서 음기(陰氣)가 아래로 내려가 손바닥과 발바닥에서 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 설사가 그치지 않고 병이 낫지 않는 것은 음이 아래로 내려가지 못하는 것이니 망음(亡陰)임을 의심할 필요가 없다. 무릇 망양증(亡陽證)과 망음증(亡陰證)은 의학의 이치를 명확히 아는 경우라야 병들기 전에 미리 증을 파악하여 예방할 수 있고 병든 지 1,2일이 지나면 명백하게 쉽게 알 수 있다. 3일이 되면 비록 우둔한 사람이라도 증세를 알아내는 것이 역시 불을 보는 것처럼 환할 것이다. 약을 씹에 있어서 반드시 2,3일을 넘기지 말아야 할 것이다. 4일이면 늦을 것이고 5일이면 위태로울 것이다.

[9-34] 少陰人，平居，裡煩汗多者，得病，則必成亡陽也。少陽人，平居，表寒下多者，得病，則必成亡陰也。亡陽亡陰人，平居，預治補陰補陽，可也。不可至於亡陽亡陰得病，臨危然後，救病也。

소음인으로 평상시에 속이 답답하고 땀이 많은 경우에 병이 생기면 반드시 망양(亡陽)이 되고, 소양인으로 평상시 겉이 차고 설사를 많이 하는 경우에 병이 생기면 반드시 망음(亡陰)이 된다. 망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 되는 사람은 평상시 음을 보하거나 양을 보하여 미리 치료하는 것이 마땅하고 망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 이르러 병을 얻어 위험하게 된 연후에 병을 치료하는 것은 마땅하지 않다.

[9-35] 少陰人，病愈之汗，人中先汗，而一次發汗，胃膈，壯快，而活潑，亡陽之汗，人中，或汗或不汗，屢次發汗，胃膈，悶燥，而下陷也。少陽人，病愈之泄，手足掌心先汗，而一次滑泄，表氣清寧，而精神爽明，亡陰之泄，手足掌心不汗，屢次泄利，表氣溯寒，而精神鬱冒。

소음인의 병이 낫는 경우의 땀은 인중(人中)에서 먼저 땀이 나고 한 번 발한(發汗)시켜도 가슴이 시원하고 활발해지나 망양(亡陽)이 된 경우의 땀은 인중(人中)에서 땀이 나고 나지 않음에 관계없이 여러 번 땀을 내도 가슴이 답답하고 조(躁)하며 기운이 없어진다. 소양인이 병이 낫는 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에 먼저 땀이 나고 한 번 설사시켜도 바깥 기운이 맑고 평안해지고 정신이 상쾌하고 명랑해지나, 망음(亡陰)이 된 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에서 땀이 나지 않고 여러 번 설사를 시켜도 바깥 기운이 거슬러서 차고 정신이 흐릿하다.

[9-36] 少陰人胃家實病, 少陽人結胃病, 正邪陰陽, 相敵, 而相格, 故日久, 而後, 危證始見也. 少陰人入陽病, 少陽人入陰病, 正邪陰陽, 不敵, 而相格, 故初證, 已爲險證, 繼, 而因爲危證矣. 譬如用兵, 合戰交鋒, 初一日合戰, 正兵, 爲邪兵所敗, 折正兵幾許兵數, 二日, 又戰又敗, 又折幾許數, 三日, 又戰又敗, 又折幾許數, 以三日交鋒, 觀之, 則將愈益戰, 而愈益敗, 愈益折矣. 若四日復戰, 五日復戰, 則正兵之全軍覆沒, 可知矣. 所以用藥, 必無過三日也.

소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기(正氣)와 사기(邪氣), 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타나나, 소음인의 망양병(陽病)이나 소양인의 망음병(陰病)은 정기와 사기, 음과 양이 적수(敵手)가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 처음 증이 벌써험증(險證)이 계속되고 그로 인하여 위증(危證)이 되는 것이다. 병사(兵士)를 썸에 비유한다면 양군이 대전하여 첫날 싸워서 정병(正兵)이 사병(邪兵)에 패하게 되어 정병의 얼마의 병수를 잃고 2일에 또 싸워서 다시 패하여 병사의 얼마를 다시 잃고 3일에 다시 싸워 또 패하여 병사의 얼마를 다시 잃으니 이 3일간 싸운 것으로 본다면 장차 싸움이 계속될수록 계속 패하게 되어 더욱더 병사를 잃을 것이다. 만일 4일에 다시 싸우고 5일에 다시 싸운다면 정병의 전군이 전멸할 것을 가히 알 수 있다. 그렇기 때문에 약을 썸에 있어서도 반드시 3일을 넘겨서는 안 된다.

[9-37] 盤龍山, 老人者, 李翁所居地, 有盤龍山, 故李翁, 自謂盤龍山老人也. 此書中, 論曰二字, 無非盤龍山老人之論, 而此章, 特舉盤龍山老人者, 蓋入陽入陰, 最是險病, 而人必尋常視之, 易於例治, 故別以盤龍山老人, 提舉驚呼, 而警覺之也.

반룡산(盤龍山) 노인이란 것은 이가(李家) 노인이 살고 있는 곳에 반룡산(盤龍山)이 있기 때문이니 이가(李家) 노인이 스스로 반룡산 노인이라 한 것이다. 이 책 가운데 '나는 논하기를'이라고 말한 구절은 반룡산 노인의 말이 아닌 것이 없으나 이 장에서 특히 반룡산 노인이라고 들어 말한 것은 대개 망양(陽)과 망음(陰)은 가장 험한 증인데도 사람들이 심상하게 보아서 예사로이 쉽게 치료하므로 특별히 반룡산 노인의 이름으로 크게 외쳐 경각심을 가지도록 하는 것이다.

[9-38] 入陰證, 古醫別無經驗用藥頭話, 而李子建·朱震亨書中, 若干論及之. 然, 自無明的快驗, 蓋此病, 從古以來, 殺人孟浪甚速, 未暇經驗獵得裡許, 故也.

망음증(入陰證)에 대하여서는 옛 의사들이 별로 약을 쓰는 경험에 대해서 말한 이가 없고 이자건(李子建)·주진형(朱震亨)의 저서 중에 약간 언급하였으나 그러나 명확한 경험은 없다. 이 병은 예로부터 지금까지 사람을 죽이는 것이 맹랑하고 매우 신속해서 경험으로 이치를 찾아낼 겨를이 없었기 때문이다.

[9-39] 張仲景曰, 太陽病不解, 轉入少陽者, 脇下硬滿, 乾嘔不能食, 往來寒熱者, 尚未吐下, 脈沈緊者, 與小柴胡湯, 若已吐下, 發汗譫語, 柴胡證罷, 此爲壞證, 依壞法治之.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 풀리지 않아 소양(少陽)으로 전입(轉入)된 것은 옆구리 아래가 뚫뚫하고 그득하며 헛구역이 나고 먹지를 못하고 추웠다 더웠다 하는 것이니 아직 토하거나 설사시키지 않고 맥이 침(沈)·긴(緊)한 경우라면 소시호탕(小柴胡湯)을 투여한다. 만일 이미 토하게 하거나 설사시키거나 땀을 내어 헛소리하는 것은 시호증(柴胡證)이 없어진 것이고 이것을 괴병(壞病)이라 하니 괴병(壞病) 치법에 의거해야 한다.

[9-40] 傷寒, 脈弦細, 頭痛發熱者, 屬少陽, 不可發汗, 發汗則譫語.

상한(傷寒)에 맥이 현(弦)하고 세(細)하며 머리가 아프고 열이 나는 것은 소양(少陽)에 속하니 땀을 내서는 안 되는데 땀을 내면 헛소리한다.

[9-41] 嘗治, 少陽人, 傷寒發狂譫語證, 時, 則乙亥年, 清明節候也. 少陽人, 一人, 得傷寒, 寒多熱少之病, 四五日後, 午未辰刻, 喘促短氣, 伊時, 經驗未熟, 但知少陽人應用藥, 六味湯, 最好之理, 故不敢用他藥, 而紙用六味湯一貼, 病人喘促, 即時頓定, 又數日後, 病人, 發狂譫語, 喘促, 又發, 又用六味湯一貼, 則喘促, 雖少定, 而不如前日之頓定矣. 病人, 發狂連三日, 午後喘促, 又發, 又用六味湯, 喘促, 略不少定, 有頃, 舌卷動風, 口噤不語, 於是, 而始知六味湯之無能爲也. 急煎白虎湯, 一貼, 以竹管, 吹入病

人鼻中下咽, 而察其動靜, 則舌卷口噤之證, 不鮮, 而病人腹中, 微鳴. 仍以兩爐煎藥, 荏苒灌鼻, 數三貼後, 病人腹中, 大鳴, 放氣出焉. 三人扶持病人, 竹管吹鼻灌藥, 而病人氣力, 益屈強, 三人扶持之力, 幾不能支當矣. 又荏苒灌鼻, 自未申時, 至亥子時, 凡用石膏八兩. 未境, 病人腹中, 大脹, 角弓反張之證, 出焉, 角弓反張後, 少頃, 得汗, 而睡, 翌日平明, 病人, 又服白虎湯, 一貼, 日出後, 滑便一次, 而病快愈. 愈後, 有眼病, 用石膏・黃栢末各一錢, 日再服, 七八日後, 眼病, 亦愈. 伊時, 未知大便驗法, 故不察大便之秘閉幾日, 然, 想必此病人, 先自表寒病, 得病後, 有大便秘閉, 而發此證矣.

일찍이 소양인 상한(傷寒)에 발광(發狂)을 하고 헛소리하는 것은 치료한 적이 있는데 때는 을해년(乙亥年) 청명(淸明) 시기였다. 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 한(寒)이 많고 열(熱)이 적은 병에 걸려 4-5일 후 오미시(午未時)에 숨이 차고 호흡이 급한데 이때에 경험이 부족하여 단지 소양인의 약을 씹어 육미탕(六味湯)이 최고로 좋은 줄만 알아서 감히 다른 약은 쓸 생각을 못하여 다만 육미탕 1첩을 썼더니 병인이 숨이 찬 것이 즉시 진정되었다. 또 수일 후에 병인이 발광(發狂)하고 헛소리하며 숨이 찬 것이 다시 발생하여 또 육미탕 1첩을 썼는데 숨이 찬 것이 비록 조금 안정되었으나 전 일과 같이 진정되지는 않았다. 병인이 3일을 이어서 발광하더니 오후에 숨이 찬 것이 다시 발생하여 다시 육미탕을 쓰니 숨이 찬 것이 조금도 안정되지 못하고 잠시 있다가 혀가 말리고 풍이 동하며 이를 악물고 말을 못하게 되니 여기에 비로소 육미탕으로 될 수 없는 것을 알고 급히 백호탕(白虎湯) 1첩을 달여 대나무 관으로 병인의 코에 붙여넣어 목구멍으로 넘어가게 하고 그 동정을 살피니 혀가 말리고 이를 악문 증상은 풀리지 않고 환자의 뱃속에서 약간 소리가 났다. 그래서 2개의 화로로 약을 달여 계속해서 코에 3첩을 부어넣었더니 환자의 뱃속에서 큰 소리가 나고 방귀가 나왔다. 세 사람이 도와서 환자를 붙들고 대나무 관으로 코에 약을 붙여넣으니 환자의 기력이 더욱 강하여 세 사람이 도와서 붙드는 힘으로는 거의 당하지 못하였다. 다시 콧속으로 약을 부어 미신시(未申時)로부터 해자시(亥子時)에 이르기까지 석고를 8냥을 썼는데 마지막에 환자의 뱃속이 대단히 부르고 각궁반장(角弓反張)의 증세가 나더니 각궁반장한 후에 잠시 있다가 땀이 나고 잠이 들었다. 이튿날 동이 틀 때 환자에게 또 백호탕(白虎湯) 1첩을 먹고 해가 돋은 후에 활변(滑便)을 한 번 보고서 병이 나았다. 병이 나은 후에 눈병이 나서 석고와 황백(黃栢) 가루 각각 1돈을 하루에 2번씩 먹이니 7,8일 후에 눈병이 역시 나았다. 그때는 아직 대변으로 징험하는 법을 알지 못하였으므로 대변을 며칠이나 보지 못하였는지를 살피지 못하였으나, 생각컨대 그 환자는 먼저 표한(表寒)병을 얻은 후에 대변이 막혀서 이러한 증이 발생하였을 것이다.

[9-42] 其後, 又有, 少陽人, 一人, 得傷寒, 熱多寒少之病, 有人, 教服雉肉湯, 仍成陽毒發斑, 余教服白虎湯, 連三貼, 而其人, 只服半貼, 數日後, 譫語, 而病重, 病家懇急, 顛倒往觀, 則病人外證, 昏憤, 已有動風之漸, 而耳聾譫語, 舌上白胎. 藥囊, 祇有石膏一斤, 滑石 一兩, 而無他藥, 故急煎石膏 一兩, 滑石 一錢, 頓服, 而其翌日, 又服石膏 一兩, 滑石 一錢, 此兩日, 則大便, 皆不過一晝夜. 至于第三日, 病家, 以過用石膏, 歸咎, 故一日不用石膏矣. 至于第四日, 病家懇急, 顛倒往觀, 則病人大便秘閉, 兩夜一晝, 而語韻不分明, 牙關緊急, 水飲不入, 急煎石膏 二兩, 艱辛下咽, 而半吐半下咽, 少頃, 牙關開, 而語韻, 則不分明如前. 又連用石膏一兩, 其翌日, 則以午後動風, 藥不下咽之慮, 故預爲午前用藥, 以備動風, 而又五六日用之, 前後用石膏, 凡十四兩, 而未境, 發狂數日, 語韻宏壯, 而病愈, 數月然後, 方出門庭. 그 후에 또 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 열(熱)이 많고 한(寒)이 적은 병을 얻어 어떤 사람이 핑고기탕을 먹게 하여 이에 양독발반(陽毒發斑)이 되었기에 내가 이르기를 백호탕(白虎湯) 3첩을 계속 복용하라 하였으나 그 사람은 다만 반첩을 먹었다. 수일 후에 헛소리하고 병이 중하여 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니, 환자의 겉으로 나타난 증상은 정신이 혼미하여지고 벌써 풍이 동할 징조가 보이고 귀가 먹고 헛소리하고 혀 위에 백태(白苔)가 끼여 있었다. 약 주머니에 다만 석고 1근과 활석 1냥만 있고 다른 약은 없었으므로 급히 석고 1냥과 활석 1돈을 달여서 한꺼번에 먹이고 그 이튿날 또 석고 1냥, 활석 1돈을 먹었더니 2일간은 대변이 막힌 것이 하루 밤낮 밖에 지나지 않았다. 3일째가 되어 환자의 집에서 석고를 너무 많이 쓴다 하여 집으로 돌아왔기 때문에 그날은 석고를 쓰지 못했다. 4일째가 되어 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니 환자가 대변이 막힌 것이 이틀 밤을 지나고도 하루 낮이 되니 말이 분명하지 않고 입을 꼭 물어서 물 마시는 것이 들어가지 않았다. 급하게 석고 2냥을 달여 간신히 목구멍으로 넘겨 보내니 절반은 토하고 절반은 넘어가서 잠시 후에 입은 열렸으나 말이 분명치 못한 것은 전과 같았다. 다

시 석고 1냥을 연이어 쓰고 그 이튿날에는 오후에 풍이 동하면 약이 목구멍으로 넘어가지 못할 염려가 있어서 미리 오전에 약을 써서 풍이 동하는 것을 예방하고 또 5,6일 석고를 썼으니 전후(前後)로 쓴 석고가 무릇 14냥이 되었다. 나중에 수일 동안 발광(發狂)을 하고 나서 말소리가 웅장해지면서 병이 나았다. 수개월 후에 대문 밖을 나가게 되었다.

[9-43] 其後, 又有, 少陽人, 一人, 初得頭痛身熱, 表寒病, 八九日. 其間, 用黃連・瓜蒌・羌活・防風等屬, 病勢少愈, 而永不快祛矣. 仍爲發狂三日, 病家, 以尋常例證, 視之, 而祇用黃連・瓜蒌等屬. 又譫語數日, 始用地黃白虎湯, 一貼, 其翌日午後動風, 急煎地黃白虎湯, 連三貼救急, 而艱辛下咽, 其翌日, 則白虎湯, 加石膏 一兩, 午前用之, 以備動風, 而連三日用之. 病人, 自起坐立, 能大小便, 病勢比前, 快蘇快壯矣. 不幸病加於少愈, 慮不周於完治, 此人, 竟不救, 恨不午前, 祇用白虎湯, 二貼, 以備動風, 而午後, 全不用藥以繼之也. 以此三人病, 觀之, 則發狂譫語證, 白虎湯, 非但午前用藥, 以備動風, 而已矣. 日用五六貼, 七八貼, 十餘貼, 以晝繼夜, 則好矣. 不必待譫語後, 而用藥, 發狂時, 當用藥, 可也. 不必待發狂後, 而用藥, 發狂前, 早察發狂之漸, 可也.

그 후에 또 소양인 한 사람이 처음에 몸에 열이 나고 머리가 아픈 표한(表寒)병이 걸렸는데 그 사이에 황련(黃連)・과루인(瓜蒌仁)・강활(羌活)・방풍(防風) 등에 속하는 약을 썼으나 병세가 좀 낫기는 하나 사뭇 쾌히 낫지 못하더니 이어 발광한지 3일이 되었다. 환자의 집에서는 가벼운 일반적인 증상으로 보고 다만 황련과 과루인 등에 속하는 약만 쓰다가 또 헛소리한지 수일에 비로소 지황백호탕(地黃白虎湯) 1첩을 쓰기 시작했다. 그 다음날 오후에 풍이 동하여 급히 지황백호탕을 달여 3첩을 계속 써서 구급하니 간신히 목구멍으로 내려갔다. 그 다음날에도 백호탕(白虎湯)에 석고 1냥을 더하여 오전에 썼는데 풍이 동할 것을 대비하기 위함이고 3일을 계속하여 석고를 쓰니 환자가 스스로 일어나 앉고 서고 대소변도 보게 되어 병세가 전에 비하여 쾌히 덜하고 회복되었으나 불행하게도 병이 조금 낫다가 다시 나빠졌는데 내 생각이 완치하는 데까지 주밀하지 못하여 이 사람을 마침내 구원하지 못하였다. 한스러운 것은 오전에 다만 백호탕 2첩을 써서 풍이 동할 것을 예방하기만 하고 오후에는 전혀 약을 쓰지 않아서 이어주지 못하였다는 것이 잘못된 것이다. 이 세 사람의 병으로 살핀다면 발광(發狂)하고 헛소리하는 증에 백호탕을 다만 오전에만 써서 풍이 동할 것을 예방하기만 할 것이 아니라 하루에 5-6첩, 7-8첩, 10여 첩을 써서 밤낮을 계속하여 이어주는 것이 좋을 것이다. 굳이 헛소리한 다음을 기다려서 약을 쓸 필요가 없고 발광할 때 당연히 약을 쓰는 것이 마땅하며, 발광한 다음을 기다려서 약을 쓸 것이 아니고 발광하기 전에 발광의 조짐을 조기에 살펴서 약을 쓰는 것이 마땅하다.

[9-44] 其後, 又有一, 少陽人, 十七歲, 女兒, 素證, 間有悖氣, 食滯腹痛矣. 忽一日, 頭痛寒熱食滯, 有醫, 用蘇合元三介, 薑湯調下, 仍爲泄瀉, 日數十行, 十餘日不止, 引飲不眠, 間有譫語證, 時則己亥年, 冬十一月, 二十三日也. 卽夜, 用生地黃・石膏 各六兩, 知母 三兩, 其夜, 泄瀉度數, 減半. 其翌日, 用荊防地黃湯, 加石膏 四錢, 二貼連服, 安睡, 而能通小便, 荊防地黃湯, 二貼藥力, 十倍於知母白虎湯, 可知矣. 於是, 每日用此藥四貼, 晝二貼連服, 夜二貼連服, 數日用之. 泄瀉永止, 頭部兩鬢, 有汗, 而病兒譫語證, 變爲發狂證, 病家驚惑, 二晝夜, 疑不用藥, 病勢遂危, 頭汗不出, 小便秘結, 口嚙冰片, 不省人事, 爻象, 可惡矣, 勢無奈何, 以不得已之計, 一夜間, 用荊防地黃湯, 加石膏一兩, 連十貼灌口. 其夜, 小便通三碗, 狂證不止, 然, 知人看面, 稍有知覺. 其翌日, 又用六貼, 連五日, 日用四五六貼, 發狂始止, 夜間, 或霎時就睡, 然, 不能久睡便覺, 又日用三四貼, 連五日, 頭頂兩鬢, 有汗, 而能半時刻, 就睡, 稍進粥飲少許. 其後, 每日荊防地黃湯, 加石膏 一錢, 日二貼用之, 大便過一日, 則加四錢. 至于十二月, 二十三日, 始得免危, 能起立房室中, 一朔內, 凡用石膏, 四十五兩. 新年正月, 十五日, 能行步一里地, 而來見我, 其後, 又連用荊防地黃湯, 加石膏 一錢, 至于新年三月.

그 후에 또 소양인 17세 여자 아이가 있었는데 평소에 간혹 딸꾹질이 나고 음식에 체하고 배가 아픈 증상이 있었다. 갑자기 하루는 머리가 아프고 추웠다 더웠다고 음식에 체했는데, 한 의사가 소합향원(蘇合香元) 3개를 생강(生薑) 달인 물로 먹었더니 설사를 하는데 하루에 수십 번을 하고 심여일이 지나도 그치지 않고 물이 먹히며 잠을 자지 못하고 가끔 헛소리하는 증상이 있었는데 그때가 기해년(己亥年) 겨울 11월 23일이었다. 그날 밤으로 생지황(生地黃)・석고(石膏)를 각각 6냥, 지모(知母) 3냥을 썼더니 그날 밤 설사의 횟수가 절반으로 감소되었다. 그 이튿날 형방지황탕(荊防地黃

湯)에 석고 4돈을 더하여 2첩을 연이어 먹게 하니 편안히 자며 소변도 잘 통하게 되었으니 형방지황탕(荊防地黃湯) 2첩의 약 효과가 지모백호탕(知母白虎湯)의 10배나 되는 것을 알 수 있었다. 이에 매일 이 약을 4첩씩 쓰는데 낮에 2첩을 이어서 먹고 밤에 2첩을 이어서 먹여 수일간 쓰니 설사가 아주 그치고 머리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 병난 아이의 헛소리하는 증상이 변하여 발광하는 증으로 되었는데 환자 집에서 놀라 의심을 하여 2일 밤낮을 약을 쓰지 못하였는데 병세가 위태하게 되어 머리에 땀이 나지 않고 오줌이 통하지 않게 되고 얼음을 씹을 때처럼 입에서 소리를 내고 사람을 알아보지 못하게 되어 병의 예후가 매우 나쁘게 되었다. 이러한 형세를 어찌할 것인가? 부득이한 계책으로 하룻밤에 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1냥을 더하여 10첩을 연이어 입에 부어 넣었더니 그 밤으로 소변이 통하여 3사발이나 누웠으나 광증(狂證)은 그치지 않고 다만 사람을 알고 얼굴을 보며 약간 제정신이 들었다. 그 다음날에 또 6첩을 쓰고 5일을 계속해서 4,5,6첩을 쓰니 발광이 그치기 시작하고 밤사이에 혹은 잠시 잠이 드나 오래 가지는 못하고 곧 깨기에 또 하루에 3,4첩을 5일 동안 이어서 쓰니 머리 정수리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 능히 반 시각 동안 자게 되고 죽을 조금씩 먹게 되었다. 그 후 매일 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈을 더하여서 하루에 2첩을 쓰되 대변을 하루 동안 보지 못하면 석고 4돈을 더하였더니 12월 23일에 이르러서 비로소 위태한 지경을 면하게 되었고 방 안에서 일어나게 되었다. 한 달 동안에 무릇 석고를 쓴 것이 45냥이 되었다. 신년(新年) 정월(正月) 5일에 능히 1리가 되는 거리를 걸어와서 나를 보고 갔다. 그 후에도 또한 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈(錢)을 더하여 새해 3월까지 계속 썼다.

[9-45] 論曰, 少陽人病, 以火熱, 爲證, 故變動甚速, 初證不可輕易視之也. 凡少陽人, 表病, 有頭痛, 裡病, 有便秘, 則已爲重病也. 重病, 不當用之藥, 一二三貼, 誤投, 則必殺人. 險病危證, 當用之藥, 一二三貼, 不及, 則亦不救命.

나는 논하기를 소양인 병은 화열(火熱)이 그 병증이 되기 때문에 변동이 매우 빨라서 처음 증이 나타나더라도 경솔하게 쉽게 보아서 안 될 것이다. 대개 소양인의 표병(表病)에 머리가 아픈 것이 있거나 이병(裏病)에 변비가 있으면 이미 중병이 된 것이니 중병에는 쓰지 못할 약을 1,2,3첩만 잘 못 투여하여도 반드시 사람을 죽일 것이고 험한 병과 위태한 증에는 반드시 써야 할 약을 1,2,3첩을 제때에 못 써도 또한 생명을 구하지 못할 것이다.

少陽人 胃受熱裏熱病論(29條)

소양인 위수열리열병론(29조)

[10-1] 張仲景曰, 太陽病, 八九日, 如瘧狀, 發熱惡寒, 熱多寒小, 脈微, 而惡寒者, 此陰陽俱虛, 不可更發汗. 更下更吐, 面色反有熱色者, 未欲解也, 不能得小汗出, 身必痒, 宜桂麻各半湯.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 8,9일에 학질(瘧疾)증상 같이 열이 나고 추위를 싫어하는데 추위보다는 열이 심하며 맥이 미(微)하고 추위를 싫어하는 것은 음과 양이 모두 허한 것이니 가벼이 땀을 내거나 설사시키거나 토하게 하지 말아야 한다. 얼굴빛이 도리어 열색(熱色) 있는 것은 병이 아직 풀리려고 하지 않는 것으로 조금이라도 땀을 내지 못하면 몸이 반드시 가려울 것이니 마땅히 계마각반탕(桂麻各半湯)을 써야 한다.

[10-2] 太陽病, 似瘧, 發熱惡寒, 熱多寒小, 脈微弱者, 此陰陽也, 身不痒, 不可發汗, 宜桂婢各半湯.

태양병(太陽病)이 학질(瘧疾) 같아서 열이 나고 추위를 싫어하며 열이 많고 한이 적으며 맥이 미(微)하고 약한 것은 이것은 망양(亡陽)이므로 몸이 가렵지 않으면 땀을 내지 말아야 한다. 마땅히 계비각반탕(桂婢各半湯)을 써야 한다.

[10-3] 論曰, 此證, 大便不過一晝夜而通者, 當用荊防瀉白散. 大便過一晝夜, 而不通者, 當用地黃白虎湯.

나는 논하기를 이러한 증에 대변이 하루 밤낮을 지나지 않아서 통하는 경우는 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하고 대변이 하루 밤낮을 지나도 통하지 않는 경우는 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 할 것이다.

[10-4] 張仲景曰, 陽明證, 小便不利, 脈浮而渴, 猪苓湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 양명증(陽明證)에 오줌이 잘 나오지를 않으며 맥이 부(浮)하고 갈증이 있는 것은 저령탕(猪苓湯)을 주로 쓴다고 하였다.

[10-5] 三陽合病, 頭痛面垢, 譫語遺尿, 中外俱熱, 自汗煩渴, 腹痛身重, 白虎湯主之.

삼양(三陽)이 합병(合病)되어 머리가 아프고 얼굴에 때가 끼고 헛소리하고 오줌이 저절로 나오고 속과 밖에 다 열이 있고 저절로 땀이 나고 번갈(煩渴)하며 배가 아프고 몸이 무거우면 백호탕(白虎湯)을 주로 쓴다.

[10-6] 論曰, 陽明證者, 但熱無寒之謂也, 三陽合病者, 太陽少陽陽明證, 俱有之謂也. 此證, 當用猪苓湯・白虎湯. 然, 古方猪苓湯, 不如新方, 猪苓車前子湯之俱備, 古方白虎湯, 不如新方, 地黃白虎湯之全美矣, 若陽明證, 小便不利者, 兼大便秘燥, 則當用地黃白虎湯.

나는 논하기를 양명증(陽明證)이란 것은 단지 열(熱)만 있고 한(寒)이 없는 것을 말하는 것이고 삼양(三陽)이 합병(合病)한다는 것은 태양・소양・양명증이 함께 있는 것을 말하는 것이다. 이러한 증에는 마땅히 저령탕(猪苓湯)이나 백호탕(白虎湯)을 써야 한다. 그러나 옛 처방인 저령탕이 새 처방인 저령차전자탕(猪苓車前子湯)의 구비한 것만 못하고, 옛 처방인 백호탕이 새 처방인 지황백호탕(地黃白虎湯)의 완전한 것만 못하다. 만일 양명병(陽明病)에 소변이 잘 나오지 않는 것에 겸하여 대변이 막히고 마른 것은 지황백호탕(地黃白虎湯)을 쓰는 것이 좋다.

[10-7] 朱肱曰, 陽厥者, 初得病, 必身熱頭痛, 外有陽證, 至四五日, 方發厥, 厥至半日, 却身熱. 盖熱氣深, 方能發厥, 若微厥, 却發熱者, 熱甚, 故也. 其脈, 雖伏, 按之滑者, 爲裏熱, 或飲水, 或揚手擲足, 或煩燥不得眠, 大便秘, 小便赤, 外證多昏憤, 用白虎湯.

주굉(朱肱)이 말하기를 양궤(陽厥)이란 것은 처음 병을 얻을 때 반드시 몸에 열이 나고 머리가 아프며 겉으로는 양증(陽證)이 있다가 4,5일에 이르러서야 장차 갈증이 일어나고 궤증(厥證)된 지 반 날이 지나서 도리어 몸에 열이 난다. 대개 열기가 심하면 장차 궤증이 일어나는데 만일 약간 궤랭(厥冷)하고 도리어 열이 나는 것은 열이 심하기 때문이다. 그 맥이 비록 복(伏)하나 누르면 활(滑)한 것은 속에 열이 있기 때문이며, 또는 물을 마시며 혹 손발을 내젓고 또는 번조하여 자지 못하며 대변이 막히고 소변이 붉으며 밖의 증세로는 정신이 혼미한 편이 많으면 백호탕을 쓴다.

[10-8] 論曰, 少陽人, 裡熱病, 地黃白虎湯, 爲聖藥, 而用之者, 必觀於大便之通不通也, 大便, 一晝夜有餘, 而不通, 則可用也, 二晝夜不通, 則必用也. 凡少陽人, 大便, 一晝夜不通, 則胃熱已結也, 二晝夜不通, 則熱重也, 三晝夜不通, 則危險也. 一晝夜八九辰刻, 二晝夜, 恰好用之, 無至三晝夜之危險, 若譫語證, 便秘, 則不可過一晝夜.

나는 논하기를 소양인의 리열병(裡熱病)에 지황백호탕(地黃白虎湯)이 가장 좋은 약이나 이것을 쓰는 데에는 반드시 대변이 통하는지 통하지 않는지를 살펴야 한다. 대변이 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않으면 쓰는 것이 마땅하고 2일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 반드시 써야 한다. 무릇 소양인의 대변이 하루 밤낮을 통하지 않으면 위(胃)의 열이 이미 맺힌 것이고 2일 밤낮을 통하지 않으면 열이 중한 것이고 3일 밤낮을 통하지 않으면 위험한 것이니 40-42시간이나 2주야에 적당히 약을 쓸 것이고 3주야의 위험한 데까지 가게 하지 말아야 한다. 만일 헛소리하는 증에 변비(便秘)가 있으면 하루 밤낮을 지나지 말아야 한다.

[10-9] 少陽人, 胃受熱, 則大便秘也. 脾受寒, 則泄瀉也. 故陰證, 泄瀉二三日, 而大便秘, 一晝夜, 則清陰將陰, 而危境也. 胃熱證, 大便, 三晝夜不通, 而汗出, 則清陽將竭, 而危境也.

소양인이 위(胃)에 열을 받으면 대변이 굳어지고 소양인이 비(脾)에 한을 받으면 설사를 한다. 그러므로 망음증(陰證)에 설사를 2,3일 하다가 대변이 굳기를 하루 밤낮이 되면 청음(淸陰)이 장차 없어지게 되어서 위태로운 경지가 되고, 위열증(胃熱證)에 대변이 3일 밤낮을 통하지 않다가 땀이 나면 맑은 양(淸陽)이 장차 고갈(枯竭)되는 것으로 위태로운 경지가 된다.

[10-10] 少陽人, 大便不通病, 用白虎湯, 三四服, 當日大便不通者, 將爲融會貫通, 大吉之兆也, 不必疑惑, 而翌日 又服二三貼, 則必無不通.

소양인이 대변이 통하지 않는 병에 백호탕을 3,4회 복용해도 당일에 대변이 통하지 않는 것은 장차 녹아서 통하게 될 것으로 이것은 크게 좋은 징조이다. 의심할 필요 없이 이튿날 다시 2,3첩을 복용하면 통하지 않을 이유가 없다.

[10-11] 少陽人, 表裡病, 結解, 必觀於大便, 而少陽人, 大便, 頭燥尾滑, 體大而疏通者, 平時無病者之大便也. 其次, 大滑便, 一二次, 快滑泄, 廣多, 而止者, 有病者之病快解之大便也. 其次, 一二次, 尋常滑便者, 有病者, 病勢不加之大便也, 其次, 或過一晝夜有餘不通, 或一晝夜間, 三四五次, 小小滑利者, 將溢之候也, 非好便也, 宜預防.

소양인의 표리병(表裏病)이 맺혔는가 풀렸는가 하는 것은 반드시 대변을 보아야 할 것이니 소양인의 대변이 처음은 조(燥)하다가 나중에는 활(滑)하며 덩이가 크고 잘 소통되는 것은 평상시에 병이 없는 경우의 대변이다. 그 다음은 크게 활변(滑便)을 보되 1,2차 시원하게 활설(滑泄)을 많이 하고 그치는 것은 병자의 병이 풀리려는 대변이다. 그 다음은 1,2차 보통 활변(滑便)을 보는 경우는 병자의 병이 병세가 더하지 않는 대변이다. 그 다음은 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않거나 또는 하루 밤낮 사이에 3,4,5차 조금씩 조금씩 활리(滑利)하는 것은 장차 대변이 막힐 징후니 좋은 대변이 아니므로 예방하는 것이 마땅하다.

[10-12] 少陰人, 裏寒病, 臍腹冷證, 受病之初, 已有腹鳴泄瀉之機驗, 而其機, 甚顯, 則其病, 執證易見, 而用藥, 可早也. 少陽人, 裏熱病, 胃隔熱證, 受病之初, 雖有胃煩悶燥之機驗, 而其機, 不甚顯, 則執證難見, 而用藥, 太晚也. 若使少陽人病, 胃煩悶燥之驗, 顯然露出, 使人可覺, 則其病, 已險, 而難爲措手矣. 凡少陽人表病, 有頭痛, 則自是表病, 明白易見之初證也, 若復引飲, 小便赤, 則可畏也, 泄瀉揚手擲足, 則大畏也. 少陽人裡病, 大便, 過一晝夜有餘而不通, 則自是裡病, 明白易見之初證也. 若復大便, 過三晝夜不通, 則危險矣. 背癰・腦疽・脣瘡・纏喉風・咽喉等病, 受病之日, 已爲危險證也, 陽毒發斑・流注丹毒・黃疸等病, 受病之日, 已爲險證也, 面目口鼻牙齒之病, 成病之日, 皆爲重證也. 凡少陽人, 表病, 有頭痛證, 則必用荊防敗毒散, 裡病, 有大便, 過一晝夜不通證, 則用白虎湯.

소음인의 속이 찬 병에 배꼽 주위가 냉한 증세는 병의 초기에 벌써 배에서 소리가 나고 설사를 할 기미와 증험이 있어 집증(執證)이 쉬우므로 약을 빨리 쓸 수 있으나, 소양인의 속이 더운 병에 흉격열(胃隔熱)증은 병이 난 초기에 비록 가슴이 답답하고 어찌할 바를 모르는 기미와 증험이 있으나 그것이 심하게 나타나지 않으니 집증(執證)하기 어려워서 약을 쓰는 일이 너무 늦어진다. 만일 소양인이 가슴이 답답해서 가만히 있지 못하는 징후가 뚜렷하게 나타나서 다른 사람이 그것을 깨달을 수 있게 되면 그 병은 이미 험증(險證)이 되니 손쓰기 어려울 것이다. 대개 소양인의 표병(表病)에 머리 아픈 것이 있으면 이것이 표병(表病)임이 확실하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 물을 많이 마시고 오줌이 붉으면 가히 염려스럽고, 설사하고 손과 발을 내저으면 대단히 염려스러운 것이다. 소양인의 이병(裏病)에 대변이 하루 밤낮이 지나도록 통하지 않으면 이것으로 이병(裏病)임이 명백하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 대변이 3일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 위험한 것이다. 배옹(背癰)・뇌저(腦疽)・순중(脣瘡)・전후풍(纏喉風)・인후(咽喉) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 위험증(危險證)이 된 것이며, 양독발반(陽毒發斑)・유주단독(流注丹毒)・황달(黃疸) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 험증(險證)이 된 것이며, 얼굴・눈・입・코・치아의 병은 병이 형성된 날부터 모두 중증(重證)이 된 것이다. 무릇 소양인의 표병에 머리 아픈 증이 있으면 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓰고 이 병에 대변이 하루 밤낮이 지나도 통하지 않는 증이 있으면 백호탕을 쓴다.

[10-13] 王好古曰, 渴病有三, 曰消渴, 曰消中, 曰消腎. 熱氣上騰, 胃中煩燥, 舌赤唇紅, 此渴, 引飲常多, 小便數, 而少, 病屬上焦, 謂之消渴, 熱蓄於中, 消穀善飢, 飲食倍常, 不生肌肉, 此渴, 亦不甚煩, 小便數, 而恬, 病屬中焦, 謂之消中, 熱伏於下, 腿膝枯細, 骨節痠疼, 飲水不多, 隨即尿下, 小便多而渴, 病屬下焦, 謂之消腎. 又有, 五石過度之人, 真氣既盡, 石勢獨留, 陽道興強, 不交精泄, 謂之強中, 消渴輕也, 消

中甚焉, 消腎尤甚焉, 若強中, 則其斃, 可立而待也.

왕호고(王好古)가 말하기를 갈병(渴病)에 세 가지가 있는데 소갈(消渴)·소증(消中) 그리고 소신(消腎)이다. 열기(熱氣)가 위로 올라가면 가슴 속이 번조(煩躁)하고 혀가 빨갛고 입술이 붉으니 이때의 갈(渴)은 항상 물을 많이 마시며 소변은 자주 보나 양은 적으니 병이 상초(上焦)에 속하는데 소갈(消渴)이라 이른다. 열기가 중초(中焦)에 쌓여 먹는 데로 삭여서 시장기를 느끼며 음식을 평상시의 배로 먹으나 살이 붙지 않는다. 이때의 갈(渴)은 역시 심한 번조(煩躁)는 아니나 소변이 잦고 그 맛이 달아 병이 중초(中焦)에 속하는데 소증(消中)이라 이른다. 열기가 하초(下焦)에 잠복되어 허벅지와 무릎이 말라서 가늘어지고 뼈마디가 쭈시고 물을 많이 마시지는 않으나 마시면 오줌으로 나오고 소변량이 많고 탁(濁)하니 병이 하초(下焦)에 속하는데 소신(消腎)이라 한다. 또 5가지 광물성 약재를 과도하게 먹은 사람으로 진기(眞氣)는 이미 다 없어지고 광물성 약의 기운만이 남아 있어서 음경(陰莖)이 역세게 일어나며, 성교(性交)하지 않아도 사정하는 것을 강중(強中)이라 한다. 소갈(消渴)은 경(輕)한 증세이고 소증(消中)은 심(甚)한 증세이고 소신(消腎)은 더욱 심한 증상이다. 만일 강중(強中)이 되면 그 죽음이 가히 서서 기다리는 것과 같다.

[10-14] 朱震亨曰, 上消者, 舌上赤裂, 大渴引飲, 白虎湯主之, 中消者, 善食, 而瘦, 自汗, 大便硬, 小便數, 黃連猪肚丸主之, 下消者, 煩躁引飲, 小便如膏, 腿膝枯細, 六味地黃湯主之.

주진형(朱震亨)이 말하기를 상소(上消)라는 것은 혀가 빨갛고 갈라지며 갈증이 심하며 물을 찾으니 백호탕(白虎湯)을 주로 써야 하고, 중소(中消)라는 것은 음식을 잘 먹어도 마르며 땀이 저절로 나며 대변이 굳으며 소변은 자주 보나 황연저두환(黃連猪肚丸)을 주로 써야 하고, 하소(下消)라는 것은 번조하여 물이 당기고 소변은 마치 기름 같으며 허벅지와 무릎이 말라서 가늘어지니 육미지황탕(六味地黃湯)을 주로 써야 한다.

[10-15] 醫學綱目曰, 渴而多飲, 爲上消, 消穀善飢, 爲中消, 渴而尿數, 有膏油, 爲下消.

《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 갈증이 나서 물을 많이 마시는 것은 상소(上消)라 하고, 음식이 잘 삭아서 시장기를 느끼는 것은 중소(中消)라 하며, 갈증이 나며 소변을 자주 보고 기름 같은 것은 하소(下消)라 한다.

[10-16] 危亦林曰, 因耽嗜色慾, 或服丹石, 眞氣既脫, 熱邪獨盛, 飲食如湯消雪, 肌膚日削, 小便如膏油, 陽強興盛, 不交精泄, 三消之中, 最爲難治.

위역림(危亦林)이 말하기를 색욕(色慾)을 탐내거나 단석(丹石)을 복용하면 진기(眞氣)가 이미 빠진 데다가 열사(熱邪)가 홀로 왕성하여 마치 끓는 물에 눈을 녹이듯이 먹고 마시나 살은 날로 말라 들어가고 소변은 마치 기름과 같고 음경(陰莖)이 강하게 일어나서 성교하지 않아도 정액(精液)을 설(泄)하는 것은 삼소(三消) 가운데서 가장 치료하기 어려운 것이다.

[10-17] 論曰, 消渴者, 病人胃次, 不能寬遠闊達, 而陋固膠小, 所見者淺, 所欲者速, 計策鶻突, 意思艱乏, 則大腸清陽, 上升之氣, 自不快足, 日月耗困, 而生此病也. 胃局清陽, 上升, 而不快足於頭面四肢, 則成上消病, 大腸局清陽, 上升, 而不快足於胃局, 則成中消病, 上消, 自爲重證, 而中消, 倍重於上消, 中消, 自爲險證, 而下消, 倍險於中消. 上消, 宜用涼膈散火湯. 中消, 宜用忍冬藤地骨皮湯. 下消, 宜用熟地黃苦參湯, 尤宜寬闊其心, 不宜膠小其心, 寬濶則所欲必緩, 清陽上達, 膠小, 則所欲必速, 清陽下耗.

나는 논하기를 소갈(消渴)이라는 것은 환자의 마음이 너그럽고 원대하고 활달하지 못하고 건문이 좁고 완고하며 작은 일에 집착하여 보는 바가 얇고 하고자 하는 바는 조급하며 계책은 골돌한데 생각은 모자라니 대장의 맑은 양이 위로 올라가는 기운이 자연히 만족하지 못하여 날이 갈수록 소모되고 노곤해서 이 병이 발생하는 것이다. 위국(胃局)의 맑은 양기(陽氣)가 상승하여 머리와 얼굴 그리고 사지(四肢)에까지 충족되지 못하면 상소(上消)가 되고, 대장국(大腸局)의 맑은 양기가 위로 올라가 위국(胃局)에까지 충족되지 못하면 중소(中消)가 된다. 상소(上消)는 자체가 중증이 되는데 중소(中消)는 상소(上消)보다 배는 중하고 중소(中消)는 자체가 험증이 되는데 하소(下消)는 중소(中消)보다 배는 험(險)한 병이다. 상소(上消)는 양격산화탕(涼膈散火湯)을 쓰는 것이 마땅하고, 중소(中

消)는 인동등지골피탕(忍冬藤地骨皮湯)을 쓰는 것이 마땅하며, 하소(下消)는 숙지황고삼탕(熟地黃
苦蔘湯)을 쓰는 것이 마땅하다. 또 마음을 너그럽고 넓게 가져야 할 것이고 작은 일에 집착하는 마
음을 가져서는 안 될 것이니 마음을 너그럽고 넓게 가진다는 것은 하고자 하는 일을 반드시 완만하
게 하는 것이니 맑은 양기가 위로 도달하고, 작은 일에 집착한다는 것은 하고자 하는 일을 반드시
조급하게 하는 것이니 맑은 양의 기운이 아래에서 소모될 것이다.

[10-18] 平心靜思, 則陽氣上升輕清, 而充足於頭面四肢也, 此, 元氣也, 清陽也. 勞心焦思, 則陽氣下陷
重濁, 而鬱熱於頭面四肢也, 此, 火氣也, 耗陽也.

마음을 편안하게 하고 생각을 고요하게 하면 양기가 위로 올라가 가볍고 맑아져서 머리와 얼굴 그
리고 사지에 충족할 것이니 이것은 원기(元氣)이고 맑은 양의 기운이다. 속을 썩히고 애를 태우면
양기가 아래로 빠져 내려가 무겁고 탁해져서 머리와 얼굴 그리고 사지에 뭉쳐서 열이 될 것이니 이
것은 화기(火氣)이고 소모된 양기이다.

[10-19] 危亦林曰, 消渴, 須防發癰疽, 忍冬藤, 不拘多少, 根莖花葉, 皆可服.

위역림(危亦林)이 말하기를 소갈(消渴)에는 모름지기 응저(癰疽)가 발생하는 것을 막아야 하니 인동
등(忍冬藤)의 많고 적음에 관계없이 뿌리·줄기·꽃·잎을 모두 먹을 것이다.

[10-20] 李杲曰, 消渴之疾, 能食者, 未傳, 必發腦疽背瘡, 不能食者, 必傳中滿鼓脹.

이고(李杲)가 말하기를 소갈(消渴)의 질병에 음식을 잘 먹는 경우는 끝에 가서 반드시 뇌저(腦疽)나
등창(背瘡)이 생길 것이고, 음식을 잘 먹지 못하는 경우는 반드시 속이 팽만하거나 고창(鼓脹)이 될
것이다.

[10-21] 東醫醫方類聚曰, 消渴之病, 變成發癰疽, 或成水病, 或雙目失明.

《동의의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 소갈(消渴)의 병은 변해서 응저(癰疽)가 되기도 하고, 또
는 수병(水病)이 되기도 하고 또는 두 눈이 멀기도 한다.

[10-22] 論曰, 癰疽眼病, 皆是中消之變證也. 中消, 自爲險證, 則上消, 當早治也. 中消, 必急治也. 下消,
則瀆死.

나는 논하기를 응저(癰疽)와 눈병은 모두 중소(中消)의 변증(辯證)이다. 중소(中消)는 자체가 험한
증세이기 때문에 상소(上消)는 마땅히 일찍 치료해야 하고, 중소(中消)는 반드시 급히 치료해야 하
고, 하소(下消)는 죽음에 임박한 것이다.

[10-23] 王好古曰, 一童子, 自嬰至童, 盜汗七年, 諸藥不效, 服涼膈散, 三日病已.

왕호고(王好古)가 말하기를 어떤 아이가 갓난아이부터 동자가 되기까지 잠자면서 땀을 흘리기가 7
년이나 계속되었으나 모든 약이 효력이 없더니 양격산(涼膈散)을 3일간 복용하고 병이 멈췄다.

[10-24] 論曰, 少陽人, 大腸清陽, 快足於胃, 充溢於頭面四肢, 則汗必不出也. 少陽人, 汗者, 自是陽弱
也, 而服涼膈散, 病已, 則此病, 卽上消, 而其病, 輕也.

나는 논하기를 소양인의 대장의 맑은 양기가 위에 충족하여 머리와 얼굴 그리고 사지에 차서 넘치
면 땀이 반드시 나지 않는다. 소양인이 땀을 흘리는 것은 본래 양기가 약한 것인데 양격산(涼膈散)
을 복용하고 병이 그쳤다는 것은 이 병은 곧 상소(上消)로 병이 경한 것이다.

[10-25] 東醫醫方類聚曰, 夫渴者, 數飲水, 其人, 必頭面眩, 背寒而嘔, 因虛故也.

《동의의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 무릇 갈(渴)이란 것은 자주 물을 마시는 것이니 그 사람
이 반드시 머리와 얼굴이 어지럽고 등이 차고 구역이 날 것이니 허하기 때문이다.

[10-26] 龔信曰, 凡陰虛證, 每日午後, 惡寒發熱, 至晚, 亦得微汗而解, 誤作瘧治, 多致不救.

공신(龔信)이 말하기를 대개 음이 허한 증은 매일 오후에는 추위를 싫어하고 열이 나다가 해가 저

물 때에는 도리어 약간 땀이 나고 풀리는 것이니 학질(瘧疾)로 잘못 알고 치료하다가는 흔히 구하지 못하는 지경에 이른다.

[10-27] 孫思邈, 千金方書曰, 消渴, 宜慎者, 有三, 一飲酒, 二房勞, 三酖食及麵, 能慎此三者, 雖不服藥, 亦可自愈.

손사막(孫思邈)의 《천금방(千金方)》에서 말하기를 소갈(消渴)에는 마땅히 삼갈 것이 셋이 있는데 첫째는 술을 마시는 것이고, 둘째는 성생활이고, 셋째는 짠 것을 먹고 국수를 먹는 것이니 능히 이 세 가지를 삼가면 비록 약을 먹지 않아도 역시 저절로 나을 수 있다.

[10-28] 論曰, 上消中消, 裡陽升氣, 雖則虛損, 表陰降氣, 猶恃完壯, 故其病雖險, 猶能歲月支撐者, 以此也. 若夫陰虛午熱, 飲水背寒, 而嘔者, 表裡陰陽, 俱爲虛損, 所以爲病, 尤險與下消, 畧相輕重. 然, 能善攝身心服藥, 則十之六七, 尚可生也, 不善攝身心服藥, 則百之百, 必死也, 此證, 當用獨活地黃湯・十二味地黃湯.

나는 논하기를 상소와 중소는 속의 양기의 올라가는 기운이 비록 허손(虛損)하나 겉의 음기의 내려가는 기운은 오히려 완장(完壯)하기 때문에 그 병이 비록 험하여도 오히려 능히 오랜 세월을 지탱해 나갈 수 있는 것이다. 만일 음이 허하여 낮에 열이 나고 물을 많이 마시고 등이 차고 구역하는 것은 겉과 속의 음양이 모두 허손된 것으로 병이 되는 까닭에 더욱 험하게 되고 하소와 더불어 경중이 서로 비슷하다는 것이다. 그러나 능히 몸과 마음을 잘 조섭하고 약을 먹는다면 10에 6,7은 오히려 살아날 수 있을 것이나 몸과 마음을 잘 조섭하지 않고 약을 먹는다면 백이면 백이 반드시 죽을 것이다. 이러한 증에는 당연히 독활지황탕(獨活地黃湯)이나 십이미지황탕(十二味地黃湯)을 써야 한다.

[10-29] 易之需, 九三爻辭曰, 需于泥, 致寇至. 象曰, 需于泥, 災在外也, 自我致寇, 敬慎, 不敗也, 以此意, 而倣之曰, 陰虛午熱, 背寒而嘔, 其病雖險, 然死尚在外也, 能齋戒其心, 恭敬其身, 又服好藥, 不死也.

《주역(周易)》의 수괘(需卦)의 9,3효사(爻辭)에 말하기를 진흙 속에서 기다리는 것이니 도둑을 이르게 하는 것이라고 하였고, 상(象)에서 말하기를 진흙 속에서 기다린다는 것은 재앙이 밖에 있기 때문이다. 내가 스스로 도적을 부르는 것이니 공경하고 삼가면 패하지 않을 것이라고 하였다. 이 뜻을 모방하여 말한다면 음이 허하여 낮에 열이 나고 등이 차고 구역하는 것은 그 병이 비록 험하나 죽음은 아직 밖에 있으니 능히 그 마음을 재계하고 그 몸을 공경하고 또 좋은 약을 먹으면 죽지 않을 것이다.

少陽人 泛論(23條)

소양인 범론(23조)

[11-1] 少陽人病, 中風・吐血・嘔吐・腹痛・食滯痞滿, 五證, 同出一屬, 而自有輕重. 浮腫・喘促・結胸・痢疾・寒熱往來胷脇滿, 五證, 同出一屬, 而自有輕重.

소양인 병의 중풍(中風)・토혈(吐血)・구토(嘔吐)・복통(腹痛)・식체비만(食滯痞滿)의 다섯 가지 증세는 다 같은 한 가지 등속(等屬)에서 나왔으며 스스로 경・중이 있고, 부종(浮腫)과 천축(瞢促)・결흉(結胸)・이질(痢疾)・한열왕래(寒熱往來)・흉협만(胸脇滿)의 다섯 가지 증세는 다 같이 한 가지 등속에서 나왔으며 스스로 경・중이 있다.

[11-2] 少陽人, 中風, 半身不遂, 一臂不遂, 末如何之疾也. 重者必死, 輕者猶生, 間以服藥, 安而復之, 待其自愈, 而不可期必治法之疾也.

소양인 중풍의 반신(半身)을 쓰지 못하는 것과 한쪽 팔을 쓰지 못하는 것은 어찌할 수 없는 병이다. 중한 경우는 반드시 죽고 경한 경우라도 살 수는 있으나 간간히 약을 복용하고 안정해서 회복되는데 스스로 낫기를 기다려야 하며 반드시 다스리는 법이 있는 병은 아니다.

[11-3] 少陽人, 吐血者, 必蕩滌剛愎偏急, 與人並駟爭塗之. 淡食服藥, 修養如釋道, 一百日, 則可以少愈. 二百日, 則可以大愈. 一周年, 則可以快愈. 三周年, 則可保其壽. 凡吐血, 調養失道, 則必再發, 再發, 則前功, 皆歸於虛地, 若再發者, 則又自發日, 計數, 一百日, 少愈, 一周年, 快愈. 若十年, 二十年, 調養, 則必得高壽.

소양인이 토혈(吐血)하는 경우는 반드시 강팍(剛愎)하고 편벽되고 급한 성질과 남과 더불어 나란히 말을 달려서 경쟁하는 것을 씻어버려야 하고 담백하게 먹으며 약을 복용하되 수양하기를 불교도 사람들과 같이 하면 100일이면 조금 나을 것이고 200일이면 많이 나을 것이고 1년이면 완전히 나을 것이고 3년이면 가히 그 수명을 보존할 수 있다. 무릇 토혈은 조리와 섭양을 옳게 못하면 반드시 재발할 것이나 재발하면 앞서의 공이 모두 다 허사로 돌아간다. 만일 재발하면 다시 재발한 날로부터 계산하여 100일이면 조금 나을 것이고 1년이면 완전히 나을 것이며, 만일 10년, 20년 조리와 섭양을 한다면 반드시 오랜 수명을 누릴 것이다.

[11-4] 凡少陽人, 間有鼻血少許, 或口鼻間痰涎中, 有血, 雖細微, 皆吐血之屬也. 又, 口中, 暗有冷涎, 逆上者, 雖不嘔吐, 亦嘔吐之屬也. 少年, 有此證者, 多致夭折, 以其等閒任置, 故也. 此二證, 必在重病險病之列, 不可不預防服藥, 永除病根然後, 可保無虞.

무릇 소양인의 코에서 피가 간혹 조금 나거나 또는 입과 코의 가래와 침 가운데에 피가 있는 것은 비록 미세하다 하여도 모두 토혈에 속한다. 또 입 안에 남몰래 차가운 침이 있는 것이 거꾸로 올라오는 것은 비록 구토하지 않아도 역시 구토에 속한다. 소년(少年)이 이런 증세가 있는 경우는 흔히 요절(夭折)하게 되니 그것을 등한히 내버려두기 때문이다. 이 두 가지 증세는 반드시 중병과 험한 병의 반열에 있으니 예방의 차원에서 약을 먹는 것이 부득이하니 영원히 병의 근원을 제거한 연후에야 가히 보존할 수 있고 근심이 없을 것이다.

[11-5] 中風, 受病太重, 故治法不可期必. 吐血, 受病猶輕, 故治法可以期必. 中風, 吐血, 調養爲主, 服藥次之.

중풍은 병을 얻는 것이 아주 중하기 때문에 치료하는 방법에 확실한 것이 있다고는 할 수 없으나 토혈은 병을 얻는 것이 아직 경하기 때문에 치료하는 방법에 확실한 것이 있다고 할 수 있다. 중풍과 토혈은 조리(調理)와 자양(滋養)이 위주고 약을 복용하는 것은 다음이 된다.

[11-6] 嘔吐以下, 腹痛, 食滯痞滿, 服藥調養, 則其病易愈.

구토 이하 복통, 식체비만은 약을 복용하고 조리하며 자양하면 그 병이 스스로 나을 것이다.

[11-7] 中風・嘔吐, 宜用獨活地黃湯. 吐血, 宜用十二味地黃湯.

중풍과 구토에는 마땅히 독활지황탕(獨活地黃湯)을 쓸 것이고, 토혈(吐血)에는 마땅히십이미지황탕(十二味地黃湯)을 쓸 것이다.

[11-8] 浮腫爲病, 急治則生, 不急治則危, 用藥早則容易愈也. 用藥不早則孟浪死也. 此病, 外勢平緩, 似不速死, 故人必易之. 此病, 實是急證, 四五日內, 必治之疾, 謾不可以十日論之也. 浮腫初發, 當用木通大安湯, 或荊防地黃湯, 加木通, 日再服, 則六七日內, 浮腫必解. 浮腫解後, 百日內, 必用荊防地黃湯, 加木通二三錢, 每日一二貼, 用之, 以清小便, 以防再發, 再發, 難治. 浮腫初解, 飲食尤宜忍飢, 而小食, 若如平人大食, 則必不免再發, 大畏小便赤也, 小便清, 則浮腫解, 小便赤, 則浮腫結.

부종이 병됨은 급히 치료하면 살 수 있고 급히 치료하지 않으면 위태로우니 약을 빨리 쓰면 쉽게 낫고 약을 빨리 쓰지 않으면 맹랑하게 죽는다. 이 병은 밖에 나타난 형세(形勢)가 평안하여 급하게 죽을 것 같지 않아서 사람들이 반드시 쉽게 생각하나 이 병은 실은 급한 증으로 4~5일 내에 반드시 그 질병을 치료해야 하며 늦어도 10일 이상을 논하는 것은 불가하다. 부종은 처음 발생했을 때 마땅히 목통대안탕(木通大安湯)을 써야 하며 혹은 형방지황탕(荊防地黃湯)에 목통(木通)을 더하여 하루 2회 먹으면 6~7일 내에 부종이 반드시 풀릴 것이다. 부종의 병이 풀린 후 백일 안에 반드시 형방지황탕에 목통 2-3돈을 더하여 써야 하는데 매일 1~2첩을 써서 소변을 맑게 하고 재발을 방지해야 할 것이니 재발하면 치료하기 어렵다. 부종이 처음 풀렸을 때에 음식은 시장기를 참아야 할

정도로 적게 먹어야 하니 만약 보통 사람처럼 많이 먹는다면 반드시 병이 재발하는 것을 면치 못할 것이다. 소변이 붉은 것을 크게 두려워해야 할 것이니 소변이 맑으면 부종이 풀리고 소변이 붉으면 부종이 맺혀진다.

[11-9] 少陽人, 中消者, 腹脹, 則必成鼓脹, 鼓脹不治. 少陽人, 鼓脹病, 如少陰人, 藏結病, 皆經歷五六七八月, 或周年, 而竟死. 蓋少陰人, 藏結, 表陽溫氣, 雖在幾絕, 裡陰溫氣, 猶恃完壯. 少陽人, 鼓脹, 裡陽清氣, 雖在幾絕, 表陰清氣, 猶恃完壯, 故皆經歷久遠, 而死也.

소양인의 중소(中消)라는 것에 배가 팽만하면 반드시 고창(鼓脹)이 되고 고창은 다스리지 못한다. 소양인의 고창병은 소음인의 장결(藏結)병과 같아서 모두 5-6, 7-8개월 혹은 1년이 지나면 죽게 된다. 대개 소음인의 장결(藏結)은 표양(表陽)의 온기(溫氣)가 비록 거의 떨어졌으나 리음(裏陰)의 온기(溫氣)가 아직 완실(完實)하고 건장한 것이 미더운 것이고, 소양인의 고창(鼓脹)은 표양(表陽)의 청기(淸氣)가 비록 거의 떨어졌으나 표음(表陰)의 청기(淸氣)가 아직 완실하고 건장한 것이 미더운 까닭에 모두 오래 경과해서 죽게 된다.

[11-10] 少陽人, 傷寒喘促, 宜先用, 靈砂 一分, 溫水調下, 因煎, 荊防瓜萸等藥用之, 則必無煎藥時刻遲滯救病.

소양인 상한(傷寒)의 천측(喘促)에는 먼저 영사(靈砂) 1푼을 따뜻한 물에 타서 먹고 형개(荊芥) · 방풍(防風) · 과루인(瓜萸仁) 등에 속하는 약을 달여서 먹으면 반드시 약을 달이는 시각이 지체됨으로써 병을 구하지 못하는 일이 없을 것이다.

[11-11] 靈砂藥力, 急迫, 可以一再用, 而不可屢用. 蓋救急之藥, 敏於救急而已, 藥必湯服然後, 充滿腸胃, 能爲補陰補陽.

영사(靈砂)는 약의 힘이 급박하므로 마땅히 한 두 번만 쓸 것이고 여러 번 쓰는 것은 마땅하지 않으니 대개 급히 구하는 약일 따름이다. 약은 반드시 달여 먹어야 장과 위에 충만하여 능히 보음(補陰) 보양(補陽)을 할 수 있다.

[11-12] 痢疾之比結胃, 則痢疾爲順證也, 而痢疾之謂重證者, 以其與浮腫相近也, 嘔吐之比腹痛, 則嘔吐爲逆證也, 而嘔吐之謂惡證者, 以其距中風不遠也.

이질(痢疾)은 결흉(結胸)에 비한다면 이질(痢疾)은 순한 병증이나 이질(痢疾)을 중증이라고 말하는 것은 그것은 부종과 가깝기 때문이다. 구토를 복통에 비한다면 구토는 순하지 못한 증이나 구토를 나쁜 증이라고 말하는 것은 그것은 중풍과 멀지 않기 때문이다.

[11-13] 少陽人, 痢疾, 宜用黃連清腸湯.

소양인의 이질(痢疾)에는 마땅히 황련청장탕(黃連清腸湯)을 써야 한다.

[11-14] 少陽人, 瘧疾, 有間兩日發者, 卽勞瘧也, 可以緩治, 不可急治, 此證, 瘧不發日, 用獨活地黃湯, 二貼, 朝暮服, 瘧發日, 預煎荊防敗毒散, 二貼, 待惡寒發作時, 二貼連服, 一月之內, 以獨活地黃湯, 四十貼, 荊防敗毒散, 二十貼, 爲準的, 則其瘧, 必無不退之理.

소양인의 학병(瘧病)에 이틀 간격으로 나타나는 것은 즉 노학(勞瘧)이다. 천천히 치료해야 마땅하며 급히 치료하는 것은 마땅하지 않다. 이러한 증은 학질이 나타나지 않는 날에 독활지황탕(獨活地黃湯) 2첩을 아침과 저녁에 먹고 학질이 나타나는 날에는 형방패독산(荊防敗毒散) 2첩을 미리 달여서 오한이 발작할 때에 2첩을 연복한다. 1개월에 독활지황탕(獨活地黃湯) 40첩과 형방패독산(荊防敗毒散) 20첩을 목표로 하고 쓰면 반드시 물러나지 않을 이치가 없다.

[11-15] 少陽人, 內發咽喉, 外腫項頰者, 謂之纏喉風, 二三日內, 殺人最急, 又上唇人中穴瘡, 謂之唇瘡. 凡人中左右逼近處一指許, 發瘡, 雖微如粟粒, 亦危證也. 此二證 始發而輕者, 當用涼膈散火湯 · 陽毒白虎湯. 重者, 當用水銀熏鼻方, 一炷熏鼻, 而項頰, 汗出, 則愈. 若倉卒, 無熏鼻藥, 則輕粉末 一分五厘, 乳香 · 沒藥 · 甘遂末 各五分, 和勻糊丸, 一服盡.

소양인이 안으로 인후(咽喉)병이 나고 밖으로 목과 뺨이 붓는 것을 전후풍(纏喉風)이라고 하는데 2-3일. 안에 사람을 죽이니 최고로 급하다. 또한 윗입술의 인중혈(人中穴)의 종기(腫氣)를 순증(脣腫)이라 하는데 인중의 좌우에 손가락 하나 놓일 만한 곳에 종기가 나면 비록 그것이 좁쌀알같이 작은 것이라도 또한 위태로운 증세이다. 이 두 가지 증세가 처음 나타나 가벼운 경우에는 마땅히 양격산화탕(涼膈散火湯)이나 양독백호탕(陽毒白虎湯)을 쓸 것이며 중한 경우에는 수은훈비방(水銀熏鼻方)을 써야 하는데 한 대를 태워 코에 연기를 쏘여서 목과 뺨에 땀이 나면 낫는다. 만약 급한 상황에서 훈비약(熏鼻藥)이 없다면 경분(輕粉) 가루 1푼 5리와 유향(乳香)·몰약(沒藥)·감수(甘遂) 각각 5푼씩을 고루 풀어 반죽한 다음 알약을 만들어 단번에 다 먹인다.

[11-16] 少陽人, 小兒, 食多飢瘦, 宜用蘆薈肥兒丸・忍冬藤地骨皮湯.

소양인 어린아이가 많이 먹으나 마르는 경우에는 마땅히 노회비아환(蘆薈肥兒丸)이나 인동등지골피탕(忍冬藤地骨皮湯)을 쓴다.

[11-17] 嘗見, 少陽人, 肩, 上有毒瘡, 火熬香油灌瘡, 肌肉焦爛, 而不知其熱. 有醫, 教以牛角片, 置火炭上, 燒, 而熏之, 煙入瘡口, 毒汁自流, 其瘡立愈.

일찍이 소양인의 어깨 위에 독종(毒腫)이 있어 참기름을 불에 끓여 헌데에 부어 살이 검게 타도 그 뜨거움을 알지 못하는 것을 어떤 의사가 소의 뿔 조각을 숯불 위에 놓고 태우면서 연기를 쏘이려 하기에 연기가 헌데에 들어가서 독즙(毒汁)이 스스로 흘러내려 그 종기(腫氣)가 곧 낫는 것을 본 일이 있다.

[11-18] 嘗見, 少陽人, 七十老人, 發腦疽, 有醫, 教以河豚卵, 作末傅之, 其疽立愈. 河豚卵, 至毒, 穢犬食之, 則立死, 掛於林木間, 烏鵲, 不敢食.

일찍이 소양인 70노인이 뇌저(腦疽)가 생겼는데 어떤 의사가 복알을 가루 내어 붙이니 뇌저가 곧 낫는 것을 본 일이 있다. 복알은 지극히 독하여 돼지나 개가 그것을 먹게 되면 곧 죽게 되고 수풀과 나무 사이에 이것을 걸어 놓아 까마귀나 까치가 감히 먹지 못한다.

[11-19] 嘗治, 少陽人, 蛇頭瘡, 河豚卵, 作末少許, 点膏藥上傳之, 而一日一次, 易以新末, 傳藥五六日, 病效, 而新肉急生, 而有妬肉, 因以磨刀砥末傅之, 妬肉立消, 而疾愈. 又用之於連珠痰, 多日傳之者, 必效. 用之於爲炭火所傷, 與狗咬蟲咬, 無不得效.

일찍이 소양인의 생안손을 치료한 적이 있는데 복알 가루 조금을 고약 위에 놓고 붙이되 1일에 1번씩 새 가루로 바꾸어 붙였더니 약을 붙인지 5~6일 만에 병에 효력이 있고 새살이 금방 생겼다. 그러나 굳은살이 생겨서 칼을 간 숯돌 가루를 붙였더니 굳살이 곧 없어지면서 병이 나았다. 또한 연주담(連珠痰)에도 썼는데 여러 날 붙이면 반드시 효과가 있었고, 이것을 숯불에 덴 데와 개에 물린 데 벌레에 물린 데도 썼는데 효과를 보지 못한 경우가 없다.

[11-20] 嘗治, 少陽人, 六十老人, 中風一臂不遂病, 用輕粉五理, 其病輒加. 少陽人二十歲少年, 一脚微不仁痺風, 用輕粉甘遂龍虎丹, 二三次用之, 得效.

일찍이 소양인 60노인을 치료한 적이 있는데 중풍으로 한쪽 팔을 쓰지 못하는 병에 경분(輕粉) 5리(厘)를 이용하니 그 병이 더 심해졌고, 소양인 20세 소년이 한쪽 다리가 약간 불편한 비풍(痺風)이 있어서 경분감수용호단(輕粉甘遂龍虎丹)을 2~3차 썼더니 효과를 보았다.

[11-21] 嘗治, 少陽人, 咽喉, 水醬不入, 大便不通, 三日, 病至危境, 用甘遂天一丸, 卽效.

일찍이 소양인 인후(咽喉)병을 치료한 적이 있는데 물과 미음을 조금도 넘기지 못하고 대변이 3일이나 통하지 못하여 병이 위태한 지경에 이르렀는데 감수천일환(甘遂天一丸)을 써서 바로 효과를 보았다.

[11-22] 嘗治, 少陽人, 七十老人, 大便四五日不通, 或六七日不通, 飲食如常, 兩脚膝寒無力. 用輕粉甘遂龍虎丹, 大便卽通, 後數日, 大便又秘則又用, 屢次用之, 竟以大便, 一日一度, 爲準, 而病愈, 此老, 竟

得八十壽.

일찍이 소양인 70세 노인을 치료한 적이 있는데 대변이 4~5일 통하지 못하거나 혹은 6~7일 통하지 못하나 음식은 평상시와 같으며 무릎이 차고 힘이 없어서 경분감수용호단(輕粉甘遂龍虎丹)을 썼더니 대변이 바로 통하고 수일 후에 다시 변비가 생겨 다시 쓰고 여러 번 써서 마침내 대변이 1일에 1회씩 기준이 되어 병이 나았다. 이 노인은 80세까지 장수하였다.

[11-23] 嘗見, 少陽人, 當門二齒齟縫, 血出, 頃刻間, 數碗, 將至危境, 有醫, 教以火熬香油, 以新綿點油, 乘熱灼齒縫, 仍爲血止.

일찍이 소양인이 앞니 두 개의 잇몸에서 피가 나오기 시작하여 잠시 동안에 두 사발씩이나 나와서 장차 위험한 지경에 이르게 되었는데 어떤 의사가 불에 끓인 참기름을 새 솜에 찍어서 뜨거운 때에 잇몸을 지지니 마침내 피가 멎는 것을 본 일이 있다.

[11-24] 嘗見, 少陽人, 一人, 每日一次梳頭, 數月後, 得口眼喎斜病, 其後, 又見少陽人, 日梳, 得喎斜病者, 凡三人, 盖日梳, 少陽人禁忌也. 嘗見, 太陰人, 八十老人, 日梳者, 老人, 自言曰, 日梳極好, 我之日梳, 已爲四十年云.

어떤 소양인 한 사람이 매일 한 차례씩 머리를 빗고 수개월 후에 구안와사(口眼喎斜)병에 걸린 것을 본 일이 있으며 그 후에 또 소양인이 매일 머리를 빗고 와사병을 얻은 것을 무릇 세 사람이나 더 보았다. 대개 머리를 빗는 것은 소양인에게 금기할 것이다. 일찍이 태음인 80세 노인이 매일 머리를 빗는 것을 본 일이 있는데 노인이 스스로 말하기를 매일 머리를 빗는 것은 매우 좋은 일이다. 내가 머리를 빗은 지가 이미 40년이나 되었다고 하였다.

張仲景 傷寒論中 少陽人病 經驗設方藥 十方

新定 少陽人病 應用要藥 十七方

새로 정한 소양인병의 주요 17처방

荊防敗毒散

형방패독산

羌活・獨活・柴胡・前胡・荊芥・防風・赤茯苓・生地黃・地骨皮・車前子 各一錢.

강활・독활・시호・전호・형개・방풍・적복령・생지황・지골피・차전자 각1돈.

右方, 治頭痛, 寒熱往來者, 宜用.

이 처방은 머리가 아프고 오한과 발열이 번갈아 나타나는 것을 치료하는데 쓴다.

荊防導赤散

형방도적산

生地黃 三錢, 木通 二錢, 玄蔘・瓜蒌仁 各一錢五分, 前胡・羌活・獨活・荊芥・防風 各一錢.

생지황 3돈, 목통 2돈, 현삼・과루인 각1돈5푼, 전호・강활・독활・형개・방풍 각1돈.

右方, 治頭痛, 胃膈煩熱者, 宜用.

이 처방은 머리가 아프고 가슴이 답답하며 열이 나는 것을 치료하는데 쓴다.

荊防瀉白散

형방사백산

生地黃 三錢, 茯苓・澤瀉 各二錢, 石膏・知母・羌活・獨活・荊芥・防風 各一錢.

생지황 3돈, 복령・택사 각2돈, 석고・지모・강활・독활・형개・방풍 각1돈.

右方, 治頭痛, 膀胱熾躁者, 宜用.

이 처방은 머리가 아프고 (방광으로 강음이 되지 않아) 속이 타며 조금해지는 것을 치료하는데 쓴다.

猪苓車前子湯

저령차전자탕

茯苓・澤瀉 各二錢, 猪苓・車前子 各一錢五分, 知母・石膏・羌活・獨活・荊芥・防風 各一錢.

복령・택사 각2돈, 저령・차전자 각1돈5푼, 지모・석고・강활・독활・형개・방풍 각1돈.

右方, 治頭腹痛, 有泄瀉者, 宜用.

이 처방은 머리와 배가 아프고 설사를 하는 것을 치료하는데 쓴다.

滑石苦參湯

활석고삼탕

茯苓・澤瀉・滑石・苦參 各二錢, 川黃連・黃柏・羌活・獨活・荊芥・防風 各一錢.

복령・택사・활석・고삼 각2돈, 천황련・황백・강활・독활・형개・방풍 각1돈.

右方, 治腹痛, 無泄瀉者, 宜用.

이 처방은 배가 아프지만 설사는 없는 것을 치료하는데 쓴다.

獨活地黃湯

독활지황탕

熟地黃 四錢, 山茱萸 二錢, 茯苓・澤瀉 各一錢五分, 牡丹皮・防風・獨活 各一錢.

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 복령・택사 각1돈5푼, 목단피・방풍・독활 각1돈.

右方, 治食滯痞滿者, 宜用.

이 처방은 먹은 것이 체하여 막힌듯 그득한 것을 치료하는데 쓴다.

荊防地黃湯

형방지황탕

熟地黃・山茱萸・茯苓・澤瀉 各二錢, 車前子・羌活・獨活・荊芥・防風 各一錢.

숙지황・산수유・복령・택사 각2돈, 차전자・강활・독활・형개・방풍 각1돈.

咳嗽, 加前胡. 血證, 加玄參・牡丹皮. 偏頭痛, 加黃連・牛蒡子. 食滯痞滿者, 加牡丹皮. 有火者, 加石膏. 頭痛煩熱, 與血證者, 用生地黃. 加石膏者, 去山茱萸. 荊芥・防風・羌活・獨活, 俱是補陰藥. 荊防, 大清胃膈散風, 羌獨, 大補膀胱真陰, 無論, 頭腹痛, 痞滿, 泄瀉, 凡虛弱者, 數百貼用之, 無不必效, 屢試屢驗.

기침에는 전호를 더하고, 혈증에는 현삼・목단피를 더하며, 편두통에는 황련・우방자를 더하고, 먹은 것이 체하여 막힌듯 그득한 것에는 목단피를 더하며, 화열증이 있으면 석고를 더하고, 머리가 아프며 답답하고 열이 나는 것이나 혈증에는 생지황을 쓰며, 석고를 더할 때에는 산수유를 뺀다. 형개・방풍・강활・독활은 모두 음을 보하는 약이니, 형개와 방풍은 가슴을 크게 맑게하며(시원하게 하며) 풍을 흩어버리고, 강활과 독활은 방광의 진음을 크게 보해준다. 두통, 복통, 비만, 설사 등을 막론하고 대개 허약한 사람에게 수백첩을 써서 반드시 효과를 보지 못한 경우가 없다는 것을 여러 번 시험하고 여러 번 증험하였다.

十二味地黃湯

십이미지황탕

熟地黃 四錢, 山茱萸 二錢, 白茯苓・澤瀉 各一錢五分. 牡丹皮・地骨皮・玄蔘・枸杞子・覆盆子・車前子・荊芥・防風 各一錢.

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 백복령・택사 각1돈5푼, 목단피・지골피・현삼・구기자・복분자・차전자・형개・방풍 각1돈.

地黃白虎湯

지황백호탕

石膏 五錢, 或一兩, 生地黃 四錢, 知母 二錢, 防風・獨活 各一錢.

석고 5돈 혹은 1냥, 생지황 4돈, 지모 2돈, 방풍·독활 각1돈.

陽毒白虎湯

양독백호탕

石膏 五錢, 或一兩, 生地黃 四錢, 知母 二錢, 荊芥・防風・牛蒡子 各一錢.

석고 5돈 혹은 1냥, 생지황 4돈, 지모 2돈, 형개·방풍·우방자 각1돈.

右方, 治陽毒發斑, 便秘者, 宜用.

이 처방은 양독으로 발진이 있고, 변비가 있는 경우에 쓴다.

涼膈散火湯

양격산화탕

生地黃・忍冬藤・連翹 各二錢, 山梔子・薄荷・知母・石膏・防風・荊芥 各一錢.

생지황・인동등・연교 각 2돈, 산치자・박하・지모・석고・방풍・형개 각 1돈.

右方, 治上消者, 宜用.

이 처방은 상소를 치료하는데 쓴다.

忍冬藤地骨皮湯

인동등지골피탕

忍冬藤 四錢, 山茱萸・地骨皮 各二錢, 川黃連・黃柏・玄蔘・苦參・生地黃・知母・山梔子・枸杞子・覆盆子・荊芥・防風・金銀花 各一錢.

인동등 4돈, 산수유・지골피 각2돈, 천황련・황백・현삼・고삼・생지황・지모・산치자・구기자・복분자・형개・방풍・금은화 각1돈.

右方, 治中消者, 宜用.

이 처방은 중소를 치료하는데 쓴다.

熟地黃苦參湯

숙지황고삼탕

熟地黃 四錢, 山茱萸 二錢, 白茯苓・澤瀉 各一錢五分, 知母・黃柏・苦參 各一錢.

숙지황 4돈, 산수유 2돈, 백복령・택사 각1돈5푼, 지모・황백・고삼 각1돈.

右方, 治下消者, 宜用.

이 처방은 하소를 치료하는데 쓴다.

木通大安湯

목통대안탕

木通・生地黃 各五錢, 赤茯苓 二錢, 澤瀉・車前子・川黃連・羌活・防風・荊芥 各一錢.

목통・생지황 각5돈, 적복령 2돈, 택사・차전자・천황련・강활・방풍・형개 각1돈.

右方, 治浮腫者, 宜用. 險病, 始終用藥, 當至百餘貼. 黃連・澤瀉, 爲貴材, 則貧者, 或去連澤.

이 처방은 부종을 치료하는데 쓴다. 험병에 처음부터 끝까지 이 약을 쓰는 것이 백여첩에 이르러야 한다. 황연・택사는 귀한 약재이므로 없으면 혹 빼고 사용한다.

黃連清腸湯

황연청장탕

生地黃 四錢, 木通・茯苓・澤瀉 各二錢, 猪苓・車前子・川黃連・羌活・防風 各一錢.

생지황 4돈, 목통・복령・택사 각2돈, 저령・차전자・천황련・강활・방풍 각1돈.

右方, 治病疾者, 宜用. 去木通二錢, 加荊芥一錢, 淋疾者, 宜用.

이 처방을 이질을 치료하는데 쓴다. 목통 2돈을 빼고 형개 1돈을 더하면 임질이 있는 경우에 쓴다.

朱砂益元散

주사익원산

滑石 二錢, 澤瀉 一錢, 甘遂 五分, 朱砂 一分, 右爲末, 溫水, 或井華水, 調服. 夏月滌暑, 宜用.

활석 2돈, 택사 1돈, 감수 5푼, 주사 1푼. 이상을 가루를 내어 따뜻한 물이 정화수로 복용한다. 여름에 더위를 떨쳐내는데 쓴다.

甘遂天一丸

감수천일환

甘遂末 一錢, 輕粉末 一分, 和勻糊丸, 分作十丸, 朱砂爲衣. 作丸乾久, 則堅硬難和, 每用時, 以紙二三疊包裹, 以杵搗碎, 作麤末, 三四五片, 口含末, 因飲井華水和下, 候三四辰刻內, 不下利, 則再用二丸, 下利三度, 爲適中, 六度, 爲快過, 預煎米飲, 下利二三次, 因進米飲, 否則氣陷, 而難堪耐. 治結胃, 水入還吐. 甘遂一錢, 輕粉五分, 分作十丸, 則名曰, 輕粉甘遂龍虎丹. 輕粉・甘遂各等分, 作十丸, 則名曰, 輕粉甘遂雌雄丹. 輕粉 一錢, 乳香・沒藥・甘遂 各五分, 分作三十丸, 則名曰, 乳香沒藥輕粉丸. 輕粉, 發汗, 甘遂, 下水. 輕粉藥力, 一分則快足, 五理則無不及. 甘遂藥力, 一分五理, 則快足, 七八理, 則無不及. 輕粉, 甘遂, 自是毒藥, 俱不可輕易過一分用之, 斟酌輕重. 病欲頭腦滌火, 則輕粉爲君. 病欲胃膈下水, 則甘遂爲君. 右少陽人藥諸種, 不可炮炙炒煨用.

감수가루 1돈, 경분가루 1푼을 고루 섞어 풀에 반죽하여 환을 만드는데 나누어 10알을 만들고 주사로 옷을 입힌다. 환을 만들어 말리는 것을 오래하면 단단해져 녹이기 어려우니, 복용할 때 종이로 두세겹을 쌓아 공이로 뿔아 부수어 거친 가루로 만든다. 3, 4, 5조각을 입에 머금어 가루로 만들고 정화수로 녹여 삼키며, 3, 4시각을 기다려서 설사를 하지 않으면 다시 2알을 쓴다. 설사를 3회 하면 알맞고, 6회 하면 너무 지나친 것이니 미리 미음을 수어 설사 2, 3회 할 때 미음을 먹는다. 그렇지 않으면 기운이 꺼져 내려가 감당하기가 어렵다. 결흉으로 물 마신 것을 도로 토하는 것을 치료한다. 감수 1돈, 경분 5푼을 10알로 나누어 만든 것을 경분감수용호단이라 한다. 경분과 감수를 같은 분량으로 하여 10알로 나누어 만든 것을 경분감수자용단이라 한다. 경분 1돈, 유향, 몰약, 감수 각 5푼을 30알로 나누어 만든 것을 유향몰약경분환이라 한다. 경분은 땀을 나게 하고, 감수는 수기를 내려가게 한다. 경분의 약력은 1푼이면 족하고, 5리면 미치지 못할 것이 없다. 감수의 약력은 1푼 5리면 족하고, 7, 8리면 미치지 못할 것이 없다. 경분과 감수는 독약으로 모두 1푼을 넘겨 쓰는 것을 가볍게 여겨서는 안되니 병증의 경중을 짐작하여 써야 한다. 병이 두뇌에 생기려 하면 화기를 씻어주어야 하니 경분을 군약으로 삼고, 병이 흉격에 생기려 하면 수기를 내려주어야 하니 감수를 군약으로 삼는다. 이상의 소양인 약물은 포구초외(炮炙炒煨)하여 사용하는 것이 불가하다.

東醫壽世保元 卷之四

동의수세보원 4권

太陰人 胃脘受寒表寒病論(13條)

태음인 위완수한표한병론

[12-1] 張仲景曰, 太陽傷寒, 頭痛發熱, 身疼腰痛, 骨節皆痛, 惡寒無汗而喘, 麻黃湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병 상한(太陽病 傷寒)에 두통이 있고 열이 나며 전신이 쭈시고 요통이 있고 뼈마디가 쭈시고 아프며 오한이 있으나 땀이 나지 않고 기침을 하면 마황탕(麻黃湯)을 쓴다.

[12-2] ○ 註曰, 傷寒, 頭痛身疼腰痛, 以至牽連, 百骨節, 俱痛者, 此太陽傷寒, 榮血不利, 故也.

주석으로 말하기를 상한에 두통이 나고 몸과 허리가 아픈 증세를 오래 끌어오다가 골절이 쭈시고 아프면 이는 태양병 상한으로 영혈(營血)이 고르지 못한 연고다.

[12-3] 論曰, 此, 卽太陰人傷寒, 背頗表病輕證也. 此證, 麻黃湯, 非不當用, 而桂枝甘草, 皆爲蠱材, 此證, 當用麻黃發表湯.

이를 태음인(太陰人)의 상한 배추표병경증(背佳頁表病輕證)이라 하였다. 이 증에 마황탕이 사용되었으나 계지(桂枝)와 감초(甘草)는 불필요한 것이며 마땅히 마황발표탕(麻黃發表湯)을 사용해야 한다.

[12-4] 張仲景曰, 傷寒四五日, 而厥者, 必發熱, 厥深者, 熱亦深, 厥微者, 熱亦微. 傷寒厥四日, 熱反, 三日, 復厥, 五日, 厥多熱少, 其病爲進. 傷寒發熱四日, 厥反, 三日, 厥少熱多, 其病當自愈.

상한 4~5일에 췌증(厥證)이 있는데 반드시 발열이 있다. 췌(厥)이 심한 것은 열도 심하고 췌가 미약한 것은 열도 미약하다. 상한병에 췌 4일에 발열은 3일하고 다시 췌 5일하는 것은 췌다열소(厥多熱小)로서 그 병이 진행되는 것이다. 상한병에 발열 4일하고 췌 3일하는 것은 췌소열다(厥小熱多)로서 그 병은 스스로 낫는다.

[12-5] 論曰, 此謂之厥者, 但惡寒不發熱之謂也, 非手足厥逆之謂也. 太陰人, 傷寒表證, 寒厥四五日後, 發熱者, 重證也, 此證, 發熱, 其汗必自髮際, 而始通於額上, 又數日後發熱, 而眉稜通汗, 又數日後發熱, 而顴上通汗, 又數日後發熱, 而脣頤通汗, 又數日後發熱, 而胃臆通汗也, 而額上之汗, 數次, 而後, 達於眉稜, 眉稜之汗, 數次, 而後, 達於顴上, 顴上之汗, 數次, 而後, 達於脣頤, 脣頤之汗, 不過一次, 而直達於胃臆矣. 此證, 首尾幾近二十日, 凡寒厥六七次, 而後病解也, 此證, 俗謂之長感病. 凡太陰人病, 先額上眉稜, 有汗, 而一汗病不解, 屢汗病解者, 名曰長感病.

이른바 췌이라 함은 단지 오한만 있고 발열이 없음을 말한 것이요, 수족(手足)의 췌역(厥逆)을 말한 것이 아니다. 태음인 상한 표증에 있어서 한췌(寒厥)이 된지 4, 5일후에 열이 나는 것은 중증(重證)이다. 이 증세에 열이 오르고 땀이 날 때에는 반드시 발제(髮際)에서 시작하여 이마로 통하고 며칠 후에 다시 열이 오르다가 눈썹 가에 땀이 통하고 또 며칠 후에는 열이 오르다가 뺨에서 땀이 나고 다시 며칠 후에는 열이 오르다가 입술과 턱에서 땀이 통하고 또 열이 오르다가 가슴에서 땀이 통한다. 이와 같이 이마에 땀이 몇 차례 난 뒤에는 눈썹 가에 이르고 눈썹 가에 땀이 몇 차례난 뒤에는 뺨에 이르고 뺨에 땀이 몇 차례난 후에는 입술과 턱에 이르러 불과 한차례 땀이 난 다음에 곧바로 가슴으로 통한다. 이 병 증세가 처음 시작하여 병이 낫기까지 근 20일이 걸려 한췌가 6, 7차 반복한 후에 풀리는데 이를 사람들은 장감병(長感病)이라 한다. 대체로 태음인 병은 먼저 이마 위와 눈썹 가에서 땀이 나는데 한 번 땀이 났는데도 병은 풀리지 않고 여러 번 땀을 낸 후 비로소 풀리는 것을 장감병이라고 하는 것이다.

[12-6] 太陰人病, 寒厥六七日, 而不發熱不汗出, 則死也. 寒厥二三日, 而發熱汗出, 則輕證也, 寒厥四五日, 而發熱, 得微汗於額上者, 此之謂長感病, 其病, 爲重證也. 此證原委, 勞心焦思之餘, 胃脘衰弱, 而表局虛薄不勝寒, 而外被寒邪所圍, 正邪相爭之形勢, 客勝主弱, 譬如一團孤軍, 困在垓心, 幾於全軍覆沒之境, 先鋒一隊, 倖而跳出, 決圍一面, 僅得開路, 後軍全隊, 尙在垓心, 將又屢次力戰然後, 方爲出來則交象, 正是凜凜之勢也. 額上通汗者, 卽先鋒一隊, 決圍跳出之象也, 眉稜通汗者, 卽前軍全隊, 決圍全面, 氣勢勇敢之象也, 顴上通汗者, 中軍半隊, 緩緩出圍之象也, 此病, 汗出眉稜, 則快免危也, 汗出顴上, 則必無危也.

태음인 병에 한췌 6~7일에 열이 나지 않고 땀도 나지 않으면 죽는다. 한췌 2~3일에 발열과 한출(汗出)이 있으면 경증(輕證)이다. 한췌 4~5일에 발열하고 이마 위에 약간 땀이 나는 것은 장감병으로 중증(重證)이다. 노심초사(勞心焦思)하여 위안(胃脘)이 쇠약해지고 표(表)가 허박(虛薄)해져서 한사(寒邪)를 이기지 못하고 한사에 에워싸여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 싸우는 형세인데 객(客)이 이기고 주인이 약한 것이다. 전장의 전세에 비유컨대 포위를 당하고 있는 외로운 군대가 포위망 속에서 거의 전군대가 모두 몰락의 위기에 있다가 선봉일대가 요행으로 뛰어나가서 결사적으로 전투를 하여 겨우 포위망을 뚫어 놓기는 하였으나 후군 전대가 아직 포위망 속에 있으니 앞으로는 여러 차례를 전투를 한 다음에야 전군이 모두 나올 수 있게 되었으니 효상(爻象)이 진실로 늑대한 기세인 것이다. 액상(額上)에서 땀이 나온 것은 선봉일대가 결사적으로 포위진을 뚫고 뛰어나오는 상이요 미릉(眉稜)에서 땀이 나는 것은 전군 전대가 적진을 무찌르는 용감한 상이요 관상(顴上)에서 땀이 나는 것은 중군 반대(中軍 半隊)가 천천히 포위를 뚫고 나오는 상이니 이 병에서 미릉에서 땀이 나오면 위급한 것을 꽤히 면한 것이고 관상에서 한출하는 것은 병이 위급하지 않은 것이다.

[12-7] 太陰人汗, 無論額上, 眉稜上, 顴上, 汗出如黍粒, 發熱稍久, 而還入者, 正強邪弱, 快汗也. 汗出如微粒, 或淋漓無粒, 乍時而還入者, 正弱邪強, 非快汗也.

태음인 땀은 이마 눈썹 뺨을 막론하고 땀방울이 기장알 같이 굵어야 하며 또 열이 약간 오래 있다가 들어가면 정기가 강하고 사기가 약한 것이니 상쾌한 땀이지만 만일 땀방울이 적고 또 방울이 없이 잠시 후에 들어가면 정기가 약하고 사기가 강한 것이니 상쾌하지 못한 땀이다.

[12-8] 太陰人, 背部後面, 自腦以下, 有汗, 而面部髮際以下, 不汗者, 凶證也. 全面, 皆有汗, 而耳門左右, 不汗者, 死證也. 大凡太陰人汗, 始自耳後高骨, 面部髮際, 大通於胷臆間, 而病解也. 髮際之汗, 始免死也, 額上之汗, 僅免危也. 眉稜之汗, 快免危也, 顴上之汗, 生路寬闊也. 脣頤之汗, 病已解也, 胷臆之汗, 病大解也. 嘗見此證, 額上汗, 欲作眉稜汗者, 寒厥之勢, 不甚猛也. 顴上汗, 欲作脣頤汗者, 寒厥之勢, 甚猛, 至於寒戰叩齒, 完若動風而其汗, 直達兩腋, 張仲景所云, 厥深者, 熱亦深, 厥微者, 熱亦微, 蓋謂此也. 此證, 寒厥之勢, 多日者, 病重之勢也. 寒厥之勢, 猛峻者, 非病重之勢也.

태음인이 등 뒤 목덜미 아래에는 땀이 있어도 얼굴 발제(髮際) 아래로 땀이 나지 않는 것은 흉(凶)한 병세이고 또 얼굴 전면에 땀이 있어도 양쪽 이문(耳門)에서 땀이 나지 않는 것은 죽는 증세이다. 대체로 태음인의 땀은 귀 뒤의 높은 뼈와 안면 발제에서 시작하여 젖가슴에서 크게 통하면 이는 병이 풀리는 것이고 발제의 땀은 비로소 죽음을 면하기 시작한 것이고 이마에서 나는 땀은 겨우 위험을 면하는 것이고 눈썹 가에서 나는 땀은 위험을 완전히 면한 것이고 뺨에서 나는 땀은 살길이 넉넉히 활짝 열린 땀이고 입술과 턱에서 나는 땀은 병이 이미 풀린 것이고 젖가슴에서 나는 땀은 병이 완전히 풀린 것이다. 대체로 모든 태음인의 땀은 귀 뒤 높은 뼈와 안면발제에서부터 시작하여 젖가슴에서 크게 통한하면 병이 풀리는 것이다. 일찍이 이마에서 땀이 나기 시작하여 눈두덩위에 땀이 나려고 할 때에는 한결을 일으키는 증상이 맹렬하지 못하고 뺨 위의 땀이 나서 입술과 턱에 일으키려는 땀은 한결이 몹시 맹렬하여 한전(寒戰)을 일으켜 이빨을 부딪치면서 턱을 떠는 것이 완전히 동풍(動風)증을 일으킬 것처럼 되더니 그 땀이 양쪽 겨드랑이 밑으로 곧장 도달하는 것이다. 장중경이 말한 꺾이 심한 것은 또한 열이 심하다 하였고 꺾이 미약한 것은 또한 열도 미약하다 한 것은 모두 이 한결하는 병증을 보고 이르는 말이다. 이 병증에서 한결하는 증상이 여러 날 계속하는 것은 그 병이 중증이 되려는 형세이고 한결하는 증상이 몹시 맹렬한 것은 중증이 될 병세가 아니다.

[12-9] 此證, 京畿道人, 謂之長感病, 咸鏡道人, 謂之四十日痛, 或謂之無汗乾病, 時俗所用荊防敗毒散・藿香正氣散・補中益氣湯, 箇箇誤治. 惟熊膽, 雖或盲人直門, 然, 又連用他藥, 病勢更變, 古人所云, 病不能殺人, 藥能殺人者, 不亦信乎. 百病加減之勢, 以凡眼目觀之, 固難推測, 而此證, 又有甚焉, 此證之汗, 在眉稜顴上時, 雖不服藥, 亦自愈矣, 而病人, 招醫, 妄投誤藥, 則顴上之汗, 還爲額上之汗, 而外證寒厥之勢, 則稍減矣. 於是焉, 醫師, 自以爲信藥效, 病人, 亦自以爲得藥效, 又數日誤藥, 則額上之汗, 又不通, 而死矣. 此證, 當以汗之進退, 占病之輕重, 不可以寒之寬猛, 占病之輕重, 張仲景曰, 其病, 當自愈云者, 豈非珍重無妄之論乎. 然, 長感病, 無疫氣者, 待其自愈, 則好也, 而瘟病, 疫氣重者, 若明知證藥無疑, 則不可尋常置之, 待其勿藥自愈, 恐生奇證.

이런 증세를 경기도 사람은 장감병이라 하고 함경도 사람은 사십일통(四十日痛)이라 하고 혹은 무한건병(無汗乾病)이라고 하여, 흔히 쓰는 약이 형방패독산(荊防敗毒散)・곽향정기산(藿香正氣散)・보중익기탕(補中益氣湯)인데, 모두 이병을 잘못 치료하는 것이니 오직 웅담(熊膽)이 혹 맹인직문(盲人直門)격으로 잘 듣는 수가 있는 것이다. 그러나 웅담을 쓰고도 다른 적당치 못한 약을 이어 쓰면 병세가 다시 변하는 것이다. 옛사람이 병이 사람을 죽이는 것이 아니라 약이 능히 사람을 죽일 수 있다 하였으니 과연 믿지 않을 수 있겠는가. 모든 병이 더하고 덜 하는 증상을 보통 식견으로 보고 추측하며 알기 어려워 더욱 이 병증은 더욱 심한 것이다. 이 병증에서 땀이 미릉과 관상에서 나오면 그런 때는 약을 쓰지 않아도 병이 스스로 나올 수 있는 것인데 병인이 의사를 불러 오게 하여 적당치 못한 약을 투약하면 관상에서 나오던 땀이 다시 액상으로 올라가면 외증(外證)인 한결하는 증세가 좀 덜하게 되어 이것을 보고 의사는 자기의 약효가 난다고 믿고 또한 병인도 약효가 있다고 생각을 하여 또 잘못된 약을 며칠 더 쓰면 이번에는 액상에서 나오던 땀마저 끊어져 죽는 것이다.

그러므로 이 병은 땀의 진퇴로서 경중을 알 것이고, 한결하는 증상이 맹렬하고 미약한 것은 병의 경중을 점쳐서는 안 된다. 장중경이 말하기를 그 병증에 약을 쓰지 않아도 스스로 나을 수 있다고 한 것이 어찌 진중하고 거짓이 없는 말이 아니겠는가? 그러나 장감병에 있어서 역기(疫氣)가 없는 환자는 스스로 낫기를 기다려도 좋겠으나 온병(瘟病)에 역기가 심한 사람은 병증과 약성을 밝게 알고 의심할 것이 없이 밝게 안다면 약을 쓰지 않고 심상하게 두어 병이 스스로 낫기를 기다려서는 안 된다. 그렇게 하면 기증(奇證)이 생길까 두렵기 때문이다.

[12-10] 論曰, 太陰人病, 寒厥四日, 而無汗者, 重證也. 寒厥五日, 而無汗者, 險證也. 當用熊膽散, 或寒多熱少湯, 加蟬蟜五七九介. 大便滑者, 必用乾栗・薏苡仁等屬. 大便燥者, 必用葛根・大黃等屬. 若額上眉稜上, 有汗則待其自愈, 而病解後, 用藥調理, 否則恐生後病.

태음인 병이 한결 4일에 무한자(無汗者)는 중증시오 한결 5일에 무한자는 험증이니 마땅히 웅담산을 쓰거나 혹 한다열소탕(寒多熱少湯)에 제조(蟬蟜) 5,7,9개를 가(加)하되 대변 묽으면 반드시 건율(乾栗)・의이인(薏苡仁) 등을 써야하고 대변이 굳으면 갈근(葛根)・대황(大黃) 등속을 써야한다. 만약 이마, 눈두덩 위에서 땀이 보이면 스스로 병이 낫기를 기다리며 병이 나은 뒤에도 약을 써서 조리해야 한다. 그렇지 않으면 후유증이 생길 우려가 있다.

[12-11] 嘗治, 太陰人, 胃脘寒證, 瘟病. 有一太陰人, 素有怔忡, 無汗, 氣短, 結咳矣. 忽焉又添出一證, 泄瀉, 數十日不止, 卽表病之重者也, 用太陰調胃湯, 加樗根皮 一錢, 日再服十日, 泄瀉, 方止, 連用三十日, 每日流汗滿面, 素證亦減, 而忽其家五六人, 一時瘟疫, 此人, 緣於救病, 數日不服藥矣. 此人, 又染瘟病瘟證, 粥食無味, 全不入口, 仍以太陰調胃湯, 加升麻・黃芩 各一錢, 連用十日, 汗流滿面, 疫氣少減, 而有二日大便不通之證, 仍用葛根承氣湯, 五日, 而五日內, 粥食大倍, 疫氣大減, 而病解. 又用太陰調胃湯, 加升麻・黃芩, 四十日調理, 疫氣既減, 素病亦完.

일찌기 태음인이 위완한증(胃脘寒證)의 온병(瘟病)을 치료한 적이 있다. 태음인 한 사람이 평소에 정충(怔忡), 무한(無汗), 기단(氣短), 결해(結咳)가 있었는데 갑자기 한 증세가 더하여 설사가 수 십일이 되어도 멎지 않는데 이것은 표병(表病)으로 중증(重證)이다. 태음조위탕(太陰調胃湯)에 저근백피(樗根白皮) 1돈을 가하여 매일 2접씩 10일간 썼더니 설사가 멎으므로 계속 30일을 쓰니 매일 얼굴에서 땀이 흐르고 본디 갖고 있던 병증도 나아갔다. 그런데 별안간 그 집안사람 5, 6명이 한꺼번에 온역병에 걸려 이 사람이 그것을 간호하게 되어 수일간 약을 복용하지 못하였다. 또한 이 사람도 온병에 전염되어 입맛이 잃고 아무것도 먹지를 못한다. 곧, 태음조위탕에 승마(升麻)・황금(黃芩) 각 1돈을 가하여 계속 10일간 복약하게 하였더니 얼굴에서 땀이 흐르고 역기도 약간 덜 하는데 대변을 이틀간 보지 못하므로 곧 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 5일간 썼더니 5일 동안 죽을 2배로 먹고 역기도 대감(大減)하면서 병이 풀리는 것이다. 또한 태음조위탕에 승마・황금을 가하여 40일간 조리시켰더니 역기는 이미 풀렸고 본래 앓던 병증도 완치되었다.

[12-12] 結咳者, 勉強發咳, 痰欲出不出而或出, 曰結咳. 少陰人結咳, 謂之胃結咳. 太陰人結咳, 謂之額結咳.

결해(結咳)라고 하는 것은 힘을 써서 기침을 하면서 가래를 뱉으려고 하여도 잘 떨어져 나오지 않기도 하고 혹 떨어져 나오기도 하는 것을 결해라 한다. 소음인 결해를 흉결해(胸結咳)라하고 태음인 결해를 함결해(頤結咳)라고 한다.

[12-13] 大凡瘟疫, 先察其人素病如何, 則表裡虛實, 可知已. 素病寒者, 得瘟疫, 則亦寒證也. 素病熱者, 得瘟疫, 則亦熱證也. 素病輕者, 得瘟疫, 則重證也. 素病重者, 得瘟疫, 則險證也.

대개 온역은 먼저 그 사람의 평소의 병이 어떠한가를 살펴보아야 표리허실(表裏虛實)을 잘 알 수 있는 것이다. 평소 한증(寒證)의 병이 있는 사람이 온병(瘟病)에 걸리면 역시 한증이 되고 평소 열증의 병이 있는 사람이 온병에 걸리면 역시 열증(熱證)이 된다. 평소의 병이 경(輕)한 사람이 온병에 걸리면 중증(重證)이 되고 평소 병증이 중(重)한 사람이 온병에 걸리면 험증(險證)이 된다.

[12-14] 有一太陰人素病, 咽嗑乾燥, 而面色青白, 表寒或泄. 盖, 咽嗑乾燥者, 肝熱也, 面色青白, 表寒

或泄者, 胃脘寒也. 此病, 表裡俱病, 素病之太重者也. 此人, 得瘟疫, 其證, 自始發日至于病解, 二十日. 大便初滑或泄, 中滑未乾, 每日二三四次, 無日不通, 初用寒多熱少湯, 病解後, 用調理肺元湯, 四十日調理, 僅僅獲生. 此病始發, 大便, 或滑或泄, 而六日內, 有額汗, 眉稜汗, 顴汗, 飲食起居, 有時如常, 六日後, 始用藥, 七日, 全體面部髮際以下, 至于脣頤, 汗流滿面, 淋漓洽足, 而汗後, 面色帶青, 有語訥證, 八日九日, 語訥耳聾, 而脣汗還爲顴汗, 顴汗還爲眉稜汗, 汗出微粒, 乍出乍入, 而只有額汗, 呼吸短喘矣. 至于十日夜, 額汗還入, 而語訥耳聾, 尤甚, 痰涎壅喉, 口不能喀, 病人, 自以手指, 探口拭之, 而出十一日, 呼吸短喘, 尤甚. 至于十二日, 忽然, 食粥二碗, 斯時, 若論其藥, 則熊膽散, 或者可也, 而熊膽闕材, 自念此人, 今夜必死矣. 當日初昏, 呼吸, 暫時少定. 十三日鷄鳴時, 髮際有汗. 十四日, 十五日, 連三日, 食粥, 二三碗, 額汗, 眉稜汗, 顴汗, 次次發出, 面色脫青. 十六日, 臆汗始通, 稍能喀痰, 語訥亦愈. 至于二十日, 臆汗, 數次大通, 遂能起立房中, 諸證皆安, 而耳聾證, 則自如也. 病解後, 用藥調理, 四十日, 耳聾目迷, 自祛.

태음인 한사람의 평소 병이 목안이 건조하고 얼굴빛이 청백(淸白)하며 몸이 차고 설사를 하는 증세가 있었다. 목안이 건조한 것은 간열(肝熱)이고 얼굴이 청백하며 몸이 차고 혹 설사 하는 것은 위완한(胃脘寒)이다. 이 병은 표리가 모두 병이 된 것이니 평소 병이 매우 중(重)한 것이다. 이 사람이 온병이 전염되었는데 그 증세가 병이 시작하여 풀리기까지 20일 사이에 대변이 처음에는 활(滑) 혹 설사하기도 하고 중간은 활하다가 끝에 가서는 건조한 대변을 보기도 한다. 이와 같이 하기를 매일 3,4회씩 보지 않는 날이 없었다. 그리하여 처음 약은 한다열소탕(寒多熱少湯)을 쓰고 병이 풀린 후에 조리폐원탕(調理肺元湯)을 40일 동안 써서 조리를 시켰더니 겨우 생명을 구하게 된 것이다. 이 병이 처음 시작할 때는 대변이 혹 묽기도 하고 혹 설사하기도 하며 6일까지는 이마 눈썹 뺨에 땀이 나고 음식과 기거가 평소와 같으므로 6일 후에 비로소 약을 쓰니 7일에는 발제이하 입술과 턱에 이르기까지 얼굴 전체에 땀이 줄줄 흐른다. 땀이 흡족히 흘러 떨어지더니 땀이 난 후에 얼굴색이 청색을 띠고 어눌증(語訥證)이 일어나더니 8,9일에는 어눌증에 이농증(耳聾證)을 더하면서 입술의 땀이 다시 뺨의 땀으로 돌아가고, 뺨의 땀이 돌아가 눈두덩이의 땀으로 되면서, 땀이 미립(微粒)모양으로 때로 있다 없다 하더니 단지 이마의 땀만 있고 숨이 몹시 차다. 10일째 되던 밤에는 이마의 땀마저 들어가고 어눌증과 이농증은 더욱 심하여지고 가래덩어리가 목에 막혀서 입으로 뱉어내지 못하고 병인이 손가락으로 더듬어 고집어내었다. 11일에 호흡곤란이 더욱 심하여지더니 12일에 이르러 갑자기 죽을 2사발이나 먹었다. 이런 때는 웅담산(熊膽散)이나 써보는 것이 좋겠지만 웅담도 없으니 나의 생각으로는 이 사람이 반드시 오늘 저녁에 죽을 것이라고 짐작하고 있었다. 그러나 그 사람이 그날 초저녁부터 호흡이 잠깐 안정되는 것이다. 13일 새벽 계명(鷄鳴)시부터는 면부 발제(面部髮際)에 땀이 나고 14,15일 연 3일간 죽을 2, 3사발씩이나 먹으면서 이마 눈두덩 뺨에 차차 땀이 나고 얼굴에 청색이 없어지고 16일에는 가슴에서 비로소 땀이 나고 가래를 조금씩 뱉고 어눌증도 또한 없어졌다. 20일에 이르러서는 가슴에서 수차례 많은 땀이 나고 드디어 차츰 방안에서 걷기도 하고 모든 증상이 다 나았으나 아직 이롱증이 남아있다. 그리하여 병이 풀린 후에 약을 써서 40일간 조리 시켰더니 이롱증과 어지러운 증세도 스스로 없어지는 것이다.

太陰人 肝受熱裏熱病論(40條)

태음인 간수열이열병론(40조)

[13-1] 朱肱曰, 陽毒, 面赤斑, 斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血, 宜葛根解肌湯・黑奴丸. 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尙緩, 斡開其口, 灌黑奴丸, 藥下咽, 卽活.

주굉(朱肱)이 말하기를 양독(陽毒)은 얼굴에 붉은 반점이 있는데 그 반점이 마치 비단 무늬같이 나타나기도 하고 목구멍이 아프며 가래에 피고름이 섞여서 나오는 것이다. 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)・흑노환(黑奴丸)을 써야 한다. 양독과 괴증상한(壞證傷寒)은 의서(醫書)에 치법(治法)이 별로 없지만 정신과 기혈(氣血)이 이미 마른 것이라도 가슴에 아직 따뜻한 기가 있으면 입을 벌려 흑노환을 물에 부어 넣어 약물이 목구멍으로 넘어가기만 하면 즉시 살아난다.

[13-2] 李梴曰, 微惡寒發熱, 宜葛根解肌湯. 目疼鼻乾, 潮汗閉澀, 滿渴狂譫, 宜調胃承氣湯. 熱在表, 則

目疼不眠, 宜解肌湯. 熱入裡, 則狂譫, 宜調胃承氣湯.

이천(李梴)이 말하기를 미오한(微惡寒) 발열(發熱)에 마땅히 갈근해기탕이오, 눈알이 아프고 콧속이 마르며 땀이 쏟아지다가 막히고 조갈이 심하며 미친 사람같이 헛소리를 하면 조위승기탕(調胃承氣湯)을 쓰는 것이 좋다. 열이 표(表)에 있으면 눈이 아프고 잠을 이루지 못하니 마땅히 해기탕(解肌湯)을 쓰고 열이 리(裏)에 들어가면 미친 사람같이 헛소리를 하니 마땅히 조위승기탕을 쓴다.

[13-3] 龔信曰, 陽明病, 目疼, 鼻乾, 不得臥, 宜葛根解肌湯.

공신(龔信)이 말하기를 양명병(陽明病)에 눈알이 아프고 콧속이 마르고 잠을 이루지 못하면 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)을 쓴다.

[13-4] 三陽病深, 變爲陽毒, 面赤眼紅, 身發斑黃, 或下利黃赤, 六脈洪大, 宜黑奴丸.

삼양병(三陽病)이 심하면 양독으로 변한다. 얼굴이 붉고 눈이 빨가며 몸에는 노란 반점이 생기고 간혹 황적색의 설사를 하며 육맥(六脈)이 홍대(弘大)하면 마땅히 흑노환(黑奴丸)을 쓴다.

[13-5] 論曰, 右諸證, 當用葛根解肌湯・黑奴丸.

위의 증에는 갈근해기탕 흑노환을 사용한다.

[13-6] 靈樞曰, 尺膚熱深, 脈盛燥者, 病瘟也.

영추(靈樞)에 말하기를 척맥(尺脈) 부위 피부에 열이 깊어서 맥(脈)이 성(盛)하고 조증(燥證) 있는 자는 온병(瘟病)이다.

[13-7] 王叔和曰, 瘟病脈, 陰陽俱盛, 病熱之極, 浮之而滑, 沈之散澁.

왕숙화(王叔和)가 이르기를 온병맥(瘟病脈)은 음양(陰陽)이 다 같이 성하니 병의 열이 극도에 이르면 맥이 부지이활(浮之而滑)하며 침지이산삽(沈之而散澁)하다.

[13-8] 脈法曰, 瘟病二三日, 體熱, 腹滿, 頭痛, 食飲如, 故脈直而疾, 八日死. 瘟病四五日, 頭痛, 腹滿而吐, 脈來細而強, 十二日死. 八九日, 頭身不痛, 目不赤, 色不變而反利, 脈來澁, 按之不足, 舉時大, 心下堅, 十七日死.

맥법(脈法)에 온병 2~3일에 몸에 열이 나고 배가 부르며 두통이 있으며 음식은 전과 같고 맥이 곧고 빠르면 8일에 죽고 온병이 4~5일이 되어서 두통이 나고 배가 부르면서 토하고 맥이 가늘면서 굳세게 나오면 12일에 죽는다. 또 8~9일이 되어서 머리와 몸이 아프지 않고 눈알이 붉거나 얼굴색이 변하지 않으나 설사를 하며 맥이 삽(澁)해도 누르면 없어지고 들면 크게 나타나고 명치 밑이 단단하면 17일에 죽는다.

[13-9] 龔信曰, 瘟病, 穰穰大熱, 脈細小者, 死, 瘟病, 下利痛甚, 死.

공신(龔信)이 말하기를 온병에 열이 몹시 성하나 맥이 가늘게 나오면 죽는 것이고 온역에 설사가 심하고 배가 몹시 아픈 것도 죽는다.

[13-10] 萬曆丙戌, 余寓大梁, 瘟疫大作, 士民多斃. 其證, 增寒壯熱, 頭面項頰赤腫, 咽喉腫痛, 昏愎. 余發一秘方, 名二聖救苦丸, 大黃四兩, 豬牙皂角二兩, 麵糊和丸, 菽豆大, 五七十丸, 一服即汗, 一汗即愈, 稟壯者, 百發百中. 牙皂, 開關竅, 發其表, 大黃, 瀉諸火, 通其裡.

공신이 또 말하기를 병술년(丙戌年)에 내가 대량(大梁) 땅에 살고 있을 때에 온역병(瘟疫病)이 크게 유행하여 많은 사람들이 죽어 가는 것을 보았다. 그 온역병의 증상을 말하면 병이 발생하는 초기부터 크게 고열이 발하면서 오한을 거듭하는 것이다. 그리고 이어 머리에서부터 얼굴 목 뺨에 이르기까지 붉게 붓고 인후에 염증을 일으켜 아프며 혼수상태가 된다. 그리하여 내가 한 가지 비방을 발명하고 이성구고환(二聖救苦丸)이라 하였다. 대황(大黃) 4양(兩)과 저아조각(豬牙皂角) 2량(兩)을 가루로 만들어 밀가루 풀로 환을 만드는데 녹두알 크기로 한다. 복용법은 1회에 50~70환(丸)을 한번만 먹게 한다. 한번 먹고 즉시 땀이 나고 그 병이 풀리니 건강한 사람들에게는 백발백중으로 낫는

것이다. 조각(皂角)은 땀구멍을 열고 사기(邪氣)를 땀으로서 밖으로 발산시키고 대항은 속에 있는 모든 열화와 사기(邪氣)를 설사로서 아래로 통하게 하는 것이다.

[13-11] 感四時不正之氣, 使人, 痰涎壅盛, 煩熱, 頭疼身痛, 增寒壯熱, 項強睛疼, 或飲食如常, 起居依舊, 甚至聲啞, 或赤眼口瘡, 大小腮腫, 喉痺, 咳嗽稠粘, 噴嚏.

신이 또 말하기를 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절에 바르지 못한 나쁜 사기(邪氣)에 감염되면 사람으로 하여금 가래가 성하여 막히고 번열(煩熱)이 나고 머리와 온 몸이 쭈시고 아프면서 또 열이 크게 나서 오한증이 점점 더하여 목이 뻣뻣하며 눈동자가 쭈시며 혹은 음식과 기거하는 것은 보통 때와 다름없고 심하게 되면 목이 쉬고 혹은 눈이 벌겍게 되고 입안이 헐고 뺨에는 크고 작은 부스럼이 생기며 목구멍이 아파서 기침하게 되면 끈끈한 가래가 나오고 재채기를 하는 것이다.

[13-12] 論曰, 右諸證, 增寒壯熱燥澀者, 當用皂角大黃湯・葛根承氣湯. 頭面項頰赤腫者, 當用皂角大黃湯・葛根承氣湯. 體熱腹滿自利者, 熱勝, 則裡證也, 當用葛根解肌湯. 寒勝, 則表證, 而太重證也, 當用太陰調胃湯, 加升麻・黃芩.

우측 제증에 증한 장열조삽자는 조각대항탕(皂角大黃湯)・갈근승기탕(葛根承氣湯), 두면 항협적증자는 조각대항탕・갈근승기탕, 체열복만자리자는 열이 승하면 이증(裏證)이니 갈근해기탕(葛根解肌湯), 한이 승하면 표증(表證)이 태중이니 태음조위탕(太陰調胃湯)에 승마・황금을 가한다.

[13-13] 嘗治, 太陰人, 肝熱熱證瘧病, 有一太陰人素病, 數年來, 眼病, 時作時止矣, 此人, 得瘧病, 自始發日, 用熱多寒少湯, 三四五日, 大便, 或滑或泄. 至六日, 有大便, 一日不通之證, 仍用葛根承氣湯, 連三日, 粥食大倍, 又用三日, 疫氣大減. 病解後, 復用熱多寒少湯, 大便燥澀, 則加大黃一錢, 滑泄太多, 則去大黃, 如此調理二十日, 其人完健.

태음인이 소병으로 안병이 있어서 때로는 나왔다가 때로는 재발하곤 하였다. 이렇게 몇 해를 지내 오던 참에 이 사람이 온병에 걸린 것이다. 1~5일 병 발생 첫 날 부터 열다한소탕을 3, 4, 5일을 계속 썼더니 대변이 흑 묽기도 하고 흑 설사를 하다가 6일에 이르러서 대변이 1일간 불통하는 것이다. 그리하여 즉시로 쓴 것이 갈근승기탕(葛根承氣湯)이었다. 3일간 계속 썼더니 죽을 곱 배나 더 먹고 3일간 또 다시 썼더니 역기가 크게 풀리고 나온 것이다. 병해 후 다시 열다한소탕(熱多寒少湯)을 쓰니 대변이 조삽하면 가 대항1돈하고, 묽거나 설사를 하면 대항을 빼고 썼다. 20일간 조리하니 완전히 건강해졌다.

[13-14] 此病始發, 嘔逆嘔吐, 昏憤不省, 重痛矣, 末境, 反爲輕證, 十二日而病解.

이 병이 처음에는 구역구토(嘔逆嘔吐)하며 혼궤불성(昏憤不)하여 중통하더니 말경에 다시 가벼워져 20일로서 병이 풀린 것이다.

[13-15] 一太陰人, 十歲兒, 得裡熱瘧病, 粥食全不入口, 藥亦不入口, 壯熱穰穰, 有時飲冷水, 至于十一日, 則大便不通, 已四日矣. 恆怯譫語, 日有百蟲滿室, 又有鼠入懷云, 奔遑匍匐, 驚呼啼泣, 有時熱極生風, 兩手厥冷, 兩膝伸而不屈, 急用葛根承氣湯, 不憚啼泣, 強灌口中, 卽日, 粥食大倍, 疫氣大解, 倖而得生.

10세된 아이가 리열 온병(裏熱 瘧病)에 걸렸다. 미음이거나 약도 전혀 입으로 넘기지 못하고 열이 가득차서 때로 냉수를 마시는 것이다. 이렇게 11일에 이르러서 대변을 못 본지 이미 4일이 되었다고 한다. 무서워서 겁을 내며 헛소리하기를 각종 벌레가 방안에 가득하다고 하며 또 내 몸으로 쥐가 들어온다고 하며 황급히 엎드려 엉금엉금 기며 놀라 소리 지르며 눈물을 흘리며 우는 것이다. 열이 극도에 이를 때는 동풍이 생겨 두 손이 차가워지는 것이다. 급히 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 다려서 울고 있는 것도 꺼리지 않고 억지로 입안에 부어 넣었더니 그날로 미음을 곱으로 더 먹고 역기가 크게 풀려 요행으로 생명을 살린 것이다.

[13-16] 此病, 始發四五日, 飲食起居如常, 無異平人矣, 末境, 反爲重證, 十七日而病解.

이 병이 발생한 지 4~5일 동안은 먹는 것이나 앉고 서는 것이 땀땀하여 보통 사람과 다름이 없다

가 나중에 도리어 중병으로 변하여서 17일로서 병이 풀린 것이다.

[13-17] 內經曰, 諸澁, 枯涸皴揭, 皆屬於燥.

내경에 말하기를 모든 조삽하여 갈갈한 것(澁)에 몸이 여위고 마르고 주글주글하게 되어 천하게 된 것은 모두 조삽(燥)에 속하는 것이라 하였다.

[13-18] 論曰, 太陰人, 面色青白者, 多無燥證. 面色黃赤黑者, 多有燥證, 盖肝熱肺燥而然也.

태음인이 면색이 청백자는 다무조증(多無燥證)하고 면색이 황적흑자는 다유조증(多有燥證)이니 모두 간열폐조(肝熱肺燥)하기 때문이다.

[13-19] 嘗治, 太陰人, 燥熱證, 手指焦黑癰瘡病, 自左手中指, 焦黑無力, 二年內, 一指黑血焦凝過掌心, 而掌背浮腫, 以刀, 斷指矣. 又一年內, 癰瘡, 遍滿全體, 大者, 如大錢, 小者, 如小錢, 得病, 已爲三年, 而以壯年人, 手力, 不能役勞一半刻, 足力, 不能日行步三十里, 以熱多寒少湯, 用藁本二錢, 加大黃一錢, 二十八貼, 用之, 大便始滑, 不過一二日, 又秘燥, 又用二十貼, 大便不甚滑泄, 而面部癰瘡, 少差, 手力足力, 稍快有效矣. 又用二十貼, 其病快差.

내가 일찌기 태음인의 간열폐조증(燥熱證)을 치료하여 본 바 있다. 그 증상이 손가락이 붉으레 검은 반점에 창병이 있었다. 처음에 왼손 가운데 손가락이 붉으레 검게 되고 힘이 없더니 2년이 채 못 되어서 한 손가락이 검은 피가 탄 것처럼 엉키어서 손바닥을 지나고 손등까지 부어 있는 것이다. 칼로 손가락을 잘라버렸더니 또 1년이 채 못 되어서 반창이 몸 전체에 두루 퍼진 것이다. 큰 것은 큰 엽전과 같고 작은 것은 작은 엽전과 만큼 되어 있다. 이런 악한 병에 잡힌 지 이미 3년이나 지내었다. 한창때인 청장년인 사람으로서 손에 힘이 없어 불과 반시간도 일 할 수 없고 다리 힘이 없어서 1일에 30회도 걷지 못하는 것이다. 열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본 2돈, 대황 1돈을 가하여 28첩을 썼더니 대변이 비로소 묽어지다가 겨우 하루나 이틀을 지나더니 굳어지는 것이다. 그리하여 다시 20첩을 썼더니 대변이 심한 설사가 아니고 묽게 나감으로서 얼굴에 반창이 조금 차도가 있고 손의 힘 다리의 힘이 조금 효과가 있는 것이다. 다시 20첩을 쓰고 그 병이 쾌차하였다.

[13-20] 靈樞曰, 二陽結, 謂之消, 飲一溲二, 死不治. 註曰, 二陽結, 謂胃及大腸, 熱結也.

영추에 이양결(二陽結)을 소(消)라 이름이니 음수1 소변2(飲一溲二)면 죽는 것으로 불치라고 하였고 주(註)에 이양결은 위와 대장의 열결(熱結)이라고 하였다.

[13-21] 扁鵲, 難經曰, 消渴脈, 當得緊實而數, 反得沈瀼而微者, 死.

편작 《난경(難經)》에 소갈 맥은 긴실이삭(緊實而數)인데 오히려 침색(沈瀼)하고 미(微)한 것은 사증이다 하였다.

[13-22] 張仲景曰, 消渴病, 小便反多, 如飲水一斗, 小便亦一斗, 腎氣丸主之.

장중경이 소갈병에 소변이 오히려 많아 음수 일두(一斗)에 소변이 역시 일두하면 신기환(腎氣丸)으로 치료한다.

[13-23] 論曰, 此病, 非少陽人消渴也, 卽太陰人燥熱也. 此證, 不當用腎氣丸, 當用熱多寒少湯, 加藁本・大黃.

이병은 소양인 소갈병이 아니고, 태음인 조열병이다. 신기환(腎氣丸)을 사용치 말고 열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본과 대황은 가하여 쓴다.

[13-24] 嘗治, 太陰人, 年五十近衰者, 燥熱病, 引飲, 小便多, 大便秘者, 用熱多寒少湯, 藁本 二錢, 加大黃 一錢, 二十貼, 得效矣. 後一月餘, 用他醫藥五貼, 此人, 更病, 復用熱多寒少湯, 加藁本・大黃, 五六十貼, 用藥時間, 其病僅僅支撐, 後終不免死, 又嘗治, 太陰人, 年少者, 燥熱病, 用此方, 三百貼, 得支撐一周年, 此病, 亦不免死, 此人, 得病一周年, 或間用他醫方, 未知緣何, 故也. 盖燥熱, 至於飲一溲二, 而病劇, 則難治. 凡太陰人, 大便秘燥, 小便覺多, 而引飲者, 不可不早治豫防.

태음인 50세 가까운 사람이 심히 쇠약해진 것이다. 이 사람이 조열증으로 물을 많이 마시고 소변을 많이 누며 변비가 되었다. 열다한소탕(熱多寒少湯)을 쓰는데 고본 2돈, 대황 2돈을 가해서 20첩을 쓰고 효과를 보았다. 그 후 1개월 후에 다른 의원에게서 약을 5첩 쓰니 다시 병이 재발되는 것이다. 그리하여 또 다시 열다한소탕을 쓰는데 고본과 대황을 가해서 50~60첩을 썼더니 약을 쓰는 기간에 겨우 지탱하다가 결국 사망하였다. 태음인 년소자가 조열병에 걸렸다. 열다한소탕에 고본·대황을 가하여 300첩을 썼는데 겨우 1년 지탱하다가 사망을 면치 못하였다. 이 사람이 병이 생긴 지 1년 쯤 되었으니 간혹 다른 의사의 처방을 썼는 지 알 수 없는 연고로 어찌 할 수 없도다. 대개 조열병은 물 한 사발 마시면 오줌 두 사발을 누며 병이 극에 이르면 고치기 어렵다. 무릇 태음인이 대변이 비조(秘燥)하고 오줌이 많다고 생각되며 물이 많이 먹히거든 빨리 약을 써서 미리 예방해야 한다.

[13-25] 此病, 非必不治之病也. 此少年, 得病用藥一周年後, 方死, 盖此病原委, 侈樂無厭, 慾火外馳, 肝熱大盛, 肺燥太枯之, 故也. 若此少年, 安心滌慾一百日, 而用藥, 則焉有不治之理乎. 盖自始病日, 至于終死日, 慾火無日不馳, 故也. 諺曰, 先祖德澤, 雖或不得, 一一箇報, 而恭敬德澤, 必無一一不受報, 凡無論某病人, 恭敬其心, 蕩滌慾火, 安靜善心, 一百日, 則其病無不愈, 二百日, 則其人無不完, 恭敬德澤之箇箇受報, 百事皆然, 而疾病尤甚.

이 병은 반드시 불치병이 아니다. 이 젊은 사람은 병을 얻고 약을 사용한지 1년 후에 비로소 죽었다. 대개 이병은 원래 치락무염(侈樂無厭)하여 불같은 욕심(慾火)이 매우 심하여 간열이 크게 성하게 되고 폐조가 매우 심하게 된 까닭이다. 만약 그 젊은 사람이 백일동안 안심척욕(安心滌慾)하면서 약을 쓴다면 어찌 불치병이 될 이치가 있겠는가? 대개 병이 시작하는 날로 부터 죽는 날까지 욕심이 불같이 밖으로 내달리지 않는 날이 없었기 때문인 것이다. 속담에 말하기를 당대 이전의 대대 어른들의 덕택은 비록 낱알이 갚을 수는 없지만 마음을 공손히 삼가는 은덕의 혜택은 반드시 하나 하나 갚음을 받지 않는 것이 없다 하니 무릇 어떠한 병자를 막론하고 그 마음을 삼가 공경하며 불같은 욕심을 깨끗이 씻고 마음을 가라앉히고 착한 마음을 가지면 100일이면 그 병이 낫지 않을 이치가 없고 200일을 안정하여 치료하면 그 사람이 완전하게 되지 않을 이치가 없는 것이다. 마음을 공손히 삼가는 덕택을 낱알이 받는 것과 같이 100가지 일이 다 그러하므로 질병에 있어서는 더욱 그러한 것이다.

[13-26] 危亦林曰, 陰血耗竭, 耳聾目暗, 脚弱腰痛, 宜用黑元丹.

위역림이 말하기를 음혈이 모갈(耗竭)하여 이롱(耳聾), 목암(目暗), 각약(脚弱), 요통이 오면 흑원단(黑元丹)을 쓴다 하였다.

[13-27] 凡男子, 方當壯年, 而眞氣猶怯, 此乃稟賦素弱, 非虛而然, 滋益之方, 群品稍衆, 藥力細微, 難見功效, 但固天元一氣, 使水升火降, 則五藏自和, 百病不生, 宜用拱辰丹.

무릇 남자가 뒤흔찬 기운이 한창인 젊은 사람으로서 오히려 겁을 내는 것은 천품 본래의 성질이 약한 것이며 신체가 허한 것은 아니다. 자익(滋益) 처방이 고루 많이 있으나 약력이 미약하여 그 효과를 보기가 어려운 것이니 본연의 선천적인 원기를 보하여 수승화강(水升火降)하게 하면 오장이 스스로 순화하여 백병이 생기지 않으니 공진단(拱辰丹)을 사용한다.

[13-28] 論曰, 此證, 當用黑元與拱辰丹, 當歸・山茱萸, 皆爲蠱材, 藥力未全, 欲收全力, 宜用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯.

이러한 병세에 흑원단·공진단이 좋기는 하지만 당귀나 산수유는 태음인에게 벌레와 같은 약이므로 공진흑원단(拱辰黑元丹)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 써야 한다.

[13-29] 太陰人證, 有食後痞滿, 腿脚無力病, 宜用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯・太陰調胃湯・調胃升清湯.

태음인의 병증에 음식을 먹은 후에 가슴과 배가 더부룩하며 다리에 힘이 없는 병세가 있으니 마땅히 공진흑원단(拱辰黑元丹)·녹용대보탕(鹿茸大補湯)·태음조위탕(太陰調胃湯)·조위승청탕(調胃

升清湯)을 써야 한다.

[13-30] 太陰人證, 有泄瀉病, 表寒證泄瀉, 當用太陰調胃湯, 表熱證泄瀉, 當用葛根蘿菴子湯.

태음인 병증에 설사병이 있으니 표한증설사(表寒證泄瀉)에 태음조위탕(太陰調胃湯)을 쓰고 표열증설사(表熱證泄瀉)에 갈근나복자탕(葛根蘿菴子湯)을 쓴다.

[13-31] 太陰人證, 有咳嗽病, 宜用太陰調胃湯・鹿茸大補湯・拱辰黑元丹.

태음인 병증에 해수(咳嗽)병이 있으니 마땅히 태음조위탕(太陰調胃湯)・녹용대보탕(鹿茸大補湯)・공진흑원단(拱辰黑元丹)을 써야 한다.

[13-32] 太陰人證, 有哮喘病, 重證也, 當用麻黃定喘湯.

태음인 병증에 효천(哮喘)병이 있으니 중증(重證)이다. 마땅히 마황정천탕(麻黃定喘湯)을 써야 한다.

[13-33] 太陰人證, 有胃腹痛病, 危險證也, 當用麻黃定痛湯.

태음인 병증에 흉복통(胸腹痛)병이 있으니 위험증(危險證)이다. 마땅히 마황정통탕(麻黃定痛湯)을 써야 한다.

[13-34] 太陰人小兒, 有泄瀉十餘次無度者, 必發慢驚風, 宜用補肺元湯, 豫備慢風.

태음인 소아가 설사를 10여 번 이상 거듭하면 반드시 만경풍(慢驚風)을 일으키게 되므로 보폐원탕(補肺元湯)으로 예방해 주어야 한다.

[13-35] 太陰人, 有腹脹浮腫病, 當用乾栗蟬蟄湯, 此病, 極危險證, 而十生九死之病也, 雖用藥病愈, 三年內, 不再發然後, 方可論生, 侈樂禁嗜慾, 三年內, 宜恭敬心身, 調養慎攝, 必在其人矣.

태음인이 복창부종(腹脹浮腫)하는 병이 있으니 마땅히 건율제조탕(乾栗蟬蟄湯)을 써야 한다. 이 병은 지극히 위험한 병으로 열의 아홉은 죽는 병이다. 비록 약을 써서 나았더라도 3년 안에 재발되지 않아야 비로소 살았다고 말할 수 있는 것이다. 사치와 향락을 경계하고 하고 싶은 것과 욕심을 버려야 하며 3년 동안 반드시 그 몸과 마음을 공경해야 하는 것이니 섭생하고 조심하는 것은 반드시 그 사람의 마음에 달려 있는 것이다.

[13-36] 凡太陰人病, 若待浮腫已發, 而治之, 則十病九死也. 此病, 不可以病論之, 而以死論之可也. 然則如之何其可也. 凡太陰人, 勞心焦思, 屢謀不成者, 或有久泄久痢, 或淋病小便不利, 食後痞滿, 腿脚無力病. 皆浮腫之漸, 已爲重險病, 而此時, 以浮腫論, 而蕩滌慾火, 恭敬其心, 用藥治之, 可也.

무릇 태음인의 병에 있어서 만약 부종이 이미 발한 후에 이를 다스리면 열에 아홉은 죽는 병이다. 그런즉 이 병을 병으로 논해서는 안 되고 죽음으로 논하는 것이 옳을 것이다. 그렇다면 이렇게 위독한 병을 어찌하여야 좋은가? 무릇 태음인이 노심초사(勞心焦思)하여 자주 도모한 일이 이루어지지 못한 자이거나 혹은 설사와 이질병이 오래된 자와 혹은 임병(淋病)으로 소변불리한 자와 식후에 비만증이 있으면서 퇴각무력(腿脚無力)한 병들이 모두 점차 부종이 되는 것이다. 이미 병이 중하여 험병(險病)이 되었으니 이때부터 부종으로 논해서 탕척욕화(蕩滌慾火)하고 공경기심(恭敬其心)하여 약을 써서 치료함이 옳을 것이다.

[13-37] 太陰人證, 有夢泄病, 一月內, 三四發者, 虛勞, 重證也, 大便秘一日, 則宜用熱多寒少湯, 加大黃一錢, 大便每日不秘, 則加龍骨, 減大黃, 或用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯. 此病, 出於謀慮太多, 思想無窮.

태음인의 병에 몽설병(夢泄病)이 있는데 1개월에 3-4회를 발설하는 것은 허로(虛勞)로서 중증(重證)이다. 대변이 하루 변비가 되면 열다한소탕(熱多寒少湯)에 대황 1돈을 가하고 대변이 매일 굳지 않으면 대황을 빼고 용골(龍骨)을 가하여 쓴다. 혹은 공진흑원단(拱辰黑元丹)・녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 쓴다. 이 병은 모려태다(謀慮太多)하고 사상무궁(思想無窮)하여 생긴 병이다.

[13-38] 太陰人證, 有卒中風病, 胃臆格格, 有窒塞聲, 而目瞪者, 必用瓜蒂散. 手足拘攣, 眼合者, 當用牛黃清心丸. 素面色黃赤黑者, 多有目瞪者, 素面色青白者, 多有眼合者, 面色青白, 而眼合者 手足拘攣, 則其病急危也, 不必待拘攣. 但見眼合, 而素面色青白者, 必急用清心丸, 古方清心丸, 每每神效. 目瞪者, 亦急發, 而稍緩死, 眼合者, 急發急死, 然, 目瞪者, 亦不可以緩論, 而急治之.

태음인이 졸중풍(卒中風)병이 있는데 가슴이 꽉 막혀 숨이 통하지 못하고 가래 끓는 소리가 나고 두 눈을 딱 부릅뜨고 있는 자에게는 반드시 과체산(瓜蒂散)을 써야 한다. 손발에 경련이 나고 눈을 감고 있는 자에게는 마땅히 우황청심환(牛黃清心丸)을 써야 한다. 평소 얼굴빛이 황적흑(黃赤黑)한 사람들은 눈을 부릅뜨는 자가 많고 평소 얼굴빛이 창백한 사람들은 대개 눈을 감는 자가 많다. 얼굴빛이 창백하고 눈을 감는 자가 손발에 경련이 일어난다면 그 병은 위급하게 된 것이다. 경련이 일어나기를 기다릴 필요가 없이 눈을 감고 있으며 평소 얼굴빛이 창백한 사람이라면 급히 청심환(清心丸)을 써야 한다. 고방청심환(古方清心丸)이 번번이 신호한 것이다. 눈을 부릅뜨는 자는 병이 급히 발생하나 조금 완완하게 죽는 것이고 눈을 감은 자는 병이 급히 발하고 급히 죽는다. 그러나 눈을 부릅뜨는 자도 병이 완만한 것이라고만 생각하면 옳지 않으며 급히 치료를 하여야 한다.

[13-39] 牛黃清心丸, 非家家必有之物, 宜用遠志・石菖蒲末各一錢, 灌口, 因以皂角末三分, 吹鼻. 此證, 手足拘攣, 而項直, 則危也, 傍人, 以兩手, 執病人兩手腕, 左右撓動兩肩, 或執病人足腕, 屈伸兩脚. 太陰人中風, 撓動病人肩脚, 好也, 少陽人中風, 大忌撓動病人手足, 又不可抱人起坐, 少陰人中風, 傍人, 抱病人起坐, 則可也, 而不可搖動兩肩, 可以徐徐按摩手足.

우황청심환(牛黃清心丸)은 집집마다 반드시 있는 약물이 아니므로 마땅히 원지(遠志)・석창포(石菖蒲) 분말 각 1돈씩을 입에 넣어주고 이어서 조각(皂角)가루 3푼을 코에다가 붙여넣는다. 이 병증에 손발에 경련을 일으키고 목이 뻣뻣해지면 위험한 것이다. 곁에 있는 사람들이 손으로 환자의 두 손목을 잡고 양쪽 어깨를 좌우로 운동시켜 주어야 하며 또 환자의 두 발목을 잡고서 양 무릎을 굴신시킨다. 태음인 중풍은 환자의 양쪽 어깨와 다리를 요동시켜 주는 것이 좋다. 소양인 중풍은 환자의 수족을 요동시키면 크게 해롭고 앓히거나 안아서 일으키는 것도 좋지 않다. 소음인 중풍은 곁에 사람들이 환자를 껴안아 일으켜 앓히는 것은 좋으나 양쪽 어깨를 흔드는 것은 좋지 않고 환자의 수족을 천천히 문질러 안마해 주는 것이 좋다.

[13-40] 中毒吐瀉, 宜用麝香.

중독으로 토사(吐瀉)할 때는 마땅히 사향(麝香)을 써야 한다.

新定 太陰人病 應用要藥 二十四方

새로 정한 태음인병의 주요 24처방

太陰調胃湯

태음조위탕

薏苡仁・乾栗 各三錢, 蘿菔子 二錢, 五味子・麥門冬・石菖蒲・桔梗・麻黃 各一錢.

의이인・건율 각3돈, 나복자 2돈, 오미자・맥문동・석창포・길경・마황 각1돈.

葛根解肌湯

갈근해기탕

葛根 三錢, 黃芩・藁本 各一錢五分, 桔梗・升麻・白芷 各一錢.

갈근 3돈, 황금・고본 각1돈5푼, 길경・승마・백지 각1돈.

調胃升清湯

조위승청탕

薏苡仁・乾栗 各三錢, 蘿菔子 一錢五分, 麻黃・桔梗・麥門冬・五味子・石菖蒲・遠志・天門冬・酸棗仁・龍眼肉 各一錢.

의이인・건율 각3돈, 나복자 1돈5푼, 마황・길경・맥문동・오미자・석창포・원지・천문동・산조

인·용안육 각1돈.

清心蓮子湯

청심연자탕

蓮子肉·山藥 各二錢, 天門冬·麥門冬·遠志·石菖蒲·酸棗仁·龍眼肉·柏子仁·黃芩·蘿菔子 各一錢, 甘菊花 三分.

연자육·산약 각2돈, 천문동·맥문동·원지·석창포·산조인·용안육·백자인·황금·나복자 각 1돈, 감국화 3푼.

麻黃定喘湯

마황정천탕

麻黃 三錢, 杏仁 一錢五分, 黃芩·蘿菔子·桑白皮·桔梗·麥門冬·款冬花 各一錢, 白果炒黃色 二一箇.

마황 3돈, 행인 1돈5푼, 황금·나복자·상백피·길경·맥문동·관동화 각1돈, 백과(볶아서 누른빛을 띄는 것) 21개.

麻黃定痛湯

마황정통탕

薏苡仁 三錢, 麻黃·蘿菔子 各二錢, 杏仁·石菖蒲·桔梗·麥門冬·五味子·使君子·龍眼肉·柏子仁 各一錢, 乾栗 七箇.

의이인 3돈, 마황·나복자 각2돈, 행인·석창포·길경·맥문동·오미자·사군자·용안육·백자인 각1돈, 건울 7개.

熱多寒少湯

열다한소탕

葛根 四錢, 黃芩·藁本 各二錢, 蘿菔子·桔梗·升麻·白芷 各一錢.

갈근 4돈, 황금·고본 각2돈, 나복자·길경·승마·백지 각1돈.

寒多熱少湯

한다열소탕

薏苡仁 三錢, 蘿菔子 二錢, 麥門冬·桔梗·黃芩·杏仁·麻黃 各一錢, 乾栗 七箇.

의이인 3돈, 나복자 2돈, 맥문동·길경·황금·행인·마황 각1돈, 건울 7개.

葛根承氣湯

갈근승기탕

葛根 四錢, 黃芩·大黃 各二錢, 桔梗·升麻·白芷 各一錢.

갈근 4돈, 황금·대황 각 2돈, 길경·승마·백지 각1돈.

本方, 加大黃 二錢, 則名曰葛根大承氣湯. 減大黃 一錢, 則名曰葛根小承氣湯.

본 처방에 대황 2돈을 가하면 갈근대승기탕이라고 하고, 대황 1돈을 빼면 갈근소승기탕이라고 한다.

調理肺元湯

조리폐원탕

麥門冬·桔梗·薏苡仁 各二錢, 黃芩·麻黃·蘿菔子 各一錢.

맥문동·길경·의이인 각2돈, 황금·마황·나복자 각1돈.

麻黃發表湯

마황발표탕

桔梗 三錢, 麻黃 一錢五分, 麥門冬・黃芩・杏仁 各一錢.
길경 3돈, 마황 1돈5푼, 맥문동・황금・행인 각1돈.

補肺元湯

보폐원탕

麥門冬 三錢, 桔梗 二錢, 五味子 一錢.
맥문동 3돈, 길경 2돈, 오미자 1돈.
加山藥・薏苡仁・蘿菔子 各一錢, 則尤妙.
산약・의이인・나복자 각1돈을 더하면 더욱 신묘하다.

鹿茸大補湯

녹용대보탕

鹿茸 二三四錢, 麥門冬・薏苡仁 各一錢五分, 山藥・天門冬・五味子・杏仁・麻黃 各一錢.
녹용 2, 3, 4돈, 맥문동・의이인 각1돈5푼, 산약・천문동・오미자・행인・마황 각1돈.
○ 虛弱人, 表症寒證多者, 宜用.
허약한 사람의 표증으로 한증이 많은 경우에 써야 한다.

拱辰黑元丹

공진흑원단

鹿茸 四五六兩, 山藥・天門冬 各四兩, 蟾蜍 一二兩, 麝香 五錢.
녹용 4, 5, 6냥, 산약・천문동 각4냥, 제조 1, 2냥, 사향 5돈.
煮烏梅肉爲膏, 和丸梧子大, 溫湯下五七十丸, 或燒酒下.
오매육을 삶아 고가 되면 섞어서 오자대 크기로 환을 만든다. 5, 7, 10환을 따뜻한 물에 복용하거나 소주로 먹어도 된다.
○ 虛弱人, 裡症多者, 宜用.
허약한 사람의 리증이 많은 경우에 써야 한다.

皂角大黃湯

조각대황탕

升麻・葛根 各三錢, 大黃・皂角 各一錢.
승마・갈근 각3돈, 대황・조각자 각1돈.
○ 用之者, 不可過三四貼, 升麻 三錢, 大黃・皂角, 同局藥力峻猛, 故也.
이 처방을 쓰는 경우에 3, 4첩을 넘게 써서는 안되니, 승마 3돈과 대황・조각은 같은 약력을 가진 것으로 강하고 맹렬하기 때문이다.

葛根浮萍湯

갈근부평탕

葛根 三錢, 蘿菔子・黃芩 各二錢, 紫背浮萍・大黃 各一錢, 蟾蜍 十箇.
갈근 3돈, 나복자・황금 각2돈, 자배부평・대황 각1돈, 제조 10개
○ 治浮腫, 裡症熱多者, 宜用.
부종에 리증으로 열증이 많은 경우에 써야한다.

乾栗蟾蜍湯

건율제조탕

乾栗 百枚, 蟾蜍 十箇.
건율 100개, 제조 10개.
湯服, 或灸食, 黃栗, 蟾蜍 十箇, 作末, 別用, 黃栗湯水, 調下.
다려서 복용하거나 혹은 구워 먹는다. 황율과 제조 10개를 가루로 만들어, 별도로 황율 다린 물로 복용한다.

○ 治浮腫, 表症寒多者, 宜用.

부중에 표증으로 한증이 많은 경우에 써야한다.

乾栗櫟根皮湯

건울저근피탕

乾栗 一兩, 櫟根白皮 三四五錢.

건울 1냥, 저근백피 3, 4, 5돈.

○ 治痢疾, 或湯服, 或丸服, 而丸服者, 或單用櫟根白皮 五錢.

이질을 치료한다. 혹은 다려서 복용하고, 혹은 환으로 만들어 복용하는데, 환으로 복용하는 경우에는 저근백피 5돈을 쓰기도 한다.

瓜蒂散

과체산

瓜蒂炒黃爲末 三五分, 溫水調下, 或乾瓜蒂 一錢, 急煎湯用.

과체를 볶아서 누렇게 된 것을 가루로 만들어 3. 5푼을 따뜻한 물로 복용하거나, 혹은 말린 과체 1돈을 신속히 다려서 복용한다.

○ 治卒中風, 臆膈格格, 有窒塞聲, 及目瞪者, 必可用. 此藥, 此病此證, 可用, 他病他證, 必不可用. 胃腹痛, 寒咳喘, 尤忌用. 雖滯食物, 不可用此藥, 而用他藥.

졸중풍병으로 가슴이 가로막혀 들어막힌 소리가 있으면서 눈을 부릅뜨는 경우에는 반드시 써야 한다. 이 약은 이 병과 증에는 쓸 수 있으나, 다른 병과 증에 써서는 안 된다.

○ 面色青白, 而素有寒證, 表虛者, 卒中風, 則當用, 熊膽散・牛黃清心元・石菖蒲遠志散, 而不可用瓜蒂散.

얼굴빛이 푸르거나 희면서 평소에 한증으로 표허한 사람이 중풍에 거린 경우에는 웅담산・우황청심환・석창포원지산 등을 써야 하며, 과체산을 써서는 안 된다.

熊膽散

웅담산

熊膽 三五分.

웅담 3, 5푼

溫水調下.

따뜻한 물로 복용한다.

麝香散

사향산

麝香 三五分.

사향 3, 5푼

溫水調下, 或溫酒調下. 只舉三五分, 則四分在其中.

따뜻한 물로 복용하거나, 따뜻한 술에 복용한다. 단지 3, 5푼을 거론했지만, 4푼도 해당된다.

石菖蒲遠志散

석창포원지산

遠志・石菖蒲 各一錢, 豬牙皂角, 並末三分.

원지・석창포 각1돈, 저아조각 가루낸 것 3푼.

溫水調下, 或遠志・菖蒲末, 溫水調下, 皂角末, 吹鼻.

따뜻한 물로 복용한다. 혹은 원지・석창포 가루를 따뜻한 물에 복용하고, 조각가루는 코에 붙여 넣는다.

麥門冬遠志散

맥문동원지산

麥門冬 三錢, 遠志・石菖蒲 各一錢, 五味子 五分.

맥문동 3돈, 원지・석창포 각1돈, 오미자 5푼.

牛黃清心元

우황청심원

○ 右太陰人藥, 諸種, 杏仁, 去雙仁, 去皮尖, 麥門冬・遠志, 去心, 白果・黃栗, 去殼, 大黃, 或酒蒸, 或生用 鹿茸・皂角, 酥炙, 酸棗仁・杏仁・白果, 炒用.

이상의 태음인약 여러 종류 중에 행인은 두 개의 씨알맹이와 피침(알맹이 끝의 씨눈)을 제거하고, 맥문동과 원지는 심을 빼버리며, 백과와 황을 겹질을 제거하고, 대황은 술로 찌거나 날 것으로 쓰며, 녹용과 조각은 줄인 짓을 발라서 볶고, 산조인, 행인 백과는 볶아서 쓴다.

太陽人 外感 腰脊病論(4條)

태양인 외감 요척병론(4조)

[14-1] 內經曰, 尺脈緩澁, 謂之鮮休. 釋曰, 尺爲陰部, 肝腎主之, 緩爲熱中, 澁爲亡血, 故謂之鮮休. 鮮休者, 寒不寒, 熱不熱, 弱不弱, 壯不壯, 瘳不可名, 謂之鮮休也.

내경(內經)에 말하기를 척맥(尺脈)이 완삽(緩澁)한 것을 일러 해역(解休)이라 한다. 해석하여 말하기를 척맥(尺脈)은 음부(陰部)가 되고 간(肝)과 신(腎)이 주관한다. 완(緩)은 열중(熱中)한 것이고 삽(澁)은 망혈(亡血)이 되기 때문에 해역(解休)이라 일컬은 것이다. 해역(解休)이라는 것은 추운 듯하나 춥지도 않고 더운 듯하나 덥지도 않고 약한 듯하나 약하지도 않고 씩씩한 것 같으나 씩씩하지도 않으므로 이상하기를 무엇이라고 이름 할 수 없어서 해역(解休)이라 일컬은 것이다.

[14-2] 靈樞曰, 髓傷則消癯, 筋痿, 體鮮休然, 不去矣, 不去, 謂不能行去也.

영추(靈樞)에 말하기를 골수(骨髓)가 상하면 말라 버려서 종아리가 저리고 몸이 해역(解休)하여서 가지를 못한다. 가지를 못한다는 것은 걸어서 가지를 못한다는 것을 일컬은 것이다.

[14-3] 論曰, 此證, 卽太陽人, 腰脊病, 太重證也, 必戒深哀, 遠嗔怒, 修清定然後, 其病可愈, 此證, 當用五加皮壯脊湯.

나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 요척(腰脊)병으로 아주 중한 증이니 반드시 너무 슬퍼함을 경계(警戒)하고 성내는 것을 멀리하며 마음을 태평하게 한 후에야 그 병이 가히 나을 수 있다. 이 증에는 마땅히 오가피장척탕(五加皮壯脊湯)을 쓸 것이다.

[14-4] 鮮休者, 上體完健, 而下體鮮休然, 脚力不能行去也, 而其脚自無痲痺腫痛之證, 脚力亦不甚弱. 此, 所以弱不弱, 壯不壯, 寒不寒, 熱不熱, 而其病, 爲腰脊病也. 有鮮休證者, 必無大惡寒發熱, 身體疼痛之證也. 太陽人, 若有大惡寒發熱, 身體疼痛之證, 則腰脊表氣, 充實也, 其病易治, 其人, 亦完健.

해역(解休)이라는 것은 상체(上體)는 완전히 건강하나 하체(下體)가 해역(解休)하여 다리 힘으로 걸아갈 수 없는 것이다. 그러나 그 다리가 마비(痲痺), 종통(腫痛)의 증은 없는 것이며 다리의 힘도 심히 약한 것은 아니니 이것은 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않고 추운 듯하나 춥지도 않고 더운 듯하나 더운 것도 아니니 이 병은 요척(腰脊)의 병이 된다. 해역의 증이 있는 경우는 반드시 심히 오한하거나 발열 또는 신체동통(身體疼痛) 등의 증은 없다. 태양인이 만약 심한 오한이

나 발열 또는 신체동통 등증이 있다면 이것은 요척(腰脊)의 표기(表氣)가 충실한 것이다. 이 병은 쉽게 치료되며 그 사람도 역시 완전하게 건강하다.

太陽人 內觸 小腸病論(11條)

태양인 내촉 소장병론(11조)

[15-1] 朱震亨曰, 噎膈反胃之病, 血液俱耗, 胃脘乾槁. 其枯, 在上近咽, 則水飲可行, 食物難入, 入亦不多, 名之曰噎, 其枯, 在下近胃, 則食雖可入, 難盡入胃, 良久復出, 名之曰膈, 亦曰反胃. 大便秘少, 若羊屎然, 名雖不同, 病出一體. 又曰, 上焦噎膈, 食下, 則胃脘當心, 而痛, 須臾吐出, 食出痛乃止, 中焦噎膈, 食物可下, 難盡入胃, 良久復出, 下焦噎膈, 朝食暮吐, 暮食朝吐. 氣血俱虛者, 口中多出沫. 但見沫多出者, 必死, 大便如羊屎者, 難治, 不淡飲食者, 難治.

주진형(朱震亨)이 말하기를 열격(噎膈), 반위(反胃)의 병은 혈(血)과 액(液)이 같이 소모되어서 위완(胃脘)이 건조하여지는 것이다. 그 건조한 것이 위에 있어서 목구멍에 근접하면 물을 넘길 수 있으나 음식물은 들어가기 어렵고 또한 많이 들어가지도 못하니 이것을 말하여 열(噎)이라고 하고, 그 건조한 것이 아래에 있어서 위와 근접하면 음식을 넘기기가 어렵고 어렵게 위에 들어가도 오래지 않아 다시 나오니 이것을 말하여 격(膈)이라 하며 또한 말하여 반위(反胃)라 한다. 대변이 마르고 적으며 마치 양의 똥과 같으니 이름이 비록 같지 않으나 병은 한 곳에서 나온 것이다. 또 말하기를 상초의 열격(噎膈)은 음식물이 내려가면 위완으로부터 가슴에까지 치받쳐서 아프다가 잠시 후에 토하게 되니 음식물이 나오면 아픈 것이 곧 멎고, 중초의 열격은 음식물은 아래로 내려가나 위에 들어가기 어렵고 얼마 후에 다시 나온다. 하초의 열격은 아침에 먹으면 저녁에 토하고 저녁에 먹으면 아침에 토하니 기혈이 모두 허한 경우는 입안에서 거품을 많이 토한다. 다만 반드시 거품이 많이 나오는데 보이는 경우는 죽는다. 대변이 양의 똥 같은 경우도 치료하기 어렵고 음식을 담백하게 먹지 않는 경우도 치료하기 어렵다.

[15-2] 張鷟曰, 噎當是神思間病, 惟內觀自養, 可以治之.

장계봉(張鷟)이 말하기를 열(噎)은 당연히 신(神)과 사(思)사이의 병이니 오직 안을 살펴서 스스로 자양(滋養)해야만 가히 치료할 수 있다.

3

[15-3] 龔信, 醫鑑曰, 反胃也, 膈也, 噎也, 受病皆同, 噎膈之證, 不屬虛, 不屬實, 不屬冷, 不屬熱, 乃神氣中一點病耳.

공신(龔信)의 《의감(醫鑑)》에 말하기를 반위(反胃), 격(膈), 열(噎)이 병이 되는 것은 모두 같은데 열격(噎膈)의 증은 허에 속하지도 않고 실에 속하지도 않고 냉에 속하지도 않고 열에 속하지도 않으니 곧 신기(神氣) 중의 한 가지 병이다.

[15-4] 論曰, 此證, 即太陽人, 小腸病, 太重證也, 必遠嗔怒, 斷厚味然後, 其病可愈. 此證, 當用獼猴藤植腸湯.

나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 소장병(小腸病)이 아주 중한 증이니 반드시 진노(嗔怒)를 멀리하고 기름진 음식을 끊은 연후에야 그 병이 나을 것이다. 이 증에는 마땅히 미후등식장탕(獼猴藤植腸湯)을 써야 한다.

[15-5] 食物, 自外入, 而有所妨碍, 曰噎. 自內受, 而有所拒格, 曰膈. 朝食暮吐, 暮食朝吐, 曰反胃. 然, 朝食而暮吐, 暮食而朝吐者, 非全食皆吐也. 有所妨碍, 而拒格於胃之上口者 經宿而自吐也, 則反胃, 亦噎膈也. 盖噎膈者, 胃脘之噎膈也, 反胃者, 胃口之噎膈也, 同是一證也. 有噎膈證者, 必無腹痛, 腸鳴, 泄瀉, 痢疾之證也. 太陽人, 若有腹痛, 腸鳴, 泄瀉, 痢疾之證, 則小腸裡氣, 充實也, 其病易治, 其人, 亦完健.

음식물이 밖으로부터 들어오는 데에 방해받는 바가 있는 것을 열(噎)이라고 말하며, 안으로부터 받아들이는 데 막히는 바가 있는 것을 격(膈)이라고 말하며, 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저녁에 먹은 것을 아침에 토하는 것을 반위(反胃)라고 말한다. 그러나 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저

넉에 먹은 것을 아침에 토하는 것은 먹은 것을 모두 토하는 것은 아니고 방해받는 바가 있어서 위(胃)의 상구(上口)에서 막혀서 체류되었던 음식물이 저절로 토하여지는 것이니 반위(反胃)도 역시 열격이다. 대개 열격은 위완의 열격이며 반위는 위구(胃口)의 열격이나 다 같은 병증이다. 열격의 증이 있는 경우는 반드시 복통, 장명(腸鳴), 설사, 이질(痢疾)의 증은 없다. 태양인이 만약 복통, 장명, 설사, 이질의 증이 있다면 소장의 리기(裏氣)가 충실한 것이니 그 병은 쉽게 치료되고 그 사람은 역시 완전히 건강하다.

[15-6] 鮮佻噎膈, 俱是重證, 而重證之中, 有輕重之等級焉. 鮮佻, 而無噎膈, 則鮮佻之輕證也. 噎膈, 而無鮮佻, 則噎膈之輕證也. 若鮮佻兼噎膈, 噎膈兼鮮佻, 則其爲重險之證, 不可勝言, 而重險中, 又有輕重也. 太陽人, 鮮佻噎膈, 不至死境之前, 起居飲食如常, 人必易之, 視以例病, 故入於危境, 而莫可挽回也. 余稟賦臟太陽人 嘗得此病, 六七年, 嘔吐涎沫, 數十年攝身, 倖, 而免夭, 錄此, 以爲太陽人有病者戒, 若論治法, 一言蔽曰, 遠嗔怒, 而已矣.

해역과 열격은 모두 중증이지만 중증 중에서도 경중의 등급이 있으니 해역만 있고 열격이 없으면 해역의 경증이고 열격만 있고 해역이 없으면 열격의 경증이다. 만약 해역에 열격을 겸하거나 열격에 해역을 겸한다면 그것이 위험한 증이라는 것을 더 말할 여지가 없으나 위험한 증에도 역시 경중이 있으니 태양인의 해역 열격은 사경(死境)에 이르기 전에는 기거(起居)와 음식(飲食)이 여전하므로 사람들이 반드시 쉽게 생각하고 보통의 병으로 보기 때문에 위경(危境)한 지경에 들어가서는 구원할 수 없는 것이다. 나는 본래 체질이 태양인인데 일찍이 이 병을 앓아 6-7년간. 연말(涎沫)을 토하다가 수 십년을 몸을 섭양하여 다행히 요절을 면하였다. 이것을 기록하여 태양인으로서 병든 경우에 경계하도록 한다. 만약 치법을 논한다면 한마디로 말하여 진노(嗔怒)를 멀리하라고 할 따름이다.

[15-7] 太陽人, 意強, 而操弱, 意強, 則胃脘之氣, 上達而呼散者, 太過而越也, 操弱則小腸之氣, 中執而吸聚者, 不支而饒也. 所以其病, 爲噎膈反胃也.

태양인은 의지(意志)가 강하고 조행(操行)이 약하다. 의지가 강하면 위완의 기가 위로 올라가서 호산(呼散)하는 것이 많아지고 넘친다. 조행(操行)이 약하면 소장의 기운이 가운데 뭉쳐서 흡취(吸取)되는 것이 부족하여 위축된다. 이러한 병을 일러 열격(噎膈), 반위(反胃)라 한다.

[15-8] 問, 朱震亨論噎膈反胃曰, 血液俱耗, 胃脘乾枯, 食物難入, 其說如何. 曰水穀, 納於胃, 而脾衛之, 出於大腸, 而腎衛之, 脾腎者, 出納水穀之府庫, 而迭爲補瀉者也. 氣液, 呼於胃脘, 而肺衛之, 吸於小腸, 而肝衛之, 肺肝者, 呼吸氣液之門戶, 而迭爲進退者也. 是, 故少陽人, 大腸出水穀陰寒之氣, 不足, 則胃中納水穀陽熱之氣, 必盛也. 太陽人, 小腸吸氣液陰涼之氣, 不足, 則胃脘呼氣液陽溫之氣, 必盛也. 胃脘陽溫之氣, 太盛, 則胃脘血液, 乾枯, 其勢固然也. 然, 非但乾枯, 而然也. 上呼之氣, 太過, 而中吸之氣, 太不支, 故食物不吸入, 而還呼出也.

어떤 사람이 문기를 주진형(朱震亨)이 열격(噎膈)과 반위(反胃)에 대하여 논하여 말하기를 혈액(血液)이 모두 소모되고 위완(胃脘)이 건조하여 마르게 되어 음식물이 들어가기 어렵다고 하니 그 말이 어떠한 것인가? 대답하기를 수곡(水穀)은 위에 들어가서 비의 보호를 받고 대장에 나가서는 신의 보호를 받으니 비와 신이라는 것은 수곡이 나가고 들어오는 창고로서 교대로 보태고 빠지는 것이다. 기액(氣液)은 위완에서 내보낼 때는 폐의 보호를 받고 소장에서 흡수될 때는 간의 보호를 받으니 폐와 간은 기액을 호흡하는 문호(門戶)로서 교대로 들어오고 나가는 것이다. 그러므로 소양인은 대장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒)한 기가 부족하기 때문에 위중(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 반드시 성하고, 태양인은 소장에서 흡수되는 기액의 음량(陰涼)한 기가 부족하기 때문에 위완에서 흡수되는 기액의 양온(陽溫)한 기가 반드시 성하다. 위완의 양온한 기가 너무 성하면 위완의 혈과 액이 건조하여 마르게 되는 것은 당연한 이치이다. 그러나 비단 건조하여 마르게 되어서만이 아니라 위로 내보내는 기가 너무 과도하여 안으로 흡수되어지는 기가 너무 부족하게 되니 음식물이 흡인(吸引)되지 못하고 다시 나오는 것이다.

[15-9] 或曰, 朱震亨所論, 噎膈反胃者, 安知非少陰少陽太陰人病, 而吾子必名曰, 曰太陽人病. 內經所

論, 鮮侏者, 安知非少陰少陽太陰人病, 而吾子必名目, 曰太陽人病, 莫非牽強附會耶, 願聞其說. 曰少陽人, 有嘔吐, 則必有大熱也. 少陰人, 有嘔吐, 則必有大寒也. 太陰人, 有嘔吐, 則必病愈也. 今此噎膈反胃, 不寒不熱, 非實非虛, 則此非太陽人病, 而何也. 鮮侏者, 上體完健, 而下體鮮侏然, 疴瘕, 不能行去之謂也, 少陰少陽太陰人, 有此證, 則他證疊出, 而亦必無, 寒不寒, 熱不熱, 弱不弱, 壯不壯之理矣. 어떤 사람이 또 문기를 주진형(朱震亨)이 논한 열격과 반위라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인의 병이라고 지명하였으며, 내경에서 논한 해역이라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인의 병이라고 지명하였는가? 말을 억지로 끌어다가 그럴 듯하게 꾸며낸 것이 아니냐? 원컨데 그 설명을 듣고 싶다. 답하기를 소양인이 구토가 있다면 반드시 높은 열이 있고, 소음인이 구토가 있다면 반드시 대한(大寒)이 있고, 태음인이 구토가 있다면 반드시 병이 낫는다. 지금 이 열격과 반위가 차지도 않고 덤지도 않고 실(實)하지도 않고 허(虛)하지도 않으니 이것이 태양인의 병이 아니고 무엇이라? 해역이라는 것은 상체(上體)는 건강하나 하체(下體)가 해역하여 종아리가 시리고 걸어가질 못하는 것을 이르는 것으로 소음인, 소양인, 태음인이 이러한 증이 있다면 다른 증이 겹쳐진 것으로 또한 반드시 추운 듯하나 춥지 않고 더운 듯하나 덥지 않고 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않을 이치가 없을 것이다.

[15-10] 或曰, 吾子論, 太陽人鮮侏病治法, 曰戒深哀, 遠嗔怒, 修清定, 論噎膈病治法, 曰遠嗔怒, 斷厚味, 意者, 太陽人鮮侏病, 重於噎膈病, 而哀心所傷者, 重於怒心所傷乎. 曰否. 太陽人噎膈病, 太重於鮮侏病, 而怒心所傷者, 太重於哀心所傷也, 太陽人哀心深着, 則傷表氣, 怒心暴發, 則傷裏氣, 故鮮侏表證, 以戒哀遠怒, 兼言之也. 曰然, 則少陽人怒性, 傷口膀胱氣, 哀情, 傷腎大腸氣, 少陰人樂性, 傷目膈氣, 喜情, 傷脾胃氣, 太陰人喜性, 傷耳腦顫氣, 樂情, 傷肺胃脘氣乎. 曰然. 어떤 사람이 또 문기를 당신이 태양인의 해역병(解侏病)의 치료법을 논하여 말하기를 깊이 슬퍼함을 경계하며 진노(嗔怒)하는 것을 멀리하며 마음을 수양하여 깨끗하고 바르게 하라 하였고, 열격병(噎膈病)의 치료법을 논하여 말하기를 진노하는 것을 멀리하고 기름진 음식을 끊으라고 하였으니 생각하건대 태양인의 해역병이 열격병보다 중하며 애심(哀心)에 손상된 것이 노심(怒心)에 손상된 것보다 더 중한 것인가? 답하기를 그렇지 않다. 태양인의 열격병은 해역병보다 더욱 중하고 노심(怒心)에 손상을 받은 것이 애심(哀心)에 손상을 받은 것 보다 더욱 중하다. 태양인의 애심(哀心)이 심하면 표기(表氣)가 상하고 노심(怒心)이 폭발하면 리기(裏氣)가 상하는 고로 해역의 표증에는 슬퍼함을 경계하고 노여워하는 것을 멀리하라고 겸하여 말한 것이다. 어떤 사람이 문기를 그러면 소양인의 노성(怒性)은 입과 방광의 기를 상하게 하고 애정(哀情)은 신과 대장의 기를 상하게 하고, 소음인의 락성(樂性)은 눈과 여(膂)의 기를 상하게 하고 희정(喜情)은 비와 위의 기를 상하게 하고, 태음인의 희성(喜性)은 귀와 뇌추의 기를 상하게 하고 락정(樂情)은 폐와 위완의 기를 상하게 하는가? 답하기를 그렇다.

[15-11] 太陽人, 大便一, 則宜滑也, 二則宜體大面多也. 小便一則宜多也, 二則宜數也. 面色, 宜白不宜黑, 肌肉, 宜瘦不宜肥, 鳩尾下, 不宜有塊, 塊小, 則病輕, 而其塊, 易消, 塊大, 則病重而其塊, 難消. 태양인의 대변은 첫째로 활(滑)한 것이 좋고 둘째로 덩어리가 굵고 많은 것이 좋으며, 소변은 첫째로 많은 것이 좋고 둘째로 자주 보는 것이 좋다. 얼굴빛은 흰 것이 좋고 검은 것은 좋지 않으며, 살은 여윈 것이 좋고 살찐 것은 좋지 않다. 구미(鳩尾)아래에 뭉친 것이 있으면 좋지 않으니 덩어리가 작으면 병이 경하며 그 덩어리는 쉽게 없어지나 덩어리가 크면 병이 중하고 그 덩어리가 없어지기 어렵다.

本草所載 太陽人病 經驗要藥 單方十種 及 李梴 龔信 經驗要藥 單方二種

본초서에 있는 태양인병에 경험된 주요 단방 10종 및 이천·공신의 경험된 단방 2처방

本草曰, 五加皮, 治兩脚疼痺, 骨節攣急, 痿痺, 小兒三歲, 不能行, 服此, 便行走. 松節, 療脚軟弱. 木苳, 止嘔逆, 煮汁飲之, 最佳. 葡萄根, 止嘔噦, 濃煎取汁, 細細飲之, 佳. 獼猴桃, 治熱壅, 反胃, 取汁服之, 藤汁, 至滑, 主胃閉吐逆, 取汁服之, 甚佳. 蘆根, 治乾嘔噎, 及五噎, 煩悶, 蘆根五兩, 水煎, 頓服, 一升, 不

過三升, 卽差. 蚌蛤, 治反胃吐食. 鯽魚, 治反胃. 蓴, 和鯽魚, 作羹食之, 主反胃, 食不下, 止嘔. 蕎麥, 實腸胃, 益氣力.

본초서에서 이르기를 오가피(땃드릅)는 양쪽 다리가 아프고 저리거나, 뼈마디에 쥐가 나며 땅기거나, 걷지 못하는 것을 치료한다. 아이가 3세가 되도록 걷지를 못하였는데, 이를 복용하고 바로 걸어다니게 되었다. 송절은 다리가 무르고 약한 것을 치료한다. 모과(모과의 열매)는 구역질을 멈추게 한다. 삶아 즙을 마시는 것이 가장 좋다. 포도근(포도의 뿌리)은 구토와 딸꾹질을 멎게 한다. 진하게 다린 물을 조금씩 마시면 좋다. 미후도(다래)는 열이 막아서 된 반위를 치료한다. 즙을 내서 복용한다. 덩굴의 즙은 매우 매끄러워서 위가 막혀 토하는데 주로 쓰며, 즙을 내서 복용하는 것이 매우 좋다. 노근은 헛구역질과 오열로 가슴이 답답한 것을 치료한다. 노근 5냥을 물에 달여 1되를 단번에 마시니, 3되를 넘지않고 즉시로 낫는다. 방합은 반위로 토하는 것을 치료한다. 붕어는 반위를 치료한다. 순채는 붕어와 함께 끓여 먹는다. 반위로 음식을 내려 보내지 못하는 것을 다스리고, 구토를 멎게 한다. 모밀은 장과 위를 실하게 하고, 기력을 더해 준다.

○ 李梴曰, 杵頭糠, 主噎, 食不下, 咽喉塞, 細糠一兩, 白粥清調服.

이천이 말하기를 저두강(절구 방망이 끝에 묻은 가는 거)은 목이 막혀서 음식을 내려 보내지 못하는 것과 목구멍이 막히는데 주로 쓴다. 자잘한 거 1냥으로 흰죽을 쑤어 숟가락에 타서 복용한다.

○ 龔信曰, 蚌蛤, 治反胃.

공신이 말하기를 방합은 반위를 치료한다.

新定 太陽人病 應用設方藥 二方

새로 정한 태양인병의 주요 2처방

五加皮壯脊湯

오가피장척탕

五加皮 四錢, 木苽・青松節 各二錢, 葡萄根・蘆根・櫻桃肉 各一錢, 蕎麥米 半匙.

오가피 4돈, 모과・청송절 각2돈, 포도근・노근・앵도육 각1돈, 교맥미 반 숟가락.

青松節, 闕材, 則以好松葉代之. 右方治表證.

청송절이 없는 약재이면 좋은 송엽으로 대체한다. 이 처방은 표증을 치료한다.

獼猴藤植腸湯

미후등식장탕

獼猴桃 四錢, 木苽・葡萄根 各二錢, 蘆根・櫻桃肉・五加皮・松花 各一錢, 杵頭糠 半匙.

미후도 4돈, 모과・포도근 각2돈, 노근・앵도육・오가피・송화 각1돈, 저두강 반 숟가락.

獼猴桃, 闕材, 則以藤代之. 右方治裏證.

미후도가 없는 약재이면 덩굴로 대체한다. 이 처방은 리증을 치료한다.

○ 凡菜果之屬, 清平疏散之藥, 皆爲肝藥, 蛤屬, 亦補肝.

무릇 채소와 과일의 부류들은 맑고 고르며 성기고 담백한 약들로 모든 간의 약이다. 조개의 부류도 역시 간의 약을 보한다.

○ 論曰, 藥驗, 不廣者, 病驗, 不廣故也. 太陽人數, 從古稀少, 故古方書中, 所載證藥, 亦稀少也. 今, 此五加皮壯脊湯, 獼猴藤植腸湯, 立方, 草草, 雖欠不博, 而若使太陽人, 有病者, 因是二方, 詳究其理, 而又變通置方, 則何患乎無好藥哉.

논하여 말하기를 약의 검허이 넓지 못한 것은 병의 경험이 넓지 못하기 때문이다. 태양인 수는 예로부터 매우 적어서 옛날 의서에도 이에 대한 증상과 약을 실은 것이 또한 매우 드물다. 지금 이 오가피장척탕과 미후등식장탕의 처방을 만든 것이 보잘 것 없고 비록 수가 모자라 두루하지 못하는 하나, 만약 태양인이 병을 얻었을 때 이 두 가지 처방을 가지고 그 이치를 자세히 궁리하고 변통하여 새로운 처방을 만들 수 있다면 어찌 좋은 약인 없는 것을 걱정할 필요가 있겠는가?

廣濟說(23條)
광제설(23조)

[16-1] 初一歲至十六歲, 曰幼, 十七歲至三十二歲, 曰少, 三十三歲至四十八歲, 曰壯, 四十九歲至六十四歲, 曰老.

1세부터 16세까지를 유년(幼年)이라고 말하며, 17세부터 32세까지를 소년(少年)이라고 말하며, 33세부터 48세까지를 장년(壯年)이라고 말하며, 49세부터 64세까지를 노년(老年)이라고 말한다.

[16-2] 凡人, 幼年, 好聞見而能愛敬, 如春生之芽. 少年, 好勇猛而能騰捷, 如夏長之苗. 壯年, 好交結而能修飭, 如秋斂之實. 老年, 好計策而能秘密, 如冬藏之根.

무릇 사람은 유년기에는 듣고 보기를 좋아하고 부모를 사랑하고 어른을 공경하니 봄날에 돋아나는 새싹과 같고, 소년기에는 용맹을 좋아하고 날뛰며 빠르니 여름날에 자라나는 어린 묘목과 같고, 장년기에는 교제하기를[交結] 좋아하고 닦고 수양을 하니 가을날에 수확하는 열매와 같고, 노년기에는 계책을 좋아하고 비밀을 잘 지키니 겨울날에 숨어 있는 뿌리와 같다.

[16-3] 幼年好文字者, 幼年之豪傑也. 少年敬長老者, 少年之豪傑也. 壯年能汎愛者, 壯年之豪傑也. 老年保可人者, 老年之豪傑也. 有好才能, 而又有十分快足於好心術者, 眞豪傑也, 有好才能, 而終不十分快足於好心術者, 才能而已.

유년기에 문자를 좋아하는 사람은 유년의 호걸(豪傑)이요, 소년기에 어른과 노인을 공경하는 사람은 소년의 호걸이요, 장년기에 널리 사람을 사랑할 줄 아는 사람은 장년의 호걸이요, 노년기에 올바른 사람을[可人] 보호할 줄 아는 사람은 노년의 호걸이다. 좋은 재능이 있고 또 좋은 마음씨까지 넉넉하게 간직한 사람은 참된 호걸이고, 좋은 재능이 있어도 좋은 마음씨까지 넉넉하게 간직하지 못한 사람은 재능만 있을 뿐이다.

[16-4] 幼年七八歲前, 聞見未及, 而喜怒哀樂膠着, 則成病也, 慈母宜保護之也. 少年二十四五歲前, 勇猛未及, 而喜怒哀樂膠着, 則成病也, 智父能兄宜保護之也. 壯年三十八九歲前, 則賢弟良朋可以助之也. 老年五十六七歲前, 則孝子孝孫可以扶之也.

유년기 7-8세 전에 보고 듣는 것이 부족하여 기뻐하고 성내고 슬퍼하고 즐거워하는 것이 교착(膠着)되면 병이 되니 자애로운 어머니가 마땅히 보호해야 할 것이며, 소년기 24-25세 전에 용맹이 부족하여 기뻐하고 성내고 슬퍼하고 즐거워하는 것이 교착되면 병이 되니 지혜로운 아버지와 능숙한 형이 마땅히 보호해야 할 것이며, 장년기 38-39세 전에는 착한 동생과 좋은 벗이라야 가히 도울 수가 있을 것이며, 노년기 56-57세 전에는 효자효손이라야 가히 부양할 수가 있을 것이다.

[16-5] 善人之家, 善人必聚, 惡人之家, 惡人必聚. 善人多聚, 則善人之臟氣, 活動, 惡人多聚, 則惡人之心氣, 強旺, 酒色財權之家, 惡人多聚, 故其家孝男孝婦受病.

착한 사람의 집에는 반드시 착한 사람이 모이고 악한 사람의 집에는 반드시 악한 사람이 모인다. 착한 사람이 많이 모이면 착한 사람의 장기(臟氣)가 활동하고 악한 사람이 많이 모이면 악한 사람의 심기(心氣)가 왕성해진다. 술·여색·재물·권세를 좋아하는 집에는 악한 사람이 많이 모이는 까닭에 그 집의 효남, 효부가 병을 얻게 되는 것이다.

[16-6] 好權之家, 朋黨比周, 敗其家者, 朋黨也. 好貨之家, 子孫驕愚, 敗其家者, 子孫也.

권세를 좋아하는 집에는 파벌꾼들이 싸고 도니 그 집을 패망케 하는 자는 파벌꾼들이며, 재물을 좋아하는 집에는 자손이 교만하고 어리석으니 그 집을 패망케 하는 자는 자손이다.

[16-7] 人家, 凡事不成, 疾病連綿, 善惡相持, 其家將敗之地, 惟明哲之慈父孝子, 處之有術也.

어느 사람의 집안이든지 모든 일이 잘되지 않고 질병이 끊이지 않으며 선과 악이 서로 대치되어 그

집이 장차 패망할 지경에 이르면 오직 현명하고 자애로운 아버지나 효자라야 이에 대처할 방법을 갖고 있는 것이다.

[16-8] 嬌奢減壽, 懶怠減壽, 偏急減壽, 貪慾減壽. 爲人嬌奢, 必耽侈色, 爲人懶怠, 必嗜酒食. 爲人偏急, 必爭權勢, 爲人貪慾, 必殉貨財.

교만하고 사치하면 수명을 감소시키고, 게으르고 나태하면 수명을 감소시키고, 성질이 편급하면 수명을 감소시키고, 욕심이 많으면 수명을 감소시킨다. 사람됨이 교만하고 사치하면 반드시 여자를 탐하고, 사람됨이 게으르고 나태하면 반드시 술과 음식을 탐하고, 사람됨이 편급하면 반드시 권세를 다투고, 사람됨이 욕심이 많으면 반드시 돈과 재물 때문에 목숨을 잃게 된다.

[16-9] 簡約得壽, 勤幹得壽, 警戒得壽, 聞見得壽. 爲人簡約, 必遠侈色, 爲人勤幹, 必潔酒食. 爲人警戒, 必避權勢, 爲人聞見, 必清貨財.

간약(簡約)하면 장수하고, 근간(勤幹)하면 장수하고, 경계(警戒)하면 장수하고, 문견(聞見)하면 장수한다. 사람됨이 간약(簡約)하면 반드시 여자를 멀리하고, 사람됨이 근간(勤幹)하면 반드시 술과 음식에 청결하고, 사람됨이 경계(警戒)할 줄 알면 반드시 권세를 피하고, 사람됨이 문견(聞見)이 있으면 반드시 돈과 재물에 청백하다.

[16-10] 居處荒涼, 色之故也, 行身闕茸, 酒之故也, 用心煩亂, 權之故也, 事務錯亂, 貨之故也.

거처(居處)가 쓸쓸하고 적막한 것은 여색 때문이며, 행신(行身)이 불량하고 비루한 것은 술 때문이며, 용심(用心)이 문란한 것은 권세 때문이며, 사무(事務)가 혼란한 것은 재물 때문이다.

[16-11] 若敬淑女, 色得中道, 若愛良朋, 酒得明德, 若尚賢人, 權得正術, 若保窮民, 貨得全功.

만약 숙녀를 존경한다면 여색에서 공정한 도리를 얻을 것이요, 만약 좋은 벗을 사귀면 술에서 좋은 덕행을 얻을 것이요, 만약 현명한 사람을 사모하면 권세에서 정당한 술수를 얻을 것이요, 만약 어려운 처지에 있는 사람을 도와준다면 재물에서 온전한 공적을 얻을 것이다.

[16-12] 酒色財權, 自古所戒, 謂之四堵牆, 而比之牢獄. 非但一身壽夭, 一家禍福之所繫也, 天下治亂, 亦在於此, 若使一天下酒色財權, 無乖戾之氣, 則庶幾近於堯舜周召南之世矣.

술과 여색, 재물과 권세는 예로부터 경계하는 바로써 네 개의 담장이라고 말하고 감옥에 비유하였다. 비단 일신의 수요(壽夭)와 일가의 화복에만 관계되는 것이 아니라 천하가 다스려짐과 어지러워짐이 역시 여기에 달려 있다. 만약 천하의 술과 여색, 재물과 권세로 하여금 어긋난 기풍에 휩쓸리지 않게 한다면 거의 요순(堯舜) · 주남(周南) · 소남(召南)의 세상에 근접하게 될 것이다.

[16-13] 凡人簡約而勤幹, 警戒而聞見, 四材圓全者, 自然上壽, 簡約勤幹而警戒, 或聞見警戒而勤幹, 三材全者, 次壽, 嬌奢而勤幹, 警戒而貪慾, 或簡約而懶怠, 偏急而聞見, 二材全者, 恭敬則壽, 怠慢則夭.

무릇 사람이 간약하고 부지런하며 경계하고 문견이 있는 이 네 가지를 다 온전하게 갖춘 자는 저절로 장수하고, 간약하고 부지런하면서 경계하거나 혹은 문견이 있고 경계하면서 부지런하거나 하여 세 가지를 갖춘 자는 그 다음으로 장수하고, 교활하며 사치하면서 부지런하거나 경계하면서 탐욕스럽거나 혹은 간약하면서 나태하거나 편급하면서도 문견이 있어서 이 두 가지를 갖춘 자는 공경하면 장수하고 나태하면 요절할 것이다.

[16-14] 凡人恭敬則必壽, 怠慢則必夭. 勤幹則必壽, 虛貪則必夭. 飢者之腸, 急於得食, 則腸氣蕩矣, 貧者之骨, 急於得財, 則骨力竭矣. 飢而安飢, 則腸氣有守, 貧而安貧, 則骨力有立, 是, 故飲食, 以能忍飢, 而不貪飽, 爲恭敬, 衣服, 以能耐寒, 而不貪溫, 爲恭敬, 筋力, 以能勤勞, 而不貪安逸, 爲恭敬, 財物, 以能謹實, 而不貪苟得, 爲恭敬.

무릇 사람은 공경(恭敬)하면 반드시 장수하고 태만(怠慢)하면 반드시 요절하며, 부지런(勤幹)하면 반드시 장수하고 허탐(虛貪)하면 반드시 요절할 것이다. 배고픈 자의 창자가 먹을 것을 얻기에 급급하면 창자의 기운이 흐트러질 것이며, 가난한 자의 뼈가 재물을 얻음에 급급하면 뼈의 힘이 말라붙

을 것이다. 배고픈 자도 편안히 주린다면 창자의 기운이 제대로 간직되고, 가난한 자도 편안히 가난하다면 뼈의 힘이 제구실을 할 것이다. 그러므로 음식은 능히 배고픔을 참고 배부름을 탐하지 않는 것이 공경이고, 의복은 능히 찬 것을 견디고 따뜻한 것을 탐내지 않는 것이 공경이고, 근력은 부지런히 일하고 편안한 것을 탐내지 않는 것이 공경이고, 재물은 능히 근실히 하고 무리한 횡재를 얻는 것을 탐내지 않는 것이 공경이다.

[16-15] 山谷之人, 沒聞見而禍夭, 市井之人, 沒簡約而禍夭, 農畝之人, 沒勤幹而禍夭, 讀書之人, 沒警戒而禍夭.

산골 사람은 문견(聞見)이 없으면 요절의 화를 당하고, 도시 사람은 간약(簡約)하지 않으면 요절의 화를 당하고, 농촌 사람은 근간(勤幹)하지 않으면 요절의 화를 당하고, 독서하는 사람은 경계(警戒)하지 않으면 요절의 화를 당한다.

[16-16] 山谷之人, 宜有聞見, 有聞見, 則福壽, 市井之人, 宜有簡約, 有簡約, 則福壽, 鄉野之人, 宜有勤幹, 有勤幹, 則福壽, 士林之人, 宜有警戒, 有警戒, 則福壽.

산골 사람은 마땅히 문견(聞見)이 있어야 하는데 문견이 있으면 장수의 복을 누리고, 도시 사람은 마땅히 간약(簡約)해야 하는데 간약하면 장수의 복을 누리고, 농촌 사람은 마땅히 근간(勤幹)해야 하는데 근간하면 장수의 복을 누리고, 학문하는 선비는 마땅히 경계(警戒)해야 하는데 경계하면 장수의 복을 누린다.

[16-17] 山谷之人, 若有聞見, 非但福壽也, 此人即, 山谷之傑也, 市井之人, 若有簡約, 非但福壽也, 此人即, 市井之傑也, 鄉野之人, 若有勤幹, 非但福壽也, 此人即, 鄉野之傑也, 士林之人, 若有警戒, 非但福壽也, 此人即, 士林之傑也.

산골 사람이 만약 문견(聞見)이 있으면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 산중의 호걸이며, 도시 사람이 만약 간약(簡約)하다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 도시의 호걸이며, 농촌 사람이 만약 근간(勤幹)하다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 농촌의 호걸이며, 학문하는 선비가 만약 경계(警戒)한다면 장수의 복을 누릴 뿐만 아니라 이 사람은 곧 학문하는 선비의 호걸이다.

[16-18] 或曰, 農夫, 元來力作, 最是勤幹者也, 而何謂沒勤幹, 士人, 元來讀書, 最是警戒者也, 而何謂沒警戒耶. 曰, 以百畝之不治, 爲己憂者, 農夫之任也, 農夫, 而比之士人, 則真是懶怠者也, 士人, 頗讀書, 故心恒妄矜, 農夫, 目不識字, 故心恒佣銘, 士人, 而擬之農夫, 則真不警戒者也. 若農夫勤於識字, 士人習於力作, 則才性調密, 臟氣堅固.

어떤 사람이 말하기를 "농부들은 원래 힘으로 농사를 지으니 가장 근간(勤幹)한 자들인데 왜 근간하지 않는다고 하였으며, 선비들은 원래 독서를 하고 있으니 가장 경계(警戒)하는 자들인데 왜 경계하지 않는다고 하였는가?" 내가 대답하기를 백 마지기의 농토를 잘못 다스릴까봐 그것을 제 걱정으로 삼는 것이 농부의 임무인 것이니 농부를 선비와 비교한다면 진정 그들은 나태한 자들이다. 선비들이란 무던히 독서하기 때문에 마음은 항상 헛되이 뿜내고, 농부들은 눈으로 글자를 볼 줄 모르기 때문에 마음은 항상 몸에 차고 돌에 새기듯 기억하고 있으니 선비들은 농부들과 비교한다면 진정 그들은 경계하지 않는 자들이다. 만약 농부들이 글자를 익히는 데 부지런하거나 선비들이 힘써 일하는 습관을 들인다면 재주나 성품이 조밀해지고 장기(臟氣)도 견고해질 것이다.

[16-19] 嬌奢者之心, 藐視閭閻生活, 輕易天下室家, 眼界驕豪, 全昧產業之艱難. 甚劣財力之方畧, 每爲女色所陷, 終身不悔.

교만하고 사치(嬌奢)하는 자의 마음은 여염집의 살림살이를 경시하며, 사회와 가정을 경솔히 여기고, 보고 느끼는 것은 교활하고 방탕하여 산업의 어려운 고비에 대해서는 까맣게 모르고, 재력을 마련하는 방략은 심히 서투르면서 매양 여색에 빠져서 종신토록 뉘우칠 줄을 모른다.

[16-20] 懶怠者之心, 極其羸猛, 不欲積工之寸累, 每有虛大之甕筭. 盖其心, 甚憚勤幹, 故欲逃其身於酒

國, 以姑避勤幹之計也. 凡懶怠者, 無不縱酒, 但見縱者, 則必知其爲懶怠人心, 羸猛也.

태만(懶怠)한 자의 마음은 극히 거칠고 사나워서 조금씩 쌓아올릴 생각은 하지 않고 매양 헛되이 큰 꿈을 꾸려고 하며, 대체로 그의 마음가짐은 심히 부지런함을 꺼려하기 때문에 자신의 몸을 술 세계로 도망치려고 하는 것이니 부지런하기를 피하려는 일시적인 계책인 것이다. 대체로 태만한 자치고 술주정뱅이가 되지 않는 자는 없는 것이니 술주정뱅이만 만나보더라도 반드시 나태한 사람의 마음이 거칠고 사납다는 것을 알 수 있을 것이다.

[16-21] 酒色之殺人者, 人皆曰, 酒毒枯腸, 色勞竭精云, 此, 知其一, 未知其二也. 縱酒者, 厭勤其身, 憂患如山, 惑色者, 深愛其女, 憂患如刀, 萬端心曲, 與酒毒色勞并力攻之, 而殺人也.

술과 색이 사람을 죽인다고 하는 사람들은 모두 말하기를 "술독이 창자를 마르게 하고 색로(色勞)가 정력을 말라붙게 한다"고 하지만 이는 그 중의 하나를 알고 둘은 모르는 말이다. 술에 방종하는 자는 그 몸을 부지런하게 쓰기를 싫어하기 때문에 걱정이 태산 같고, 색에 미혹된 자는 계집을 깊이 사랑하기 때문에 걱정이 칼날 같아서 만 갈래로 찢어지고 이지러진 마음이 술독과 색로와 함께 힘을 합하여 공격하므로 사람을 죽이게 하는 것이다.

[16-22] 狂童, 必愛淫女, 淫女, 亦愛狂童, 愚夫, 必愛妬婦, 妬婦, 必愛愚夫, 以物理觀之, 則淫女斷合, 狂童之配也, 愚夫, 亦宜妬婦之匹也. 蓋淫女妬婦, 可以爲惡人賤人之配匹也, 不可爲君子貴人之配匹也. 七去惡中, 淫去妬去, 爲首惡, 而世俗, 不知妬字之義, 但以憎疾衆妾爲言, 貴人之繼嗣, 最重, 則婦人, 必不可憎疾貴人之有妾, 而亂家之卒, 未嘗不在於衆妾, 則婦人之憎疾衆妾之邪媚者, 猶爲婦人之賢德也. 何所當於妬字之義乎. 詩云, 桃之夭夭, 其葉蓁蓁, 之子于歸, 宜其家人, 宜其家人者, 好賢樂善, 而宜於家人之謂也, 不宜其家人者, 妬賢嫉能, 而不宜於家人之謂也. 凡人家, 疾病連綿, 死亾相隨, 子孫愚蚩, 資產零落者, 莫非愚夫妬婦, 妬賢嫉能之所做出也.

광동(狂童)은 반드시 음녀(淫女)를 사랑하고 음녀는 또한 광동을 사랑하며, 우부(愚夫)는 반드시 투부(妬婦)를 사랑하고 투부는 또한 우부를 사랑하는 것이니, 만물의 이치로 이를 따져보더라도 음녀는 단연코 광동의 배필에 합당할 것이요, 우부는 또한 투부의 배필함이 마땅할 것이다. 대개 음녀나 투부는 악인이나 천인(賤人)의 배필이 될 수는 있어도 군자나 귀인의 배필이 될 수는 없는 것이다. 칠거지악 중에서도 음란한 것과 질투하는 것이 그 으뜸되는 악이지만 세상 사람들은 '투'자의 의미를 잘 모르고 단지 많은 첩들을 미워하며 투기하는 것만을 이야기한다. 귀인이 후사를 이어야 한다는 것은 가장 소중한 일이기 때문에 귀인이 첩을 갖는 것을 부인이 미워하며 투기하는 것은 절대로 안 되는 법이다. 그러나 가정의 법도를 어지럽히는 근본이 일찍이 많은 첩을 거느리는 데 있기 때문에 부인이 첩들의 간교하고 아첨하는 것을 미워하며 투기하는 것은 오히려 부인의 현명한 품성이 될 수도 있으니 어찌 투자의 뜻과 일치한다고 할 수가 있겠는가? 《시경(詩經)》에 이르기를 "복숭아나무 옛되고 예뻐이여, 그 잎도 짙게 푸르도다. 이 아가씨 시집감이여 그 집안사람들을 화목케 하도다"라고 하였으니 그 집안사람과 화목하게 한다는 것은 현인을 좋아하며 선행을 즐기면서 그 집안사람과 화목하다는 것을 이름이요, 그 집안사람들을 화목하게 하지 못한다는 것은 현인을 미워하며 남의 재능을 투기하면서 그 집안사람들을 화목하지 못하게 한다는 것을 이름이다. 대체로 어느 사람의 집안에서 질병이 잇따르고 사망이 뒤따르며 자손은 천치바보가 되고 재산은 몰락하여 없어지는 것은 우부나 투부가 현인을 시기하며 남의 재능을 질투하는 데서 기인되지 않는 것이 없다.

[16-23] 天下之惡, 莫多於妬賢嫉能, 天下之善, 莫大於好賢樂善, 不妬賢嫉能, 而爲惡, 則惡必不多也, 不好賢樂善, 而爲善, 則善必不大也. 歷稽往牒, 天下之受病, 都出於妬賢嫉能, 天下之救病, 都出於好賢樂善, 故曰, 妬賢嫉能, 天下之多病也, 好賢樂善, 天下之大藥也.

천하의 악은 어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것보다 더 많은 것은 없을 것이요, 천하의 선은 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것보다 더 큰 것은 없다. 어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것이 아닌데도 악이라고 한다면 악이라 하더라도 그리 많지는 않을 것이요, 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것이 아닌데도 선이라고 한다면 선이라 하더라도 그리 크지는 않을 것이다. 옛 글을 낱낱이 참고하면 천하의 병에 걸린다고 하는 것은 어진 사람을 시기

하며 남의 재능을 질투하는 것에서 나오는 것이요, 천하의 병을 구원한다는 것은 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것에서 나오는 것이다. 그러므로 나는 말하기를 "어진 사람을 시기하며 남의 재능을 질투하는 것은 천하에서도 가장 많은 병이요, 어진 사람을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 것은 천하에서도 아주 큰 약이 되는 것이다."

四象人 辨證論(28條)

사상인 변증론(28조)

[17-1] 太少陰陽人, 以今時目見, 一縣萬人數, 大畧之, 則太陰人, 五千人也, 少陽人, 三千人也, 少陰人, 二千人也, 太陽人數, 絕少, 一縣中, 或三四人, 十餘人, 而已.

태소음양인(太少陰陽人)을 오늘까지 관찰한 결과 한 고을에 사람 수가 대략 1만 명이라 하고 논하면 그 중에서 태음인이 5,000명이고 소양인이 3,000명이고 소음인이 2,000명이며 태양인의 수는 극히 적어서 한 고을에 3,4명 내지 10여 명에 불과하다.

[17-2] 太陽人, 體形氣像, 腦頤之起勢, 盛壯, 而腰圍之立勢, 孤弱. 少陽人, 體形氣像, 胷襟之包勢, 盛壯, 而膀胱之坐勢, 孤弱. 太陰人, 體形氣像, 腰圍之立勢, 盛壯, 而腦頤之起勢, 孤弱. 少陰人, 體形氣像, 膀胱之坐勢, 盛壯, 而胷襟之包勢, 孤弱.

태양인 체형의 기상(體形氣像)은 뇌추(腦頤)의 기세가 웅장하고 허리 주위(腰圍)의 서 있는 형세가 연약하다. 소양인의 체형기상은 흉襟(胸襟)의 벌어진 형세가 웅장하고 방광(膀胱)의 좌세(坐勢)가 연약하다. 태음인의 체형기상은 허리 주위(腰圍)의 서 있는 형세가 장하고 뇌추(腦頤)의 기세가 연약하다. 소음인의 체형기상은 방광(膀胱)의 좌세가 웅장하고 흉襟(胸襟)의 벌어진 형세가 연약하다.

[17-3] 太陽人, 性質, 長於疏通, 而材幹, 能於交遇. 少陽人, 性質, 長於剛武, 而材幹, 能於事務. 太陰人, 性質, 長於成就, 而材幹, 能於居處. 少陰人, 性質, 長於端重, 而材幹, 能於黨與.

태양인의 성질(性質)은 활달한 것이 장점이며 재간(材幹)은 교우(交遇)에 능하다. 소양인의 성질은 용감한 것이 장점이며 재간은 사무(事務)에 능하다. 태음인의 성질은 성취하는 것이 장점이며 재간은 거처(居處)에 능하다. 소음인의 성질은 단정한 것이 장점이며 재간은 당여(黨與)에 능하다.

[17-4] 太陽人, 體形, 元不難辨, 而人數稀罕, 故最爲難辨也. 其體形, 腦頤之起勢強旺, 性質疏通, 又有果斷, 其病, 噎膈・反胃・解信證, 亦自易辨, 而病未至重險之前, 別無大證, 完若無病壯健人也.

태양인의 체형은 원래 감별하기 어렵지 않으나 사람 수가 드물기 때문에 가장 감별하기 어려운 것이다. 그 체형은 뇌추(腦頤)의 기세가 웅장하고 성질은 활발하며 또 과단성이 있고 그 병은 열격(噎膈)・반위(反胃)・해역(解信) 등 증상이 있으니 역시 스스로 변증하기가 쉬우며 별로 큰 증세가 없으며 아무 병이 없고 건강한 사람 같다.

[17-5] 少陰人, 老人, 亦有噎證, 不可誤作太陽人治.

소음인 노인도 또한 열격증(噎證)이 있으니 태양인으로 오진하고 치료하지 말아야 한다.

[17-6] 太陽女體形, 壯實而肝小脇窄, 子宮不足, 故不能生產, 以六畜玩理, 而太陽牝牛馬, 體形壯實, 而亦鮮能生產者, 其理可推.

태양인 여자는 체형이 건장하고 실하나 간이 적고 옆구리가 좁아서 자궁이 부족하므로 아이를 낳을 수 없으니 가축으로 말하면 태양의 암소와 말은 체형이 건장하고 실하나 역시 생산치 못하는 것은 그 이치가 동일한 것이다.

[17-7] 少陽人, 體形, 上盛下虛, 胷實足輕, 剽銳好勇, 而人數亦多, 四象人中, 最爲易辨.

소양인의 체형은 위가 성하고 아래가 허하여 가슴이 실하고 발이 가벼워 매우 날카롭고 용기를 좋아(剽銳好勇)하며 사람 수도 또한 많으니 사상인(四象人) 중에 가장 감별하기가 쉬운 것이다.

[17-8] 少陽人, 或有短小靜雅, 外形, 恰似少陰人者, 觀其病勢寒熱, 仔細執證, 不可誤作少陰人治. 소양인도 혹 몸이 작고 적으며 성질이 조용하고 아담하여 외형이 소음인과 흡사한 자가 있으니 그 병세의 한열(寒熱)을 보아 자세히 집증(執證)할 것이며 잘못 소음인으로 알고 치료하지 말 것이다.

[17-9] 太陰少陰人體形, 或暑相彷彿, 難辨疑似, 而觀其病證, 則必無不辨. 太陰人, 虛汗則完實也, 少陰人, 虛汗則大病也, 太陰人, 陽剛堅密則大病也, 少陰人, 陽剛堅密則完實也, 太陰人, 有胃膈怔忡證也, 少陰人, 有手足悞亂證也, 太陰人, 有目眦上引證, 又有目睛內疼證也, 少陰人, 則無此證也, 少陰人, 平時呼吸, 平均而間有一太息呼吸也, 太陰人, 則無此太息呼吸也, 太陰人, 瘧疾惡寒中, 能飲冷水, 少陰人, 瘧疾惡寒中, 不飲冷水, 太陰人脈, 長而緊, 少陰人脈, 緩而弱, 太陰人肌肉, 堅實, 少陰人肌肉, 浮軟, 太陰人, 容貌詞氣, 起居有儀, 而修整正大, 少陰人, 容貌詞氣, 體任自然, 而簡易小巧.

태음인과 소음인의 체형이 혹은 서로 비슷하여 가리기 어렵다. 그러나 그 병증을 관찰하면 반드시 구별하지 못할 것이 없다. 태음인이 허한(虛汗)이 있으면 완실(完實)하고 소음인이 허한이 있으면 큰 병이다. 태음인이 피부가 강하고 견밀(堅密)하면 큰 병이고 소음인이 피부가 강하고 견밀하면 완실할 것이다. 태음인은 흉격정충증(胸膈怔忡證)이 있고 소음인은 수족문란증(手足悞亂證)이 있다. 태음인은 눈초리가 위로 땅기는 증(目眦上引證)이 있으며 또 안구 동통증이 있고 소음인은 이런 증이 없다. 소음인은 평시에 호흡이 고르나 간혹 큰 한숨(太息呼吸)을 쉬는 일이 있고 태음인은 이렇게 큰 한숨을 쉬는 일이 없다. 태음인은 학질(瘧疾)·오한(惡寒) 중에도 능히 냉수를 마시나 소음인은 학질·오한 중에 냉수를 마시지 않는다. 태음인의 맥은 장(長)하고 긴(緊)하나 소음인의 맥은 완(緩)하고 약(弱)하다. 태음인의 기육(肌肉)은 견실하나 소음인의 기육은 부드럽다. 태음인은 용모와 말하는 기운(容貌詞氣)은 생활이 의젓하고 잘못을 고쳐 바로잡으며 소음인은 용모와 말하는 기운(容貌詞氣)은 동작이 자연스럽고 간편하면서 약간 기교가 있다.

[17-10] 少陰人, 體形, 矮短, 而亦多有長大者, 或有八九尺長大者, 太陰人, 體形, 長大, 而亦或有六尺矮短者.

소음인의 체형은 왜단(矮短)하나 장대(長大)하여 8,9척이 되는 자도 있으며 태음인의 체형은 장대하나 6척이 되는 왜단한 자도 있다.

[17-11] 太陰人, 恒有怯心, 怯心寧靜, 則居之安, 資之深, 而造於道也, 怯心益多, 則放心桎梏, 而物化之也, 若怯心, 至於怕心, 則大病, 作而怔忡也, 怔忡者, 太陰人病之重證也.

태음인은 항상 겁내는 마음(怯心)이 있으니 겁내는 마음이 안정하고 고요하면 거처가 편안하며 실력(자질)이 축적되어서 도에 나아갈 것이고 겁내는 마음이 더욱 많으면 방심되고 자유스럽지 못하여 시기에 의하여 동요된다. 만약 겁내는 마음이 두려운 마음(怕心)에 이르게 되면 큰 병이 발생하여 정충(怔忡)이 될 것이니 정충증은 태음인 병에서 중증이다.

[17-12] 少陽人, 恒有懼心, 懼心寧靜, 則居之安, 資之深, 而造於道也, 懼心益多, 則放心桎梏, 而物化之也, 若懼心, 至於恐心, 則大病, 作而健忘也, 健忘者, 少陽人病之險證也.

소양인은 항상 두려운 마음(懼心)이 있으니 두려운 마음이 안정되고 고요하면 거처가 편안하며 실력(자질)이 축적되어서 도에 나아갈 것이고 두려운 마음이 더욱 풍부하면 몸이 자유스럽지 못하여 시기에 따라 동요한다. 만약 두려운 마음이 공포심(恐心)에 이르게 되면 큰 병이 일어나 건망증(健忘症)이 될 것이니 건망증은 소양인 병에서 위험한 증세이다.

[17-13] 少陰人, 恒有不安定之心, 不安定之心寧靜, 則脾氣, 卽活也, 太陽人, 恒有急迫之心, 急迫之心寧靜, 則肝血, 卽和也.

소음인은 항상 불안정한 마음(不安定之心)이 있으니 불안정한 마음이 안정되고 고요하면 비장의 기(脾氣)가 곧 활발할 것이다. 태양인은 항상 급박한 마음(急迫之心)이 있으니 급박한 마음이 안정되고 고요하면 간장의 혈(肝血)이 곧 조화될 것이다.

[17-14] 少陰人, 有咽喉證, 其病太重, 而爲緩病也, 不可等閒任置, 當用蔘桂八物湯, 或用獐肝・金蛇

酒.

소음인은 인후증(咽喉證)이 있으면 그 병이 대단히 중하면서도 장기적 질환으로 변하니 등한히 보지 않을 것이다. 마땅히 삼계팔물탕(蔘桂八物湯)을 쓰며 혹은 노루의 간이나 또는 금사주(金蛇酒)를 쓸 것이다.

[17-15] 太陽人, 有八九日, 大便不通證, 其病, 非殆證也, 不必疑惑, 而亦不可無藥, 當用獼猴藤五加皮湯.

태양인이 8,9일간 대변 불통증이 있으면 그 병은 위대한 증세가 아니다. 의혹할 것은 아니며 또한 약이 있으니 마땅히 미후등오가피탕(獼猴藤五加皮湯)을 쓸 것이다.

[17-16] 太陽人, 小便旺多, 則完實而無病. 太陰人, 汗液通暢, 則完實而無病. 少陽人, 大便善通, 則完實而無病. 少陰人, 飲食善化, 則完實而無病.

태양인은 소변이 많으면 건강하고 병이 없으며(完實而無病), 태음인은 땀이 잘 나면 건강하고 병이 없으며, 소양인은 대변이 잘 통하면 건강하고 병이 없으며, 소음인은 음식이 잘 소화되면 건강하고 병이 없는 것이다.

[17-17] 太陽人, 噎膈, 則胃脘之上焦, 散豁如風. 太陰人, 痢病, 則小腸之中焦, 窒塞如霧. 少陽人, 大便不通, 則胃膈, 必如烈火. 少陰人, 泄瀉不止, 則臍下, 必如冰冷.

태양인은 열격이 되면 위완(胃脘)의 상초(上焦)가 시원한 것이 바람과 같고, 태음인은 이질이 나면 소장(小腸)의 중초가 막힌 것이 안개 같고, 소양인은 대변이 통하지 않으면 흥격이 반드시 열화와 같이 뜨겁고, 소음인은 설사가 그치지 않으면 배꼽 아래가 반드시 얼음과 같이 차다.

[17-18] 明知其人, 而又明知其證, 則應用之藥, 必無可疑.

똑똑하게 그 사람을 감별하고 또 똑똑하게 그 증세를 알면 응용하는 약 처방은 반드시 의심할 것이 없을 것이다.

[17-19] 人物形容, 仔細商量, 再三推移, 如有迷惑, 則參互病證, 明見無疑然後, 可以用藥, 最不可輕忽, 而一貼藥, 誤投重病險證, 一貼藥, 必殺人.

사람의 형용(체형과 용모)을 자세히 관찰하여 재삼 연구하되 만약 의혹되는 점이 있으면 병증(病證)을 참작하여 똑똑히 보아 의심이 없는 연후에 약을 쓸 것이고 결코 경솔하게 한 첩의 약이라도 투약하지 말 것이다. 중병 위증에는 잘못 투약하면 한 첩의 약이라도 반드시 사람을 죽이는 것이다.

[17-20] 華佗曰, 養生之術, 每欲小勞, 但莫大疲. 有一老人曰, 人可日再食, 而不四五食也, 又不可既食後添食, 如此, 則必無不壽.

화타(華他)가 말하기를 양생의 방법은 적당한 노력(小勞)을 할 것이고 공연히 과로는 하지 말 것이다. 한 노인이 말하기를 사람은 하루 두 번만 먹고(再食) 4,5번씩 먹지 말아야 하며 또 이미 먹고 난 후에는 더 먹지 말아야 할 것이다. 이렇게만 하면 반드시 장수하지 않을 수가 없다.

[17-21] 余足之曰, 太陰人, 察於外, 而恒寧靜怯心, 少陽人, 察於內, 而恒寧靜懼心, 太陽人, 退一步, 而恒寧靜急迫之心, 少陰人, 進一步, 而恒寧靜不安定之心, 如此, 則必無不壽.

나는 이것을 보충하여 말하겠다. 태음인은 밖을 살펴 항상 겁내는 마음(怯心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 소양인은 안을 살펴 두려운 마음(懼心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 태양인은 한 걸음 물러서서 항상 급박한 마음(急迫之心)을 안정시키고 고요히 할 것이며, 소음인은 한 걸음 나아가서 항상 불안정한 마음(不安定之心)을 안정시키고 고요히 할 것이니 이렇게만 하면 반드시 장수하지 않을 수가 없을 것이다.

[17-22] 又曰, 太陽人, 恒戒怒心哀心, 少陽人, 恒戒哀心怒心, 太陰人, 恒戒樂心喜心, 少陰人, 恒戒喜心樂心, 如此, 則必無不壽.

또 말하겠다. 태양인은 항상 노여운 마음과 슬픈 마음을 경계할 것이며, 소양인은 항상 슬픈 마음과 노여운 마음을 경계할 것이며, 태음인은 항상 즐거운 마음과 기쁜 마음을 경계할 것이며, 소음인은 항상 기쁜 마음과 즐거운 마음을 경계할 것이니 이렇게만 하면 장수하지 않을 수 없을 것이다.

[17-23] 大舜, 自畊稼陶漁, 無非取諸人以爲善, 夫子曰, 三人行, 必有我師, 以此觀之, 則天下衆人之才能, 聖人, 必博學審問, 而兼之, 故大, 而化也. 太少陰陽人, 識見才局, 各有所長, 文筆射御歌舞揖讓, 以至於博奕小技, 細鎖動作. 凡百做造, 面面不同, 皆異其妙, 儻乎衆人才能之浩多於造化中也.

대순(大舜)이 밭을 갈고 심고 질그릇을 굽든지 고기 잡는 일을 하든지 모든 것을 대중 속에서 배워 선을 행하였고, 공자는 말하기를 세 사람만 동행하면 반드시 나의 스승이 있다고 하였다. 이것으로써 연구하여 보면 천하에 대중의 재능을 성인이 반드시 널리 배우고 자세히 물어서 다 소유하였다. 그러므로 집대성한 것이다. 태소음양인의 식견과 재능은 각각 장점이 있다. 문필(文筆) · 사어(射御) · 가무(歌舞) · 음양(揖讓)으로부터 장기와 바둑, 그리고 작은 기능과 세세한 동작에 이르기까지 온갖 행동이 각각 같지 않으며 다 그 묘한 것이 다르니 실로 대중의 재능이란 자연 조화의 가운데 아주 많은 것이다.

[17-24] 靈樞書中, 有太少陰陽五行人論, 而畧得外形, 未得臟理, 盖太少陰陽人, 早有古昔之見, 而未盡精究也.

《영추(靈樞)》중에 태소음양오행인론이 있는데 대략 외형만 말하고 오장 이치는 말하지 않았다. 대개 태소음양인을 벌써 옛적에도 발명하였으나 정밀하게 다 연구하지 못하였던 것이다.

跋

발문

此書, 自癸巳, 七月十三日, 始作, 晝思夜度, 無頃刻休息, 至于翌年, 甲午, 四月十三日, 少陰少陽人論, 則畧得詳備, 太陰太陽人論, 則僅成簡約, 盖經驗, 未遍, 而精力, 已憊, 故也. 記曰, 開, 而不達, 則思, 若太陰太陽人, 思, 而得之, 則亦何損乎簡約哉.

이 글을 계사(癸巳) 7월 13일부터 시작하여 잠시도 쉴 새 없이 주야로 연구하고 써서 그 이듬해 갑오(甲午)년 4월 13일에 이르러서 끝내었다. 그런데 소음소양인론은 대략 정리되었으나 태음태양인론은 겨우 간략한 정도로서 되었으니 이것은 경험이 많지 못하였고 정력도 이미 소모된 까닭이다. 《예기(禮記)》에 · 보고서 이해하지 못할 것이면 생각하여 보라'고 하였으니 만약 태음태양인을 생각하여서 해득하게 되면 간략한 것이 또한 무슨 손실이 있겠는가.

萬室之邑, 一人, 陶, 則器不足也, 百家之村, 一人, 醫, 則活人, 不足也. 必廣明醫學, 家家知醫, 人人知病然後, 可以壽世保元.

만호가 되는 읍에서 한 사람이 그릇을 만들면 그릇이 부족할 것이고 백호가 되는 촌에서 한 사람이 의원을 하면 치료 사업이 부족할 것이다. 반드시 널리 의학을 발전시켜서 집집마다 의학을 알게 되고 사람마다 병리를 알게 된 연후에야 세상을 장수하게 하고 원기를 보전할 것이다.

光緒甲午四月十三日, 咸興李濟馬畢書于漢南山中.

광서(光緒) 갑오(甲午) 4월 12일 함흥 이제마는 한남(漢南) 산중에서 쓴다.

嗚呼公甲午畢書後 乙未下鄉, 至于庚子, 因本改抄, 自性命論, 至太陰人諸論, 各有增刪, 而太陽人以下三論, 未有增刪, 故今以甲午舊本, 刊行. 大韓光武, 五年辛丑六月日, 咸興郡栗洞契, 新刊.

아! 공(公)께서는 갑오년(1894년)에 다 쓰고 을미년(1895년)에 고향에 돌아왔다. 경자년(1900년)에 이 책을 다시 수정하는데 의원론(醫源論)으로부터 태음인 제론(諸論)에 이르기까지는 각각 수정하였고 기타 제론을 수정하지 못하였으므로 신구본에 의하여 인쇄 발생한다.

門人金永寬, 韓稷淵, 宋賢秀, 韓昌淵, 崔謙鏞, 魏俊赫, 李燮恒.

문인 김영관, 한직연, 송현수, 한창연, 최겸용, 위준혁, 이섭항