

MODELADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Modelado empírico y Modelado físico

El objetivo de un modelo es reproducir (predecir) el comportamiento (funcionamiento) de un sistema bajo unas condiciones predefinidas

Un modelo “condensa” todo el conocimiento disponible sobre el sistema

Cualquier análisis o evaluación que se realice sobre un sistema informático se basa en una concepción abstracta, implícita o explícita, de cómo debe funcionar el sistema

Esta concepción abstracta se puede formalizar en forma de MODELO
De ahí, la gran importancia de los modelos en el análisis de sistemas

TIPOS DE MODELOS

- EMPÍRICOS** Basados exclusivamente en observaciones experimentales
Sólo modelan la relación entre las variables de entrada y las de salida
- FÍSICOS** Basados en caracterizar las propiedades físicas de los componentes del sistema y su interconexión (arquitectura del sistema)

En este tema $\xrightarrow{\text{Se presentan las técnicas básicas de}}$ Modelado Empírico

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Introducción a los modelos de regresión

Modelos de regresión

Técnicas aplicables a series de datos con tendencias y valores estacionarios

Definición:

Un modelo de regresión permite estimar o predecir una variable aleatoria en función de otras variables

La variable estimada se denomina “**variable respuesta**” y las variables a partir de las que se estima: “**variables predictoras**”, “predictores” o “factores”

Los modelos de regresión más simples son los que presuponen una relación lineal entre la variable respuesta y las variables predictoras, son los **modelos de regresión lineal**

Si además se considera que solamente existe una variable predictora tendremos: **modelos de regresión lineal simple**

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Con esta técnica, se ajustan los puntos mediante una recta:

Donde:


\hat{y} es el valor predicho

x es la variable predictora

b_0 y b_1 son los parámetros de regresión

y es el valor medido

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$



Se ajusta la recta de forma que la suma de los errores cometidos sea nula

si el error (o residuo) es $e_i = y_i - \hat{y}_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1x) = 0$

De entre todas las líneas que cumplen la condición anterior, se toma aquella que minimiza la suma de los cuadrados de los errores (SSE), este criterio se denomina, criterio de mínimos cuadrados

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1x)^2$$

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Los parámetros de regresión se calculan:

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} \quad b_1 = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}$$

$$\sum xy = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\sum x^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Donde:

\bar{x} e \bar{y} Son los valores medios de la variable predictora y la variable respuesta.

Ejemplo. El número de E/S a disco y los tiempos de procesador medidos para siete programas, fueron: (14, 2), (16, 5), (27, 7), (42, 9), (39, 10), (50, 13), (83, 20). Se puede desarrollar un modelo lineal para predecir el tiempo de CPU en función del número de E/S a disco de la forma siguiente:

Tenemos:

nº de datos, $n = 7$; $\sum xy = 3375$; $\sum x = 271$; $\sum x^2 = 13885$; $\sum y = 66$; $\sum y^2 = 828$;

$$\bar{x} = 38.71; \quad \bar{y} = 9.43;$$

Con estos datos y sustituyendo en las fórmulas de b_0 y b_1 nos quedarán:

$$b_0 = -0.0083; \quad b_1 = 0.2438;$$

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Coeficiente de determinación: R^2 , es una medida de la calidad de la regresión ($0 \leq R^2 \leq 1$)

Se calcula:

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Suma total de cuadrados \rightarrow

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - n\bar{y}^2 = SSY - SS0$$

Se tiene:

$$SST = SSR + SSE$$

Parte explicada
por la regresión

Parte **NO** explicada
por la regresión

Entonces:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{SST - SSE}{SST}$$

$R^2 = 1$, ajuste perfecto
 $R^2 = 0$, ningún ajuste

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Grados de libertad de las sumas de cuadrados

GL = Numero de elementos independientes de información usados para estimar un parámetro

$GL(SSE) = n-2$ Porque se obtiene después de calcular 2 parámetros a partir de n datos

$GL(SSY) = n$ Porque se obtiene de n datos independientes sin estimar ningún parámetro

$GL(SS0) = 1$ Porque se obtiene simplemente de la media de las observaciones

$GL(SST) = n-1$ Porque hay que calcular la media para obtenerlo

Los grados de libertad se suman igual que las sumas de cuadrados correspondientes:

$$SST = SSY - SS0 = SSR + SSE$$

$$(n-1) = n - 1 = 1 + (n-2)$$

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Intervalos de confianza para las predicciones

Se define la desviación estándar de los errores: $s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$

Se calcula la desviación estándar para las predicciones de m observaciones futuras:

$$s_{\hat{y}_{mp}} = s_e \left[\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{\sum x^2 - n\bar{x}^2} \right]^{1/2}$$

Casos particulares:
 $m = 1 \rightarrow (1/m) = 1$ y
 $m = \infty \rightarrow (1/m) = 0$

El intervalo de confianza con la muestra usada para calcular la regresión será:

$$\text{Intervalo} = \hat{y}_p \pm t_{1-\alpha/2; n-2} \cdot s_{\hat{y}_{mp}}$$

Valor predicho por el
modelo de regresión


$$\hat{y}_p = b_0 + b_1 x$$

Distribución t para un nivel
de confianza $100(1-\alpha)\%$ y
 $n-2$ grados de libertad

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal simple

Ejemplo:




Los intervalos son más estrechos en la parte central y se abren a medida que nos alejamos del centro.

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS


Modelos de regresión lineal simple

Comprobación visual de la idoneidad del modelo de regresión lineal


A) Relación lineal




B) Independencia de los errores



C) Errores distribuidos normalmente



D) Desviación de errores constante



MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Modelos de regresión lineal multivariable

Modelos de regresión lineal multivariable: **se utiliza más de una variable predictora**

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_kx_k + e \quad \Longrightarrow \quad [y] = [X] \cdot [b] + [e]$$

$$\begin{aligned} y_1 &= b_0 + b_1x_{11} + b_2x_{21} + \cdots + b_kx_{k1} + e_1 \\ y_2 &= b_0 + b_1x_{12} + b_2x_{22} + \cdots + b_kx_{k2} + e_2 \\ &\vdots \\ y_n &= b_0 + b_1x_{1n} + b_2x_{2n} + \cdots + b_kx_{kn} + e_n \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{k2} \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \cdots & x_{kn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

y = Vector columna con n observaciones de Y

X = Matriz de n filas · k+1 columnas con n·k observaciones de X

b = Vector columna con k+1 parámetros a estimar

e = Vector columna con n errores de estimación

Estimación de parámetros: $b = (X^T X)^{-1} (X^T y)$

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Regresión curvilínea

Las técnicas de regresión lineal solo se pueden usar si observa una relación lineal entre los predictores y la respuesta al representarlos gráficamente

Si la función NO lineal observada se puede transformar en una función lineal entonces se pueden aplicar las técnicas de regresión lineal (simple o múltiple)
Y a esta regresión se la denomina regresión curvilínea

EJEMPLOS DE RELACIONES NO LINEALES QUE PUEDEN TRANSFORMARSE EN LINEALES

NO lineal	Lineal
$y = a + b / x$	$y = a + b(1 / x)$
$y = 1 / (a + bx)$	$(1 / y) = a + bx$
$y = x / (a + bx)$	$(x / y) = a + bx$
$y = ab^x$	$\ln y = \ln a + (\ln b)x$
$y = a + bx^n$	$y = a + b(x^n)$

MODELADO EMPÍRICO DE SISTEMAS

Utilidades de regresión en EXCEL

La hoja de cálculo EXCEL permite trabajar con modelos de regresión lineal de forma sencilla: **Herramientas → Análisis de datos → Regresión**
Se puede realizar el análisis de regresión lineal simple de los datos

Aparte provee **funciones** para calcular coeficientes de regresión:

- **ESTIMACION.LINEAL** → Coeficientes de la recta de regresión
 - **ESTIMACION.LOGARITMICA** → Coeficientes que mejor describen los datos según una curva exponencial, calculado mediante un análisis de regresión
 - **TENDENCIA** → Permite predecir los valores que resultan de una regresión lineal simple
-

Por último, en el **análisis gráfico** permite calcular líneas de tendencia:

- Lineal → se supone una relación lineal
 - Logarítmica → $\text{Log } y = \text{Log } x + C$
 - Polinomial → Mediante un polinomio de grado ≥ 2
 - Potencial → relación en forma de potencia, $y = x^a$
 - Exponencial → relación en forma exponencial, $y = e^{ax}$
-