

## TUGAS 02 METODE NUMERIK

**01.** Carilah akar dari persamaan non linear dengan metode tabulasi (1 kali iterasi)

$$f(x) = 2 - 3x + \sin x = 0$$

Answer:

**Step 1: Menentukan dua titik uji, misal dipilih  $x = 0$  dan  $x = 1$**

Dari titik uji yang telah dipilih maka dilakukan pengecekan untuk syarat dari metode tabulasi

$$f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$$

$$f(x=0) = 2 + 3(0) + \sin 0 = 2$$

$$f(x=1) = 2 + 3(1) + \sin 1 = -0.15853$$

$$f(x_1) \cdot f(x_2) = (2) \cdot (-0.15853) = -0.31706 < 0 \text{ (Terbukti)}$$

**Step 2: Membuat table fungsi  $f(x)$  disekitar  $f(x_1)$  dan  $f(x_2)$**

Diperoleh tabel fungsi  $f(x)$

$x$	$f(x)$	$ f(x) $
0	2	2
0.1	1.799833	1.799833
0.2	1.598669	1.598669
0.3	1.39552	1.39552
0.4	1.189418	1.189418
0.5	0.979426	0.979426
0.6	0.764642	0.764642
0.7	0.544218	0.544218
0.8	0.317356	0.317356
0.9	0.083327	0.083327
1	-0.15853	0.158529

**Step 3: Menentukan perubahan tanda pada step 2**

Dari hasil pemetaan untuk  $f(x_1)$  dan  $f(x_2)$  maka diketahui terdapat perubahan tanda pada  $x = 0.9$  dan  $x = 1$ . Error terkecil yang terjadi pada kedua titik tersebut 0.083327

**Step 4: Mengulangi langkah ketiga**

Iterasi ke 1

$x$	$f(x)$	$ f(x) $
0.9	0.083327	0.083327
0.91	0.059504	0.059504
0.92	0.035602	0.035602
0.93	0.01162	0.01162
0.94	-0.01244	0.012442
0.95	-0.03658	0.036584
0.96	-0.06081	0.060808
0.97	-0.08511	0.085114
0.98	-0.1095	0.109503
0.99	-0.13397	0.133974
1	-0.15853	0.158529

Dari hasil pemetaan untuk  $f(x_1)$  dan  $f(x_2)$  maka diketahui terdapat perubahan tanda pada  $x = 0.93$  dan  $x = 0.94$ . Error terkecil yang terjadi pada kedua titik tersebut 0.01162

Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah  $x = 0.93$  dimana error yang terjadi sebesar 0.01162

**02. Carilah akar dari persamaan non linear dengan metode biseksi (3 kali iterasi)**

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$$

Answer:

**Step 1: Menentukan dua titik uji, misal dipilih  $x = 0$  dan  $x = 1$** 

Dari titik uji yang telah dipilih maka dilakukan pengecekan untuk syarat dari metode biseksi

$$f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$$

$$f(x = 0) = (0)^3 - (0)^2 - 2(0) + 1 = 1$$

$$f(x = 1) = (1)^3 - (1)^2 - 2(1) + 1 = -1$$

$$f(x_1) \cdot f(x_2) = (1) \cdot (-1) = -1 < 0 \text{ (Terbukti)}$$

**Step 2: Mencari nilai  $x_3$  dan nilai  $f(x_3)$** 

Nilai dari  $x_3$  (iterasi ke 1) dapat diketahui dari

$$x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{0 + 1}{2} = 0.5$$

$$f(x = 0.5) = (0.5)^3 - (0.5)^2 - 2(0.5) + 1 = -0.125$$

**Step 3: Melakukan iterasi untuk memperoleh akar penyelesaian**

Iterasi ke 2:

$$x_4 = \frac{x_1 + x_3}{2} = \frac{0 + 0.5}{2} = 0.25$$

$$f(x = 0.25) = (0.25)^3 - (0.25)^2 - 2(0.25) + 1 = -0.578125$$

Iterasi ke 3:

$$x_5 = \frac{x_1 + x_4}{2} = \frac{0 + 0.25}{2} = 0.125$$

$$f(x = 0.125) = (0.125)^3 - (0.125)^2 - 2(0.125) + 1 = 0.767578$$

Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah  $x=0.125$  dimana error yang terjadi sebesar 0.767578

**03. Carilah akar dari persamaan non linear dengan metode regula falsi (3 kali iterasi)**

$$f(x) = 3x - \cos x = 0$$

Answer:

**Step 1: Menentukan dua titik uji, misal dipilih  $x = 0$  dan  $x = 1$** 

Dari titik uji yang telah dipilih maka dilakukan pengecekan untuk syarat dari metode regula falsi

$$f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$$

$$f(x = 0) = 3(0) - \cos 0 = -1$$

$$f(x = 1) = 3(1) - \cos 1 = 2.459698$$

$$f(x_1) \cdot f(x_2) = (-1) \cdot (2.459698) = -2.459698 < 0 \text{ (Terbukti)}$$

**Step 2: Mencari nilai  $x_3$  dan nilai  $f(x_3)$** 

Nilai dari  $x_3$  (iterasi ke 1) dapat diketahui dari

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)}(x_2 - x_1) = 0.289043$$

$$f(x = 0.28904) = 3(0.28904) - \cos 0.28904 = -0.09139$$

**Step 3: Melakukan iterasi untuk memperoleh akar penyelesaian**

Iterasi ke 2

$$x_4 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f(x_2) - f(x_3)}(x_2 - x_3) = 0.314512$$

$$f(x = 0.314512) = 3(0.314512) - \cos 0.314512 = -0.00741$$

Iterasi ke 3

$$x_5 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f(x_2) - f(x_4)}(x_2 - x_4) = 0.316571$$

$$f(x = 0.316571) = 3(0.316571) - \cos 0.316571 = -0.00059$$

Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah  $x = 0.316571$  dimana error yang terjadi sebesar 0.00059

- 04.** Carilah akar dari persamaan non linear dengan metode iterasi bentuk  $x = g(x)$  (3 kali iterasi)

$$f(x) = e^x - 2x + 21 = 0$$

Answer:

**Step 1: Merubah ke persamaan  $x = g(x)$** 

$$f(x) = e^x - 2x + 21 = 0$$

$$2x = e^x + 21$$

$$x = \frac{e^x + 21}{2}$$

**Step 2: Mencari turunan  $g(x)$  dan menentukan titik uji**Turunan dari  $g(x)$ 

$$g'(x) = \frac{e^x}{2}$$

Jika ditentukan nilai uji  $x_1 = 0$ 

$$g'(x = 0) = \frac{e^0}{2} = 0.5$$

Syarat  $|g'(x = 0)| = 0.5 < 1$  (Terbukti)**Step 3:**

Iterasi ke 1

$$x_2 = \frac{e^{x_1} + 21}{2} = \frac{1 + 21}{2} = 11$$

Iterasi ke 2

$$x_3 = \frac{e^{x_2} + 21}{2} = \frac{59874.1417 + 21}{2} = 29947.5709$$

Iterasi ke 3

$$x_4 = \frac{e^{x_3} + 21}{2} = \infty$$

**05.** Carilah akar dari persamaan non linear dengan metode Newton Raphson (3 kali iterasi)

$$f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 3 = 0$$

Answer:

**Step 1:** Mencari turunan pertama dan kedua dari  $f(x)$

Jika diketahui  $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 3 = 0$ , maka

- Turunan pertama dari  $f(x)$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 3 = 0$$

- Turunan kedua dari  $f(x)$

$$f''(x) = 6x - 2 = 0$$

**Step 2** Menentukan titik uji

Jika ditentukan titik uji untuk  $x_1 = 0$ , maka

$$f(x_1) = x_1^3 - x_1^2 - 3x_1 + 3 = (0)^3 - (0)^2 - 3(0) + 3 = 3$$

$$f'(x_1) = 3x_1^2 - 2x_1 - 3 = 3(0)^2 - 2(0) - 3 = -3$$

$$f''(x_1) = 6x_1 - 2 = 6(0) - 2 = -2$$

Syarat titik uji dapat digunakan

$$\left| \frac{f(x_1) \cdot f''(x_1)}{f'(x_1) \cdot f'(x_1)} \right| = \left| \frac{(3)(-2)}{(-3)(-3)} \right| = \left| \frac{-6}{9} \right| = 0.6667 < 1 \text{ (Syarat terpenuhi)}$$

**Step 3** Melakukan iterasi dengan persamaan

Iterasi pertama  $n = 1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 - \frac{3}{(-3)} = 1$$

Iterasi kedua

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 1 - \frac{0}{(-2)} = 1$$

Iterasi ketiga

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 1 - \frac{0}{(-2)} = 1$$

