# Probabilidad y Variables Aleatorias con R

**Tema II (Parte I) — Fundamentos de Probabilidad y Variables Aleatorias**

Miguel Angel Luque-Fernández

2026-01-01

## Probabilidad y Variables Aleatorias



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

**Grado en Fisioterapia**

**CC BY 4.0** · Miguel Angel Luque-Fernández

Miguel Angel Luque-Fernández · maluque.netlify.app

Dpto. Estadística e Investigación Operativa · Universidad de Granada

### De la descripción al modelo

**Conexión T01→T02:** En el Tema 1 aprendiste a **describir** una muestra (tablas, gráficos, estadísticos). Ahora damos el salto a **modelar** la población: necesitamos un lenguaje para cuantificar la incertidumbre y la variabilidad. Ese lenguaje es la **probabilidad**.

| T01 — Descriptiva | → | T02 — Probabilidad |
|---|---|---|
| Resumir lo observado | → | Modelar lo no observado |
| $\bar{x}$, $s$, histograma | → | $P(A)$, distribuciones, densidad |
| «¿Cómo son mis datos?» | → | «¿Qué modelo siguen mis datos?» |

## Objetivos de aprendizaje — Tema 2

> Tip
>
> **Al finalizar este tema sabrás:**

1. Distinguir los enfoques frecuentista, axiomático y bayesiano de la probabilidad
2. Aplicar las reglas básicas: complemento, unión, intersección, probabilidad condicional
3. Usar el Teorema de Bayes para actualizar diagnósticos clínicos
4. Identificar qué distribución (Normal, Binomial, Poisson) modela cada situación clínica
5. Calcular probabilidades con `pnorm()`, `pbinom()`, `ppois()` y sus equivalentes BioEstatR
6. Interpretar Z-scores para comparar mediciones de distintos pacientes

## Las tres caras de la probabilidad — Frecuentista, axiomática y Bayesiana

**Tres enfoques complementarios para definir la probabilidad:**

| Enfoque | Definición | Fundador(es) | Uso en Fisioterapia |
|---|---|---|---|
| **Frecuentista** | $P(A) = \lim_{n\to\infty} n_A/n$ | von Mises, Fisher | Estimar tasas de recuperación poblacionales |
| **Axiomática** | $P$ satisface 3 axiomas (Kolmogorov 1933) | Kolmogorov | Base matemática de TODA la estadística |
| **Bayesiana** | $P(A \mid B) = \frac{P(B\|A)P(A)}{P(B)}$ | Bayes, Laplace | Actualizar diagnósticos con evidencia clínica |

**Relación entre los tres enfoques:** - El enfoque **frecuentista** define probabilidad como frecuencia relativa a largo plazo → $P(A) = \lim_{n\to\infty} n_A/n$ - Kolmogorov demostró que esta definición satisface los **axiomas** de la teoría de la probabilidad → base matemática rigurosa - El enfoque **bayesiano** usa esos mismos axiomas pero interpreta $P(A)$ como grado de creencia, actualizable con el Teorema de Bayes

**En Fisioterapia:** usamos el enfoque frecuentista para estudios poblacionales, el bayesiano para razonamiento clínico, y ambos descansan sobre los axiomas de Kolmogorov.

## Introducción a la probabilidad

- La probabilidad es una **medida numérica** de la posibilidad de que ocurra un evento
- Se denota como $P(A)$, donde $A$ es el evento

- Se expresa como un número entre **0** (imposibilidad) y **1** (certeza)
- El enfoque **frecuentista**: $P(A)$ es el límite de la frecuencia relativa cuando $n \to \infty$

## ¿Por Qué Necesito la Probabilidad como Fisioterapeuta?

**Cada día tomas decisiones bajo incertidumbre:**

- Un paciente con lumbalgia: ¿probabilidad de que mejore con ejercicio terapéutico?
- Un test de Lasegue positivo: ¿probabilidad de que realmente tenga hernia discal?
- Lees un artículo: "El tratamiento A es significativamente mejor que B (P = 0.03)". ¿Es fiable?

**La probabilidad te da las herramientas para:**

- **Cuantificar** la incertidumbre clínica
- **Actualizar** tus creencias con nueva evidencia (Bayes)
- **Interpretar** críticamente la literatura científica
- **Comunicar** riesgos a tus pacientes de forma comprensible

**"La estadística es el arte de tomar decisiones en presencia de incertidumbre."** — Stephen Senn

**Experimento aleatorio:** Proceso que puede repetirse bajo condiciones idénticas, tiene al menos dos resultados posibles, y cuyo resultado no puede predecirse con certeza.

**Espacio muestral ($\Omega$):** Conjunto de todos los resultados posibles.

**Evento ($A$):** Subconjunto del espacio muestral.

## Concepto frecuentista de probabilidad y regla de Laplace

**Enfoque frecuentista:**

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

**Regla de Laplace** (resultados equiprobables):

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

**Ejemplo — Dado de 6 caras:**

$P(3) = 1/6$ $P(\text{par}) = 3/6 = 1/2$ $P(> 4) = 2/6$

```r
P_3 <- 1/6; P_par <- 3/6; P_mayor_4 <- 2/6
cat("P(3) =", P_3, "\nP(par) =", P_par, "\nP(>4) =", P_mayor_4)
```


```
P(3) = 0.1666667
P(par) = 0.5
P(>4) = 0.3333333
```

### Ley de los grandes números

La frecuencia relativa converge a la probabilidad teórica cuando $n \to \infty$.

**Simulación:** Aleatorización de pacientes a Fisioterapia Manual (FM) vs Ejercicio Terapéutico (ET).

```r
set.seed(123)
par(mfrow=c(2,3), mar=c(3,3,2,1))
for(n in c(10, 100, 500, 1000, 5000, 10000)){
  asign <- rbinom(n, 1, 0.5)
  plot(cumsum(asign)/(1:n), type="l", col="steelblue", ylim=c(0,1),
       main=paste("n =",n), xlab="Ensayos", ylab="Proporción FM")
  abline(h=0.5, col="darkgreen", lty=2)
}
```




```
par(mfrow=c(1,1))
```

## Axiomas de Kolmogorov (1933)

1. **No negatividad:** $P(A) \geq 0$ para todo evento $A$
2. **Normalización:** $P(\Omega) = 1$
3. **Aditividad:** Si $A_1, A_2, \ldots$ son mutuamente excluyentes: $P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$

> Tip
>
> **¿Qué significa esto?** Los tres axiomas son el "contrato" mínimo que debe cumplir cualquier probabilidad. Todo lo demás (complemento, unión, Bayes…) se deduce de ellos.

No necesitas memorizarlos — solo entender que son la base lógica de todo lo que sigue.

**Ejemplo clínico — Diagnósticos excluyentes en consulta de fisioterapia:**

| Diagnóstico | Frecuencia | Probabilidad |
|---|---|---|
| Lumbalgia | 40 | 0.40 |
| Cervicalgia | 35 | 0.35 |
| Omalgia | 25 | 0.25 |
| **Total** | **100** | **1.00** |

$\sum_i P(A_i) = 0.40 + 0.35 + 0.25 = 1.00$

Note

**Consecuencias algebraicas de los axiomas**
De los tres axiomas se deducen **todas** las reglas de la probabilidad:

## De los axiomas a las propiedades

| Regla | Fórmula | Derivación |
|---|---|---|
| Complemento | $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ | $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$<br>$P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$ |
| Probabilidad del vacío | $P(\emptyset) = 0$ | $\emptyset = \bar{\Omega} \quad P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 0$ |
| Cota superior | $P(A) \leq 1$ | $P(A) = 1 - P(\bar{A}) \leq 1$ pues $P(\bar{A}) \geq 0$ |
| Unión general | $P(A \cup B) =$<br>$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ | Partición: $A \cup B = A \cup (B \cap \bar{A})$, con $A$ y $B \cap \bar{A}$ excluyentes |

Tip

**¿Por qué importa esto?** No necesitas memorizar las derivaciones — solo saber que TODO en probabilidad (complemento, unión, Bayes, distribuciones) se deduce lógicamente de estos tres axiomas. Son el "ADN" de la estadística.

## Complemento

*En clínica, a menudo es más fácil calcular la probabilidad de que algo NO ocurra. La regla del complemento nos permite obtener una probabilidad a partir de la otra.*

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

**Ejemplo clínico:** El 30% de pacientes en consulta de fisioterapia tienen HTA.

$$P(\text{HTA}) = 0.30 \quad \Rightarrow \quad P(\text{no HTA}) = 1 - 0.30 = 0.70$$

```
cat("P(no HTA) =", 1 - 0.30, "→ El 70% no presentan HTA")
```

```
P(no HTA) = 0.7 → El 70% no presentan HTA
```

### Unión de eventos — Regla de la suma


*Cuando nos preguntamos por la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos clínicos, necesitamos la regla de la suma.*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

**Ejemplo clínico — Comorbilidad en 100 pacientes de fisioterapia:**

40 con HTA, 30 con Diabetes tipo 2, 10 con ambas condiciones.

```
par(mar=c(2,2,2,2))
plot(NA, xlim=c(-2.2,2.2), ylim=c(-1.8,1.8), axes=F, xlab="", ylab="",
     main="Diagrama de Venn: Comorbilidad HTA y DM")
theta <- seq(0, 2*pi, length=200)
polygon(-0.4+1.3*cos(theta), 1.3*sin(theta), col=rgb(0,0,1,0.2), border="steelblue", lwd=2)
polygon( 0.4+1.3*cos(theta), 1.3*sin(theta), col=rgb(0,0.5,0.3,0.2), border="coral", lwd=2)
text(-1, 0.3, "HTA\n(30 solo)", col="steelblue", font=2, cex=0.9)
text( 1, 0.3, "DM\n(20 solo)", col="darkgreen", font=2, cex=0.9)
text( 0,-0.3, "Ambas\n(10)", font=2, cex=0.9)
text(-2, -1.5, "P(HTA DM) = 0.40+0.30-0.10 = 0.60", pos=4, cex=0.85)
```




$$P(\text{HTA} \cup \text{DM}) = \frac{40}{100} + \frac{30}{100} - \frac{10}{100} = 0.60$$

```
cat("P(HTA   DM) =", 40/100 + 30/100 - 10/100, "→ 60 pacientes")
```

```
P(HTA   DM) = 0.6 → 60 pacientes
```

### Diagramas de Venn — Complemento, unión e intersección

```
par(mfrow=c(1,3), mar=c(2.5, 3, 3.5, 1))
theta <- seq(0, 2*pi, length=400)

# arcos para la lente de intersección
```

```r
a <- acos(0.35)
ang_r <- seq(pi-a, pi+a, length=200)
ang_l <- seq(-a, a, length=200)


# símbolos    y fuente Unicode
U <- intToUtf8(8746)
I <- intToUtf8(8745)
par(family = "")   # fuente del sistema por defecto

#   Panel 1: COMPLEMENTO
plot(NA, xlim=c(-1.5,1.5), ylim=c(-1.5,1.5), axes=F, xlab="", ylab="",
     main=bquote(bold("Complemento:") ~ P(bar(A)) == 1 - P(A)),
     cex.main=1.05)
rect(-1.5, -1.5, 1.5, 1.5, col=rgb(0.18,0.53,0.76,0.22), border="#2c3e50", lwd=2.5)
polygon(cos(theta), sin(theta), col="white", border="#2e86c1", lwd=3.5)
text(0, 0, "A", cex=2.5, font=2, col="#2e86c1")
text(1.3, 1.25, expression(bar(A)), cex=1.8, col="#2e86c1", font=2)
text(0, -1.45, "P(Ā) = zona coloreada fuera de A", cex=0.75, col="grey40")

#   Panel 2: UNIÓN - todo verde (círculos + intersección)
plot(NA, xlim=c(-1.5,1.5), ylim=c(-1.5,1.5), axes=F, xlab="", ylab="",
     main=bquote(bold("Union:") ~ P(A * .(U) * B) == P(A) + P(B) - P(A * .(I) * B)),
     cex.main=1.05)
polygon(-0.35+cos(theta), sin(theta), col=rgb(0.12,0.52,0.29,0.50), border="#1e8449", lwd=3)
polygon( 0.35+cos(theta), sin(theta), col=rgb(0.12,0.52,0.29,0.50), border="#1e8449", lwd=3)
text(-0.85, 0, "A", cex=2, font=2, col="#1e8449")
text( 0.85, 0, "B", cex=2, font=2, col="#1e8449")
text(0, -1.45, bquote(P(A * .(U) * B) == " toda la zona verde"), cex=0.75, col="grey40")

#   Panel 3: INTERSECCIÓN
plot(NA, xlim=c(-1.5,1.5), ylim=c(-1.5,1.5), axes=F, xlab="", ylab="",
     main=bquote(bold("Intersección:") ~ P(A * .(I) * B)),
     cex.main=1.05)
polygon(-0.35+cos(theta), sin(theta), col="white", border="#2c3e50", lwd=2.5)
polygon( 0.35+cos(theta), sin(theta), col="white", border="#2c3e50", lwd=2.5)
text(-0.85, 0, "A", cex=2, font=2, col="#2c3e50")
text( 0.85, 0, "B", cex=2, font=2, col="#2c3e50")
polygon(c(0.35+cos(ang_r), -0.35+cos(ang_l)),
        c(sin(ang_r), sin(ang_l)),
        col=rgb(0.80,0.18,0.15,0.90), border=NA)
text(0, 0.2, bquote(A * .(I) * B), cex=1.4, font=2, col="white")
text(0, -1.45, bquote(P(A * .(I) * B) == " solo zona roja"), cex=0.75, col="grey40")
```

**Complemento:** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ **Union:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A$ **Intersección:** $P(A \cap B)$




P(Ā) = zona coloreada fuera de A  P(A∪B) = toda la zona verde  P(A∩B) = solo zona roja

```
par(mfrow=c(1,1))
```

> **Tip**
>
> **Para el estudiante:** $\cup$ = unión = **O** (A o B ocurre, o ambos). $\cap$ = intersección = **Y** (A y B ocurren simultáneamente). El complemento $\bar{A}$ = todo lo que **NO** es A. En la figura: **azul** = complemento $\bar{A}$, **verde** = unión $A \cup B$, **rojo** = intersección $A \cap B$.

### Inclusión-exclusión para tres eventos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

**Ejemplo clínico — Tres comorbilidades (n=100 pacientes de fisioterapia):**

| Condición | n | Intersecciones | n |
|---|---|---|---|
| HTA ($A$) | 40 | $A \cap B$ | 10 |
| DM ($B$) | 30 | $A \cap C$ | 8 |
| Obesidad ($C$) | 20 | $B \cap C$ | 5 |
| | | $A \cap B \cap C$ | 3 |

$$|A \cup B \cup C| = 40 + 30 + 20 - (10 + 8 + 5) + 3 = 90 - 23 + 3 = 70$$


**70 de cada 100 pacientes presentan al menos una de las tres condiciones.**

## Probabilidad condicional — Visualización con diagrama de Venn

**Recuperación de lumbalgia según sexo (n=200):**

```
par(mfrow=c(1,2), mar=c(2,3,3,2))
# Panel 1: P(Recuperado | Mujer)
plot(NA, xlim=c(-1.5,1.5), ylim=c(-1.5,1.5), axes=F, xlab="", ylab="",
     main="P(Recuperado | Mujer)")
# Espacio muestral: solo mujeres (120)
rect(-1.5,-1.5,1.5,1.5, col=rgb(1,0.7,0.7,0.3), border="pink", lwd=2)
text(0,1.3,"Mujeres (120)",col="darkgreen",font=2,cex=1.1)
# Recuperadas: 72
theta <- seq(0,2*pi,length=200)
polygon(0.6*cos(theta), 0.6*sin(theta), col=rgb(0,0.6,0,0.4), border="darkgreen", lwd=2)
text(0,0,"Recuperadas\n72/120\n= 60%",font=2,cex=1,col="darkgreen")

# Panel 2: P(Recuperado | Hombre)
plot(NA, xlim=c(-1.5,1.5), ylim=c(-1.5,1.5), axes=F, xlab="", ylab="",
     main="P(Recuperado | Hombre)")
rect(-1.5,-1.5,1.5,1.5, col=rgb(0.7,0.7,1,0.3), border="steelblue", lwd=2)
text(0,1.3,"Hombres (80)",col="steelblue",font=2,cex=1.1)
polygon(0.6*cos(theta), 0.6*sin(theta), col=rgb(0,0.6,0,0.4), border="darkgreen", lwd=2)
text(0,0,"Recuperados\n32/80\n= 40%",font=2,cex=1,col="darkgreen")
```




```
par(mfrow=c(1,1))
```

**La probabilidad condicional reduce el espacio muestral al subconjunto condicionante.**

### Probabilidad condicional

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

**Ejemplo clínico — Recuperación de lumbalgia según sexo (n=200):**

| | Recuperado ($R$) | No recuperado | Total |
|---|---|---|---|
| **Mujer** | 72 | 48 | 120 |
| **Hombre** | 32 | 48 | 80 |
| **Total** | 104 | 96 | 200 |

$$P(R \mid \text{Mujer}) = \frac{72/200}{120/200} = \frac{72}{120} = 0.60$$

$$P(R \mid \text{Hombre}) = \frac{32/200}{80/200} = \frac{32}{80} = 0.40$$

```
cat("P(Recuperado | Mujer)  =", 72/120,
    "\nP(Recuperado | Hombre) =", 32/80)
```

```
P(Recuperado | Mujer)  = 0.6
P(Recuperado | Hombre) = 0.4
```

### Independencia de eventos

*Cuando dos eventos no se influyen mutuamente, podemos simplificar los cálculos. Pero necesitamos un criterio formal para determinarlo.*

$A$ y $B$ son **independientes** si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, o equivalentemente si $P(A \mid B) = P(A)$.

**Ejemplo clínico — Ejercicio Terapéutico y Mejoría (n=100):**

| | Mejoría ($M$) | No mejoría | Total |
|---|---|---|---|
| **Ejercicio ($E$)** | 30 | 20 | 50 |
| **Sin ejercicio** | 20 | 30 | 50 |
| **Total** | 50 | 50 | 100 |

$P(M) = 50/100 = 0.50$ $P(M \mid E) = 30/50 = 0.60$

$P(M \mid E) = 0.60 \neq 0.50 = P(M) \rightarrow$ **NO son independientes.** El ejercicio terapéutico está **asociado** con la mejoría.

### Probabilidad total — Visualización: Partición del espacio muestral

El espacio muestral $\Omega$ se **particiona** en $B_1, B_2, B_3$ (excluyentes, $\cup B_i = \Omega$). El evento $A$ se distribuye a través de todas las particiones:

$$P(A) = P(A \mid B_1) \cdot P(B_1) + P(A \mid B_2) \cdot P(B_2) + P(A \mid B_3) \cdot P(B_3)$$

```r
par(mar=c(3, 2, 5, 2), bg="white")
plot(NA, xlim=c(-0.5, 16.5), ylim=c(-0.8, 11), axes=F, xlab="", ylab="",
     main="Teorema de la Probabilidad Total - Partición de Ω y Evento A")

# colores verde-azul
col_O_fill  <- "#f8fafb"
col_O_bord  <- "#1a3a4a"
col_B1_fill <- rgb(0.35, 0.75, 0.55, 0.30)   # verde suave
col_B1_bord <- "#1e6e3e"
col_B2_fill <- rgb(0.30, 0.68, 0.75, 0.30)   # verde-azulado
col_B2_bord <- "#1a5c6e"
col_B3_fill <- rgb(0.25, 0.50, 0.80, 0.30)   # azul medio
col_B3_bord <- "#1a4070"
col_A_fill  <- rgb(0.15, 0.35, 0.60, 0.25)   # azul profundo semitransparente
col_A_bord  <- "#0f2a4a"
col_lbl     <- "#0d3b66"

# Ω - rectángulo exterior
xL <- 0.5; xR <- 15.5; yB <- 0.3; yT <- 10.0
rect(xL, yB, xR, yT, col=col_O_fill, border=col_O_bord, lwd=4)
text(1.2, yT - 0.25, expression(Omega), cex=2.0, font=2, col=col_O_bord)

# Particiones (60%, 30%, 10% del ancho de Ω)
w <- xR - xL
b1r <- xL + w * 0.60
b2r <- b1r + w * 0.30

rect(xL,  yB, b1r, yT, col=col_B1_fill, border=col_B1_bord, lwd=3)
text(xL + w*0.30, yT - 0.25, expression(B[1]), cex=1.6, col=col_B1_bord, font=2)
text(xL + w*0.30, yT - 0.65, "(Bajo riesgo, 60%)", cex=1.2, col=col_B1_bord)

rect(b1r, yB, b2r, yT, col=col_B2_fill, border=col_B2_bord, lwd=3)
text(b1r + w*0.15, yT - 0.25, expression(B[2]), cex=1.6, col=col_B2_bord, font=2)
text(b1r + w*0.15, yT - 0.65, "(Moderado, 30%)", cex=1.2, col=col_B2_bord)

rect(b2r, yB, xR,  yT, col=col_B3_fill, border=col_B3_bord, lwd=3)
text(b2r + w*0.05, yT - 0.25, expression(B[3]), cex=1.5, col=col_B3_bord, font=2)
text(b2r + w*0.05, yT - 0.65, "(Alto, 10%)", cex=1.1, col=col_B3_bord)

# Evento A - elipse dentro de Ω que cubre las 3 particiones
theta <- seq(0, 2*pi, length=300)
cx <- (xL + xR) / 2; cy <- (yB + yT) / 2
```


```
rx <- w * 0.47; ry <- (yT - yB) * 0.43
x_ell <- cx + rx*cos(theta)
y_ell <- cy + ry*sin(theta)
polygon(x_ell, y_ell, col=col_A_fill, border=col_A_bord, lwd=4)
text(cx, cy, "Evento A\n(Recuperación)", cex=1.3, col=col_A_bord, font=2)

# Etiquetas: intersecciones y probabilidades condicionadas
text(xL + w*0.30, cy + 0.9, expression(A * "   " * B[1] * ":"), cex=1.25, col=col_A_bord, fon
text(xL + w*0.30, cy - 0.6, expression(P(A * "|" * B[1]) == 0.90), cex=1.2, col=col_lbl)

text(b1r + w*0.15, cy + 0.9, expression(A * "   " * B[2] * ":"), cex=1.25, col=col_A_bord, fo
text(b1r + w*0.15, cy - 0.6, expression(P(A * "|" * B[2]) == 0.70), cex=1.2, col=col_lbl)

text(b2r + w*0.05, cy + 0.9, expression(A * "   " * B[3] * ":"), cex=1.15, col=col_A_bord, fo
text(b2r + w*0.05, cy - 0.6, expression(P(A * "|" * B[3]) == 0.40), cex=1.15, col=col_lbl)

# Fórmula de probabilidad total (debajo de Ω)
text((xL + xR)/2, yB - 0.35,
     expression(P(A) == P(A * "|" * B[1]) * " · " * P(B[1]) ~+~
                        P(A * "|" * B[2]) * " · " * P(B[2]) ~+~
                        P(A * "|" * B[3]) * " · " * P(B[3])),
     cex=1.4, col=col_A_bord, font=2)
text((xL + xR)/2, yB - 0.8,
     "P(Recuperación) = 0.90 × 0.60  +  0.70 × 0.30  +  0.40 × 0.10  =  0.79",
     cex=1.25, font=2, col=col_A_bord)
```





## Probabilidad total — Ejemplo: Recuperación en fisioterapia

**Contexto clínico:** Tres grupos de riesgo en rehabilitación de lumbalgia:

| Grupo de riesgo | $P(B_i)$ | $P(R \mid B_i)$ | Aporte $P(R \mid B_i) \cdot P(B_i)$ |
|---|---|---|---|
| Bajo (sin comorbilidades) | 0.60 | 0.90 | 0.54 |
| Moderado (una comorbilidad) | 0.30 | 0.70 | 0.21 |
| Alto (múltiples comorbilidades) | 0.10 | 0.40 | 0.04 |
| **Total** | **1.00** | | $P(R) = 0.79$ |

```r
aporte <- c(0.54, 0.21, 0.04)
names(aporte) <- c("Bajo\n(0.60×0.90)", "Moderado\n(0.30×0.70)", "Alto\n(0.10×0.40)")
bp <- barplot(aporte, col=c("darkgreen","gold","coral"),
        main="Aportes a P(Recuperación) = 0.79",
        ylab="Probabilidad", ylim=c(0,0.6))
text(bp, aporte+0.02, aporte, font=2, cex=1.2)
abline(h=0.79, col="steelblue", lwd=2, lty=2)
```




```
cat("P(Recuperación) =", 0.6*0.9+0.3*0.7+0.1*0.4, "→ 79% de los pacientes se recuperan")
```

```
P(Recuperación) = 0.79 → 79% de los pacientes se recuperan
```

### Teorema de la probabilidad total

> **!** Important
>
> Si $B_1, B_2, \ldots, B_k$ son **mutuamente excluyentes** y cubren todo el espacio muestral ($\cup_i B_i = \Omega$), entonces para cualquier evento $A$:
>
> $$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)$$

La probabilidad total es la **suma ponderada** de las probabilidades condicionadas a cada estrato, usando como pesos las proporciones de cada estrato en la población.

### Teorema de Bayes

**!** Important

Permite **actualizar** la probabilidad de una hipótesis $A$ con nueva evidencia $B$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Usando Probabilidad Total en el denominador:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B \mid A) \cdot P(A) + P(B \mid NoA) \cdot P(NoA)}$$

- $P(A)$: probabilidad **a priori** (antes de observar $B$)
- $P(B \mid A)$: **verosimilitud** de observar $B$ si $A$ es cierta
- $P(A \mid B)$: probabilidad **a posteriori** (actualizada con $B$)
- $P(B)$: probabilidad total de $B$ (normalizador)

### Bayes — Ejemplo: Test diagnóstico

**Enunciado:** Prevalencia de enfermedad $P(D) = 0.01$ (1%). Test con sensibilidad $P(+ \mid D) = 0.99$ (99%) y especificidad $P(- \mid NoD) = 0.95$ (95%).

**Si una persona da positivo, ¿probabilidad de que tenga la enfermedad?**

**Paso 1 — Probabilidad total de dar positivo:**

$$P(+) = P(+ \mid D) \cdot P(D) + P(+ \mid NoD) \cdot P(NoD)$$

$$P(+) = 0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0099 + 0.0495 = 0.0594$$


**Paso 2 — Aplicar Bayes:**

$$P(D \mid +) = \frac{P(+ \mid D) \cdot P(D)}{P(+)} = \frac{0.99 \times 0.01}{0.0594} = \frac{0.0099}{0.0594} = 0.1667$$

```r
P_D <- 0.01; P_NoD <- 0.99
P_Pos_given_D <- 0.99; P_Pos_given_NoD <- 0.05
P_Pos <- (P_Pos_given_D * P_D) + (P_Pos_given_NoD * P_NoD)
P_D_given_Pos <- (P_Pos_given_D * P_D) / P_Pos
cat("P(+)     =", round(P_Pos, 4),
    "\nP(D | +) =", round(P_D_given_Pos, 4),
    "\n→ Solo el 16.7% de los positivos tienen la enfermedad")
```

```
P(+)     = 0.0594
P(D | +) = 0.1667
→ Solo el 16.7% de los positivos tienen la enfermedad
```

```r
# Visualización: matriz de confusión
par(mfrow=c(1,2), mar=c(4,4,3,1))
# Panel 1: Barras de composición del test
vp <- P_Pos_given_D * P_D; fp <- P_Pos_given_NoD * P_NoD
vn <- (1-P_Pos_given_NoD) * P_NoD; fn <- (1-P_Pos_given_D) * P_D
m <- matrix(c(vp, fp, vn, fn), 2, dimnames=list(
  c("D+ (Enfermo)","D- (Sano)"), c("Test +","Test -")))
barplot(m, beside=TRUE, col=c("coral","steelblue"),
        main=paste0("VPP=", round(vp/(vp+fp)*100,1), "%  VPN=", round(vn/(vn+fn)*100,1), "%"),
        ylab="Probabilidad", ylim=c(0,0.9))
legend("topright", c("Enfermo","Sano"), fill=c("coral","steelblue"), bty="n", cex=0.8)
# Panel 2: Árbol simplificado
plot(NA, xlim=c(0,10), ylim=c(0,10), axes=F, xlab="", ylab="",
     main="Árbol de decisión diagnóstica")
text(5, 9.5, "Paciente", font=2, cex=1.2)
arrows(5, 9, 2.5, 7, lwd=2, col="coral")
arrows(5, 9, 7.5, 7, lwd=2, col="steelblue")
text(2.5, 8, paste0("D+ (", P_D*100, "%)"), col="coral", font=2)
text(7.5, 8, paste0("D- (", P_NoD*100, "%)"), col="steelblue", font=2)
rect(1, 3, 4, 6, col=rgb(1,0,0,0.1), border="coral")
text(2.5, 4.5, paste0("VPP\n", round(vp/(vp+fp)*100,1), "%"), font=2, cex=0.8)
rect(6, 3, 9, 6, col=rgb(0,0,1,0.1), border="steelblue")
text(7.5, 4.5, paste0("VPN\n", round(vn/(vn+fn)*100,1), "%"), font=2, cex=0.8)
```




```
par(mfrow=c(1,1))
```

> **Warning**
>
> A pesar de la alta sensibilidad (99%), el VPP es solo **16.7%** porque la **baja prevalencia** (1%) hace que los falsos positivos dominen: $P(+ \mid NoD) \times P(NoD) = 0.0495 > P(+ \mid D) \times P(D) = 0.0099$.

*Si P(Recuperado | Mujer) = 60% y P(Recuperado | Hombre) = 40%, ¿significa esto que el sexo causa la diferencia en recuperación? ¿Qué otra explicación podría haber?*

*En el ejemplo, P(M | E) = 0.60 y P(M) = 0.50. ¿Qué necesitarías cambiar en la tabla para que Ejercicio y Mejoría fueran independientes?*

## Teorema de Bayes — Perspectiva histórica

### Thomas Bayes (1701–1761)

- Ministro presbiteriano y matemático inglés en Tunbridge Wells
- Su ensayo *"An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances"* fue publicado **póstumamente en 1763** por su amigo Richard Price
- Bayes abordó el problema inverso: conocidos los resultados, ¿cuál es la probabilidad de sus causas?

**Pierre-Simon Laplace (1749–1827)**

- Redescubrió y generalizó el teorema de forma independiente (1774, 1812)
- Lo aplicó a problemas astronómicos, demográficos y jurídicos
- Formuló la versión moderna que usamos hoy con probabilidad total en el denominador

> **Note**
>
> **Ironía histórica:** Bayes nunca publicó su teorema en vida. Hoy lleva su nombre una rama entera de la estadística que él nunca imaginó.

> **Tip**
>
> **Dato clave:** Laplace aplicó el teorema de Bayes para estimar la masa de Saturno y la población de Francia, mostrando que la inferencia probabilística inversa funciona tanto para el cosmos como para los censos.

## Del teorema de Bayes a la estadística Bayesiana

> **Important**
>
> El teorema de Bayes es la **piedra angular** de la estadística bayesiana: un paradigma donde la probabilidad representa **grado de creencia** (incertidumbre subjetiva), y no solo frecuencia a largo plazo.

**El flujo bayesiano:**

$$\underbrace{P(\theta)}_{\text{Distribución a priori}} \times \underbrace{P(\text{datos} \mid \theta)}_{\text{Verosimilitud}} \propto \underbrace{P(\theta \mid \text{datos})}_{\text{Distribución a posteriori}}$$

| Concepto | Enfoque Frecuentista | Enfoque Bayesiano |
|---|---|---|
| **Parámetro** $\theta$ | Fijo, desconocido | Variable aleatoria |
| **Probabilidad** | Frecuencia a largo plazo | Grado de creencia |
| **Inferencia** | Estimadores, IC, p-valores | Distribución a posteriori, intervalos creíbles |

| Concepto | Enfoque Frecuentista | Enfoque Bayesiano |
|---|---|---|
| **Información previa** | No se incorpora formalmente | Se modela explícitamente con la *priori* |
| **Interpretación IC** | "El 95% de los IC contienen $\theta$" | "Hay 95% de probabilidad de que $\theta$ esté en el intervalo" |

*En Fisioterapia:* La estadística bayesiana permite actualizar probabilidades diagnósticas con cada nueva prueba o signo clínico — el razonamiento clínico es inherentemente bayesiano.

*El test tiene 99% de sensibilidad pero el VPP es solo 16.7%. ¿Qué cambiaría si la prevalencia fuera del 10% en lugar del 1%?*

---

## De la Probabilidad a las Variables Aleatorias

**Conexión:** Hasta ahora hemos cuantificado la incertidumbre de eventos clínicos mediante reglas de probabilidad. Las variables aleatorias nos permiten modelizar esa incertidumbre matemáticamente, asignando números a los resultados y describiendo su distribución.

---

### Respiro visual — Incertidumbre en la práctica clínica



Figure 1: Fisioterapeuta evaluando a un paciente

*Cada paciente es único. La probabilidad nos da el lenguaje para cuantificar la incertidumbre clínica y tomar decisiones informadas.*

---

## De la Probabilidad a las Variables Aleatorias

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Hasta aquí hemos modelado **eventos** (A, B, intersecciones, condicionales). Ahora damos el salto a modelar **variables**: magnitudes clínicas que varían de paciente a paciente. Una variable aleatoria asigna un número a cada resultado incierto.

| **En T01 (Descriptiva)** | **En T02 (Probabilidad)** |
|---|---|
| $\bar{x}$ — media muestral | $\mu = E(X)$ — esperanza poblacional |
| $s^2$ — varianza muestral | $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ — varianza poblacional |
| $s$ — desviación típica muestral | $\sigma = \text{SD}(X)$ — desviación típica poblacional |
| $\hat{p}$ — proporción muestral | $p = P(X \in A)$ — probabilidad poblacional |
| Describías **tu muestra** | Modelas **la población** |

## Variable aleatoria — Definición

*Para modelar matemáticamente la incertidumbre clínica, necesitamos asignar valores numéricos a los resultados inciertos: esto es una variable aleatoria.*

> **i** Note
>
> Una **variable aleatoria (VA)** es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio.

**Tipos de variables aleatorias:**

| Tipo | Descripción | Ejemplo en Fisioterapia |
|---|---|---|
| **Discreta** | Toma valores aislados (contables) | Nº de sesiones hasta mejoría |
| **Continua** | Toma cualquier valor en un intervalo | Rango de movimiento (grados) |

**Función de probabilidad / densidad:** Describe el comportamiento probabilístico de la VA. Para discretas usamos la **función de masa** $P(X = x)$. Para continuas, la **función de densidad** $f(x)$ donde el área bajo la curva entre $a$ y $b$ es $P(a \leq X \leq b)$.

### Función de masa de probabilidad — Va discreta


> **Note**
>
> **f.m.p.:** $P(X = x) = f(x)$ asigna una probabilidad a cada valor posible de una VA discreta.

**Propiedades:** (1) $P(X = x) \geq 0$ para todo $x$; (2) $\sum_x P(X = x) = 1$

**Ejemplo clínico:** $X =$ nº de pacientes con mejoría en 3 tratados ($p = 0.5$)

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $P(X = x)$ | $1/8 = 0.125$ | $3/8 = 0.375$ | $3/8 = 0.375$ | $1/8 = 0.125$ |

```
x <- 0:3; px <- dbinom(x, 3, 0.5)
bp <- barplot(px, names=x, col="seagreen", ylim=c(0,0.45),
        main="Función de Masa de Probabilidad - VA Discreta",
        xlab="x (nº pacientes con mejoría)", ylab="P(X = x)")
text(bp, px+0.02, paste0(px*8,"/8 = ", px), font=2, cex=0.95)
abline(h=0, col="grey")
```




**Verificación:** $\sum P(X = x) = 0.125 + 0.375 + 0.375 + 0.125 = 1.00$

### Esperanza matemática — Va discreta

> **Note**
>
> $$E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$
>
> La esperanza es el **valor esperado** o **media poblacional** de la VA.

**Ejemplo (mejoría en 3 pacientes):**

| $x_i$ | $P(X = x_i)$ | $x_i \cdot P(X = x_i)$ |
|---|---|---|
| 0 | 1/8 | $0 \times 1/8 = 0$ |
| 1 | 3/8 | $1 \times 3/8 = 3/8$ |
| 2 | 3/8 | $2 \times 3/8 = 6/8$ |
| 3 | 1/8 | $3 \times 1/8 = 3/8$ |

$$E(X) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1.5$$

**Interpretación:** En promedio se espera que **1.5 de cada 3 pacientes** muestren mejoría.

### Varianza — Va discreta

> **Note**
>
> $$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_i (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$
>
> Fórmula alternativa: $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

**Ejemplo (mejoría, $\mu = 1.5$):**

| $x_i$ | $P(X = x_i)$ | $(x_i - 1.5)^2$ | $(x_i - 1.5)^2 \cdot P(X = x_i)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1/8 | 2.25 | $2.25 \times 1/8 = 0.281$ |
| 1 | 3/8 | 0.25 | $0.25 \times 3/8 = 0.094$ |
| 2 | 3/8 | 0.25 | $0.25 \times 3/8 = 0.094$ |
| 3 | 1/8 | 2.25 | $2.25 \times 1/8 = 0.281$ |

$$\text{Var}(X) = 0.281 + 0.094 + 0.094 + 0.281 = 0.75$$

```
x <- 0:3; px <- dbinom(x, 3, 0.5)
mu <- sum(x*px)
cat("E(X) =", mu, "  Var(X) =", sum((x-mu)^2*px),
    "\nVerificación: n·p·(1-p) =", 3*0.5*0.5)
```


```
E(X) = 1.5   Var(X) = 0.75
Verificación: n·p·(1-p) = 0.75
```

### Función de distribución acumulativa (f.d.a.)

> **Note**
>
> $$F(x) = P(X \leq x)$$
>
> La f.d.a. acumula la probabilidad desde $-\infty$ hasta $x$. Es **no decreciente**, $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$, y $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

### f.d.a. de la Normal — Cálculo de Probabilidades

```
mu <- 30; sigma <- 8
curve(pnorm(x, mu, sigma), mu-24, mu+24, lwd=3, col="steelblue",
      main=expression(paste("f.d.a. Normal: F(x) = P(X   x),  N(30,", 8^2, ")")),
      xlab="Fuerza de prensión (kg)", ylab="F(x)")
abline(h=c(0,0.5,1), lty=3, col="grey"); abline(v=mu, lty=2, col="darkgreen")
# Marcar F(22)
arrows(22, 0, 22, pnorm(22, mu, sigma), col="darkgreen", lwd=2, length=0.1)
points(22, pnorm(22, mu, sigma), pch=19, col="darkgreen", cex=1.5)
text(22, pnorm(22,mu,sigma)+0.05, paste0("F(22) = ", round(pnorm(22,mu,sigma),3)), col="dark
```





$$F(22) = P(X \leq 22) = \Phi\left(\frac{22-30}{8}\right) = \Phi(-1) = 0.159$$

**f.d.a. — VA Discreta vs VA Continua**

```
par(mfrow=c(1,2), mar=c(4,4,3,1))

# DISCRETA: Binomial(10, 0.4) - funcion escalonada
x_d <- 0:10; Fx_d <- pbinom(x_d, 10, 0.4)
plot(x_d, Fx_d, type="s", lwd=3, col="steelblue",
     main="f.d.a. Discreta - Binomial(10,0.4)",
     xlab="x", ylab="F(x)", ylim=c(0,1), xlim=c(-0.5,10.5))
abline(h=c(0,0.5,1), lty=3, col="grey"); points(x_d, Fx_d, pch=19, col="steelblue", cex=1.2)
```

```r
# CONTINUA: Normal(0,1) - función continua
curve(pnorm(x), -4, 4, lwd=3, col="seagreen",
      main="f.d.a. Continua - Normal(0,1)",
      xlab="x", ylab="F(x)", ylim=c(0,1))
abline(h=c(0,0.5,1), lty=3, col="grey"); abline(v=0, lty=3, col="grey")
points(0, 0.5, pch=19, col="darkgreen", cex=1.5)
```




```r
par(mfrow=c(1,1))
```

**VA Discreta:** $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) \rightarrow$ **función escalonada**, salta en cada valor posible

**VA Continua:** $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \rightarrow$ **función continua suave**, sin saltos

### Función de densidad — Va continua


> **Note**
>
> $$P(a \leq X \leq b) = \text{área bajo } f(x) \text{ entre } a \text{ y } b$$
>
> La probabilidad es el **área bajo la curva** de la función de densidad $f(x)$.

**Propiedades:** (1) $f(x) \geq 0$; (2) área total bajo $f(x) = 1$; (3) $P(X = c) = 0$ para cualquier $c$

> **Tip**
>
> **Notación:** El símbolo $\int_a^b f(x)dx$ significa "área bajo la curva $f(x)$ entre $a$ y $b$". En este curso **siempre usaremos R** (`pnorm`, `dnorm`, `pt`, `pchisq`) en lugar de calcular integrales a mano.

```r
set.seed(123)
ROM <- rnorm(500, mean=150, sd=20)
hist(ROM, col="steelblue", border="white", breaks=25, freq=FALSE,
     main="f.d.p. - ROM de Hombro (n=500)",
     xlab="Grados de flexión", ylab="Densidad de probabilidad f(x)", cex.lab=1.1)
curve(dnorm(x, 150, 20), add=TRUE, col="darkgreen", lwd=3)

# Sombrear P(130   X   170)
xr <- seq(130, 170, 0.5); yr <- dnorm(xr, 150, 20)
polygon(c(xr, rev(xr)), c(yr, rep(0,length(yr))), col=rgb(0,0.5,0.3,0.25), border=NA)
text(150, 0.003, paste("P(130 X 170) =",
    round(pnorm(170,150,20)-pnorm(130,150,20),3)), font=2, cex=1.1, col="darkgreen")
```




### Esperanza y varianza — Va continua


> **Note**
>
> $$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx \qquad \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \cdot f(x)\, dx$$

**Ejemplo — ROM de hombro ($\mu = 150$, $\sigma = 20$):**

```
set.seed(123)
ROM <- rnorm(10000, 150, 20)
cat("E(X) teórica = 150°   E(X) simulada =", round(mean(ROM),1), "°",
    "\nVar(X) teórica = 400   Var(X) simulada =", round(var(ROM),1),
    "\n  teórica = 20°     simulada =", round(sd(ROM),1), "°")
```

```
E(X) teórica = 150°   E(X) simulada = 150 °
Var(X) teórica = 400   Var(X) simulada = 398.9
  teórica = 20°     simulada = 20 °
```

```r
# Comparación de dos VA continuas con distinta dispersión
curve(dnorm(x, 150, 10), 110, 190, col="steelblue", lwd=3,
      main=expression(paste("Dos VA Normales: misma ", mu, ", distinta ", sigma)),
      xlab="Grados ROM", ylab="f(x)", cex.lab=1.1)
curve(dnorm(x, 150, 25), 110, 190, col="seagreen", lwd=3, add=TRUE)
abline(v=150, lty=2, col="grey")
legend("topright", c(expression(sigma==10), expression(sigma==25)),
       col=c("steelblue","seagreen"), lwd=3, bty="n", cex=1.2)
text(150, 0.04, expression(mu==150), pos=1, cex=1.1)
```





**Interpretación:** Ambas tienen la misma esperanza ($\mu = 150°$), pero la distribución naranja

($\sigma = 25$) tiene **mayor dispersión** que la azul ($\sigma = 10$).

### Comparativa: Discreta vs continua — Conceptos análogos

| Concepto | VA Discreta | VA Continua |
|---|---|---|
| **Función de probabilidad** | f.m.p.: $P(X = x)$ | f.d.p.: $f(x)$ |
| **Probabilidad en intervalo** | $\sum_{x \in [a,b]} P(X = x)$ | $\int_a^b f(x)\,dx$ |
| **Probabilidad puntual** | $P(X = x) \geq 0$ | $P(X = x) = 0$ |
| **f.d.a.** | $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$ | $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$ |
| **Normalización** | $\sum_x P(X = x) = 1$ | $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$ |
| **Esperanza** $E(X)$ | $\sum x_i \cdot P(X = x_i)$ | $\int x \cdot f(x)\,dx$ |
| **Varianza Var**$(X)$ | $\sum (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$ | $\int (x - \mu)^2 \cdot f(x)\,dx$ |

```r
par(mfrow=c(1,2), mar=c(4,4,3,1))
# Discreta: Binomial
x <- 0:10
plot(x, dbinom(x,10,0.5), type="h", lwd=4, col="steelblue",
     main="VA Discreta: Binomial(10,0.5)", xlab="x", ylab="P(X=x)")
# Continua: Normal
curve(dnorm(x), -4, 4, lwd=3, col="seagreen",
      main="VA Continua: Normal(0,1)", xlab="x", ylab="f(x)")
```




```r
par(mfrow=c(1,1))
```

**Las cuatro funciones de R para distribuciones**

| Prefijo | Función | Fórmula | Ejemplo (Normal) |
|---|---|---|---|
| `d` | Densidad/Masa | $f(x)$ | `dnorm(x, mean, sd)` |
| `p` | Distribución acumulada | $F(x) = P(X \leq x)$ | `pnorm(q, mean, sd)` |
| `q` | Cuantil (percentil) | $F^{-1}(p)$ | `qnorm(p, mean, sd)` |
| `r` | Aleatorio | Genera $n$ valores | `rnorm(n, mean, sd)` |

Tip

Este patrón se repite para todas las distribuciones: `dbinom`, `pbinom`, `qbinom`, `rbinom`; `dpois`, `ppois`, `qpois`, `rpois`, etc.

---

### Ejercicio Clínico — Tema II (Parte I)

**Contexto:** El 15% de pacientes en consulta tienen lumbalgia crónica. Un test tiene sensibilidad 90% y especificidad 85%.

1. Si un paciente da positivo, ¿probabilidad de tener lumbalgia?
2. ¿Por qué el VPP es bajo pese a la alta sensibilidad?

Tip


**Solución**

1. $VPP = \frac{0.90 \times 0.15}{0.90 \times 0.15 + 0.15 \times 0.85} = \frac{0.135}{0.2625} = \mathbf{51.4}\%$
2. La baja prevalencia (15%) hace que los falsos positivos sean casi tan numerosos como los verdaderos positivos, reduciendo el VPP al 51.4%

```
prev <- 0.15; sens <- 0.90; spec <- 0.85
vpp <- (sens*prev) / (sens*prev + (1-spec)*(1-prev))
vpn <- (spec*(1-prev)) / (spec*(1-prev)+(1-sens)*prev)

# Visualización
par(mfrow=c(1,2), mar=c(4,4,3,1))
# Panel 1: Árbol de probabilidades
labels <- c("Enfermo\n(15%)", "Sano\n(85%)")
bp <- barplot(c(prev, 1-prev), names=labels, col=c("coral","steelblue"),
        main="Prevalencia de lumbalgia", ylab="Proporción", ylim=c(0,1))
text(bp, c(prev,1-prev)+0.05, paste0(round(c(prev,1-prev)*100,1),"%"), font=2, cex=1.2)

# Panel 2: Rendimiento del test
vp <- sens*prev; fp <- (1-spec)*(1-prev); vn <- spec*(1-prev); fn <- (1-sens)*prev
m <- matrix(c(vp, fn, fp, vn), 2, dimnames=list(c("Positivo","Negativo"), c("Enfermo","Sano
barplot(m, beside=TRUE, col=c("coral","steelblue"),
        main=paste0("Test: VPP=", round(vpp*100,1), "%  VPN=", round(vpn*100,1), "%"),
        ylab="Probabilidad", ylim=c(0,0.8))
legend("topright", c("Positivo","Negativo"), fill=c("coral","steelblue"), bty="n", cex=0.85
```




```
par(mfrow=c(1,1))

cat("VPP =", round(vpp*100,1), "%\nVPN =", round(vpn*100,1), "%")
```

```
VPP = 51.4 %
VPN = 98 %
```

# Código del Tema II (Parte I) — Resumen Organizado

## Probabilidad básica

```
# Regla de Laplace
P_3 <- 1/6          # P(sacar un 3 en un dado)
P_par <- 3/6        # P(sacar par)

# Complemento
P_HTA <- 0.30
P_no_HTA <- 1 - P_HTA  # P(no HTA) = 0.70

# Unión de eventos (inclusión-exclusión)
P_A <- 40/100; P_B <- 30/100; P_AB <- 10/100
P_A_union_B <- P_A + P_B - P_AB  # 0.60
```

## Probabilidad condicional y Bayes

```
# Probabilidad condicional
P_R_given_M <- 72/120     # P(Recuperado | Mujer) = 0.60
P_R_given_H <- 32/80      # P(Recuperado | Hombre) = 0.40

# Teorema de Bayes - Test diagnóstico
prev <- 0.15              # Prevalencia
sens <- 0.90              # Sensibilidad
spec <- 0.85              # Especificidad

vpp <- (sens * prev) / (sens * prev + (1 - spec) * (1 - prev))
vpn <- (spec * (1 - prev)) / (spec * (1 - prev) + (1 - sens) * prev)
cat("VPP =", round(vpp * 100, 1), "%")
cat("VPN =", round(vpn * 100, 1), "%")
```

## Variables aleatorias

```
# VA Discreta - Binomial
x <- 0:3
px <- dbinom(x, 3, 0.5)   # P(X = x)
```

```r
Ex <- sum(x * px)          # Esperanza
Varx <- sum((x - Ex)^2 * px)  # Varianza

# VA Continua - Normal
mu <- 30; sigma <- 8; x_obs <- 22
z <- (x_obs - mu) / sigma  # Z-score
p_bajo <- pnorm(x_obs, mu, sigma)  # P(X   22)

# Las 4 funciones de R para distribuciones
dnorm(x, mu, sigma)    # Densidad f(x)
pnorm(q, mu, sigma)    # Distribución F(q) = P(X   q)
qnorm(p, mu, sigma)    # Cuantil
rnorm(n, mu, sigma)    # Generar n valores aleatorios
```