Target C · 12 predeclared, disjoint material events
Percent of the full modeled posterior; rows sum to 100%, no Top-K normalization
Solid 40.8 3.0 <0.05 2.2 0.2 <0.05 11.6 0.5 <0.05 41.1 0.6 <0.05
Small central 69.1 0.7 <0.05 3.6 <0.05 <0.05 12.0 0.1 <0.05 14.4 0.1 <0.05
Large central 16.3 4.1 0.1 0.9 0.2 <0.05 7.2 1.0 <0.05 67.7 2.5 <0.05
Annular 1.2 8.5 52.0 0.1 0.5 2.7 0.5 2.0 8.7 5.5 6.5 11.7
Combined 0.7 8.5 50.2 <0.05 0.5 2.6 0.4 2.2 8.6 5.8 8.0 12.4
Prior boundary <0.05 2.4 51.9 <0.05 0.1 2.8 <0.05 0.6 11.0 0.2 2.9 28.1
Gain mismatch 0.1 7.8 52.8 <0.05 0.4 2.7 0.1 2.2 9.0 3.1 9.2 12.5
C0A0 C0A1 C0A2 C1A0 C1A1 C1A2 C2A0 C2A1 C2A2 C3A0 C3A1 C3A2
C: central-radius bin 0 / (0,.10] / (.10,.20] / (.20,rmax]; A: annular halfwidth 0 / (0,.06] / (.06,hmax]
Posterior event mass
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0