

Resolução

1. (a) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg} x - \int -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$
(35 pontos)

$$= -\frac{\operatorname{arctg} x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

$$= -\frac{\operatorname{arctg} x}{x} + \int \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= -\frac{\operatorname{arctg} x}{x} + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C,$$

C constante em intervalos.

(b) $\int \frac{1}{x^2(1-x^2)} dx = \int \frac{1}{x^2(1-x)(1+x)} dx$
(40 pontos)

$$= \int \frac{1}{x^2} + \frac{\frac{1}{2}}{1-x} + \frac{\frac{1}{2}}{1+x} dx$$

$$= -\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \ln|1-x| + \frac{1}{2} \ln|1+x| + C$$

$$= -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C,$$

C constante em intervalos.

$$\text{C.A.: } \frac{1}{x^2(1-x)(1+x)} =$$

$$= \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{C}{1-x} + \frac{D}{1+x}$$

$$\Rightarrow 1 = A(1-x^2) + Bx(1-x^2) + Cx^2(1+x) + Dx^2(1-x)$$

$$\Leftrightarrow 1 = A - \cancel{Ax^2} + Bx - \cancel{Bx^3} + \cancel{Cx^3} + \cancel{Cx^4} + \cancel{Dx^3} - \cancel{Dx^4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -B+C-D=0 \\ -A+C+D=0 \\ B=0 \\ A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=0 \\ C-D=0 \\ C+D=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=0 \\ C=\frac{1}{2} \\ D=\frac{1}{2} \end{cases}$$

(c) $\int \frac{\sqrt[4]{x} + x}{\sqrt{x}} dx$
(25 pontos)

$$= \int \frac{t + t^4}{t^2} 4t^3 dt$$

$$= 4 \int t^2 + t^5 dt = 4 \frac{t^3}{3} + 4 \frac{t^6}{6} + C$$

$$= \frac{4}{3} x^{3/4} + \frac{2}{3} x^{3/2} + C,$$

C constante em intervalos.

C.A.: Mudança de variável dada por $x = t^4, t > 0$

$$(\Leftrightarrow t = \sqrt[4]{x}, x > 0).$$

$$\frac{dx}{dt} = 4t^3 > 0 \text{ (sempre constante)}$$

Em alternativa (em vez de regra e integrais):

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} + x}{\sqrt{x}} dx = \int x^{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}} + x^{1 - \frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{4} + 1}}{-\frac{1}{4} + 1} + \frac{x^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1} + C$$

$$= \frac{4}{3} x^{3/4} + \frac{2}{3} x^{3/2} + C, \quad C \text{ constante em intervalos.}$$

2. $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq \sqrt{x^2 - x^4}\}.$

(a) $x^2 - x^4 \geq 0 \Leftrightarrow x^4 \leq x^2 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$


(10 pontos) \therefore Os valores de x para o quais $\sqrt{x^2 - x^4}$ faz sentido são o de intervalos $[-1, 1]$.

(b) $\sqrt{x^2 - x^4} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x^4 = 0 \Leftrightarrow x^2(1 - x^2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x^2 = 1$

(10 pontos) $\Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1.$

Os pontos pedidos são $(0, 0)$, $(-1, 0)$ e $(1, 0)$.

(c)
(20 pontos)



Região A é sombreada

NOTA: Não é muito importante determinar o máximo de funções, a monotonia e as concavidades. Pelos dados anteriores, em cada um dos intervalos $[-1, 0]$ e $[0, 1]$ o gráfico está acima do eixo dos x , exceto em -1 , 0 e 1 , em que está exatamente nesse eixo. É o gráfico e simétrico relativamente ao eixo dos y , pois $\sqrt{x^2 - x^4}$ é par.

Referimo-nos
à função e
ao gráfico de
 $y = \sqrt{x^2 - x^4}$

(d)
(30 pontos)

$$\begin{aligned} \text{Área de } A &= 2 \int_0^1 \sqrt{x^2 - x^4} dx \\ &= 2 \int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx \\ &= - \left[\frac{(1 - x^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 \\ &= -\frac{2}{3} (0 - 1) = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua; $a \in \mathbb{R}$; $(I_a f)(x) := \int_a^x f(t) dt$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

(a) Dado um qualquer $x \in \mathbb{R}$,

(10 pontos)

$(I_a(I_a f))(x) = \left(\int_a^x \int_a^t f(s) ds dt \right)'$
 $\rightarrow \left(\int_a^x f(s) ds \right)' = f(x)$.
 Pelo Teorema Fundamental de Cálculo, atendendo a que $t \mapsto \int_a^t f(s) ds$ é continua em \mathbb{R} , atendendo a que f é integrável (e está continua) em qualquer intervalo limitado e fechado contendo o ponto a .
 Novamente pelo Teorema Fundamental de Cálculo, agora atendendo à continuidade de f em \mathbb{R} .

(b) Dado um qualquer $x \in \mathbb{R}$,

(20 pontos)

$(I_a(I_a f))(x) = \int_a^x \int_a^t f(s) ds dt$ ← Integrar por partes
 $= \left[t \cdot \int_a^t f(s) ds \right]_a^x - \int_a^x t \cdot f(t) dt$
 $= x \cdot \int_a^x f(s) ds - \underbrace{a \cdot \int_a^a f(s) ds}_0 - \int_a^x t \cdot f(t) dt$
 Na 2ª parte usamos o Teorema Fundamental de Cálculo, por justificação dada no último parágrafo de (a).

Pelo Linearidade de integral (e alteramos primeiro o nome da variável de integração no primeiro integral)
 $= \int_a^x x f(t) - t f(t) dt = \int_a^x (x-t) f(t) dt$

É claro que isto é o mesmo que usar x em vez de t por variável de integração.

NOTA: Seria admirável usar-se a informação dada em (b) para se resolver a questão (a) de um modo diferente de indicar acima.