

Nome:

N.º mec.:

Classificação
(espaço reservado
ao professor):

E\C	0	1	2	3
0	0	7	14	20
1	0	4	10	
2	0	0		
3	0			

Declaro que desisto:

Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro

Cálculo I - agr. 4

2021/22

1.º miniteste: *turma TP5; versão 2*

Duração: 0h15

- Desenha uma circunferência à volta da opção A, B ou C que consideres correta em cada uma das três questões abaixo.
- Relativamente a cada uma dessas questões, a cotação preliminar a atribuir será a seguinte: 10 pontos se a tua escolha de opção estiver correta; 0 pontos se não escolheres nenhuma opção ou se escolheres mais do que uma; -5 pontos se a tua escolha de opção estiver errada. Designando por S a soma aritmética das cotações preliminares obtidas nas três questões, a nota na escala de 0 a 20 valores que terás neste miniteste será dada pela expressão $\lceil \frac{2}{3} \max\{S, 0\} \rceil$ (em resumo, será a nota no quadro no espaço acima reservado ao professor que resulta do cruzamento do n.º de respostas certas C com o n.º de respostas erradas E).

-
- Escolhe a função $u(x)$ que mais diretamente (isto é, com menos contas ou com contas mais simples) permite primitivar quase imediatamente a função $\frac{2x^5}{(1-x^6)\sqrt{1-x^6}}$:

A. x^3 .
B. $\sqrt{1-x^6}$.
C. $1-x^6$.
 - Se na primitivação quase imediata de $\frac{2}{x(2+\ln(x^2))}$ escolhermos para $u(x)$ a função $2+\ln(x^2)$, a igualdade correta é

A. $\int \frac{2}{x(2+\ln(x^2))} dx = \int \frac{2}{u^2} du$.
B. $\int \frac{2}{x(2+\ln(x^2))} dx = \int \frac{1}{u} du$.
C. $\int \frac{2}{x(2+\ln(x^2))} dx = \int \frac{2x}{u} du$.
 - Se numa primitivação quase imediata usarmos $u(x) = \sqrt{x}$ e daí resultar $\int 2^u du$, em intervalos a expressão geral das primitivas da função dada é

A. $\frac{2^u}{\ln 2} + C$.
B. $(\ln 2)e^{\sqrt{x}} + C$.
C. $\frac{2^{\sqrt{x}}}{\ln 2} + C$.