

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI  
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

**TUTORIAT**  
**ALGEBRĂ ȘI GEOMETRIE**  
**IV**

STUDENȚI:

Radu Dimitrie Octavian

Țigănilă Ștefania

Bălan Mihai

BUCUREȘTI

2025

Aplicații liniare. Repere în  $\text{Ker } f$  respectiv  $\text{Im } f$ .

Exemplu 1:

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$$

$$f(x) = (x_1 - 2x_2 + x_3, 3x_1 + 3x_3, 7x_1 + 3x_2 + 7x_3)$$

a) Aratați ca  $f$  este liniară.

b)  $\text{Ker } f = ?$      $\text{Im } f = ?$

Sa se gaseasca cate un reper in  $\text{Ker } f$  respectiv  $\text{Im } f$ .

Rezolvare:

a)

$$f \text{ liniara} \Leftrightarrow f(ax + by) = a f(x) + b f(y) \quad \begin{matrix} \forall x, y \in \mathbb{R}^3 \\ \forall a, b \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} f(ax + by) &= f(ax_1 + by_1, ax_2 + by_2, ax_3 + by_3) = \\ &= (ax_1 + by_1 - 2ax_2 - 2by_2 + ax_3 + by_3, 3ax_1 + 3by_1 + 3ax_3 + 3by_3, 7ax_1 + 7by_1 + \\ &\quad + 3ax_2 + 3by_2 + 7ax_3 + 7by_3) = (a(x_1 - 2x_2 + x_3) + b(y_1 - 2y_2 + y_3), a(3x_1 + 3x_3) + \\ &\quad + b(3y_1 + 3y_3), a(7x_1 + 3x_2 + 7x_3) + b(7y_1 + 3y_2 + 7y_3)) = \\ &= a(x_1 - 2x_2 + x_3, 3x_1 + 3x_3, 7x_1 + 3x_2 + 7x_3) + b(y_1 - 2y_2 + y_3, 3y_1 + 3y_3, 7y_1 + \\ &\quad + 3y_2 + 7y_3) = a f(x) + b f(y) \quad \begin{matrix} \forall x, y \in \mathbb{R}^3 \\ \forall a, b \in \mathbb{R} \end{matrix} \end{aligned}$$

b)

$$\text{Ker } f = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid f(x) = 0_{\mathbb{R}^3}\} = S(A)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_3 = 0 \\ 7x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Observăm că  $C_1 = C_3 \Rightarrow \det A = 0$ .

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{pmatrix} = 2 \left( d_p = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \right) \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 = -3x_3 \\ 7x_1 + 3x_2 = -7x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ 7x_1 + 3x_2 = -7x_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$S(A) = \{(-x_3, 0, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$$\operatorname{Ker} f = \langle \{(-1, 0, 1)\} \rangle$$

$$R_1 = \{(-1, 0, 1)\} \text{ reper în } \operatorname{Ker} f$$

Metoda 1:

$$\operatorname{Im} f = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid \exists x \in \mathbb{R}^3 \text{ astfel încât } f(x) = y\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{matrix} \right\}$$

$$\text{Sistemul este compatibil} \Rightarrow \operatorname{rg}(B) = \operatorname{rg}(B^*)$$

$$d_p = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \neq 0. \text{ În plus, } d_c = 0.$$

$$d_c = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 9y_1 - 17y_2 + 6y_3 = 0$$

$$\operatorname{Im} f = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid 9y_1 - 17y_2 + 6y_3 = 0\}$$

$$B' = (9 \ -17 \ 6 \mid 0)$$

$$\dim \operatorname{Im} f = 3 - \operatorname{rg}(B') = 3 - 1 = 2$$

$$y_2 = \frac{9y_1 + 6y_3}{17}$$

$$\operatorname{Im} f = \left\{ \left( y_1, \frac{9}{17}y_1 + \frac{6}{17}y_3, y_3 \right) \mid y_1, y_3 \in \mathbb{R} \right\} = \{y_1 \left( 1, \frac{9}{17}, 0 \right) + y_3 \left( 0, \frac{6}{17}, 1 \right) \mid y_1, y_3 \in \mathbb{R}\}$$

$$\operatorname{Im} f = \left\langle \left( 1, \frac{9}{17}, 0 \right), \left( 0, \frac{6}{17}, 1 \right) \right\rangle$$

$$R_2 = \left\{ \left( 1, \frac{9}{17}, 0 \right), \left( 0, \frac{6}{17}, 1 \right) \right\} \text{ reper in } \text{Im } f$$

Metoda 2:

Extindem  $R_1$  la un reper in  $\mathbb{R}^3$

$R_1 \cup \{ \text{vect\_ales1}, \text{vect\_ales2} \}$  reper in  $\mathbb{R}^3$

$R_2 \cup \{ f(\text{vect\_ales1}), f(\text{vect\_ales2}) \}$  reper in  $\text{Im } f$

Exemplu 2:

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$$

$$f(x) = (x_1, 3x_1 - 2x_2 - 3x_3, -x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

a) Aratati ca  $f$  este liniara.

b)  $\text{Ker } f = ?$       $\text{Im } f = ?$

Sa se gaseasca cate un reper in  $\text{Ker } f$  respectiv  $\text{Im } f$ .

-----> de facut

Matricea asociată unei aplicații liniare.

Exemplu 3:

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 - 2x_2 - x_3, 2x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 + x_3)$$

a)  $[f]_{R_0, R_0} = ?$

b)  $\text{Ker } f = ?$       $\text{Im } f = ?$

Rezolvare:

a)

$R_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$  reperul canonic

$$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (-2 * 1 - 2 * 0 - 0, 2 * 1 + 2 * 0 + 0, 1 + 3 * 0 + 0) = (-2, 2, 1) = \\ = -2e_1 + 2e_2 + 1e_3$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (-2 * 0 - 2 * 1 - 0, 2 * 0 + 2 * 1 + 0, 0 + 3 * 1 + 0) = (-2, 2, 3) = \\ = -2e_1 + 2e_2 + 3e_3$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-2 * 0 - 2 * 0 - 1, 2 * 0 + 2 * 0 + 1, 0 + 3 * 0 + 1) = (-1, 1, 1) = \\ = -1e_1 + 1e_2 + 1e_3$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = [f]_{R_0, R_0}$$

b) Analog exemplului 1.

Exemplu 4:

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$$

$$f(x) = (-x_1 - 2x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_3)$$

a) Verificati daca  $f$  este liniara.

b)  $\text{Ker } f = ?$      $\text{Im } f = ?$

Sa se gaseasca cate un reper in  $\text{Ker } f$  respectiv  $\text{Im } f$ .

c) Este  $R = \{(1, 3, -11), (1, 4, 0), (1, 2, -1)\}$  reper ?

$$[f]_{R_0, R_0} = ?$$

$$[f]_{R,R} = ?$$

-----> *de facut*

*Exemplu 5:*

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$$

$$f(x) = (x_1 + x_2, 3x_1 - x_2)$$

$$a) [f]_{R_0, R_0} = ?$$

$$b) [f]_{R,R} = ? ; R = \{(1,1), (-1,3)\} \text{ baza.}$$

-----> *de facut*

Idee: de folosit formula de schimbare a matricei transformării liniare  
 (...  $C^{-1}AC$ ...) 😊.