

Tietorakenteet 2018

Harjoitukset 2, ratkaisut (Viikko 38)

1 Luentomonisteen laskusääntöjen perusteella saadaan (s.49)

$$\sqrt{19n} = \sqrt{19}\sqrt{n} \in \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{19}} * (\sqrt{19}\sqrt{n})\right) = \mathcal{O}(\sqrt{n})$$

$$21n^2 \in \mathcal{O}(n^2)$$

$$2^{100000} \in \mathcal{O}\left(\frac{1}{2^{100000}} * (2^{100000} * 1)\right) = \mathcal{O}(1)$$

$$\log(4n^7) = \log 4 + 7 \log n \in \mathcal{O}(\log n)$$

$$\log\left(\frac{n \log n^2}{\log n}\right) = \log\left(\frac{2n \log n}{\log n}\right) = \log 2n \in \mathcal{O}(\log n)$$

$$\log k^n = \underbrace{\log k + \log k + \cdots + \log k}_{n \text{ kappaletta}} = n \underbrace{\log k}_{\text{vakio}} \in \mathcal{O}(n)$$

$$7(n^3 + 1)(n + 1) = 7n^4 + 7n^3 + 7n + 7 \in \mathcal{O}(n^4)$$

$$\log(10n) = \underbrace{\log 10}_{\text{vakio}} + \log n \in \mathcal{O}(\log n)$$

$$11n \log n \in \mathcal{O}(n \log n)$$

2 Järjestys on seuraava:

$$42, 7 \log \log n, 3 \log n, \sqrt{n}, \sqrt{n} \log n, 6n, n \log n, 5n^2, n!.$$

Perustelut voidaan tehdä raja-arvon avulla, esimerkiksi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{5n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n-1)!}{5n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} \cdot \underbrace{\frac{(n-1)}{n}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{(n-2)!}_{\rightarrow \infty} \right) = \infty,$$

eli $n!$ on kasvunopeudeltaan suurempi kuin $5n^2$.

3 Katso PrintValue.java.

4 Katso SortingComparison.java.

5 Olkoon $f(n) = a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_dn^d$, missä $a_k \in \mathbb{R}$ ja $a_d \neq 0$, $k = 0, 1, 2, \dots, d$. Koska kaikilla $n \geq 1$ on voimassa

$$\begin{aligned} f(n) &\leq |f(n)| = |a_0 + a_1n + a_2n^2 + \cdots + a_dn^d| \\ &\leq |a_0| + |a_1|n + |a_2|n^2 + \cdots + |a_d|n^d \\ &= \left(\frac{|a_0|}{n^d} + \frac{|a_1|}{n^{d-1}} + \frac{|a_2|}{n^{d-2}} + \cdots + |a_d| \right) n^d \\ &\leq (|a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_d|) n^d \end{aligned}$$

ja valitsemalla $c = |a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_d|$ ja $n_0 = 1$, saamme, että $f(n) \leq cn^d$, kun $n \geq n_0$ eli $f(n)$ on $\mathcal{O}(n^d)$.

6 Koska $d(n)$ on $\mathcal{O}(f(n))$ ja $e(n)$ on $\mathcal{O}(g(n))$, on olemassa $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ ja $r, s > 0$ siten, että $d(n) \leq rf(n)$ kun $n \geq n_0$ ja $e(n) \leq sg(n)$ kun $n \geq n_1$. Tällöin valitsemalla $n_2 = \max\{n_0, n_1\}$ ja $b = rs$ saadaan $d(n)e(n) \leq r \cdot s \cdot f(n)g(n) = b \cdot f(n)g(n)$, kun $n \geq n_2$. Siis $d(n)e(n)$ on $\mathcal{O}(f(n)g(n))$.

7 Olkoot $f(n) = 7 + \sqrt{5n} + n + 12n^3 + 6n^4$ ja $g(n) = n^4$. Koska

$$\begin{aligned}6n^4 &\leq 6n^4, \\12n^3 &\leq 12n^4, \\n &\leq n^4, \\\sqrt{5n} &= \sqrt{5}\sqrt{n} \leq \sqrt{5}n \leq \sqrt{5}n^4, \\7 &\leq 7n^4\end{aligned}$$

kaikilla $n \geq 1$, saamme

$$\begin{aligned}f(n) &= 7 + \sqrt{5n} + n + 12n^3 + 6n^4 \\&\leq 7n^4 + \sqrt{5}n^4 + n^4 + 12n^4 + 6n^4 = (26 + \sqrt{5})n^4,\end{aligned}$$

kun $n \geq 1$. Näin ollen voimme valita $c = 26 + \sqrt{5}$ ja $n_0 = 1$. Siis on olemassa sellaiset positiiviset vakiot c ja n_0 , että $f(n) \leq cg(n)$, kun $n \geq n_0$. Siis $f(n)$ on $\mathcal{O}(n^4)$.

8 Olkoot $f(n) = 6 + 2 \log \log \log n + 5n\sqrt{n} + n^3 + \sqrt[3]{2}n^4 + n^5$ ja $g(n) = n^5$.
Koska

$$\begin{aligned} n^5 &\leq n^5, \\ \sqrt[3]{2}n^4 &\leq \sqrt[3]{2}n^5, \\ n^3 &\leq n^5, \\ 5n\sqrt{n} &\leq 5n \cdot n = 5n^2 \leq 5n^5 \\ 6 &\leq 6n^5 \end{aligned}$$

kaikilla $n \geq 1$ ja $2 \log \log \log n \leq 2 \log n \leq 2n \leq 2n^5$, kun $n \geq 3$ ($2 \log \log \log n$ ei ole määritelty, kun $n \in \{1, 2\}$ ja logaritmi on 2-kantainen), saamme

$$\begin{aligned} &6 + 2 \log \log \log n + 5n\sqrt{n} + n^3 + \sqrt[3]{2}n^4 + n^5 \\ &\leq 6n^5 + 2n^5 + 5n^5 + n^5 + \sqrt[3]{2}n^5 + n^5 = (15 + \sqrt[3]{2})n^5. \end{aligned}$$

kun $n \geq 3$. Näin ollen voimme valita $c = 15 + \sqrt[3]{2}$ ja $n_0 = 3$. Siis on olemassa sellaiset positiiviset vakiot c ja n_0 , että $f(n) \leq cg(n)$, kun $n \geq n_0$. Siis $f(n)$ on $\mathcal{O}(n^5)$.