
Version: 2019/07/12

1 Hamiltonian in barycentric coordinates

Hamiltonian in barycentric coordinates $q_i, p_i \in \mathbb{R}^3$, $i = 0, \dots, N$,

$$H(q, p) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^N \frac{\|p_i\|^2}{m_i} - G \sum_{0 \leq i < j \leq N}^N \frac{m_i m_j}{\|q_i - q_j\|}. \quad (1)$$

2 Canonical Heliocentric Coordinates

Planet indices

$$\begin{aligned} Q_0 &: Sun \\ Q_i (i = 1, \dots, N-2) &: \text{rest of the planets} \\ Q_{N-1} &: Earth \\ Q_N &: Moon \end{aligned}$$

Some definitions

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu_0} &= \frac{1}{M}, \quad M = \sum_{i=0}^N m_i \\ \frac{1}{\mu_i} &= \frac{1}{m_0} + \frac{1}{m_i}, \quad i < N-1 \\ \frac{1}{\mu_{N-1}} &= \frac{1}{m_0} + \frac{1}{(m_{N-1} + m_N)} \\ \frac{1}{\mu_N} &= \frac{1}{m_N} - \frac{1}{(m_{N-1} + m_N)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_i &= (m_0 + m_i), \quad i < N-1 \\ k_{N-1} &= m_0 + m_{N-1} + m_N \\ k_N &= \frac{m_{N-1}^3}{(m_{N-1} + m_N)^2} \end{aligned}$$

Hamiltonian

Hmiltonian in canonical Heliocentric Coordinates, $Q_i, V_i \in \mathbb{R}^3$, $i = 0, \dots, N$,

$$H(Q, V) = \frac{1}{M} V_0^2 + H_K(Q, V) + H_I(Q, V)$$

where,

$$- H_k(Q, V)$$

$$\sum_{i=1}^N \left(\frac{\|V_i\|^2 \mu_i}{2} - \frac{\mu_i k_i}{\|Q_i\|} \right)$$

$$- H_I(Q, V)$$

$$\begin{aligned} H_I(Q, V) = & \frac{1}{m_0} \sum_{1 \leq i < j}^{N-1} \mu_i V_i \mu_j V_j - \sum_{1 \leq i < j}^{N-2} \frac{m_i m_j}{\|Q_i - Q_j\|} \\ & - \sum_{i=1}^{N-2} \left(\frac{m_i m_N}{\|Q_i - Q_{N-1} - Q_N\|} + \frac{m_i m_{N-1}}{\|Q_i - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|} \right) \\ & + \frac{m_0(m_{N-1} + m_N)}{\|Q_{N-1}\|} - \frac{m_0 m_{N-1}}{\|Q_{N-1} - \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|} - \frac{m_0 m_N}{\|Q_{N-1} + Q_N\|} \end{aligned}$$

Ordinary Differential Equations

1. Position

$$\begin{aligned} \dot{Q}_i &= V_i + \sum_{j \neq i, j=1}^{N-1} \frac{V_j \mu_j}{m_0}, \quad i \leq N-1 \\ \dot{Q}_{N-1} &= V_{N-1} + \sum_{j \neq N-1, j=1}^{N-1} \frac{V_j \mu_j}{m_0} \\ \dot{Q}_N &= V_N \end{aligned}$$

2. Velocity

$$\begin{aligned}\dot{V}_i = & -\frac{k_i}{\|Q_i\|^3} Q_i - \frac{m_i}{\mu_i} \left(\sum_{j \neq i, j=1}^{N-2} \frac{m_j}{\|Q_i - Q_j\|^3} (Q_i - Q_j) \right. \\ & \left. - \frac{m_N}{\|Q_i - Q_{N-1} - Q_N\|^3} (Q_i - Q_{N-1} - Q_N) - \frac{m_{N-1}}{\|Q_i - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|^3} (Q_i - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N) \right) \\ & i \leq N-2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_{N-1} = & -\frac{k_{N-1}}{\|Q_{N-1}\|^3} Q_{N-1} \\ & + \frac{1}{\mu_{N-1}} \left(\sum_{i=1}^{N-2} \left(\frac{m_i m_N}{\|Q_j - Q_{N-1} - Q_N\|^3} (Q_j - Q_{N-1} - Q_N) + \frac{m_i m_{N-1}}{\|Q_j - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|^3} (Q_j - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N) \right) \right. \\ & \left. + \frac{m_0(m_N + m_{N-1})}{\|Q_{N-1}\|^3} (Q_{N-1}) - \frac{m_0 m_{N-1}}{\|Q_{N-1} - \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|^3} (Q_{N-1} - \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N) - \frac{m_o m_N}{\|Q_{N-1} + Q_N\|^3} (Q_{N-1} + Q_N) \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_N = & -\frac{k_N}{\|Q_N\|^3} Q_N \\ & + \frac{1}{\mu_N} \left(\sum_{i=1}^{N-2} \left(\frac{m_i m_N}{\|Q_j - Q_{N-1} - Q_N\|^3} (Q_j - Q_{N-1} - Q_N) - \frac{m_i m_N}{\|Q_j - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|^3} (Q_j - Q_{N-1} + \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N) \right) \right. \\ & \left. + \frac{m_0 m_N}{\|Q_{N-1} - \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N\|^3} (Q_{N-1} - \frac{m_N}{m_{N-1}} Q_N) - \frac{m_0 m_N}{\|Q_{N-1} + Q_N\|^3} (Q_{N-1} + Q_N) \right)\end{aligned}$$

References