


RESOLUCIÓN Y APLICACIONES

2026




- 1 Sección 1: introducción
- 2 Sección 2: aplicaciones de las ecuaciones
- 3 Sección 3: Metas
- 4 Sección 4: Partes, clases y solución de una ecuación
- 5 Sección 5: Propiedades de las igualdades en ecuaciones y consecuencias
- 6 Sección 6: Resolución de una ecuación de grado uno
- 7 Sección 7: Más sobre ecuaciones de grado 1
- 8 Sección 8: Actividades
 - Actividad 12
 - Actividad 13
 - Actividad 15

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN


PARA PENSAR!

¿Cuál es el peso de un cubo azul para mantener la balanza en equilibrio?



PARA PENSAR!

¿Cuál es el peso de un cubo azul para mantener la balanza en equilibrio?



Una forma de resolver: pues ... El lado izquierdo numéricamente debe ser igual al lado derecho.

$$2 \times \text{2 Kg} \text{ debe ser igual } 3 \times ?$$

DEFINICIÓN: QUÉ ES UNA ECUACIÓN?

$$2 \times 2 = 3x$$

x = Peso de un cubo azul



Figura: Por costumbre se usa “ x ” para representar la incógnita.

- Una ecuación es una expresión que representa una igualdad entre valores conocidos y desconocidos.
- Las ecuaciones son de uso (muy) frecuente en ciencias y matemáticas.
- Los valores desconocidos se denomina incógnitas, usualmente representado por letras.

SECCIÓN 2: APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

¿...Donde aparecen las ecuaciones?

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

¿...Donde aparecen las ecuaciones?




Figura: El propósito de una ecuación es encontrar los valores que satisfacen la igualdad.

■ Un simple problema de astronomía




Figura: Las oscilaciones en la distancia de nuestro planeta con respecto al Sol presentan un mínimo y un máximo ¿Es posible observarlas o determinarlas?

■ Un simple problema de astronomía





Figura: Observaciones del Sol desde el satélite científico SDO.

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

- Las causas del afelio y perihelio son debidas a la atracción entre cuerpos y su movimiento alrededor del sol.



La *ecuación* para determinar las distancias,

$$r^2 - 2r + 0.999721 = 0$$

$$(r - 1.0167)(r - 0.9833) = 0$$

Perihelio: 0.9833 UA

Afelio: 1.0167 UA

SECCIÓN 3: METAS

Propósito

Entender el manejo de los diferentes métodos de solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, desarrollando apropiadamente sus algoritmos en la resolución de problemas.

Desempeños

Resuelve algebraicamente ecuaciones de primer y segundo grado.



SECCIÓN 4: PARTES, CLASES Y SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

Ecuación numérica

$$\underbrace{2X + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{8 + 5X}_{\text{2do miembro}}$$

Partes

1. Miembros: expresiones algebraicas a la izquierda o derecha del “=”.
2. Términos: cantidades conectadas por un signo.

Ecuación literal

$$E = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

Clases

Según su forma y grado:

1. Numérica: aparecen una(s) letra(s) cuyo resultado es numérico.
2. Literal: aparecen de forma mixta (letras y números) cuyo resultado es una expresión.

El grado es determinado por el grado mayor de la incógnita.

Ejemplo 1

$$5x^3 - 8x^2 + 2x - 2 = 0$$

grado 3, numérica

Ejemplo 2

$$x = \frac{1}{2}at^2 + vt + s$$

respecto a t: grado 2, literal

Ejemplo 3

$$3q^2 - 4q - 5q^2 + 7q + 2q^2 = 3q^3 - 5 - 2q^3 + 12 - q^3$$

$$\cancel{3q^2} - 4q - \cancel{5q^2} + 7q + \cancel{2q^2} = \cancel{3q^3} - 5 - \cancel{2q^3} + 12 - \cancel{q^3}$$

$$3q = 7$$

grado 1, numérica

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

La solución de una(s) ecuación(es) consiste en hallar el(los) valor(es) numérico(s) de la(s) incógnita(s) que verifican y hacen verdadera la igualdad. En resumen, los miembros de la ecuación deben ser idénticamente iguales.

Ejemplo inicial: la balanza

$$3x = 4, \quad \text{solución: } x = \frac{4}{3} \text{ porque } 3 \times \frac{4}{3} = 4$$

La solución de una ecuación también es llamada raíz[1].

SECCIÓN 5: PROPIEDADES DE LAS IGUALDADES EN ECUACIONES Y CON-SECUENCIAS

PROPIEDADES

- I. Si a los dos miembros de una ecuación se suma o se resta una cantidad positiva o negativa, la igualdad se mantiene.

Ejemplo

$$x + 8 = 10, \quad x + 8 - 8 = 10 - 8, \quad x = 10 - 8 = 2$$

- II. Si a los dos miembros de una ecuación se multiplica o se divide una cantidad positiva o negativa, la igualdad se mantiene.

Ejemplo

$$3x = 4, \quad \frac{3x}{3} = \frac{4}{3}, \quad x = \frac{4}{3}$$

CONSECUENCIAS: TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS

De lo anterior se obtiene como consecuencia:

- I. Cualquier término puede cambiar de miembro, cambiando el signo.

$$x + 8 = 10 \Rightarrow x = 10 - 8$$

- II. Cualquier término que multiplique (divida) la incógnita, cambia de miembro a dividir (a multiplicar).

$$3x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{3}; \quad \frac{y}{8} = 5 \Rightarrow y = 5 \cdot 8 = 40$$

Estas consecuencias sencillas permiten resolver una ecuación [2].

SECCIÓN 6: RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE GRADO UNO

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN GRADO 1

Procedimiento para resolver una **ec. de grado 1 y una incógnita**:

- I) Realizar operaciones, si las hay (productos, eliminar paréntesis, etc.).
- II) Realizar transposición de términos reuniendo en un miembro las cantidades incógnitas y en el otro las cantidades conocidas.
- III) Reducir términos semejantes.
- IV) Aislar la incógnita mediante división o multiplicación (consecuencia II).
- V) Verificar la solución reemplazando el valor hallado en la ecuación.

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

paso ii) $10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

$$\text{paso iv) } x = \frac{138}{46} = 3$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

$$\text{paso iv) } x = \frac{138}{46} = 3$$

$$\text{paso v) } 10(3) - 90 - 45 + 54(3) = 8(3) - 2 + 5 + 10(3)$$

SECCIÓN 7: MÁS SOBRE ECUACIONES DE GRADO 1

- Algunas ecuaciones de grado superior pueden convertirse a una ecuación de grado uno (o lineal) mediante *reducción de términos semejantes*.

Simplificación de una ecuación de grado superior

$$(5z^2 + z^3 + 3z - 2) - (z - 6 - 2z^2 - z^3) - (2z^3 + 7z^2) = 0$$

$$4 + 2z = 0$$

¿Cuál es la solución?

SECCIÓN 8: ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 12

De acuerdo a la exposición, redactar cada pregunta con su respuesta.

1. a) ¿Qué es una ecuación? b) ¿Cuál es su propósito?
2. ¿Cuál es el valor de x del problema $4 = 3x$?
3. ¿Qué es el perihelio y el afelio?
4. Redacte brevemente con sus palabras las causas del perihelio y el afelio.
5. ¿Cuál es el valor de una (1) unidad astronómica (UA) en km?
6. Use el resultado anterior para obtener las distancias de Perihelio (0.983 UA) y Afelio (1.017 UA) en km. Resultados de la multiplicación deben ser evidentes.
7. Redactar las metas del periodo (ver diapositiva 8).

ACTIVIDAD 13 I

- I. Redactar la diapositiva 14 sobre la resolución de una ecuación de grado 1.
- II. Resolver las ecuaciones con su procedimiento (escrito) y verificación:

1. $5x=8x-15$, $x \rightarrow 5$

2. $y-5=3y-25$, $y \rightarrow 10$

3. $9y-11=-10+12y$, $y \rightarrow -\frac{1}{3}$

4. $8x-4+3x=7x+x+14$, $x \rightarrow 6$

5. $5y+6y-81=7y+102+65y$, $y \rightarrow -3$

6. $16+7x-5+x=11x-3-x$, $x \rightarrow 7$

Finalizada la actividad una nota complementaria (Quiz) será evaluada.

Ver nota siguiente página.

Nota importante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

ACTIVIDAD 15

Resolver con procedimiento las siguientes ecuaciones de productos entre paréntesis.

1. $3(t - 2) - t = 8$

2. $4(-v - 1) + 5v - 2 = -2v - v$

3. $3 + 2(4 + 2d) + 1 = 20 - 2(2 - d)$

4. $4(h - 3) - 5(h + 2) = 7(3h - 1) + 29h$

Verificar las ecuaciones de los problemas 2 y 3 (obligatorio).

Nota importante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

THANKS!

REFERENCIAS



J.A. BALDOR.

ALGEBRA.

Grupo Editorial Patria, 1983.



JESÚS RAMOS AND LUDWIG ORTIZ.

SUPERMAT 9.

Voluntad, 2000.

BACKUP FRAME

This is a backup frame, useful to include additional material for questions from the audience.