

# ТЕОРВЕР МАТСТАТИСТИКА

и тщетные попытки понять что-нибудь из  
вышеперечисленного

Лектор: Р. С. Пусев  
Записал :taxus

17 января 2017 г.

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Элементарная теория вероятностей</b>	<b>2</b>
§ 1	Аксиоматическое определение вероятности . . . . .	2
§ 2	Формула полной вероятности . . . . .	3
§ 3	Теорема Байеса . . . . .	3
§ 4	Независимые события . . . . .	3
§ 5	Случайные величины и их распределения . . . . .	4
§ 6	Моменты случайных величин . . . . .	5
§ 7	Характеристическая функция . . . . .	6
§ 8	Теорема Муавра-Лапласа . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Матстатистика</b>	<b>7</b>
§ 9	Случайные векторы . . . . .	7
§ 10	Функция от случайного вектора . . . . .	8
§ 11	Матожидание и дисперсия суммы случайных величин . . . . .	9
§ 12	Матожидание функции случайной величины . . . . .	10
§ 13	Неравенство Шварца . . . . .	11
§ 14	Характеристическая функция суммы случайных величин . . . . .	11
§ 15	Суммирование большого числа случайных величин . . . . .	11
§ 16	Центральная предельная теорема . . . . .	12
§ 17	Обобщённая теорема Муавра-Лапласа . . . . .	13
§ 18	Метод моментов . . . . .	14
§ 19	Метод максимального правдоподобия . . . . .	15
§ 20	Лемма Фишера . . . . .	16
§ 21	Доверительны интервалы нормального распределения . . . . .	17
§ 22	Проверка гипотез по параметрам нормального распределения . . . . .	18
§ 23	Линейная регрессия . . . . .	19
<b>3</b>	<b>Случайные процессы</b>	<b>19</b>
<b>А</b>	<b>Обозначения</b>	<b>20</b>
	<b>Литература</b>	<b>20</b>

# Глава 1: Элементарная теория вероятностей

## §1 Аксиоматическое определение вероятности

**Определение 1** ( $\sigma$ -алгебра). Алгеброй  $\mathcal{A}$  подмножеств множества  $\Omega$  называется такой набор его подмножеств с заданными операциями объединения, пересечения и дополнения множеств, что

1.  $\Omega \in \mathcal{A}$
2.  $X \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{X} \in \mathcal{A}$
3.  $X_1, X_2 \in \mathcal{A} \Rightarrow X_1 \cup X_2$

Сигма-алгеброй подмножеств называется всё тоже самое, только можно объединять счётное число подмножеств.

**Определение 2** (Вероятностное пространство). Рассмотрим упорядоченную тройку  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , где

$\Omega$  — Множество (элементарных исходов). Чисел, например.

$\mathcal{F}$  —  $\sigma$  — алгебра подмножеств  $\Omega$

$P$  — Собственно, вероятность

**Определение 3** (Вероятность).  $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  такая, что

1.  $\forall A \in \mathcal{F} \quad P(A) \geq 0$
2.  $\forall \{A_i\}: A_i \cap A_j = \emptyset \quad P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$
3.  $P(\Omega) = 1$

Как видно, сильно похоже на площадь. Что впрочем неслучайно, вероятность — нормированная мера. Последнее условие как раз и означает нормированность.

**Определение 4** (Тривиальные события).  $\emptyset, \Omega$ .

**Утверждение 1.** *Свойства вероятности:*

1.  $P(\emptyset) = 0$
2.  $0 \leq P(A) \leq 1$
3.  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
4.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$A$  это очень важное и будет в отдельном утверждении.

**Утверждение 2** (Непрерывность меры). Пусть  $A_1 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$ ,  $\bigcup_i A_i = A$ . Тогда  $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ .



Пусть

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Тогда

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i; \quad A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

Следовательно,

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Всё работает, потому что в  $\sigma$ -алгебре можно объединять счётное число множеств.



## § 2 Формула полной вероятности

**Определение 1** (Условная вероятность). Пусть  $A, B \in \mathcal{F}$ ,  $P(A) > 0$ <sup>1</sup>. Тогда

$$P(B \mid A) := \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

**Утверждение 1.** Пусть  $\{A_i, H\} \subset \mathcal{F}$  и

1.  $P(A_i) > 0$
2.  $A_i \cap A_j = \emptyset$
3.  $\bigcup_i A_i = \Omega$

(полная группа/система событий). Тогда

$$P(H) = \sum_i P(A_i) \cdot P(H \mid A_i)$$

## § 3 Теорема Байеса

**Теорема 1.** Пусть  $A_i$  — полная система событий,  $H \in \mathcal{F}$ :  $P(H) > 0$ . Тогда

$$P(A_k \mid H) = \frac{P(A_k) \cdot P(H \mid A_k)}{\sum_i P(A_i) \cdot P(H \mid A_i)}$$

## § 4 Независимые события

**Определение 1.** Пусть  $A, B \in \mathcal{F}$ . Они называются независимыми, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

**Утверждение 1.** События  $A, B$  независимы  $\Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A) \vee P(B \mid A) = P(B)$  (в зависимости от того, что определено, вдруг там ноль где-нибудь).

**Утверждение 2.** Если  $A, B$  несовместны, то нетривиальные  $A, B$  — зависимы.

---

<sup>1</sup>ну мы же делим, надо убедиться что ненуль


**Определение 2.** Случайные величины  $\{X_i\}$  попарно независимы, если

$$\forall i, j \quad P(X_i \cap X_j) = P(X_i) \cdot P(X_j)$$

**Определение 3.** Случайные величины  $\{X_i\}_{i=1}^n$  независимы по совокупности, если

$$\forall \{i_k \mid i_k, k \in (\mathbb{Z} \cap [1; n])\} \quad P\left(\bigcap_{i_k} X_{i_k}\right) = \prod_{i_k} P(X_{i_k})$$

*Замечание 1.* Определения 1.4.3 и 1.4.3 правда разные. Конечно попарная независимость следует из независимости по совокупности, но обратное неверно.



**Пример 1.** Тетраэдр Бернштейна: . Здесь вероятность выпадения всех 3 цветов —  $1/4$ , а через попарные —  $1/8$

## § 5 Случайные величины и их распределения

**Определение 1** (Случайная величина). Случайной величиной назовём произвольное хорошее отображение  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

Тут нужно бы сказать про измеримость, это потребуется, чтобы говорить о вероятности попадания в интервал на прямой. Так что

$$X: (X^{-1}(B) = \{\omega \mid X(\omega) \in B\}) \in \mathcal{F},$$

где  $B$  — борелевское множество

**Определение 2.** Пусть  $B \subset \mathbb{R}$ ,  $B$  — промежуток, или дополнение в нему (борелевское множество).<sup>1</sup>

$$P(X \in B) = P(\{\omega \mid X(\omega) \in B\})$$

**Определение 3.** Случайная величина называется дискретной, если

$$\exists (\{a_i\} \sim \mathbb{N}): \left( \sum_i P(X = a_i) = 1 \right)$$

то есть

$$P(X \in B) = \sum_{\{i \mid a_i \in B\}} p_i, \quad p_i = P(X = a_i)$$

**Определение 4.** Случайная величина называется непрерывной, если

$$\exists (f_X: B \rightarrow \mathbb{R}): \left( P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx \right)$$

**Определение 5** (Распределение случайной величины).  $F(B) = P(X \in B)$

<sup>1</sup>тут вроде концы могут входить, так что точка — тоже борелевское множество.

**Пример 1** (К непрерывному распределению). Пусть  $X(\omega) = \omega$ ,  $B = (0, 1)$ ,  $\Omega = (-1; 1)$ . Выберем  $f_X \equiv \frac{1}{2}$ .

$$F(B) = P(X \in B) = P(\{\omega \mid \omega \in (0, 1)\}) = P((0, 1)) = \frac{1-0}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$F(B) = \int_{(0,1)} \frac{1}{2} dx = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$

Это всё верно, потому что на множестве интервалов вероятность — нормированная длина интервала.

**Определение 6** (Функция распределения).

$$F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]: F_X(x) = P(X < x) = P(\{\omega \mid X(\omega) < x\})$$

**Утверждение 1.** Про  $F(x)$  верно следующее:

1.  $F \uparrow \mathbb{R}$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4.  $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = F(x_0)$

**Утверждение 2.** Верно и обратное: если существует функция с указанными свойствами, под неё найдётся случайная величина.

*Замечание.* Если рассматривать обобщённые функции, то любое распределение запишется как

$$\int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

## § 6 Моменты случайных величин

**Определение 1.** Пусть  $X$  — случайная величина,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$$

Тогда

$$\langle x \rangle \equiv \bar{x} \equiv M X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

**Утверждение 1.** Свойства матожидания:

1.  $M < \infty$
2.  $M(aX + bY) = a M X + b M Y$
3.  $P(X \geq 0) = 1 \Rightarrow M X \geq 0$
4.  $\begin{cases} P(X \geq 0) = 1 \\ M X = 0 \end{cases} \Rightarrow P(X = 0) = 1$

5. если  $X, Y$  — независимы, то  $M(XY) = M X \cdot M Y$

**Определение 2.** Момент  $k$ -ого порядка относительно начала  $a$ :

$$\lambda_{k,a} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^k f(x) dx$$

(если есть абсолютная сходимость)

**Определение 3.** Начальный момент:  $\nu_k = \lambda_{k,0}$

**Определение 4.** Центральные моменты:  $\mu_k = \lambda_{k,\bar{x}}$

**Утверждение 2.**  $\nu_k = \sum_{i=0}^k C_k^i a^i \lambda_{k-i,a}$

**Определение 5** (Дисперсия).  $D X = M(X - M X)^2$ ,  $\sigma = \sqrt{D X}$  — среднеквадратичное отклонение.

**Утверждение 3.**

$$D(aX + bY) = a^2 D X + b^2 D Y$$

если  $X, Y$  — независимы, то  $D(XY) = D X \cdot D Y$

$$D(X + C) = D X$$

## § 7 Характеристическая функция

**Определение 1** (Характеристическая функция).  $\Phi(t) = M e^{itx}$

**Утверждение 1.** Свойства характеристической функции:

1. Всегда существует и  $|\Phi(t)| \leq 1$ .

$$2. f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \Phi(t) dt$$

$$3. \Phi_{a+Xb}(t) = e^{ita} \Phi_X(bt)$$

$$4. \text{ Если } X, Y \text{ — независимы, то } \Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) \Phi_Y(t)$$

$$5. \text{ Если } M|X|^n < \infty, \text{ то } \Phi^{(k)}(0) = i^k M X^k$$

**Определение 2** (Сходимость по распределению).  $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow F_n(x) \rightarrow F(x)$

**Теорема 2** (О непрерывном соответствии).  $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \Phi_{X_n}(t) \xrightarrow{t} \Phi_X(t)$ . Здесь на самом деле всё сложно. В разных книжках пишут равномерную сходимость на разных интервалах. У нас вроде было на всей вещественной прямой, но тогда это слишком сильное утверждение. К слову так же в [1] и [2]. А вот в [3] требуют только сходимости в каждом конечном интервале. Можно взять экспоненту, и понять, что эти условия разные.

## Глава 2: Матстатистика

### § 9 Случайные векторы

**Определение 1** (Случайный вектор). Случайным вектором назовём произвольное хорошее отображение  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ . См. примечание про измеримость в § 5. Борелевские множества можно рассматривать и в  $\mathbb{R}^n$ , как наименьшую сигма-алгебру, содержащую все полуоткрытые параллелепипеды.

Так же можно считать, что случайный вектор — набор случайных величин.

**Определение 2** (Функция распределения).

$$F_X: \mathbb{R}^n \rightarrow [0; 1]: F_X(x) = P(X^1 < x^1, \dots, X^n < x^n)$$

То есть вероятность попадания в параллелепипед, уходящий в бесконечность.

*Замечание 1.* Тут как раз используется, что борелевские множества «прямоугольные».

**Утверждение 1.** Про  $F(x)$  верно следующее:

1.  $F$  не убывает по каждому аргументу.
2.  $\lim_{x_i \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4.  $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = F(x_0)$  (по совокупности переменных). Это просто следует из непрерывности меры.

тоже важно, так что отдельно

**Утверждение 2.** Пусть  $a^1 < b^1, \dots, a^n < b^n$ , тогда работает формула включений и исключений

$$F(b^1, \dots, b^n) - \sum_i F(b^1, \dots, a^i, \dots, b^n) + \dots + F(a^1, \dots, a^n) = P(x \in [a^1, b^1] \times \dots \times [a^n, b^n])$$

По сути следствие формулы про вероятность объединения.

**Определение 3.** Векторная случайная величина называется дискретной, если

$$\exists (\{a_i \mid a_i \in \mathbb{R}^n\} \sim \mathbb{N}): \left( \sum_i P(X = a_i) = 1 \right)$$

то есть

$$P(X \in B) = \sum_{\{i \mid a_i \in B\}} p_i, \quad p_i = P(X = a_i)$$

**Определение 4.** Векторная случайная величина называется непрерывной, если

$$\exists (f_X: B \rightarrow \mathbb{R}): \left( P(X \in B) = \int_B f_X(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n \right)$$



*Замечание 1.* Для функций распределения:

$$F(x^1, \dots, x^n) = \int_{-\infty}^{x^n} \cdots \int_{-\infty}^{x^1} f_X(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n$$

**Утверждение 3.** Пусть  $X, Y$  — независимы. Тогда  $p_{X+Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

▼

По определению функции распределения

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy$$

Из независимости  $X, Y$

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= P(X < x, Y < y) = P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty; x] \cap \omega \mid Y(\omega) \in (-\infty; y]) \\ &= P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty; x]) \cdot P(\omega \mid Y(\omega) \in (-\infty; y]) \\ &= P(X < x) \cdot P(Y < y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \end{aligned}$$

А тогда из независимости подынтегральных функций

$$F_X(x) \cdot F_Y(y) = \int_{-\infty}^x p_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^y p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p_X(x) \cdot p_Y(y) dx dy$$

А дальше можно заметить, что нам неважно по какому множеству интегрировать.

$$\int_B (p(x, y) - p_X(x) \cdot p_Y(y)) dx dy = 0$$

Здесь правда всё ломается на отсутствии непрерывности у  $p$ . Но если она есть, то дальше стандартное рассуждение в окрестности точки где не 0.

▲

## § 10 Функция от случайного вектора

**Определение 1** (Функция от случайного вектора).  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ .

Здесь нужно снова говорить про измеримость  $g$  — прообраз борелевского множества должен быть борелевским множеством. Иначе  $g(X)$  может не получиться случайной величиной. Но всякие мерзкие отображения всё равно никому не нужны ☺.

**Утверждение 1.** Пусть  $X$  — дискретная случайная величина,  $f$  — обратима,  $Y = g(X)$ ,  $b_j = f(a_j)$ . Тогда  $P(Y^i = b_j^i) = P(X^i = a_j^i)$ .

▼

$$P(Y^i = b_j^i) = P(f(X^i) = f(a_j^i)) = P(\omega \mid f(X^i(\omega)) = f(a_j^i))$$

Поскольку  $f$  — обратима, она биективна. Значит  $f(X) = f(a_j) \Leftrightarrow X = a_j$ . Собственно, всё.

▲

**Утверждение 2.** Пусть  $X$  — непрерывная случайная величина,  $f$  — обратима,  $Y = g(X)$ ,  $f^{-1} = g$ . Тогда  $p_y(y) = p_X(g(y)) \left| \frac{dg}{dy} \right|$ .

▼

Пусть  $D = f(B)$ . Тогда  $P(Y \in D) = P(X \in B)$  опять-таки в силу биективности  $f$ . Ну, ничего нового туда попасть не может и у всего есть прообраз. Так что (здесь будем рисовать один значок интеграла и дифференциала из экономии размера пдф-ки, хотя в этом замечании данных может и больше)

$$\int_D p_Y(y) dy = \int_B p_X(x) dx = \int_D p_X(g(y)) \left| \frac{dg}{dy} \right|$$

Якобиан тут под модулем, так как множество неориентированное. Я верю, что нам ещё про это расскажут на матане.

▲

## § 11 Матожидание и дисперсия суммы случайных величин

**Утверждение 1.** Пусть  $X, Y, n \in (A \sim \mathbb{N})$  — две дискретные независимые случайные величины. Тогда

$$P(X + Y = n) = \sum_{k \in A} P(X = n - k) \cdot P(Y = k)$$

▼

Из формулы полной вероятности ( $Y = k, k \in A$  правда полная группа)

$$P(X + Y = n) = \sum_{k \in A} P(X + Y = n \mid Y = k) \cdot P(Y = k) = \sum_{k \in A} P(X = n - k \mid Y = k) \cdot P(Y = k)$$

А вот тут уже поможет независимость  $X, Y$ .

$$\dots = P(X = n - k) \cdot P(Y = k)$$

▲

**Утверждение 2.** Пусть  $X_1, X_2, n \in \mathbb{R}$  — две непрерывные независимые случайные величины. Тогда

$$p_{X_1+X_2}(y) = \int_{\mathbb{R}} p_1(y - t) p_2(t) dt$$

▼

Пусть  $Y = X_1 + X_2$ . Тут видно, что нет биекции, придется руками что-то делать.

$$F_Y(y) = \iint_{x_1+x_2 \leq y} p(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{y-x_1} p(x_1, x_2) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^y p(x_1, u - x_1) du$$

Переменные независимы, так что можно поменять местами интегралы (ещё же по области интегрируем, неважно как)<sup>1</sup> А тогда, убирая внешний интеграл из определения функции распределения, получаем

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t, y - t) dt$$

Поскольку  $X_1, X_2$  независимы, то  $p(t, y - t) = p_1(t) \cdot p_2(y - t)$ . Нумерация никого не интересует, так что

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p_1(y - t) \cdot p_2(t) dt$$

<sup>1</sup>слишком много раз пользовались на физике, так что оставим на 4 семестр

▲

Теперь можно перейти и к содержанию билета

**Утверждение 3.**  $M(\sum_i X_i) = \sum_i M X_i$ . Да и вообще оно линейно.

▼

Пусть  $f(X, Y) = X + Y$

$$\begin{aligned} M(X + Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} y p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \left( \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \right) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y \left( \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \right) dy \\ &= M X + M Y \end{aligned}$$

Покажем, что  $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = p_X(x)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^x \left( \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \right) dy &= F(x, +\infty) = P(X < x, Y < +\infty) \\ &= P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty, x], Y \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}) \\ &= P(X < x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(x) dx \end{aligned}$$

Опять-таки интервал можно сжать как угодно, правда снова проблемы с непрерывностью.

Часть про константу слишком очевидна, не будем её доказывать.

▲

**Утверждение 4** (Дисперсия суммы).  $D(\sum_i X_i) = \sum_i D X_i$

▼

Сначала заметим, что  $D X = M(X - M X)^2$ ,  $M(X - M X) = M X - M X = 0$

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= M(X + Y - M(X + Y))^2 = M((X - M X) + (Y - M Y))^2 \\ &= M(X - M X)^2 + M(Y - M Y)^2 + 2 M(X - M X) M(Y - M Y) \\ &= D X + D Y \end{aligned}$$

▲

**Утверждение 5.** Если  $X, Y$  — независимы, то  $M X Y = M X M Y$

## § 12 Матожидание функции случайной величины

**Определение 1** ( $\tilde{\sim}$ ). Пусть  $f(X)$  — функция от случайной величины. Тогда  $M f(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p(x) dx$ .

В случае чего он многомерный, просто прикидывается. Существует, если есть абсолютная сходимость.

*Замечание.* я ещё подумаю, может это всё же утверждение.

**Утверждение 1.** Матожидание функции линейно

**Утверждение 2.** Если  $X, Y$  — независимы, то  $M f_1(X_1) f_2(X_2) = M f_1(X_1) M f_2(X_2)$

### § 13 Неравенство Шварца

**Утверждение 1.**  $(MXY)^2 \leq M X^2 M Y^2$

▼

$M(X+tY)^2 = t^2 M Y^2 + 2t MXY + M X^2 \geq 0$  из свойств математического ожидания. Ну там и подинтегральная функция положительна. Тогда квадратное уравнение в правой части может иметь не более одного корня.

$$(2 MXY)^2 - 4 M X^2 M Y^2 \leq 0 \Leftrightarrow (MXY)^2 \leq M X^2 M Y^2$$

▲

### § 14 Характеристическая функция суммы случайных величин

**Утверждение 1.** Пусть  $X, Y$  — независимые случайные величины. Тогда

$$\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) \cdot \Phi_Y(t)$$

▼

Из 2.14.1

$$\Phi_{X+Y}(t) = M e^{itX} e^{itY} = M e^{itX} \cdot M e^{itY} = \Phi_X(t) \cdot \Phi_Y(t)$$

▲

**Следствие 1.** Если все величины одинаково распределены, то  $\Phi_{X_1+\dots+X_n}(t) = (\Phi(t))^n$ ,

$$p_{X_1+\dots+X_n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (\Phi(t))^n dt$$

### § 15 Суммирование большого числа случайных величин

:set aflame🔥🌀

**Теорема 1** (ЦПТ Линдберга-Леви-Агекияна 🌀). Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — независимые одинаково распределённые случайные величины. Пусть к тому же  $S_n = X_1, \dots, X_n$ ,  $0 < D X_k < \infty$ . Пусть  $M X_k = a$ ,  $D X_k = \sigma$ . Тогда при  $n \rightarrow \infty$   $Z_n \sim N(0, 1)$ , в вариации из Агекияна  $S_n \sim N(na, n\sigma^2)$

□ Пусть  $M X_k = a$ ,  $D X_k = \sigma^2$ . Рассмотрим характеристическую функцию  $\Phi(t) = M e^{itX_k}$ . Введём замену (которая z-преобразование.):

$$z_n = \frac{S_n - an}{\sigma\sqrt{n}}$$

Давайте ещё немного схитрим и положим  $X_k \leftarrow X_k - a$ . А то потом будет много возни с бедным  $a$ . При этом  $z_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}$  Тогда

$$\Phi_{z_n}(t) = M \left( e^{\frac{itS_n}{\sigma\sqrt{n}}} \right) = \left( \Phi \left( \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) \right)^n$$

А характеристическая функция дифференцируема дважды из существования дисперсии.

$$\Phi'(0) = 0$$

$$\Phi''(0) = -\sigma^2$$

$$\Phi \left( \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) = \Phi(0) + \Phi'(0) \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} + \Phi''(0) \frac{t^2}{2\sigma^2 n} + o \left( \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n} + o \left( \frac{1}{n} \right)$$

А при  $n \rightarrow \infty$

$$\Phi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \Rightarrow e^{-t^2/2}$$

Здесь сходимость есть на любом конечном интервале, но вот про всю прямую этого уже не скажешь. Так что снова поднимается вопрос какой теоремой о непрерывном соответствии пользоваться. Но если ей воспользоваться (тут по-тихому применили обратное преобразование Фурье), то

$$p_{z_n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-s^2 + s^2 - 2its - t^2}{2} = \frac{e^{-s^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left( - \underbrace{\left( \frac{t + is}{\sqrt{2}} \right)}_{\eta} \right)^2 d\eta = \frac{e^{-s^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$F_{Z_n}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-s^2/2} ds$$

Дальше — вариация из Агекяна. Используя утверждение 2.10.2 про замену переменной как раз получаем нормальное распределение. Только тут нужно поменять в процессе  $\sigma$

$$Z_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}$$

$$F_{S_n}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2 n}} du$$

Вернёмся обратно к ненулевому  $a$

$$S_n \leftarrow S_n - na$$

$$F_{S_n} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(u-na)^2}{2\sigma^2 n}} du$$

$$S_n \sim N(na, n\sigma^2)(n \rightarrow \infty)$$

■

## § 16 Центральная предельная теорема

**Теорема 1** (ЦПТ Ляпунова). Пусть  $\{X_k\}$  — независимые случайные величины (тут нет одинаковости распределений!). Введём горю обозначений:

$$S_n = \sum_i x_i$$

$$a_k = M X_k \quad \sigma_k^2 = D X_k \quad \gamma_k = M |X_k - a_k|^3$$

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \quad C_n = \sum_{k=1}^n \gamma_k$$

Тогда

$$\frac{C_N}{B_n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \frac{S_n - A_n}{B_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

*Замечание.* Тут какая-то жесть. Она мало где формулируется и нигде не доказывается. Что-то есть тут:[3], а здесь [1] так другую теорему обозвали

:set aflame

## § 17 Обобщённая теорема Муавра-Лапласа

**Определение 1.** Пусть  $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$  и независимы. Тогда говорят, что случайная величина  $\chi_n^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2$  имеет распределение  $\chi^2$  с  $n$  степенями свободы.

**Утверждение 1.**  $p_{\chi^2}(z) = \frac{1}{2^{n/2} \cdot \Gamma(\frac{n}{2})} z^{n/2-1} e^{-z/2}$

▼

Характеристическая функция  $\chi$  может быть найдена из 1 Найдём сначала характеристическую функцию  $X_k^2$ . Для этого было бы недурно найти плотность соответствующего распределения

$$\begin{aligned} P(y < X^2 < y + dy) &= P(\sqrt{y} < X < \sqrt{y + dy}) + P(-\sqrt{y} > X > -\sqrt{y + dy}) \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{y+dy}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}} \end{aligned}$$

А теперь можно и фурье-образ найти

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{-\eta^2(1-2it)}{2}\right) d\eta = (1-2it)^{-1/2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Вспоминая про коэффициент получим  $\Phi_k(t) = (1-2it)^{-1/2}$ .

$$\Phi_\chi(t) = (\Phi_k(t))^n = (1-2it)^{-n/2}$$

Тогда

$$p_\chi(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (1-2it)^{-n/2} e^{-itz} dt$$

Дальше немного жёсть

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (1-2it)^{-n/2} e^{-itz} dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-l} \left(1 - 2\frac{l}{z}\right)^{-n/2} \frac{1}{iz} dl = 2 \cdot \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2}} \int_0^\infty s^{-n/2} e^{-s} ds \\ &= 2 \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2}} \cdot \Gamma\left(1 - \frac{n}{2}\right) \end{aligned}$$

Из правила отражения для  $\Gamma$ -функции  $\Gamma(1-n/2)\Gamma(n/2) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi n}{2}}$ . А это почти что надо. ✂там надо интеграл поаккуратнее брать.

▲

**Теорема 2** (Обобщённая теорема Муавра-Лапласа). Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — независимые случайные величины с дискретным распределением:

$$X_k: \frac{1}{p_1} \mid \dots \mid \frac{r}{p_r}$$

Рассмотрим  $\nu_k = \#\{1 \leq i \leq n \mid X_i = k\}$ ,  $1 \leq k \leq r$ . Тогда

$$\sum_{k=1}^r \left( \frac{\nu_k - np_k}{\sqrt{np_k}} \right) \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$$

## § 18 Метод моментов

Здесь походу нужно все статистические определения в одном параграфе :set aflame

**Вводные слова** В отличие от теорвера, матстатистике неизвестно распределение случайной величины. И нужно придумать, как его восстановить по конкретной реализации. Пусть  $X$  — та самая величина, про распределение которой очень хочется узнать

Главная героиня матстатистики — выборка

**Определение 1.** Выборка объёма  $n$  —

1.  $n$  независимых случайных величин, распределённых так же, как и  $X$
2. набор чисел  $X_i(\omega)$ ,  $\omega \in \Omega$  — какой-то исход. Ещё называется реализацией выборки.

Собственно, первое определение — это до испытания, а второе — уже после.

**Основные задачи** Пусть  $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta)$ ,  $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$  — множество параметров.

1. Оценивание параметров:

- Точечные оценки:  $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$
- Доверительные интервалы:  $P_\alpha(T_1 < \theta < T_2) = \alpha$

2. Проверка гипотез

Пусть  $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ . А мы хотим узнать чему принадлежит  $\theta$ .

$H_0$ :  $\theta \in \Theta_0$  — основная гипотеза

$H_1$ :  $\theta \in \Theta_1$  — альтернативная гипотеза

**Выборочные характеристики** Выберем реализацию случайной величины (выборку во втором смысле)  $X_1, \dots, X_n$ . Рассмотрим новую случайную величину:

$$\tilde{X}: \begin{array}{c|c|c} X_1 & \cdots & X_n \\ \hline \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{array}$$

Ну а дальше все выборочные характеристики определяются уже для этой случайной величины. Напомним следующее

**Определение 2** (Индикатор).  $I_A(X) = \begin{cases} 1, & X \in A \\ 0, & X \notin A \end{cases}, I(X < x) = \begin{cases} 1, & X < x \\ 0, & X \geq x \end{cases}$

**Определение 3.** Если  $X_1, \dots, X_n$  можно упорядочить, то  $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$  называется вариационным рядом.

### ✂Свойства оценок

### Метод моментов

**Определение 4.** Пусть  $F(x, \theta)$  — семейство распределений,  $m(x) = M g(x)$  — какой-то момент этого распределения. Пусть известно, что  $h(\theta) = m(x)$ . Тогда собственно сам метод состоит в том, чтобы оценить  $\theta$  как решение уравнения выше.

$$\hat{\theta} = h^{-1}(m(x))$$

В случае чего там векторы, но особо не страшно.

**Пример 1.** <+примеры про непрерывные распределения+>

Генеральная совокупность		Выборка	
Матожидание	$M X$	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_k X_k$	Выборочное среднее
Дисперсия	$D X$	$S^2 = \frac{1}{n} \sum_k (X_k - \bar{X})^2$	Выборочная дисперсия
Момент порядка $l$	$M X^l$	$m_l = \frac{1}{n} \sum_k X_k^l$	
Ковариация	$M(X - M X)(Y - M Y)$	$\frac{1}{n} \sum_k (X_k - \bar{X})(Y_k - \bar{Y})$	
Ассиметрия ( $\gamma_3$ )	$M(X - M X)^3 / \sigma^3$	$\frac{1}{n} \sum (X - \bar{X})^3 / S^3$	
Эксцесс ( $\gamma_4$ )	$\frac{M(X - M X)^4}{\sigma^4} - 3$		
Функция распределения		$\frac{1}{n} \sum_k I(X_k < y)$	эмпирическая
Квантиль порядка $p \in (0; 1)$	$\sup\{x \mid F(x) \leq p\}$	$X_{([pn]+1)}$	член вариационного ряда

## § 19 Метод максимального правдоподобия

**Определение 1.** За  $p(x, \theta)$  обозначим плотность функции распределения  $F(x, \theta)$  в точке  $x$  в случае непрерывного распределения и  $P(X = x)$  в случае дискретного.

**Определение 2.** Пусть  $\{X_k\}$  —  $n$  независимых случайных величин. Тогда  $L(\theta) := \prod_{k=1}^n f_{\theta}(X_k)$  — функция правдоподобия. Ещё берут её логарифм.

**Определение 3.** Сам метод состоит в следующем:

$$\hat{\theta}: L(\hat{\theta}) = \max_{\theta} L(\theta)$$

Однако проще искать максимум у  $\ln L(\theta)$ . Так можно в силу монотонности логарифма.

$$(\ln L(\theta))' = \frac{L'(\theta)}{L(\theta)}$$

<+гора примеров+>

## §\* Эффективные оценки

**Утверждение 1** (Неравенство Рао-Крамера). Пусть  $\theta, \hat{\theta}$  — параметр и его оценка,  $b(\theta) = M(\hat{\theta} - \theta)$  — смещение оценки,  $I(\theta)$  — информация Фишера,  $F(x, \theta)$  — параметрическое семейство распределений.

$$I(\theta) = M \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X, \theta) \right)^2,$$

где  $p(X, \theta)$  из определения 2.19.1. Если выполнены условия регулярности

1. Существует  $C \subset \mathbb{R}: \forall \theta \in \Theta P(X_1 \in C) = 1$  и  $\forall y \in C \sqrt{p(X, \theta)} \in C_{\theta}^1(\Theta)$

2.  $I(\theta) \in C_{\theta}(\Theta), I \geq 0$

и  $D \hat{\theta}$  ограничена на любом компакте  $\subset \Theta$ ,  
то

$$M(\hat{\theta} - \theta)^2 \geq \frac{(1 + b'(\theta))^2}{nI(\theta)} + b^2(\theta)$$



*Замечание 1.* Всякая регулярность нужна, чтобы можно было законно записывать производную по параметру по интеграл.

**Определение 4.** Оценка называется эффективной, если для неё неравенство Рао-Крамера обращается в равенство.

## § 20 Лемма Фишера

**Определение 1.** Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — независимые случайные величины с распределением  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Тогда  $\sum_i X_i^2$  имеет распределение  $\chi^2$  с  $n$  степенями свободы. Ещё так обозначается:  $K_n$

**Утверждение 1.** Плотность распределения  $\chi_n^2$  ищется по формуле

$$k_n = \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

**Определение 2.** Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — независимые случайные величины с распределением  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Тогда  $\frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i X_i^2}}$  имеет распределение Стьюдента с  $n$  степенями свободы.

**Утверждение 2.** Плотность распределения  $T_n$  ищется по формуле

$$t_n = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

**Определение 3.** Пусть  $C: V_1 \rightarrow V_1$ . Тогда  $C$  — ортогональный, если  $CC^T = E$

**Следствие 1.**  $\det C = 1$

**Следствие 2.**  $\|Cx\| = \|x\|$

**Утверждение 3.** Оператор ортогональный  $\Leftrightarrow$  строки его матрицы (как векторы линейного пространства наборов чисел) образуют ортонормированный базис.

**Утверждение 4.** Пусть  $\{X_i\} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ,  $C$  — ортогональный линейный оператор. Тогда и  $Y = CX \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

▼

Докажется через утверждение о преобразовании плотности при замене переменных 2.10.2 и следствие 2. Независимость получится просто из того, что вышло нормальное распределение. А  $\sigma$ -у можно сначала засунуть в случайные величины, а потом вытащить обратно.

▲

**Лемма 5 (Фишера).** Пусть  $X_1, \dots, X_n$  независимы и  $X_i \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ . Тогда

1.  $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
2.  $\bar{X}, S^2$  независимы <sup>1</sup>
3.  $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$
4.  $\sqrt{n-1} \frac{\bar{X} - \theta}{S} \sim t_{n-1}$

□

---

<sup>1</sup>Здесь смещённая дисперсия

1. Заменим  $Z_i = \frac{X_i - \theta}{\sigma}$ ,  $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$  Найдем распределение  $\sum_i Z_i = \Sigma$ .

$$\Phi_i(t) = e^{-t^2/2}$$

$$\Phi_{S_n}(t) = \frac{1}{n} \cdot \exp\left(-n \frac{t^2}{2}\right) = \exp\left(-\left(\frac{\sqrt{n} t}{\sqrt{2}}\right)^2\right) \Rightarrow p_{\Sigma}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{n}} \exp\left(-\frac{z^2}{2n}\right)$$

$$\frac{S_n - n\theta}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{n}) \Rightarrow \frac{n}{\sqrt{n}} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

2. Пусть

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix}$$

Первая строка как вектор имеет норму 1. А значит можно вспомнить процесс Грамма-Шмидта и набрать ортонормированный базис. Тогда  $C$  будет ортогональным. Пусть  $Y = CX$ . Из горы утверждений выше мы получим:

$$Y_1 = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}} = \bar{X}\sqrt{n}$$

$$\|Y\| = \|X\| \Rightarrow \sum_i X_i^2 = \sum_i Y_i^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_i X_i^2 - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n Y_i^2$$

А дальше надо честно посчитать  $\text{cov}\left(\frac{Y_1}{\sqrt{n}}, \sum_{i=2}^n Y_i\right)$ . Правда ноль получается. Если что,

$$\text{cov}(X, Y) = M(X - M X)(Y - M Y) = M(XY) - M X M Y$$

$$3. \frac{nS^2}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2 = \chi_{n-1}^2$$

4. Мы там порешили, что  $\theta = 0$ , так что

$$\sqrt{n-1} \frac{\bar{X}}{S} = \frac{Y_1}{\sqrt{\frac{n}{n(n-1)} \sum_{i=2}^n Y_i^2}} = \frac{Y_1}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n Y_i^2}} \sim t_{n-1}$$

■

## § 21 Доверительны интервалы нормального распределения

Здесь собственно перешли к более интересной части — от точечных оценок параметров к построению для доверительных интервалов.

**Определение 1.**  $(T_1, T_2)$  — доверительный интервал уровня  $\gamma$ , если  $P(T_1 < \theta < T_2) = \gamma$

Дальше всюду ведутся рассуждения про доверительные интервалы (уровня  $\gamma$ ) параметров нормального распределения.

**Утверждение 1.** Доверительный интервал для  $\theta$  при известном  $\sigma$  равен  $\left(\bar{X} - \sigma \frac{z_{(1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}; \bar{X} + \sigma \frac{z_{(1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}\right)$

▼

Интервал ищем явно симметричный, так что посчитаем

$$P\left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta|}{\sigma} < z\right)$$

Поскольку величина внутри подчиняется стандартному нормальному распределению,

$$P\left(-z < \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \theta)}{\sigma} < z\right) = F_n(z) - F_n(-z) = 2F_n(z) - 1 = \gamma$$

По дороге сделали замену переменной, не пугайтесь. А дальше  $z = F_n^{-1}(\frac{1+\gamma}{2})$ , что как раз соответствует определению  $\frac{1+\gamma}{2}$  квантили. Ну а дальше всё уже очевидно из преобразования неравенства выше. Мы умеем это делать, можно порассматривать  $\{\omega \mid X(\omega) \cdots\}$  как уже делали раньше.

▲

**Утверждение 2.** Доверительный интервал для  $\theta$  при неизвестном  $\sigma$  равен  $\left(\bar{X} - S \frac{t_{n-1, (1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}; \bar{X} + S \frac{t_{n-1, (1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}\right)$ .

▼

аналогично 2.21.4, только пользуемся 4 пунктом леммы Фишера 2.20.5.

▲

**Утверждение 3.** Доверительный интервал для  $\sigma^2$  при неизвестном  $\theta$  равен  $\left(\frac{nS^2}{v^2}; \frac{nS^2}{u}\right)$ .

Чиселки  $u, v$  определяются с помощью  $\chi^2$ .

**Утверждение 4.** Доверительный интервал для  $\sigma^2$  при неизвестном  $\theta$  нормально не выражается. Проще численно.

$$1. \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

$$2. \frac{n(\bar{X} - \theta)^2}{\sigma^2} \sim \chi_1^2$$

## § 22 Проверка гипотез по параметрам нормального распределения

Будем рассматривать здесь простую гипотезу:

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

1. Пусть  $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ ,  $\sigma^2$  известно. Примем  $H_0: \theta = \theta_0$ . Но тогда

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta_0}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

из 1 пункта леммы Фишера (2.20.5).

Рассмотрим  $\alpha$  — уровень значимости — какое-нибудь маленькое число. Часто берут 0.05.

$$P\left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma} > z\right) = \alpha \Leftrightarrow \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma} > z_{1-\alpha/2}$$

Таким образом можно найти границы критической области.

Если  $H_0$  верна, то  $P\left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta|}{\sigma} > z_{1-\alpha/2}\right)$  мала. Можно выбрать, меньше чего мы хотим её сделать, и объявить сие критерием проверки. Собственно, так и делали на практике.

2.  $\sigma^2$  неизвестна. Здесь всё то же самое, только с распределением Стюдента.

А здесь такую

$$\begin{aligned} H_0: \theta_1 &= \theta_2 \\ H_1: \theta_1 &\neq \theta_2 \end{aligned}$$

Будем считать, что  $X_i, Y_i$  независимы, и нормально распределены:

$$\begin{aligned} X_1, \dots, X_{n_1} &\sim \mathcal{N}(\theta_1, \sigma_1^2) \\ Y_1, \dots, Y_{n_2} &\sim \mathcal{N}(\theta_2, \sigma_2^2) \end{aligned}$$

1.  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  — известны.

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

2.  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ , но не известны

$$\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}} \sim S_{n_1 + n_2 - 2}$$

Это как раз тот самый **t-тест**

3.  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  неизвестны. Тут вообще ничего не понятно. (Проблемы Беренса-Фишера)

## § 23 Линейная регрессия

**Определение 1.** Ковариационная матрица случайных векторов  $X, Y$  — матрица ковариаций их компонент

$$\text{cov}(X, Y)_{ij} = \text{cov}(X_i, Y_j) = \text{M}(X - \text{M} X)(Y - \text{M} Y)^T$$

**Определение 2.**  $\text{cov} X = \text{cov}(X, X)$

**Определение 3** (Эффективность оценок). Оценка параметра  $\hat{\theta}_1$  эффективнее оценки  $\hat{\theta}_2$ , если матрица  $\text{cov} \hat{\theta}_1 - \text{cov} \hat{\theta}_2$  отрицательно определена.

**Определение 4** (Регрессия). Пусть  $Y, X_1, \dots, X_m$  — случайные векторы. Тогда если определено уравнение  $y(x_1, \dots, x_m) = \text{M}(Y \mid X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m)$ , то  $y$  называется регрессией  $Y$  по  $X_1, \dots, X_m$ .

**Определение 5** (Линейная регрессия). Пусть  $Y, X_1, \dots, X_m$  — случайные векторы. Тогда если определено уравнение  $y(x) = \text{M}(Y \mid X_i = x_i \forall i)$ , и  $y(x) = x \cdot \theta + \varepsilon$  то  $y$  называется линейной регрессией  $Y$  по  $X$ .

Здесь  $x$  — матрица  $n \times m$ ,  $\theta \in R^m$ ,  $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}^n$

*Замечание 1.* Можно с тем же успехом написать  $y(X)$

**Определение 6.**  $Y$  называется откликом,  $X$  — регрессоры (предикторы),  $\varepsilon$  — шум,  $\theta$  — параметры.

Основной метод поиска оптимальных параметров — по функции максимального правдоподобия. Если не сильно расписывать, то это выльется в  $\arg \min_{\theta} (Y - X\theta)(Y - X\theta)^T$

При этом нужны условия из следующего билета

# Глава 3: Случайные процессы

## Глава А: Обозначения

$\Omega$  — пространство элементарных исходов

$\omega$  — элемент пространства элементарных исходов

$\mathcal{A}$  — алгебра множеств

$\mathcal{F}$  —  $\sigma$ -алгебра множеств (случайные события)

$P$  — вероятность

$p(x_1, \dots, x_n)$  — плотность вероятности

$X(\omega), Y(\omega), \xi(\omega)$  — случайная величина

$F_X(x_1, \dots, x_n)$  — функция распределения случайной величины  $X$

$\Phi_X(t)$  — характеристическая функция случайной величины  $X$ .

---

✂ — ещё правится. Впрочем, относится почти ко всему.

□...■ — начало и конец доказательства теоремы

▼...▲ — начало и конец доказательства более мелкого утверждения

⋈ — кривоватая формулировка

:set aflame — набирающему зело не нравится билет

<+что-то+> — тут будет что-то, но попозже

## Литература

[1] Чернова Н.И. Теория вероятностей.

[2] Ширяев А.Н. *Вероятность*. М.: Наука, 1980.

[3] Пономаренко Л.С. Прохоров Ю.В. *Лекции по теории вероятности и математической статистике*. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Московского университета, 2012.