

1. $\mathbf{r}: \mathbf{r}(t), (x, y, z)(t), \mathbf{r}(s).$

$\dot{\mathbf{r}}: \dot{\mathbf{r}}(t), (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})(t), \boldsymbol{\tau} \dot{s}.$

$\ddot{\mathbf{r}}: \ddot{\mathbf{r}}(t), (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})(t), \ddot{s} \boldsymbol{\tau} + \dot{s}^2 k_1 \mathbf{n}$

2. В криволинейных координатах

$$\triangleright \mathbf{e}^k \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{kj}, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_i a^i b_i$$

$$\triangleright \xi_k = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_k = \sum_j \xi_j^j g_{jk},$$

$$\xi^k = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}^k = \sum_j \xi_j g^{jk}$$

$$\triangleright \mathbf{e}^k = \sum_j g^{jk} \mathbf{e}_j, \mathbf{e}^k = \sum_j g^{jk} \mathbf{e}^j$$

$$\triangleright \sum_i g^{il} g_{ik} = \delta_{lk}$$

3. Скорость и ускорение

$$\triangleright \mathbf{v} = \sum_k \dot{q}^k \mathbf{e}_k$$

$$\triangleright \mathbf{w} = \sum_k \ddot{q}^k \mathbf{e}_k + \sum_{k,i} \dot{q}^k \dot{q}^i \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i}$$

$$\triangleright w^j = \ddot{q}^j + \sum_{k,i} \dot{q}^k \dot{q}^i \Gamma_{ki}^j$$

$$\triangleright \Gamma_{j,ki} = \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i} \cdot \mathbf{e}_j - \text{I рода}$$

$$\triangleright \Gamma_{ki}^j = \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i} \cdot \mathbf{e}^j - \text{II рода}$$

$$\triangleright w_\ell = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}^\ell} \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}^2}{2} \right) \right) - \frac{d}{dq^\ell} \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}^2}{2} \right)$$


4. Про углы Эйлера

$$\triangleright \boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{i}'_3 + \dot{\theta} \mathbf{i}''_1 + \dot{\varphi} \mathbf{i}_3$$

$$\triangleright \mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0(t) + \mathbf{r}(t)$$

$$\triangleright \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} + \mathbf{v}_r$$

$$\triangleright \mathbf{w} = \mathbf{w}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r + \mathbf{w}_r$$



5. Динамика точки и систем точек

$$\triangleright \mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(t, \{c_\ell\}), k \in 1 \dots N, \ell \in 1 \dots 6N$$

$$\triangleright m_k \ddot{\mathbf{r}}_k = \mathbf{F}_k, m w_\ell = Q_\ell$$

$$\triangleright \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^\ell} \right) - \frac{dT}{dq^\ell} = Q_\ell$$

$$\triangleright \mathbf{r}_c = \frac{\sum_k m_k \mathbf{r}_k}{\sum_k m_k}, \sum_k m_k = M$$

6. Закон сохранения импульса

$$\triangleright \mathbf{p} = \sum_k \mathbf{p}_k, \mathbf{p}_k = m_k \mathbf{v}_k$$

$$\triangleright \mathbf{F} = \sum_k \left(\mathbf{F}_k^{(e)} + \mathbf{F}_k^{(i)} \right)$$

$$\triangleright \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum_k \mathbf{F}_k^{(e)}. \text{ Все силы взаимодействия вымерли.}$$

7. Момент импульса

$$\triangleright \mathbf{l} = \sum_k \mathbf{l}_k, \mathbf{l}_k = \mathbf{r}_k \times \mathbf{p}_k$$

$$\triangleright \mathbf{L} = \sum_k \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_k^{(e)} + \sum_k \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_k^{(i)}$$

$$\triangleright \mathbf{F}_{kj}^{(i)} = \lambda(r_{kj}) \mathbf{r}_{kj} \Rightarrow \frac{d\mathbf{l}}{dt} = \sum_k \mathbf{L}_k^{(e)}.$$

8. Энергия

$$\triangleright T = \sum_k T_k, T_k = \frac{m_k (\mathbf{v}_k \cdot \mathbf{v}_k)}{2}$$

$$\triangleright \delta A_k = \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{r}_k, A = \int_\Gamma \delta A, \text{ а вообще-т интеграл от формы.}$$

$$\triangleright dT = \delta A_k^{(e)} + \delta A_k^{(i)}$$

$$\triangleright dE = d \left(T + \Pi^{(e)} + \Pi^{(i)} \right) = \delta A_{\text{не пот}}$$

9. В поле центральной силы

$$\triangleright u = 1/\rho.$$

Формулы Бине

$$\begin{cases} v^2 = c^2 \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right) \\ w_\rho = -c^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \end{cases}$$

Невыразимая жжесь

10. $\langle ? \rangle \langle : \text{set aflame} \rangle$ Движение твёрдого тела

$\triangleright \boldsymbol{\omega} = 0$ — поступательное

$\triangleright \mathbf{v}_0, \mathbf{w}_0 = 0, \boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{i}_3$ — вращение вокруг неподвижной оси

$\triangleright \mathbf{v}_0 \uparrow \boldsymbol{\omega}$ — винт

\triangleright Как попало вокруг неподвижной точки

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} = & \mathbf{i}_1 (\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi) + \\ & + \mathbf{i}_2 (\dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi) + \\ & + \mathbf{i}_3 (\dot{\psi} \cos \varphi + \dot{\varphi}) \end{aligned}$$

11. Скорость и ускорение точек твердого тела

$$\triangleright \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

$$\triangleright \mathbf{w} = \mathbf{w}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

12. Сложение движений ТТ

$$\triangleright \mathbf{v}_{r_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\mathbf{v}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \overrightarrow{O_k O} \right) + \sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{r}_0,$$

$$O_0 = O.$$

$$\triangleright \mathbf{V} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\mathbf{v}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \overrightarrow{O_k O} \right)$$

$$\triangleright \boldsymbol{\Omega} = \sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{\omega}_k \Rightarrow \mathbf{v}_{r_n} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_0$$

13. Кинематический винт

$$\triangleright \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = 0$$

14. Плоское движение

$$\triangleright 0 = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_c$$

$$\triangleright \mathbf{r}_* = \left(-\frac{v_{0y}}{\omega}, \frac{v_{0x}}{\omega} \right) \text{ — подвижная центроида}$$

$\triangleright \mathbf{r}'_* = \mathbf{r}_* + \mathbf{r}_0$ — неподвижная центроида

$$\triangleright \boldsymbol{\omega} = \frac{|\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A|}{|\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A|}$$

$$\triangleright \boldsymbol{\omega} = \frac{|\mathbf{v}_a \times \mathbf{r}_{A*}|}{r_{A*}^2} \text{ и то же с } B.$$

\triangleright центр ускорений: $\langle ? \rangle$

15. Динамика вращения ТТ

$$\triangleright M = \int_\tau 1 d\mu(r), \mathbf{r}_c = \frac{\int_\tau \mathbf{r} d\mu(r)}{\int_\tau 1 d\mu(r)}$$

$$\triangleright \mathbf{l} = \int_\tau (\mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})) d\mu, \mathbf{l}' = \int_\tau (\mathbf{R} \times \mathbf{v}) d\mu$$

$$\triangleright \mathbf{l}' = \mathbf{R}_0 \times \mathbf{v}_0 M + \mathbf{r}_c \times \mathbf{v}_0 M + \mathbf{R}_0 \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_c) M + \mathbf{l}$$

$$\triangleright T = \frac{1}{2} \int_\tau (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 d\mu, T' = \frac{1}{2} \int_\tau \mathbf{v}^2 d\mu$$

$$\triangleright T' = T + \frac{1}{2} M v_0^2 + M \mathbf{v}_0 \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_c)$$

$$\triangleright \ell_\omega = \omega J_\omega$$

$$\triangleright \mathbf{l} = \hat{J} \boldsymbol{\omega} = \sum_{j,k} J_{jk} \omega_k \mathbf{i}_j,$$

$$J_{ik} = \int_\tau (r^2 \delta_{ik} - x_j x_k) d\mu$$

$$\triangleright T = \frac{J_\omega \omega^2}{2} = \frac{\hat{J} \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\omega}}{2}$$

$$\triangleright L = \frac{d\ell}{dt}$$

\triangleright Динамические уравнения Эйлера

$$L_a = J_a \dot{\omega}_a + (J_c - J_b) \omega_c \omega_b$$

$$L_b = J_b \dot{\omega}_b + (J_a - J_c) \omega_a \omega_c$$

$$L_c = J_c \dot{\omega}_c + (J_b - J_a) \omega_b \omega_a$$

\triangleright Кинематические уравнения Эйлера

$$\omega_a = (\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi)$$

$$\omega_b = (\dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi)$$


$$\omega_c = (\dot{\psi} \cos \varphi + \dot{\varphi})$$

16. Вращение вокруг неподвижной оси

$$\begin{aligned} \triangleright m \frac{d\mathbf{v}_c}{dt} &= \mathbf{F} + \mathbf{N}_A + \mathbf{N}_B, \quad \mathbf{v}_c = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_c, \Rightarrow \\ m(-\ddot{\varphi} x_{c_2} + (\dot{\varphi})^2 x_{c_1}) &= F_1 + N_{A_1} + N_{B_1} \\ m(\ddot{\varphi} x_{c_1} - (\dot{\varphi})^2 x_{c_2}) &= F_2 + N_{A_2} + N_{B_2} \\ 0 &= F_3 + N_{A_3} + N_{B_3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{d\mathbf{L}}{dt} &= \mathbf{L} + (\mathbf{r}_A \times \mathbf{N}_A) + (\mathbf{r}_B \times \mathbf{N}_B) \Rightarrow \\ J_{13}\ddot{\varphi} - J_{23}(\dot{\varphi})^2 &= L_1 - r_A N_{A_2} + r_B N_{B_2} \\ J_{23}\ddot{\varphi} + J_{13}(\dot{\varphi})^2 &= L_2 + r_A N_{A_1} - r_B N_{B_1} \\ J_{33}\ddot{\varphi} &= L_3 \end{aligned}$$

17. $L = 0$



18. Сила всего одна и приложена к центру масс





Рис. 10. Волчок.



19. Связи

$$\begin{aligned} \triangleright \varphi(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) &\geq 0 \text{ (или } = 0) \\ \triangleright \varphi(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) = 0 &\Leftrightarrow f(t, \mathbf{r}) = 0 \text{ — голоном-} \\ &\text{ные} \\ \triangleright \mathbf{R}_i &= \Lambda_i \nabla' \varphi_i + \mathbf{T}_i, \quad \Lambda_i = - \frac{m \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} + m \nabla \varphi_i \mathbf{v} + \nabla' \varphi_i \mathbf{F}}{|\nabla' \varphi_i|^2} \end{aligned}$$

20. По поверхности

$$\begin{aligned} \triangleright m\mathbf{w} &= \mathbf{F} + \Lambda \nabla f + \mathbf{T} \\ \triangleright \mathbf{T} &= -kN\boldsymbol{\tau} \\ \triangleright \mathbf{F} = 0, \quad v^2 &= v_0^2 e^{-\alpha(s)} \end{aligned}$$

21. По кривой

$$\begin{aligned} \triangleright m\mathbf{w} &= \mathbf{F} + \Lambda_1 \nabla f_1 + \Lambda_2 \nabla f_2 + \mathbf{T} \\ \triangleright \mathbf{T} &= -kN\boldsymbol{\tau} \\ \triangleright &\text{катится мир к упадку} \end{aligned}$$

22. Принцип Даламбера-Лагранжа:
Суммарная работа сил инерции и активных сил по виртуальным перемещениям равна нулю:
 $(M\ddot{\mathbf{y}} - \mathbf{Y}) \cdot \delta \mathbf{y} = 0$

23. При варьировании с фиксированными

$$\begin{aligned} \text{концами} \quad &\begin{pmatrix} \delta t_1 = \delta t_0 = 0, & \delta q^\ell|_{t_1} = 0 \\ & \delta q^\ell|_{t_2} = 0 \end{pmatrix} \\ \delta S = 0 &\Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0 \end{aligned}$$

24. Интегральный принцип Лагранжа:

$$\begin{aligned} \triangleright \delta W &= \delta \int_{t_0}^{t_1} 2T, \quad T = \frac{M}{2} \sum_{j,k} g_{ij} \dot{q}^j \dot{q}^k \\ \triangleright \delta q_0^\ell &= \delta q_1^\ell = 0 \Rightarrow \Delta q|_{t_1} = \Delta q|_{t_0}, \\ &\Delta q^\ell = \delta q^\ell + \dot{q}^\ell \delta t \text{ (полная вариация)} \\ \triangleright &\text{Лишь при этом условии работает} \\ &\text{принцип выше} \end{aligned}$$

$$25. \frac{\partial S}{\partial t} + H \left(q^\ell, \frac{\partial S}{\partial q^\ell}, t \right) = 0$$

$$26. \begin{cases} \dot{q}^k = \frac{\partial H}{\partial p_k} \\ \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q^k} + Q_k \end{cases}$$

27. Теорема Якоби

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial t} + H \left(q^\ell, \frac{\partial S}{\partial q^\ell}, t \right) = 0, \\ \det \left(\frac{\partial^2 S}{\partial q^i \partial a^p} \right) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}^k = \frac{\partial H}{\partial p_k} \\ \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q^k} \end{cases} \\ p_\ell = \frac{\partial S}{\partial q^\ell}, \quad b_k = \frac{\partial S}{\partial a^k} \\ a_k, b_k - \text{const} \end{cases}$$

28. Инварианты

$$\begin{aligned} \triangleright \Phi. \text{ объём: } \int_M \rho d\Omega, \quad d\Omega &= \left(\prod_i \right) dq^i dp_i \\ \triangleright \text{Пуанкаре: } \oint_C p_k dq^k & \\ \triangleright \text{Пуанкаре-Картане: } \oint_C p_k dq^k - H dt & \end{aligned}$$

Здесь

M — сечение фазовой трубки,
 C — охватывающий её контур.

29. Канонические преобразования

Когда нету зависимости от времени

$$\begin{aligned} \triangleright p_k &= p_k(\tilde{p}, \tilde{q}), \quad q^k = q^k(\tilde{p}, \tilde{q}), \\ \tilde{H}(t, \tilde{p}, \tilde{q}) &= H(t, p(\tilde{p}, \tilde{q}), q(\tilde{p}, \tilde{q})) \end{aligned}$$

Когда есть порождающая функция V .

$$\begin{aligned} 0^* \quad \tilde{L} &= L + \frac{dV}{dt} \\ 1^* \quad V_1(t, q, \tilde{q}) &= V \\ 2^* \quad V_2(t, p, \tilde{q}) &= V + \sum_k p_k q^k \\ 3^* \quad V_3(t, \tilde{p}, q) &= V - \sum_k \tilde{p}_k \tilde{q}^k \\ 4^* \quad V_4(t, p, \tilde{p}) &= V + \sum_k p_k q^k - \sum_k \tilde{p}_k \tilde{q}^k \end{aligned}$$

При этом

$$\begin{aligned} \langle 1 \rangle \quad \tilde{p}_k &= + \frac{\partial V_1}{\partial \tilde{q}^k}, \quad p_k = + \frac{\partial V_1}{\partial q^k}, \quad \tilde{H} = H - \frac{\partial V_1}{\partial t} \\ \langle 2 \rangle \quad \tilde{p}_k &= + \frac{\partial V_2}{\partial \tilde{q}^k}, \quad q^k = - \frac{\partial V_2}{\partial p_k}, \quad \tilde{H} = H - \frac{\partial V_2}{\partial t} \\ \langle 3 \rangle \quad \tilde{q}^k &= - \frac{\partial V_3}{\partial \tilde{p}_k}, \quad p_k = - \frac{\partial V_3}{\partial q^k}, \quad \tilde{H} = H - \frac{\partial V_3}{\partial t} \\ \langle 4 \rangle \quad \tilde{q}^k &= - \frac{\partial V_4}{\partial \tilde{p}_k}, \quad q^k = + \frac{\partial V_4}{\partial p_k}, \quad \tilde{H} = H - \frac{\partial V_4}{\partial t} \end{aligned}$$

Выглядит не очень, но бывают вещи и похуже

Заметки

¹У нас тут вроде косяк, а дальше снова как здесь $\langle \sim \rangle$
²Здесь по-хорошему надо меру на многообразии вводить
³Здесь вообще градиенты, но жирная набла выглядит некрасиво: $\nabla \varphi$