

ТЕОРЕМ
МАТСТАТИСТИКА
и тщетные попытки понять что-нибудь из
вышеперечисленного

Лектор: Р. С. Пусев
Записал :taxus

17 января 2017 г.

Оглавление

1	Элементарная теория вероятностей	2
§ 1	Аксиоматическое определение вероятности	2
§ 2	Формула полной вероятности	3
§ 3	Теорема Байеса	3
§ 4	Независимые события	4
§ 5	Случайные величины и их распределения	4
§ 6	Моменты случайных величин	5
§ 7	Характеристическая функция	6
§ 8	Теорема Муавра-Лапласа	7
2	Матстатистика	7
§ 9	Случайные векторы	7
§ 10	Функция от случайного вектора	8
§ 11	Матожидание и дисперсия суммы случайных величин	9
§ 12	Матожидание функции случайной величины	11
§ 13	Неравенство Шварца	11
§ 14	Характеристическая функция суммы случайных величин	11
§ 15	Суммирование большого числа случайных величин	12
§ 16	Центральная предельная теорема	13
§ 17	Обобщённая теорема Муавра-Лапласа	13
§ 18	Метод моментов	14
§ 19	Метод максимального правдоподобия	15
§ 20	Лемма Фишера	17
§ 21	Доверительны интервалы нормального распределения	19
§ 22	Проверка гипотез по параметрам нормального распределения	20
§ 23	Линейная регрессия	21
§ 24	Теорема Гаусса-Маркова	22
§ 25	Оценка дисперсии погрешностей	22
3	Случайные процессы	22
А	Обозначения	23
	Литература	23

Глава 1: Элементарная теория вероятностей

§ 1 Аксиоматическое определение вероятности

Определение 1 (σ -алгебра). Алгеброй \mathcal{A} подмножеств множества Ω называется такой набор его подмножеств с заданными операциями объединения, пересечения и дополнения множеств, что

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. $X \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{X} \in \mathcal{A}$
3. $X_1, X_2 \in \mathcal{A} \Rightarrow X_1 \cup X_2 \in \mathcal{A}$

Сигма-алгеброй подмножеств называется всё тоже самое, только можно объединять счётное число подмножеств.

Определение 2 (Вероятностное пространство). Рассмотрим упорядоченную тройку (Ω, \mathcal{F}, P) , где

Ω — Множество (элементарных исходов). Чисел, например.

\mathcal{F} — σ — алгебра подмножеств Ω

P — Собственно, вероятность

Определение 3 (Вероятность). $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что

1. $\forall A \in \mathcal{F} \quad P(A) \geq 0$
2. $\forall \{A_i\}: A_i \cap A_j = \emptyset \quad P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$
3. $P(\Omega) = 1$

Как видно, сильно похоже на площадь. Что впрочем неслучайно, вероятность — нормированная мера. Последнее условие как раз и означает нормированность.

Определение 4 (Тривиальные события). \emptyset, Ω .

Утверждение 1. *Свойства вероятности:*

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $0 \leq P(A) \leq 1$
3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

А это очень важное и будет в отдельном утверждении.

Утверждение 2 (Непрерывность меры). Пусть $A_1 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$, $\bigcup_i A_i = A$. Тогда $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.



Пусть

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Тогда

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i; \quad A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

Следовательно,

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Всё работает, потому что в σ -алгебре можно объединять счётное число множеств.



§ 2 Формула полной вероятности

Определение 1 (Условная вероятность). Пусть $A, B \in \mathcal{F}$, $P(A) > 0$ ¹. Тогда

$$P(B \mid A) := \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Утверждение 1. Пусть $\{A_i, H\} \subset \mathcal{F}$ и

1. $P(A_i) > 0$
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$
3. $\bigcup_i A_i = \Omega$

(полная группа/система событий). Тогда

$$P(H) = \sum_i P(A_i) \cdot P(H \mid A_i)$$

§ 3 Теорема Байеса

Теорема 1. Пусть A_i — полная система событий, $H \in \mathcal{F}$: $P(H) > 0$. Тогда

$$P(A_k \mid H) = \frac{P(A_k) \cdot P(H \mid A_k)}{\sum_i P(A_i) \cdot P(H \mid A_i)}$$

¹ну мы же делим, надо убедиться что ненуль

§ 4 Независимые события

Определение 1. Пусть $A, B \in \mathcal{F}$. Они называются независимыми, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Утверждение 1. События A, B независимы $\Leftrightarrow P(A | B) = P(A) \vee P(B | A) = P(B)$ (в зависимости от того, что определено, вдруг там ноль где-нибудь).

Утверждение 2. Если A, B несовместны, то нетривиальные A, B — зависимы.


Определение 2. Случайные величины $\{X_i\}$ попарно независимы, если

$$\forall i, j \quad P(X_i \cap X_j) = P(X_i) \cdot P(X_j)$$

Определение 3. Случайные величины $\{X_i\}_{i=1}^n$ независимы по совокупности, если

$$\forall \{i_k \mid i_k, k \in (\mathbb{Z} \cap [1; n])\} \quad P\left(\bigcap_{i_k} X_{i_k}\right) = \prod_{i_k} P(X_{i_k})$$

Замечание 1. Определения 1.4.3 и 1.4.3 правда разные. Конечно попарная независимость следует из независимости по совокупности, но обратное неверно.



Пример 1. Тетраэдр Бернштейна: . Здесь вероятность выпадения всех 3 цветов — $1/4$, а через попарные — $1/8$

§ 5 Случайные величины и их распределения

Определение 1 (Случайная величина). Случайной величиной назовём произвольное хорошее отображение $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Тут нужно бы сказать про измеримость, это потребуется, чтобы говорить о вероятности попадания в интервал на прямой. Так что

$$X: (X^{-1}(B) = \{\omega \mid X(\omega) \in B\}) \in \mathcal{F},$$

где B — борелевское множество

Определение 2. Пусть $B \subset \mathbb{R}$, B — промежуток, или дополнение в нему (борелевское множество).¹

$$P(X \in B) = P(\{\omega \mid X(\omega) \in B\})$$

Определение 3. Случайная величина называется дискретной, если

$$\exists (\{a_i\} \sim \mathbb{N}): \left(\sum_i P(X = a_i) = 1 \right)$$

то есть

$$P(X \in B) = \sum_{\{i \mid a_i \in B\}} p_i, \quad p_i = P(X = a_i)$$

¹тут вроде концы могут входить, так что точка — тоже борелевское множество.

Определение 4. Случайная величина называется непрерывной, если

$$\exists (f_X: B \rightarrow \mathbb{R}): \left(P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx \right)$$

Определение 5 (Распределение случайной величины). $F(B) = P(X \in B)$

Пример 1 (К непрерывному распределению). Пусть $X(\omega) = \omega$, $B = (0, 1)$, $\Omega = (-1; 1)$. Выберем $f_X \equiv \frac{1}{2}$.

$$F(B) = P(X \in B) = P(\{\omega \mid \omega \in (0, 1)\}) = P((0, 1)) = \frac{1-0}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$F(B) = \int_{(0,1)} \frac{1}{2} dx = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$

Это всё верно, потому что на множестве интервалов вероятность — нормированная длина интервала.

Определение 6 (Функция распределения).

$$F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]: F_X(x) = P(X < x) = P(\{\omega \mid X(\omega) < x\})$$

Утверждение 1. Про $F(x)$ верно следующее:

1. $F \uparrow \mathbb{R}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = F(x_0)$

Утверждение 2. Верно и обратное: если существует функция с указанными свойствами, под неё найдётся случайная величина.

Замечание. Если рассматривать обобщённые функции, то любое распределение запишется как

$$\int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

§ 6 Моменты случайных величин

Определение 1. Пусть X — случайная величина,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$$

Тогда

$$\langle x \rangle \equiv \bar{x} \equiv M X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Утверждение 1. Свойства матожидания:

1. $M < \infty$

2. $M(aX + bY) = aMX + bMY$

3. $P(X \geq 0) = 1 \Rightarrow MX \geq 0$

4.
$$\begin{cases} P(X \geq 0) = 1 \\ MX = 0 \end{cases} \Rightarrow P(X = 0) = 1$$

5. если X, Y — независимы, то $M(XY) = MX \cdot MY$

Определение 2. Момент k -ого порядка относительно начала a :

$$\lambda_{k,a} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^k f(x) dx$$

(если есть абсолютная сходимость)

Определение 3. Начальный момент: $\nu_k = \lambda_{k,0}$

Определение 4. Центральный момент: $\mu_k = \lambda_{k,\bar{x}}$

Утверждение 2.
$$\nu_k = \sum_{i=0}^k C_k^i a^i \lambda_{k-i,a}$$

Определение 5 (Дисперсия). $DX = M(X - MX)^2$, $\sigma = \sqrt{DX}$ — среднее квадратичное отклонение.

Утверждение 3.

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY$$

если X, Y — независимы, то $D(XY) = DX \cdot DY$

$$D(X + C) = DX$$

§ 7 Характеристическая функция

Определение 1 (Характеристическая функция). $\Phi(t) = Me^{itx}$

Утверждение 1. Свойства характеристической функции:

1. Всегда существует и $|\Phi(t)| \leq 1$.

2.
$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \Phi(t) dt$$

3. $\Phi_{a+Xb}(t) = e^{ita} \Phi_X(tb)$

4. Если X, Y — независимы, то $\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) \Phi_Y(t)$

5. Если $M|X|^n < \infty$, то $\Phi^{(k)}(0) = i^k MX^k$

Определение 2 (Сходимость по распределению). $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow F_n(x) \rightarrow F(x)$

Теорема 2 (О непрерывном соответствии). $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \Phi_{X_n}(t) \xrightarrow[t]{} \Phi_X(t)$. Здесь на самом деле всё сложно. В разных книжках пишут равномерную сходимость на разных интервалах. У нас вроде было на всей вещественной прямой, но тогда это слишком сильное утверждение. К слову так же в [1] и [2]. А вот в [3] требуют только сходимости в каждом конечном интервале. Можно взять экспоненту, и понять, что эти условия разные.

Глава 2: Матстатистика

§ 9 Случайные векторы

Определение 1 (Случайный вектор). Случайным вектором назовём произвольное хорошее отображение $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. См. примечание про измеримость в § 5. Борелевские множества можно рассматривать и в \mathbb{R}^n , как наименьшую сигма-алгебру, содержащую все полуоткрытые параллелепипеды.

Так же можно считать, что случайный вектор — набор случайных величин.

Определение 2 (Функция распределения).

$$F_X: \mathbb{R}^n \rightarrow [0; 1]: F_X(x) = P(X^1 < x^1, \dots, X^n < x^n)$$

То есть вероятность попадания в параллелепипед, уходящий в бесконечность.

Замечание 1. Тут как раз используется, что борелевские множества «прямоугольные».

Утверждение 1. Про $F(x)$ верно следующее:

1. F не убывает по каждому аргументу.
2. $\lim_{x_i \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = F(x_0)$ (по совокупности переменных). Это просто следует из непрерывности меры.

тоже важно, так что отдельно

Утверждение 2. Пусть $a^1 < b^1, \dots, a^n < b^n$, тогда работает формула включений и исключений

$$F(b^1, \dots, b^n) - \sum_i F(b^1, \dots, a^i, \dots, b^n) + \dots + F(a^1, \dots, a^n) = P(x \in [a^1, b^1) \times \dots \times [a^n, b^n))$$

По сути следствие формулки про вероятность объединения.

Определение 3. Векторная случайная величина называется дискретной, если

$$\exists (\{a_i \mid a_i \in \mathbb{R}^n\} \sim \mathbb{N}): \left(\sum_i P(X = a_i) = 1 \right)$$

то есть

$$P(X \in B) = \sum_{\{i \mid a_i \in B\}} p_i, \quad p_i = P(X = a_i)$$

Определение 4. Векторная случайная величина называется непрерывной, если

$$\exists (f_X: B \rightarrow \mathbb{R}): \left(P(X \in B) = \int_B f_X(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n \right)$$

Замечание 1. Для функций распределения:

$$F(x^1, \dots, x^n) = \int_{-\infty}^{x^n} \cdots \int_{-\infty}^{x^1} f_X(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n$$

Утверждение 3. Пусть X, Y — независимы. Тогда $p_{X+Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

▼

По определению функции распределения

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy$$

Из независимости X, Y

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= P(X < x, Y < y) = P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty; x] \cap \omega \mid Y(\omega) \in (-\infty; y]) \\ &= P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty; x]) \cdot P(\omega \mid Y(\omega) \in (-\infty; y]) \\ &= P(X < x) \cdot P(Y < y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \end{aligned}$$

А тогда из независимости подынтегральных функций

$$F_X(x) \cdot F_Y(y) = \int_{-\infty}^x p_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^y p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p_X(x) \cdot p_Y(y) dx dy$$

А дальше можно заметить, что нам неважно по какому множеству интегрировать.

$$\int_B (p(x, y) - p_X(x) \cdot p_Y(y)) dx dy = 0$$

Здесь правда всё ломается на отсутствии непрерывности у p . Но если она есть, то дальше стандартное рассуждение в окрестности точки где не 0.

▲

§ 10 Функция от случайного вектора

Определение 1 (Функция от случайного вектора). $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Здесь нужно снова говорить про измеримость g — прообраз борелевского множества должен быть борелевским множеством. Иначе $g(X)$ может не получиться случайной величиной. Но всякие мерзкие отображения всё равно никому не нужны ☺.

Утверждение 1. Пусть X — дискретная случайная величина, f — обратима, $Y = g(X)$, $b_j = f(a_j)$. Тогда $P(Y^i = b_j^i) = P(X^i = a_j^i)$.

▼

$$P(Y^i = b_j^i) = P(f(X^i) = f(a_j^i)) = P(\omega \mid f(X^i(\omega)) = f(a_j^i))$$

Поскольку f — обратима, она биективна. Значит $f(X) = f(a_j) \Leftrightarrow X = a_j$. Собственно, всё.

▲

Утверждение 2. Пусть X — непрерывная случайная величина, f — обратима, $Y = g(X)$, $f^{-1} = g$. Тогда $p_Y(y) = p_X(g(y)) \left| \frac{dg}{dy} \right|$.

▼

Пусть $D = f(B)$. Тогда $P(Y \in D) = P(X \in B)$ опять-таки в силу биективности f . Ну, ничего нового туда попасть не может и у всего есть прообраз. Так что (здесь будем рисовать один значок интеграла и дифференциала из экономии размера пдф-ки, хотя в этом замечании данных может и больше)

$$\int_D p_Y(y) dy = \int_B p_X(x) dx = \int_D p_X(g(y)) \left| \frac{dg}{dy} \right|$$

Якобиан тут под модулем, так как множество неориентированное. Я верю, что нам ещё про это расскажут на матане.

▲

§ 11 Матожидание и дисперсия суммы случайных величин

Утверждение 1. Пусть $X, Y, n \in (A \sim \mathbb{N})$ — две дискретные независимые случайные величины. Тогда

$$P(X + Y = n) = \sum_{k \in A} P(X = n - k) \cdot P(Y = k)$$

▼

Из формулы полной вероятности ($Y = k, k \in A$ правда полная группа)

$$P(X+Y = n) = \sum_{k \in A} P(X+Y = n \mid Y = k) \cdot P(Y = k) = \sum_{k \in A} P(X = n-k \mid Y = k) \cdot P(Y = k)$$

А вот тут уже поможет независимость X, Y .

$$\dots = P(X = n - k) \cdot P(Y = k)$$

▲

Утверждение 2. Пусть $X_1, X_2, n \in \mathbb{R}$ — две непрерывные независимые случайные величины. Тогда

$$p_{X_1+X_2}(y) = \int_{\mathbb{R}} p_1(y-t)p_2(t) dt$$



Пусть $Y = X_1 + X_2$. Тут видно, что нет биекции, придется руками что-то делать.

$$F_Y(y) = \iint_{x_1+x_2 < y} p(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{y-x_1} p(x_1, x_2) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^y p(x_1, u-x_1) du$$

Переменные независимы, так что можно поменять местами интегралы (ещё же по области интегрируем, неважно как)¹ А тогда, убирая внешний интеграл из определения функции распределения, получаем

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t, y-t) dt$$

Поскольку X_1, X_2 независимы, то $p(t, y-t) = p_1(t) \cdot p_2(y-t)$. Нумерация никого не интересует, так что

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p_1(y-t) \cdot p_2(t) dt$$



Теперь можно перейти и к содержанию билета

Утверждение 3. $M(\sum_i X_i) = \sum_i M X_i$. Да и вообще оно линейно.



Пусть $f(X, Y) = X + Y$

$$\begin{aligned} M(X+Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} y p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \right) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \right) dy \\ &= M X + M Y \end{aligned}$$

Покажем, что $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = p_X(x)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \right) dy &= F(x, +\infty) = P(X < x, Y < +\infty) \\ &= P(\omega \mid X(\omega) \in (-\infty, x], Y \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}) \\ &= P(X < x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(x) dx \end{aligned}$$

Опять-таки интервал можно сжать как угодно, правда снова проблемы с непрерывностью.

Часть про константу слишком очевидна, не будем её доказывать.



¹слишком много раз пользовались на физике, так что оставим на 4 семестр

Утверждение 4 (Дисперсия суммы). $D(\sum_i X_i) = \sum_i D X_i$

▼

Сначала заметим, что $D X = M(X - M X)^2$, $M(X - M X) = M X - M X = 0$

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= M(X + Y - M(X + Y))^2 = M((X - M X) + (Y - M Y))^2 \\ &= M(X - M X)^2 + M(Y - M Y)^2 + 2 M(X - M X) M(Y - M Y) \\ &= D X + D Y \end{aligned}$$

▲

Утверждение 5. Если X, Y — независимы, то $M X Y = M X M Y$

§ 12 Матожидание функции случайной величины

Определение 1 ($\ddot{\sim}$). Пусть $f(X)$ — функция от случайной величины. Тогда

$$M f(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p(x) dx.$$

В случае чего он многомерный, просто прикидывается. Существует, если есть абсолютная сходимость.

Замечание. я ещё подумаю, может это всё же утверждение.

Утверждение 1. Матожидание функции линейно

Утверждение 2. Если X, Y — независимы, то $M f_1(X_1) f_2(X_2) = M f_1(X_1) M f_2(X_2)$

§ 13 Неравенство Шварца

Утверждение 1. $(M X Y)^2 \leq M X^2 M Y^2$

▼

$M(X + tY)^2 = t^2 M Y^2 + 2t M X Y + M X^2 \geq 0$ из свойств матожидания. Ну там и подынтегральная функция положительна. Тогда квадратное уравнение в правой части может иметь не более одного корня.

$$(2 M X Y)^2 - 4 M X^2 M Y^2 \leq 0 \Leftrightarrow (M X Y)^2 \leq M X^2 M Y^2$$

▲

§ 14 Характеристическая функция суммы случайных величин

Утверждение 1. Пусть X, Y — независимые случайные величины. Тогда

$$\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) \cdot \Phi_Y(t)$$

▼

Из 2.14.1

$$\Phi_{X+Y}(t) = M e^{itX} e^{itY} = M e^{itX} \cdot M e^{itY} = \Phi_X(t) \cdot \Phi_Y(t)$$

▲

Следствие 1. Если все величины одинаково распределены, то $\Phi_{X_1+\dots+X_n}(t) = (\Phi(t))^n$,

$$p_{X_1+\dots+X_n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (\Phi(t))^n dt$$

§ 15 Суммирование большого числа случайных величин

:set aflameX~

Теорема 1 (ЦПТ Линдберга-Леви-Агекияна ~). Пусть X_1, \dots, X_n — независимые одинаково распределённые случайные величины. Пусть к тому же $S_n = X_1, \dots, X_n$, $0 < D X_k < \infty$. Пусть $M X_k = a$, $D X_k = \sigma$. Тогда при $n \rightarrow \infty$ $Z_n \sim N(0, 1)$, в вариации из Агекияна $S_n \sim N(na, n\sigma^2)$

□ Пусть $M X_k = a$, $D X_k = \sigma^2$. Рассмотрим характеристическую функцию $\Phi(t) = M e^{itX_k}$. Введём замену (которая z-преобразование.):

$$z_n = \frac{S_n - an}{\sigma\sqrt{n}}$$

Давайте ещё немного схитрим и положим $X_k \leftarrow X_k - a$. А то потом будет много возни с бедным a . При этом $z_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}$ Тогда

$$\Phi_{z_n}(t) = M \left(e^{\frac{itS_n}{\sigma\sqrt{n}}} \right) = \left(\Phi \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) \right)^n$$

А характеристическая функция дифференцируема дважды из существования дисперсии.

$$\Phi'(0) = 0$$

$$\Phi''(0) = -\sigma^2$$

$$\Phi \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) = \Phi(0) + \Phi'(0) \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} + \Phi''(0) \frac{t^2}{2\sigma^2 n} + o \left(\frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right)$$

А при $n \rightarrow \infty$

$$\Phi \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n \Rightarrow e^{-t^2/2}$$

Здесь сходимость есть на любом конечном интервале, но вот про всю прямую этого уже не скажешь. Так что снова поднимается вопрос какой теоремой о непрерывном соответствии пользоваться. Но если ей воспользоваться (тут потихому применили обратное преобразование Фурье), то

$$p_{z_n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-s^2 + s^2 - 2its - t^2}{2} = \frac{e^{-s^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left(- \underbrace{\left(\frac{t + is}{\sqrt{2}} \right)}_{\eta}^2 \right) d\eta = \frac{e^{-s^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$F_{Z_n}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-s^2/2} ds$$

Дальше — вариация из Агекияна. Используя утверждение 2.10.2 про замену переменной как раз получаем нормальное распределение. Только тут нужно поменять в процессе σ

$$Z_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}$$

$$F_{S_n}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2 n}} du$$

Вернёмся обратно к ненулевому a

$$S_n \leftarrow S_n - na$$

$$F_{S_n} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(u-na)^2}{2\sigma^2 n}} du$$

$$S_n \sim N(na, n\sigma^2)(n \rightarrow \infty)$$

■

§ 16 Центральная предельная теорема

Теорема 1 (ЦПТ Ляпунова). Пусть $\{X_k\}$ — независимые случайные величины (тут нет одинаковости распределений!). Введём горю обозначений:

$$S_n = \sum_i x_i$$

$$a_k = M X_k \quad \sigma_k^2 = D x_k \quad \gamma_k = M |X_k - a_k|^3$$

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \quad C_n = \sum_{k=1}^n \gamma_k$$

Тогда

$$\frac{C_N}{B_n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \frac{S_n - A_n}{B_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Замечание. Тут какая-то жесть. Она мало где формулируется и нигде не доказывается. Что-то есть тут: [3], а здесь [1] так другую теорему обозвали

:set aflame

§ 17 Обобщённая теорема Муавра-Лапласа

Определение 1. Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и независимы. Тогда говорят, что случайная величина $\chi_n^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2$ имеет распределение χ^2 с n степенями свободы.

Утверждение 1. $p_{\chi^2}(z) = \frac{1}{2^{n/2} \cdot \Gamma(\frac{n}{2})} z^{n/2-1} e^{-z/2}$

▼

Характеристическая функция χ может быть найдена из 1 Найдём сначала характеристическую функцию X_k^2 . Для этого было бы недурно найти плотность соответствующего распределения

$$P(y < X^2 < y + dy) = P(\sqrt{y} < X < \sqrt{y + dy}) + P(-\sqrt{y} > X > -\sqrt{y + dy})$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{y+dy}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}}$$

А теперь можно и фурье-образ найти

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-y/2}}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{-\eta^2(1-2it)}{2}\right) d\eta = (1-2it)^{-1/2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Вспоминая про коэффициент получим $\Phi_k(t) = (1 - 2it)^{-1/2}$.

$$\Phi_\chi(t) = (\Phi_k(t))^n = (1 - 2it)^{-n/2}$$

Тогда

$$p_\chi(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - 2it)^{-n/2} e^{-itz} dt$$

Дальше немного жёсть

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - 2it)^{-n/2} e^{-itz} dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-l} \left(1 - 2 \frac{l}{z}\right)^{-n/2} \frac{1}{iz} dl = 2 \cdot \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2}} \int_0^\infty s^{-n/2} e^{-s} ds \\ &= 2 \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2}} \cdot \Gamma\left(1 - \frac{n}{2}\right) \end{aligned}$$

Из правила отражения для Γ -функции $\Gamma(1 - n/2) \Gamma(n/2) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi n}{2}}$. А это почти что надо. ✂там надо интеграл поаккуратнее брать.

▲

Теорема 2 (Обобщённая теорема Муавра-Лапласа). Пусть X_1, \dots, X_n — независимые случайные величины с дискретным распределением:

$$X_k: \frac{1}{p_1} \mid \dots \mid \frac{r}{p_r}$$

Рассмотрим $\nu_k = \#\{1 \leq i \leq n \mid X_i = k\}$, $1 \leq k \leq r$. Тогда

$$\sum_{k=1}^r \left(\frac{\nu_k - np_k}{\sqrt{np_k}} \right) \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$$

§ 18 Метод моментов

Здесь походу нужно все статистические определения в одном параграфе :set aflame

Вводные слова В отличие от теорвера, матстатистике неизвестно распределение случайной величины. И нужно придумать, как его восстановить по конкретной реализации. Пусть X — та самая величина, про распределение которой очень хочется узнать

Главная героиня матстатистики — выборка

Определение 1. Выборка объёма n —

1. n независимых случайных величин, распределённых так же, как и X
2. набор чисел $X_i(\omega)$, $\omega \in \Omega$ — какой-то исход. Ещё называется реализацией выборки.

Собственно, первое определение — это до испытания, а второе — уже после.

Основные задачи Пусть $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$ — множество параметров.

1. Оценивание параметров:

- Точечные оценки: $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$
- Доверительные интервалы: $P_\alpha(T_1 < \theta < T_2) = \alpha$

2. Проверка гипотез

Пусть $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$. А мы хотим узнать чему принадлежит θ .

H_0 : $\theta \in \Theta_0$ — основная гипотеза

H_1 : $\theta \in \Theta_1$ — альтернативная гипотеза

Выборочные характеристики Выберем реализацию случайной величины (выборку во втором смысле) X_1, \dots, X_n . Рассмотрим новую случайную величину:

$$\tilde{X}: \begin{array}{c|c|c} X_1 & \cdots & X_n \\ \hline \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{array}$$

Ну а дальше все выборочные характеристики определяются уже для этой случайной величины. Напомним следующее

Определение 2 (Индикатор). $I_A(X) = \begin{cases} 1, & X \in A \\ 0, & X \notin A \end{cases}, I(X < x) = \begin{cases} 1, & X < x \\ 0, & X \geq x \end{cases}$

Определение 3. Если X_1, \dots, X_n можно упорядочить, то $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ называется вариационным рядом.

✂Свойства оценок

Метод моментов

Определение 4. Пусть $F(x, \theta)$ — семейство распределений, $m(x) = M g(x)$ — какой-то момент этого распределения. Пусть известно, что $h(\theta) = m(x)$. Тогда собственно сам метод состоит в том, чтобы оценить θ как решение уравнения выше.

$$\hat{\theta} = h^{-1}(m(x))$$

В случае чего там векторы, но особо не страшно.

Пример 1. <+примеры про непрерывные распределения+>

§ 19 Метод максимального правдоподобия

Определение 1. За $p(x, \theta)$ обозначим плотность функции распределения $F(x, \theta)$ в точке x в случае непрерывного распределения и $P(X = x)$ в случае дискретного.

Определение 2. Пусть $\{X_k\}$ — n независимых случайных величин. Тогда $L(\theta) := \prod_{k=1}^n f_\theta(X_k)$ — функция правдоподобия. Ещё берут её логарифм.

Генеральная совокупность		Выборка	
Матожидание	$M X$	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_k X_k$	Выборочное среднее
Дисперсия	$D X$	$S^2 = \frac{1}{n} \sum_k (X_k - \bar{X})^2$	Выборочная дисперсия
Момент порядка l	$M X^l$	$m_l = \frac{1}{n} \sum_k X_k^l$	
Ковариация	$M(X - M X)(Y - M Y)$	$\frac{1}{n} \sum_k (X_k - \bar{X})(Y_k - \bar{Y})$	
Ассиметрия (γ_3)	$M(X - M X)^3 / \sigma^3$	$\frac{1}{n} \sum (X - \bar{X})^3 / S^3$	
Эксцесс (γ_4)	$\frac{M(X - M X)^4}{\sigma^4} - 3$		
Функция распределения		$\frac{1}{n} \sum_k I(X_k < y)$	эмпирическая
Квантиль порядка $p \in (0; 1)$	$\sup\{x \mid F(x) \leq p\}$	$X_{([pn]+1)}$	член вариационного ряда

Определение 3. Сам метод состоит в следующем:

$$\hat{\theta}: L(\hat{\theta}) = \max_{\theta} L(\theta)$$

Однако проще искать максимум у $\ln L(\theta)$. Так можно в силу монотонности логарифма.

$$(\ln L(\theta))' = \frac{L'(\theta)}{L(\theta)}$$

<+гора примеров+>

§* Эффективные оценки

Утверждение 1 (Неравенство Рао-Крамера). Пусть $\theta, \hat{\theta}$ — параметр и его оценка, $b(\theta) = M(\hat{\theta} - \theta)$ — смещение оценки, $I(\theta)$ — информация Фишера, $F(x, \theta)$ — параметрическое семейство распределений.

$$I(\theta) = M \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X, \theta) \right)^2,$$

где $p(X, \theta)$ из определения 2.19.1. Если выполнены условия регулярности

1. Существует $C \subset \mathbb{R}: \forall \theta \in \Theta P(X_1 \in C) = 1$ и $\forall y \in C \sqrt{p(X, \theta)} \in C_{\theta}^1(\Theta)$

2. $I(\theta) \in C_{\theta}(\Theta)$, $I \geq 0$

и $D \hat{\theta}$ ограничена на любом компакте $\subset \Theta$,

то

$$M(\hat{\theta} - \theta)^2 \geq \frac{(1 + b'(\theta))}{nI(\theta)} + b^2(\theta)$$

Замечание 1. Всякая регулярность нужна, чтобы можно было законно записать производную по параметру под интеграл.

Определение 4. Оценка называется эффективной, если для неё неравенство Рао-Крамера обращается в равенство.

§ 20 Лемма Фишера

Определение 1. Пусть X_1, \dots, X_n — независимые случайные величины с распределением $\mathcal{N}(0, 1)$. Тогда $\sum_i X_i^2$ имеет распределение χ^2 с n степенями свободы. Ещё так обозначается: K_n

Утверждение 1. Плотность распределения χ_n^2 ищется по формуле

$$k_n = \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

Определение 2. Пусть X_1, \dots, X_n — независимые случайные величины с распределением $\mathcal{N}(0, 1)$. Тогда $\frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i X_i^2}}$ имеет распределение Стьюдента с n степенями свободы.

Утверждение 2. Плотность распределения T_n ищется по формуле

$$t_n = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

Определение 3. Пусть $C: V_1 \rightarrow V_1$. Тогда C — ортогональный, если $CC^T = E$

Следствие 1. $\det C = 1$

Следствие 2. $\|Cx\| = \|x\|$

Утверждение 3. Оператор ортогональный \Leftrightarrow строки его матрицы (как векторы линейного пространства наборов чисел) образуют ортонормированный базис.

Утверждение 4. Пусть $\{X_i\} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, C — ортогональный линейный оператор. Тогда и $Y = CX \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

▼

Докажется через утверждение о преобразовании плотности при замене переменных 2.10.2 и следствие 2. Независимость получится просто из того, что вышло нормальное распределение. А σ -у можно сначала засунуть в случайные величины, а потом вытащить обратно.

▲

Лемма 5 (Фишера). Пусть X_1, \dots, X_n независимы и $X_i \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. Тогда

$$1. \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$2. \bar{X}, S^2 \text{ независимы }^1$$

¹Здесь смещённая дисперсия

$$3. \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

$$4. \sqrt{n-1} \frac{\bar{X} - \theta}{S} \sim t_{n-1}$$

□

1. Заменим $Z_i = \frac{X_i - \theta}{\sigma}$, $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ Найдем распределение $\sum_i Z_i = \Sigma$.

$$\begin{aligned} \Phi_i(t) &= e^{-t^2/2} \\ \Phi_{S_n}(t) &= \frac{1}{n} \cdot \exp\left(-n \frac{t^2}{2}\right) = \exp\left(-\left(\frac{\sqrt{n}t}{\sqrt{2}}\right)^2\right) \Rightarrow p_{\Sigma}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{n}} \exp\left(-\frac{z^2}{2n}\right) \\ \frac{S_n - n\theta}{\sigma} &\sim \mathcal{N}(0, \sqrt{n}) \Rightarrow \frac{n}{\sqrt{n}} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \end{aligned}$$

2. Пусть

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix}$$

Первая строка как вектор имеет норму 1. А значит можно вспомнить процесс Грамма-Шмидта и набрать ортонормированный базис. Тогда C будет ортогональным. Пусть $Y = CX$. Из горы утверждений выше мы получим:

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}} = \bar{X}\sqrt{n} \\ \|Y\| &= \|X\| \Rightarrow \sum_i X_i^2 = \sum_i Y_i^2 \\ S^2 &= \frac{1}{n} \sum_i X_i^2 - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n Y_i^2 \end{aligned}$$

А дальше надо честно посчитать $\text{cov}\left(\frac{Y_1}{\sqrt{n}}, \sum_{i=2}^n Y_i\right)$. Правда ноль получается. Если что,

$$\text{cov}(X, Y) = M(X - M X)(Y - M Y) = M(XY) - M X M Y$$

$$3. \frac{nS^2}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2 = \chi_{n-1}^2$$

4. Мы там порешили, что $\theta = 0$, так что

$$\sqrt{n-1} \frac{\bar{X}}{S} = \frac{Y_1}{\sqrt{\frac{n}{n(n-1)} \sum_{i=2}^n Y_i^2}} = \frac{Y_1}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n Y_i^2}} \sim t_{n-1}$$

■

§ 21 Доверительны интервалы нормального распределения

Здесь собственно перешли к более интересной части — от точечных оценок параметров к построению для доверительных интервалов.

Определение 1. (T_1, T_2) — доверительный интервал уровня γ , если $P(T_1 < \theta < T_2) = \gamma$

Дальше всюду ведутся рассуждения про доверительные интервалы (уровня γ) параметров нормального распределения.

Утверждение 1. Доверительный интервал для θ при известном σ равен $\left(\bar{X} - \sigma \frac{z_{(1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}; \bar{X} + \sigma \frac{z_{(1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}} \right)$

▼

Интервал ищем явно симметричный, так что посчитаем

$$P \left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta|}{\sigma} < z \right)$$

Поскольку величина внутри подчиняется стандартному нормальному распределению,

$$P \left(-z < \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \theta)}{\sigma} < z \right) = F_n(z) - F_n(-z) = 2F_n(z) - 1 = \gamma$$

По дороге сделали замену переменной, не пугайтесь. А дальше $z = F_n(\frac{1+\gamma}{2})$, что как раз соответствует определению $\frac{1+\gamma}{2}$ квантили. Ну а дальше всё уже очевидно из преобразования неравенства выше. Мы умеем это делать, можно порассматривать $\{\omega \mid X(\omega) \cdots\}$ как уже делали раньше.

▲

Утверждение 2. Доверительный интервал для θ при неизвестном σ равен $\left(\bar{X} - S \frac{t_{n-1, (1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}}; \bar{X} + S \frac{t_{n-1, (1+\gamma)/2}}{\sqrt{n}} \right)$

▼

аналогично 2.21.4, только пользуемся 4 пунктом леммы Фишера 2.20.5.

▲

Утверждение 3. Доверительный интервал для σ^2 при неизвестном θ равен $\left(\frac{nS^2}{v^2}; \frac{nS^2}{u} \right)$. Чиселки u, v определяются с помощью χ^2 .

Утверждение 4. Доверительный интервал для σ^2 при неизвестном θ нормально не выражается. Проще численно.

$$1. \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

$$2. \frac{n(\bar{X} - \theta)^2}{\sigma^2} \sim \chi_1^2$$

§ 22 Проверка гипотез по параметрам нормального распределения

Будем рассматривать здесь простую гипотезу:

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

1. Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, σ^2 известно. Примем $H_0: \theta = \theta_0$. Но тогда

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta_0}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

из 1 пункта леммы Фишера (2.20.5).

Рассмотрим α — уровень значимости — какое-нибудь маленькое число. Часто берут 0.05.

$$P\left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma} > z\right) = \alpha \Leftrightarrow \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma} > z_{1-\alpha/2}$$

Таким образом можно найти границы критической области.

Если H_0 верна, то $P\left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \theta|}{\sigma} > z_{1-\alpha/2}\right)$ мала. Можно выбрать, меньше чего мы хотим её сделать, и объявить это критерием проверки. Собственно, так и делали на практике.

2. σ^2 неизвестна. Здесь всё то же самое, только с распределением Стьюдента.

А здесь такую

$$H_0: \theta_1 = \theta_2$$

$$H_1: \theta_1 \neq \theta_2$$

Будем считать, что X_i, Y_i независимы, и нормально распределены:

$$X_1, \dots, X_{n_1} \sim \mathcal{N}(\theta_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim \mathcal{N}(\theta_2, \sigma_2^2)$$

1. σ_1^2, σ_2^2 — известны.

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

2. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, но не известны

$$\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}} \sim S_{n_1 + n_2 - 2}$$

Это как раз тот самый **t-тест**

3. σ_1^2, σ_2^2 неизвестны. Тут вообще ничего не понятно. (Проблемы Беренса-Фишера)

§ 23 Линейная регрессия

Определение 1 (Регрессия). Пусть Y, X_1, \dots, X_m — случайные векторы. Тогда если определено уравнение $y(x_1, \dots, x_m) = M(Y \mid X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m)$, то y называется регрессией Y по X_1, \dots, X_m .

Определение 2 (Линейная регрессия). Пусть Y, X_1, \dots, X_m — случайные векторы. Тогда если определено уравнение $y(x) = M(Y \mid X_i = x_i \forall i)$, и $y(x) = x \cdot \theta$ то y называется линейной регрессией Y по X .

Здесь x — матрица $n \times m$, $\theta \in R^m$, $\epsilon \in R^n$, $y \in R^n$

Замечание 1. Можно с тем же успехом написать $Y = y(X) + \epsilon$, если $M \epsilon = 0$

Определение 3. Y называется откликом, X — регрессоры (предикторы), ϵ — шум, θ — параметры.

Основной метод поиска оптимальных параметров — по функции максимального правдоподобия. Если не сильно расписывать, то это выльется в $\arg \min_{\hat{\theta}} (Y - X\hat{\theta})^T (Y - X\hat{\theta})$

При этом нужны условия Гаусса-Маркова:

1. $X^T X$ обратима
2. $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ и независимы

Утверждение 1. Явное выражение для $\hat{\theta}$ при минимизации выражения выше выглядит так: $\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

▼

Пусть

$$Q(\theta) = (Y - X\theta)^T (Y - X\theta) = Y^T Y - \theta^T X^T Y - Y^T X \theta + \theta^T X^T X \theta \in R$$

В координатах это перепишется так (как обычно, суммирование по повторяющимся индексам)

$$Q(\theta) = y_i y_i - 2 y_j \theta_i X_{ji} + (X_{si} \theta_i) (X_{sj} \theta_j)$$

Тогда можно и продифференцировать

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial \theta_j} &= 2 X_{si} X_{sj} \theta_j - 2 X_{ji} y_j = 0 \Leftrightarrow 2 X^T X \theta - 2 X^T Y = 0 \Leftrightarrow \hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \\ \frac{\partial^2 Q}{\partial \theta_j \partial \theta_i} &= X_{si} X_{sj} \delta_{ij} \end{aligned}$$

Как видно, там и правда минимум. Здесь второй дифференциал просто сразу приведён к диагональному виду, и все числа на диагонали его матрицы положительны.

▲

§ 24 Теорема Гаусса-Маркова

Определение 1. Ковариационная матрица случайных векторов X, Y — матрица ковариаций их компонент

$$\text{cov}(X, Y)_{ij} = \text{cov}(X_i, Y_j) = M(X - M X)(Y - M Y)^T$$

Определение 2. $\text{cov } X = \text{cov}(X, X)$

Определение 3 (Эффективность оценок). Оценка параметра $\hat{\theta}_1$ эффективнее оценки $\hat{\theta}_2$, если матрица $\text{cov } \hat{\theta}_1 - \text{cov } \hat{\theta}_2$ отрицательно определена.

Теорема 1. Пусть

1. $X^T X$ обратима
2. $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ и независимы

Тогда

1. $\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ — несмещённая оценка θ ,
2. $\hat{\theta}$ — наиболее эффективная среди линейных несмещённых оценок

□

1. $\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T (X\theta + \varepsilon) = \theta + (X^T X)^{-1} X^T \varepsilon$. Так как $M \varepsilon = 0$, ε не зависит от X , последнее слагаемое обращается в ноль
2. Пусть $\tilde{\theta} = HY$. Такая оценка тоже будет несмещённой, если $HX = E$. Тогда

$$\text{cov } HY = (M HY - \theta)(HY - \theta)^T = M((HX - E)\theta + \varepsilon)((HX - E)\theta + \varepsilon)^T = M H \varepsilon \varepsilon^T H^T = \sigma^2 H H^T$$

Для изначальной оценки $H_0 = (X^T X)^{-1} X^T$, так что $H_0 H_0^T = (X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} = (X^T X)^{-1}$.

Покажем, что матрица $H H^T - (X^T X)^{-1}$ положительно определена. Пусть $C = H - (X^T X)^{-1}$. Тогда

$$\begin{aligned} CX &= CH - E = 0 \\ HH^T &= (C + (X^T X)^{-1} X^T)(C^T + X (X^T X)^{-1}) = CC^T + (X^T X)^{-1} \end{aligned}$$

А матрицы вида CC^T обычно (над \mathbb{R}) положительно определены.

■

§ 25 Оценка дисперсии погрешностей

Теорема 1. Пусть $S^2 = \frac{1}{n-m}(Y - X\hat{\theta})(Y - X\hat{\theta})^T$. Тогда S^2 — несмещённая оценка σ^2

Глава 3: Случайные процессы

Глава А: Обозначения

Ω — пространство элементарных исходов

ω — элемент пространства элементарных исходов

\mathcal{A} — алгебра множеств

\mathcal{F} — σ -алгебра множеств (случайные события)

P — вероятность

$p(x_1, \dots, x_n)$ — плотность вероятности

$X(\omega), Y(\omega), \xi(\omega)$ — случайная величина

$F_X(x_1, \dots, x_n)$ — функция распределения случайной величины X

$\Phi_X(t)$ — характеристическая функция случайной величины X .

✂ — ещё правится. Впрочем, относится почти ко всему.

□...■ — начало и конец доказательства теоремы

▼...▲ — начало и конец доказательства более мелкого утверждения

↪ — кривоватая формулировка

:set aflame — набирающему зело не нравится билет

<+что-то+> — тут будет что-то, но попозже

Литература

- [1] Чернова Н.И. Теория вероятностей.
- [2] Ширяев А.Н. *Вероятность*. М.: Наука, 1980.
- [3] Пономаренко Л.С. Прохоров Ю.В. *Лекции по теории вероятности и математической статистике*. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Московского университета, 2012.