

## § 1 Матрицы, основные определения

**Определение 1** (Матрицы над  $K$ ). Пусть  $K$  — поле,  $m, n \in \mathbb{N}$ . Тогда

$$M_{m,n}(K) = \left\{ A \mid A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, a_{ij} \in K \right\}$$

**Определение 2** (Сложение матриц).  $A_{mn} \cdot B_{mn}$  :

$$(a + b)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

**Определение 3** (Умножение матриц).  $A_{mn} \cdot B_{nk}$  :

$$(ab)_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot b_{lj}$$

## § 2 Кольцо квадратных матриц

Обозначается  $M_n(K)$

Ноль:

$$Z_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Единица:

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

## §§ 3–4 Определитель

**Определение 1.** Пусть  $A \in M_n(K)$

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{I(\sigma)} \cdot a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

**Определение 2.** Если обозначать строки  $A_1, \dots, A_n$ , а столбцы  $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$ , то можно ввести ещё такую функцию:

$$\det(A_1, \dots, A_n) = \det(A^{(1)}, \dots, A^{(n)}) := \det A$$

**Определение 3** (Элементарные преобразования).

$$\begin{array}{l|l} \text{I} & A_i \leftrightarrow A_j \\ \text{II} & A_i := A_i + \lambda A_j \\ \text{III} & A_i := \lambda A_i \end{array} \quad \begin{array}{l} A^{(i)} \leftrightarrow A^{(j)} \\ A^{(i)} := A^{(i)} + \lambda A^{(j)} \\ A^{(i)} := \lambda A^{(i)} \end{array}$$

**Определение 4** (Транспонированная матрица).

$$A^T : (a^T)_{ij} = (a)_{ij}$$

### Свойства

1. Определитель (в описанном в 0.4.2 смысле) полилинеен и кососимметричен по строкам и столбцам.
2. Если 2 строчки или столбца одинаковые, то определитель равен 0
3. Элементарные преобразования влияют на определитель следующим образом:

$$\begin{array}{l|l} \text{I} & (-1) \det A \\ \text{II} & \det A \\ \text{III} & \lambda \det A \end{array}$$

4.  $\det A^T = \det A$

## § 5 Теорема Лапласа

**Определение 1** (Минор). Пусть  $A \in M_n(K)$ , а  $k \in \mathbb{N}$ . Тогда определитель подматрицы, собранной из  $k$  строк и  $k$  столбцов называется *минором* порядка  $k$ .

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_k j_1} & \cdots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}$$

$\Delta'$  — дополнительный минор— всё, что осталось. Его ещё иногда (когда минор— один элемент) обозначают как  $M_{ij}$

**Определение 2** (Алгебраическое дополнение).

$$A_\Delta = (-1)^{i_1 + \cdots + i_k + j_1 + \cdots + j_k} \Delta'$$

**Теорема 1** (Теорема Лапласа). Пусть  $A \in M_n(K)$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . Выберем из матрицы  $k$  строчек. Тогда

$$\det A = \sum_{\Delta} \Delta \cdot A_\Delta$$

где  $\Delta$  — любой минор, содержащий нужные  $k$  строчек.

□ Выберем какой-то один минор,  $i_k$  — его строчки,  $j_\ell$  — его столбцы

$$\Delta : \begin{cases} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{cases}$$

Теперь отправим все элементы, попавшие в минор, в левый верхний угол. Сначала сдвинем все строчки:

[illegible]

Потом все столбцы

[illegible]

В итоге, из свойств элементарных преобразований, получим:

$$\det B = (-1)^{i_1-1+\dots+i_k-k+j_1-1+\dots+j_k-k} \det A = (-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k} \det A$$

так как все добавки парные  $\Rightarrow$  делится на 2.

С другой стороны,  $\Delta$  и  $\Delta'$  никак не поменялись, так как переставляемые чиселки в них не входят. Также нужно отметить, что  $B_\Delta = \Delta'$ , по тем же причинам, в общем-то.

Посмотрим, что такое  $\Delta \cdot \Delta'$  <sup>1</sup>.

$$\Delta \cdot \Delta' = \left( \sum_{\tau \in S_k} (-1)^{I(\tau)} b_{1\tau(1)} \cdots b_{k\tau(k)} \right) \cdot \left( \sum_{\tau' \in S_{n-k}} (-1)^{I(\tau')} b_{k+1\tau'(k+1)} \cdots b_{n\tau(n)} \right)$$

Пусть теперь  $\sigma = \tau \circ \tau'$ . Тогда  $I(\sigma) = I(\tau) + I(\tau')$  по свойствам перестановок, а  $\sigma$  фактически разбивается на 2 независимых цикла:  $\tau$  и  $\tau'$ . В итоге

$$\Delta \cdot \Delta' = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{I(\sigma)} b_{1\sigma(1)} \cdots b_{n\sigma(n)}$$

А это вообще-то правильный кусок определителя  $B$ . Поймём, что это за кусок определителя  $A$ . Числа-то те же самые. А вот на вопрос со знаком мы уже по сути ответили, когда рассуждали про определитель.

<sup>1</sup>Вообще, тут маленькая неточность: здесь фактически *действие* группы перестановок на множестве  $\{k+1, \dots, n\}$

Слагаемые точно не перемешиваются, так что каждое слагаемое просто умножается на  $(-1) \cdots$ . Так что

$$\begin{aligned}\Delta \cdot \Delta' &= (-1)^{i_1 + \cdots + i_k + j_1 + \cdots + j_k} \sum_{\sigma'} a_{1\sigma'(1)} \cdots a_{n\sigma'(n)} \\ A_\Delta &= (-1)^{i_1 + \cdots + i_k + j_1 + \cdots + j_k} \Delta' \\ \Delta \cdot A_\Delta &= \sum_{\sigma'} a_{1\sigma'(1)} \cdots a_{n\sigma'(n)}\end{aligned}$$

где у  $\sigma'$  уже другие независимые циклы:  $\begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix}$  и всё остальное.

■

**Следствие 1.**

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

**Следствие 2.**

$$a_{j1}A_{i1} + \cdots + a_{jn}A_{in} = 0$$

▼

Приравняем  $i$  строчку к  $j$ -ой, получим матрицу  $B$ . Тогда

$$a_{j1}A_{i1} + \cdots + a_{jn}A_{in} = b_{i1}B_{i1} + \cdots + b_{in}B_{in} = \det B = 0$$

Так как определитель  $B$  очевидно равен 0

▲

## § 6 Ступенчатая матрица

**Определение 1.**  $A =$ 

$A_1$		
	$A_2$	
		$\ddots$
$0$		$A_n$

 $—$  ступенчатая матрица.

**Теорема 1** (Определитель ступенчатой матрицы).

$$\det A = \det A_1 \cdots \det A_n$$

□ По индукции через теорему Лапласа [0.5.1](#) ■

## § 7 Определитель произведения матриц

**Теорема 1.** Пусть  $A, B \in M_n(K)$ . Тогда

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

□ Докажем, что такие матрицы имеют одинаковый определитель:

$$C = \left( \begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline -E_n & B \end{array} \right) \quad \text{и} \quad D = \left( \begin{array}{c|c} AB & A \\ \hline 0 & -E_n \end{array} \right)$$

■