

Universität Wien
Fakultät für Physik

Laborpraktikum Theoretische Physik 2021S

Milutin Popovic & Tim Vogel

Betreuer: Dr. Stefan Palenta

May the 26th, 2021

Abstract

Contents

1 Kugelkoordinaten in \mathbb{R}^3	1
2 Differentialoperatoren	3
3 Schwarzschild Metic	5
4 Inkompressibler Relativistischer Stern	7

1 Kugelkoordinaten in \mathbb{R}^3

Im euklidischen \mathbb{R}^3 Raum werden die Basisvektoren mit partiellen Ableitungen identifiziert. In kartesischen Koordinaten wird e_x, e_y, e_z mit $\partial_x, \partial_y, \partial_z$ identifiziert. Der Basisvektor e_x z.B. gibt an in welche Richtung sich ein Punkt P verschiebt, wenn man die Koordinate x um ein dx vergrößert. Die Koordinatendifferentiale sind dann dx, dy, dz und die in der euklidischen Metrik gilt dann $dx^i(\partial_j) = \partial_j x^i = \delta_j^i$.

Das selbe Spiel kann man mit Kugelkoordinaten machen

$$x^i = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1)$$

Die Kugelkoordinaten Basisvektoren ∂_r , ∂_ϕ , ∂_θ werden durch die Kettenregel berechnet

$$\partial_r = \partial_r \partial^i \partial_i \quad (2)$$

$$= \sin \theta \cos \phi \partial_x + \sin \theta \sin \phi \partial_y + \cos \theta \partial_z \quad (3)$$

$$\partial_\theta = \partial_\theta \partial^i \partial_i \quad (4)$$

$$= -r \cos \theta \sin \phi \partial_x + r \cos \theta \sin \phi \partial_y - r \sin \theta \partial_z \quad (5)$$

$$\partial_\phi = \partial_\phi \partial^i \partial_i \quad (6)$$

$$= -r \sin \theta \sin \phi \partial_x + r \sin \theta \cos \phi \partial_y \quad (7)$$

Die Einheitsvektoren sind die normierten Basisvektoren

$$e_r = \partial_r; \quad e_\theta = \frac{1}{r} \partial_\theta; \quad e_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\phi. \quad (8)$$

Wichtiger einschub ist, dass die Lie-Klammer $[e_r, e_\phi]$ nicht verschwindet.

$$[e_r, e_\theta] = e_r e_\theta - e_\theta e_r = \partial_r \frac{1}{r} \partial_\theta - \frac{1}{r} \partial_\theta \partial_r = \quad (9)$$

$$= -\frac{1}{r^2} \partial_\theta + \frac{1}{r} \partial_r \partial_\theta - \frac{1}{r} \partial_\theta \partial_r = \quad (10)$$

$$= \frac{1}{r} ([\partial_r, \partial_\theta] - \partial_\theta) \quad (11)$$

was bedeutet, dass e_r nicht mit e_θ kommutiert. Damit die Einheitsvektoren eine Koordinatenbasis bilden können müssen sie linear unabhängig voneinander sein, da sie aber eine nicht-triviale Lie-Klammer besitzen, sind sie nicht linear unabhängig und können somit keine Koordinatenbasis sein kann.

Die Metrik g_{ij} in Kugelkoordinaten ist verschwindend für alle $i \neq j$, sie kann sie ausgerechnet werden durch

z.B. $g_{rr} = \bar{g}(\partial_r, \partial_r)$.

$$g_{rr} = (\sin \theta \cos \phi e_x + \sin \theta \sin \phi e_y + \cos \theta e_z)^2 \quad (12)$$

$$= 1 \quad (13)$$

$$g_{\phi\phi} = (-r \sin \theta \sin \phi e_x + r \cos \phi \sin \phi e_y)^2 = \quad (14)$$

$$= r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi \quad (15)$$

$$= r^2 \sin^2 \theta \quad (16)$$

$$g_{\theta\theta} = (r \cos \theta \sin \phi e_x + r \cos \phi \sin \phi e_y - r \sin \theta e_z)^2 \quad (17)$$

$$= r^2 \quad (18)$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (19)$$

Weiteres können wir die kovariante Ableitung ∇_{∂_a} (kurz ∇_a eines Vektorfeldes $X = X^b \partial_b$ entlang ∂_a betrachten, dabei tauchen die Cristoffelsymbole Γ_{ab}^c auf.

$$\nabla_{\partial_a}(X^b \partial_b) = (\nabla_{\partial_b} X^b) \partial_b + X^b (\nabla_{\partial_a} \partial_b) = \quad (20)$$

$$= (\nabla_{\partial_b} X^b) \partial_b + X^b \Gamma_{ab}^c \partial_c \quad (21)$$

Die Christoffelsymbole sind gegeben durch die Metrik-Komponenten.

$$\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{ce} (\partial_a g_{eb} + \partial_b g_{ea} - \partial_e g_{ab}). \quad (22)$$

Offensichtlich verschwinden die Christoffelsymbole bezüglich der karthesischen Koordinatenbasis, da $g_{ij} = \delta_{ij}$ konstant ist. Nun berechnen wir die Christoffelsymbole $\Gamma_{\theta\phi}^d$ und $\Gamma_{\phi\phi}^d$ bezüglich den Kugelkoordinaten ($d \in \{r, \theta, \phi\}$).

$$\Gamma_{\theta\phi}^r = \frac{1}{2} g^{rr} (\partial_\theta g_{\phi r} + \partial_\phi g_{\theta r} - \partial_r g_{\theta\phi}) = 0 \quad (23)$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -\frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{\phi\phi} = -r \sin^2 \theta \quad (24)$$

$$\Gamma_{\theta\phi}^\theta = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\phi g_{\theta\theta} = 0 \quad (25)$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\phi\phi} = -2 \sin 2\theta \quad (26)$$

$$\Gamma_{\theta\phi}^\phi = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} \partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot \theta \quad (27)$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^\phi = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} \partial_\phi g_{\phi\phi} = 0. \quad (28)$$

Die Christoffelsymbole sind symmetrisch bezüglich der Vertauschung der kovarianten Indizes, d.h.

$$\Gamma_{\phi\theta}^r = 0 \quad (29)$$

$$\Gamma_{\phi\theta}^\theta = 0 \quad (30)$$

$$\Gamma_{\phi\theta}^\phi = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} \partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot \phi \quad (31)$$

2 Differentialoperatoren

In der Allgemeinen Relativitätstheorie ist eine allgemeine Metrik gegeben, eine symmetrische $n \times n$ Matrix g_{ab} . Mit der inversen Metrik g^{ab} ergibt sich die triviale Identität $g_{ab}g^{bc} = \delta_a^c$. Mithilfe der Determinante $g := \det(g_{ab})$ und der Cramer'schen Regel kann auf die inverse Matrix umgeformt werden.

$$g = g_{ab} \operatorname{adj}(g_{ab}) \quad (32)$$

Differentiert man diese Gleichung auf beiden Seiten mit $\frac{\partial}{\partial g_{ij}}$

$$\frac{\partial g}{\partial g_{ij}} = \delta_{ab}^{ij} \operatorname{adj}(g_{ab}) = \operatorname{adj}(g_{ij}) = g^{ab} \cdot g \quad (33)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{g} \frac{\partial g}{\partial g_{ij}} = g^{ab}. \quad (34)$$

Als nächstes zeigen wir eine Relation für Christoffelsymbole $\Gamma_{\mu\nu}^\mu$ bezüglich einer allgemeinen Metrik.

$$\Gamma_{\mu\nu}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\rho} (\partial_\nu g_{\mu\nu} + \partial_\mu g_{\nu\rho} - \partial_\rho g_{\mu\nu}) = \quad (35)$$

$$= \frac{1}{2} g^{\mu\rho} \partial_\nu g_{\mu\rho}. \quad (36)$$

Betrachtet man die Ableitung von g nach ∂_ν bekommt man

$$\partial_\nu g = g g^{\mu\rho} \partial_\nu g_{\mu\rho} \quad (37)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial_\nu g}{g} = g^{\mu\rho} \partial_\nu g_{\mu\rho}. \quad (38)$$

Man kann die wurzel von g , \sqrt{g} betrachten dann kommt ein Faktor von $\frac{1}{2}$ durch die Kettenregel und es ergibt sich die allgemeine Relation

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\nu \sqrt{g} = g^{\mu\rho} \partial_\nu g_{\mu\rho} = \Gamma_{\mu\nu}^\mu. \quad (39)$$

Weiteres zeigen wir eine weitere Relation zur kovarianten Ableitung eines Vektorfeldes $\nabla_a A^a$

$$\nabla_a A^a = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} A^a). \quad (40)$$

Nun mithilfe von dem Levi-Civita-Zusammenhang

$$\nabla_a A^a = \partial_a A^a + \Gamma_{ac}^a A^a \quad (41)$$

um das Christoffelsymbol auszurechnen benutzen wir die allgemein gültige Relation

$$\nabla_a A^a = \partial_a A^a + \left(\frac{1}{\sqrt{g}}\right) \partial_a (\sqrt{g}) A^a = \quad (42)$$

$$= \partial_a A^a + \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} A^a) - \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{g}} \partial_a A^a = \quad (43)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} A^a) \quad (44)$$

Das selbe kann man mit eine antisymmetrischen $(2,0)$ Tensor $F^{ab} = -F^{ba}$

$$\nabla_a F^{ab} = \partial_a F^{ab} + \Gamma_{ac}^a F^{cb} \Gamma_{ac}^b F^{ac} \quad (45)$$

wobei hier das letztere Christoffelsymbol Γ_{ac}^b verschwindet wegen der antisymmetrie des Tensors F^{ac} . Weiterhin schreiben wir wieder die allgemeine Relation für Γ_{ac}^a und wenden die umgekehrte Produktregel an, somit kommen wir auf

$$\nabla_a F^{ab} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_c (\sqrt{g} F^{ca}) \quad (46)$$

In der Elektrodynamik ist F^{ab} der Maxwelltensor und die oberen Gleichungen representieren die Maxwellgleichungen.

$$\nabla_a F^{ab} = J^b \quad (47)$$

Die kontinuierätsgleichung $\nabla_b J^b = 0$ kann leicht gezeigt werden

$$\nabla_b \nabla_a F^{ab} = \nabla_b \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} F^{ab}) \right) = \quad (48)$$

$$= \partial_b \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} F^{ab}) + \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_b (\sqrt{g}) \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} F^{ab}) = \quad (49)$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a F^{ab} \partial_b \sqrt{g} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a F^{ab} \partial_b \sqrt{g} \quad (50)$$

$$= 0 \quad (51)$$

Weiterhin zeigen wir eine weitere Relation, dabei wenden wir zwei mal die kovariante Ableitung auf ein Skalarfeld U .

$$g^{ab} \nabla_a \nabla_b U = \Delta U = \nabla_a \partial^a U = \quad (52)$$

$$= \partial_a \partial^a U + \Gamma_{ac}^b \partial^a U = \quad (53)$$

$$= \partial_a \partial^a U \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} \partial^a U) = \quad (54)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} \partial^a U) \quad (55)$$

3 Schwarzschild Metic

Eine Kugelsymmetrische Raumzeit kann durch die Schwarzschild-Koordinaten beschrieben werden $\{ct, r, \vartheta, \varphi\}$, für das Linienelement haben wir den folgenden Ansatz gegeben

$$ds^2 = -e^v c^2 dt^2 + e^\lambda dr^2 + r^2 (d^2 \vartheta \sin^2 \vartheta d^2 \varphi). \quad (56)$$

wobei hier $v = v(t, r)$ und $\lambda = \lambda(t, r)$, Funktionen sind die noch bestimmt werden. Mithilfe dieses Linienelements können wir direkt die Metrik ablesen. Weiterhin setzen wir $c = 1$ und schreiben

$$ds^2 = g_{00}dt^2 + g_{11}dr^2 + g_{22}d^2\vartheta + g_{33}d^2\varphi$$

$$\Rightarrow (g_{ij}) = \begin{pmatrix} -e^v & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \vartheta \end{pmatrix} \quad (57)$$

Alle von null verschiedenen Christoffelsymbole lassen sich leicht berechnen, da die meisten Koeffizienten wegfallen aufgrund der diagonalen Metrik

$$\Gamma_{00}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{00} = \frac{1}{2} \dot{v} \quad (58)$$

$$\Gamma_{01}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_1 g_{00} = \frac{1}{2} v' \quad (59)$$

$$\Gamma_{11}^0 = -\frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{11} = \frac{1}{2} e^{\lambda-v} \dot{\lambda} \quad (60)$$

$$\Gamma_{00}^1 = -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{00} = \frac{1}{2} e^{v-\lambda} v' \quad (61)$$

$$\Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2} g^{11} \partial_0 g_{11} = \frac{\dot{\lambda}}{2} \quad (62)$$

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{22} = -e^{-\lambda} r \quad (63)$$

$$\Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} g^{22} \partial_1 g_{22} = r \quad (64)$$

$$\Gamma_{33}^2 = \frac{1}{2} g^{22} \partial_2 g_{33} = \frac{1}{2} \sin(2\vartheta) \quad (65)$$

$$\Gamma_{11}^3 = \frac{1}{2} g^{33} \partial_1 g_{33} = \frac{1}{r} \quad (66)$$

$$\Gamma_{23}^3 = \frac{1}{2} g^{33} \partial_2 g_{33} = \cot \vartheta \quad (67)$$

Nun können wir den Ricci Tensor R_{ab} ausrechnen

$$R_{ab} := R_{abc}^c = \Gamma_{ab,c}^c - \Gamma_{ac,b}^c + \Gamma_{ab}^c \Gamma_{ad}^d - \Gamma_{db}^c \Gamma_{ac}^d. \quad (68)$$

Für die Indizes 00 zeigen wir

$$R_{00} = \Gamma_{00,c}^c - \Gamma_{0c,0}^c + \Gamma_{dc}^c \Gamma_{00}^d - \Gamma_{d0}^c \Gamma_{0c}^d = \quad (69)$$

$$= \Gamma_{00,0}^0 + \Gamma_{00,1}^1 - \Gamma_{00}^0 + \Gamma_{01,0}^1 \Gamma_{0c}^0 \Gamma_{00}^0 - \Gamma_{00}^c \Gamma_{0c}^0 - \Gamma_{10}^c \Gamma_{0c}^1 = \quad (70)$$

$$= \Gamma_{00,1}^1 - \Gamma_{01,0}^1 + \Gamma_{01}^1 \Gamma_{00}^0 \Gamma_{11}^1 \Gamma_{00}^1 - \Gamma_{00}^1 \Gamma_{01}^0 - \Gamma_{10}^1 \Gamma_{01}^1 = \quad (71)$$

$$= \frac{1}{2} e^{\lambda-v} \left(\frac{v'}{r} + v'' \right) - \frac{1}{2} \ddot{\lambda} + \frac{1}{4} \dot{\lambda} \dot{v} \frac{1}{4} e^{\lambda-v} v' \lambda' - \frac{1}{4} e^{\lambda-v} v' v' - \frac{1}{4} \dot{\lambda} \dot{\lambda} = \quad (72)$$

$$= \frac{1}{2} e^{\lambda-v} \left(v'' - \frac{1}{2} (\lambda' - v') \frac{v'}{r} \right) - \frac{1}{2} \ddot{\lambda} + \frac{1}{4} \dot{\lambda} (\dot{v} - \dot{\lambda}). \quad (73)$$

Die anderen nicht-trivialen Koeffizienten lauten

$$R_{11} = e^{\lambda-v} \left(\frac{1}{2} \ddot{\lambda} + \frac{1}{4} \dot{\lambda} (\dot{\lambda} - \dot{v}) \right) - \frac{1}{4} v' (\lambda' - v') + \frac{\lambda'}{r} \quad (74)$$

$$R_{22} = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \frac{1}{2r} (v' - \lambda') \right) \quad (75)$$

$$R_{23} = \sin^2 \vartheta R_{22} \quad (76)$$

$$R_{01} = R_{10} = \frac{\dot{\lambda}}{r}. \quad (77)$$

Im Vakuum besagen die Einsteinschen Feldgleichungen, dass $R_{ab} = 0$ für alle a, b , somit folgt sofort aus $R_{01} = 0$ dass $\lambda = \lambda(r)$. Die Funktion λ hängt nur vom Abstand ab. Differenziert man R_{22} nach der 0 Koordinate so erhält man ein Ergebnis für v

$$\partial_0 R_{22} = -e^{-\lambda} \dot{\lambda} \left(1 + \frac{r}{2} (v' - \lambda') \right) + e^{-\lambda} \frac{r}{2} \partial_0 v' = 0 \quad (78)$$

$$\Rightarrow \partial_0 \partial_1 v = \partial_1 \partial_0 = 0 \quad (79)$$

$$\Rightarrow \partial_0 v = 0 \Leftrightarrow v = v(r) \quad (80)$$

weiterhin zeigen wir, dass $\lambda = -v$ indem wir folgendes rechnen

$$R_{00} + e^{\lambda-v} R_{11} = 0 \quad (81)$$

$$\frac{\lambda'}{r} + \frac{v'}{r} = 0 \Rightarrow \lambda = -v. \quad (82)$$

Aus $R_{22} = 0$ und der obigen Relation lässt sich eine Differentialgleichung für v aufstellen

$$R_{22} = 1 - e^v \left(1 + \frac{1}{2} r (v' + v') \right) = \quad (83)$$

$$= 1 - e^v (1 + v' r) = 0. \quad (84)$$

Diese kann man leicht durch Separation der Variablen lösen

$$\int \frac{dv}{e^{-v} - 1} = \int \frac{1}{r} dr \quad (85)$$

$$\Rightarrow e^v = 1 - \frac{r_S}{r} \quad (r_S \in \mathbb{R}) \quad (86)$$

4 Inkompressibler Relativistischer Stern

Wir berechnen nun den Druckverlauf eines relativistischen Sterns mit konstanter Massendichte μ mithilfe der TOV-Gleichung. Der Druck an der Sternoberfläche ist $p(r_0) = 0$. In der Rechnung substituieren wir $P = \kappa p$, $A = \frac{8\pi\mu}{3c^2}$ und $x = r^2 \Rightarrow dr = \frac{dx}{2r}$. Weiters ist zu beachten, dass $\mu = \text{konst.}$ und somit die Masse des Sterns gegeben ist durch

$$m(r) = m = 4\pi \int_0^r \mu \tilde{r}^2 d\tilde{r} = \frac{4\pi}{3} \mu r^3 \quad (87)$$

Wir kommen auf die folgende Differentialgleichung.

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{(3A + P)(A + P)}{(1 - Ax)}. \quad (88)$$

Diese lässt sich durch Separation der Variablen lösen und mithilfe von $p(r_0) = 0$ bekommen wir die Lösung

$$P(r) = 3A \left(\frac{\sqrt{\frac{1-Ar^2}{1-Ar_0^2}} - 1}{3 - \sqrt{\frac{1-Ar^2}{1-Ar_0^2}}} \right) \quad (89)$$

Der Zentraldruck p_c ist gegeben durch

$$p_c = p(0) = \frac{3A}{\kappa} \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{1-Ar_0^2}} - 1}{3 - \sqrt{\frac{1}{1-Ar_0^2}}} \right) \quad (90)$$

Weiteres aus $e^{\lambda(r)} > 0$ folgt $e^{\lambda(r_0)} > 0$, was ergibt

$$\sqrt{1 - Ar_0^2} > \frac{1}{3} \quad (91)$$

$$\Rightarrow r_0 > \sqrt{\frac{8}{9A}} \quad (92)$$

hieraus leiten wir die obere Schranke der Masse ab, da $\mu = \text{konst.}$ rechnet sich M wie oben, $M = \frac{4\pi}{3} \mu r_0^3$. Wir quadrieren die Ungleichung von oben und setzen für A ein, es ergibt sich

$$M < M_{\max} = \frac{4c^3}{9\sqrt{3\pi G^3 \mu}} \quad (93)$$

Die beiden Metrischen Funktionen lassen sich leicht durch einsetzen herausfinden

$$e^{\lambda(r)} = \frac{1}{1 - Ar^2} \quad (94)$$

$$e^{\nu(r)} = e^{-\lambda(r)} = 1 - Ar^2 \quad (95)$$

Aus $Ar_0^2 = \frac{r_s}{r_0}$ ergibt sich die Buchdahl Grenze

$$Ar_0^2 = \frac{r_s}{r_0} < \frac{8}{9} \quad (96)$$

Für den gravitative Massendeffekt berechnen wir $\Delta M = M_1 - M$, wobei M_1 durch das folgende Integral gegeben ist.

$$M_1 = 4\pi \int_0^{r_0} \mu(r) e^{\lambda(r)/2} r^2 dr = \quad (97)$$

$$= \frac{4\pi\mu}{\int_0^{r_0}} \sqrt{\frac{1}{1-Ar^2}} r^2 dr = \quad (98)$$

$$= \frac{2\pi\mu}{A^{3/2}} (\arcsin(\sqrt{A}r_0) - A r_0 \sqrt{1-Ar_0^2}) \quad (99)$$

Dann ist ΔM

$$\Delta M \frac{2\pi\mu}{A^{3/2}} (\arcsin(\sqrt{A}r_0) - A r_0 \sqrt{1-Ar_0^2}) + \frac{4\pi}{3} \mu r_0^3 \quad (100)$$

Der Newtonische Grenzfall der gravitativen Bindungsenergie ist

$$W = -\Delta M c^2 = -c^2 \left(4\pi \int_0^{r_0} \frac{1}{\sqrt{1-Ar^2}} r^2 dr + \frac{4\pi}{3} \mu r_0^3 \right) \quad (101)$$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} W = -4\pi G \int_0^{r_0} m r dr = 2\pi G m r_0^2 \quad (102)$$

References

- [1] Reinhard Meinel. *Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie für Bachelorstudenten*. Springer-Verlag, 2019. ISBN: 978-3-662-58966-3.
- [2] Piotr Chruściel. *Elements of General Relativity*. Birkhäuser, 2019. ISBN: 978-3-030-28415-2.
- [3] Reiner Oloff. *Geometrie der Raumzeit, Eine mathematische Einführung*. Springer-Verlag, 2018. ISBN: ISBN 978-3-662-56736-4.